



四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

# 四庫全書存目叢書

子部  
第四四冊






魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

E66310

## 四庫全書存目叢書·子部四四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 44.625 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

# 子部第四冊目次

## 子部・醫家類

丹溪心法附餘二十四卷首一卷

〔明〕方廣撰  
清華大學圖書館藏明萬曆二十八年刻本

上池雜說一卷

〔明〕馮時可撰  
中國科學院圖書館藏清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

丹溪心法附餘二十四卷首

一卷

〔明〕方廣撰

清華大學圖書館藏明萬曆二十八年

刻本

附《四庫全書總目·丹溪心法

附餘二十四卷》提要

丹溪心法附餘序

竊惟人之有生負陰抱陽而形神爰發故其為情不能無感如喜怒之動於中寒暑之盪於外是以痾瘵攸萌而天昏凶札之患所不免也粵自上古軒岐首出巫彭繼起內經作而醫道興矣迨至中古代有其人而醫道以傳秦漢以還下及近代若張長沙李東垣劉河間朱丹溪之四子者皆深於醫而各極其聖者也其所著方書口義傳布既久不能無舛而世之庸士往往昧此而不知變膠固拘泥藥罔奏功遂使微言奧義舉失其真毫釐之差千里之謬貽患可勝言哉予以多病懇乞

賜休林下暇日檢方亦竊疑之於是遠延方君過賴因出所次丹溪心法附餘凡



二十四卷相與訂之夫方君名廣字約之古菴其號新安儒醫也嘗遊河洛旅寓陳留野亭劉公亦雅重之恒以藥活人乃謂是書超邁群識尤切日用雖經楊楚玉輩再纂而不能備集脉訣之詳程用光氏翻刻而不能盡芟附錄之誤於是重加櫟括訛者正之偽者去之且萃諸君子方論於下精切簡要不畔古

心法附餘前序

二

附錄

經銓次成帙間亦竊附己意以發明之嗚呼三皇之書古稱墳典所謂內經乃其一焉實與周易分庭抗禮柰何人自易之目為末技則其道安得與易並傳哉方君沉潛古典有年矣惟是書之成幾易星霜而於藥脉證治分演詳明論著切當有識之士謂真有補於丹溪不惑乎後學矣功亦偉哉吾省大方伯姚

陳二公見而喜之因命工鋟梓以嘉惠人人甚盛心也方懇請為序遂書此刻諸卷端外有地理書藥性書傷寒書若干卷亦君手自為之欲同惠諸人而未果者茲固不贅及云

嘉靖十五年歲丙申秋七月朔旦特進光祿大夫柱國少保兼太子太保禮部尚書

心法附餘前序

三

附錄

武英殿大學士知制誥同知經筵國史總裁致仕臨潁貢詠書于南塢草堂之暇

丹溪心法附餘序

昔予母年艾時以家事繁冗不暇啜粥惟飲冷酒以致內傷脾胃遍身發出赤斑是時天庖瘡傳深斑與相類醫之者多不能辯遽然而卒罔覺其咎蓋斑無頭粒瘡有頭粒易分別而不知爾厥後葬母不得已而與鄰人訟三載始白既而感激乃志於學讀書之餘恒取醫書

心法附餘前序

四

無天

丹溪心法覽之見其所謂飲食內傷脾胃發出赤斑之論乃喟然悲歎其前病果誤於醫者正程夫子所謂病卧於床委之庸醫譬之不孝者也終天之恨曷有窮耶由是心之於醫若口之於芻豢不能釋也竊惟斯道肇自軒岐迄漢而下代不乏賢求其可以為萬世法者張長沙外感李東垣內傷劉河間熱證朱

丹溪雜病數者而已然而丹溪實又貫通乎諸君子尤號集醫道之大成者也先生既沒而其遺書則有丹溪心法傳于世蓋其術至精故其為言至切寔保命之良規濟人之妙訣也惜乎是書詳於法而猶畧於方袖珍等書則又詳於方而畧於法皆不便檢閱時祥符鄭尚宜張汝孝輩亦達於醫者也以予言為

心法附餘前序

五

然予於是乃將心法去訛留正群方剛繁就簡合為一書凡五年餘始脫藁不敢他有所名名之曰丹溪心法附餘其間病目分之以門藥方聚之以類每證之下先具心法後附羣方俾法不離乎方方不離乎法又取丹溪本草衍義補遺及崔真人脉訣舉要王節齋明醫雜著附載于中而於醫之藥性脉理病機

治法經絡運氣六者粗備其正誤補闕以俟後之君子然初學之士與養生之家或有取焉庶乎得醫道之正而不為他岐所惑僭妄之罪固知無所逃矣謹序

嘉靖十五年丙申春三月穀旦新安後學方廣序

立書本旨

予觀得醫道之全者丹溪一人發丹溪之蘊者心法一書然其書自程用光重訂之後若無餘憾第附錄不盡削去而與正法矛盾焉丹溪纂要醫學集成雖能備丹溪群書然因心法混淆而采取亦不免於差謬蓋丹溪群書其門人戴元禮趙以德劉叔淵已采載於丹溪心法之上矣而纂要集成二書又是將丹溪群書翻謄一次今已百年之後追想其人之言何若親炙領教之為的哉王機微義蒐輯群書條陳潔白為醫書之折衷惜乎丹溪心法而不得與焉袖珍方乾坤生意保生餘錄等書雖備群方然其間有一等用藥辛香燥熱與夫眩之劑寔非氣血虛者所宜乎因此而留心焉今除王機微義一書不煩之外謹將丹溪心法除去附錄止以正法正方具于前群書惟取切合病情之劑附于後彪分臚列集為一書名曰丹溪心法附餘將與王機微義同驅並駕于世而醫之方書庶幾乎備矣觀者詳焉



凡例

- 一病目謹依丹溪心法之舊凡有增入者註新增二字以別之其間以門而分者庶見病機之同也
- 一各證首具丹溪正法正方依程用光考索精確為醫門萬世之規矩準繩者也
- 一附諸賢論庶見病之源流治之方法也不能悉載其間有闕者君子宜於玉機微義求之
- 一附脉理庶知病之陰陽表裏虛實寒熱之情也亦不能悉載其間有闕者宜於脉經脉訣求之
- 一附諸方以輔丹溪所不及其間以類而聚者庶見治法之異也然方書汗牛充棟不勝其多姑取不違於理者列載于上以待君子采擇焉
- 一王節齋明醫雜著方論取附于各證之下蓋節齋深得丹溪之旨故備載以俟參考焉
- 一病證久發明處藥方有疑難處予綴俗說以通之有廣按二字別之倘有差謬後之君子幸賜教焉
- 一丹溪本草衍義補遺雖另成一書然陝板蜀板閩板丹溪心法咸載之程用光重訂丹溪心法而徽板乃削去之反不為美今仍取載書首使人獲見丹溪用藥之旨也

門類目錄

- |     |     |     |     |    |      |
|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 外感門 | 中風  | 傷風  | 中寒  | 傷寒 | 中暑   |
| 中濕  | 瘟疫  | 內傷門 | 內傷  | 傷食 | 調補脾胃 |
| 風門  | 破傷風 | 胃風  | 痛風  | 痺  | 癘風   |
| 寒門  | 咳嗽  | 霍亂  | 暑門  | 瘧  | 痢    |
| 濕門  | 瘡   | 泄瀉  | 濕熱門 | 瘡  | 泄瀉   |
| 痰門  | 吞酸  | 疸   | 水腫  | 鼓脹 | 赤白濁  |
| 痰   | 哮喘  | 喘   | 惡心  | 嘔吐 | 瘰癧   |
| 欬逆  | 翻胃  | 嘈雜  | 關格  | 瘰癧 | 瘰癧   |
| 痰熱門 |     |     |     |    |      |

瘧	癰	顛狂	驚悸怔忡	健忘
纏喉風喉痺				
火門				
火	吐血	咳血	嘔血	咯血
衄血	溺血	下血	腸風臟毒	痔瘡
漏瘡	脫肛	淋	小便不通	小便不禁
夢遺				
風熱門				
斑疹	頭眩	頭痛	頭風	眼目
耳聾	鼻病	口舌	牙齒	
燥門	心法附餘目錄 四			
消渴	燥結			
鬱門				
六鬱	氣滯			
寒鬱門				
心脾痛	腹痛			
火鬱門				
脇痛	跌撲損傷	疥瘡	癰疽	疔瘰
諸瘡				
濕熱門				

腰痛	疝痛	腳氣
積門		
積聚痞塊		
虛損門		
發熱	惡寒	自汗
厥	勞瘵	補損
婦人門		
經病	崩漏	帶下
子嗣	諸病	產前
小兒門		產後
小兒諸病	痘瘡	
雜治門	心法附餘目錄 五	
倒倉法	吐法	救急諸方
體氣	汗癥	烏髭
醫論	用藥大畧	製方之法
	製藥法	醫畧
廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其		

本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先  
 之以外感內傷然外感又有風寒暑濕致疾之殊  
 故繼之以風寒暑濕內傷又有濕熱痰火為病之  
 異故繼之以濕熱痰火况外感內傷久而不治則  
 成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛  
 損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男  
 子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且  
 要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

丹溪本草衍義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱濕燥寒論

診家樞要

十二經脉歌

卷之一

外感門上

中風

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

外感門下

中暑

暑風

注夏

中濕

濕熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

卷之四



風門		破傷風	胃風	痛風	肢節痛	肩背痛
卷之五		痺	癰風	血風瘡	身上虛瘡	癰疹
寒門		咳嗽	肺痿	肺癰	霍亂	
卷之六		暑門				
卷之七		瘡	痢			
濕門		瘡	泄瀉			
卷之八		濕熱門	吞酸	噯氣	疸	水腫
赤白濁						鼓脹
卷之九		痰門	痰	痰熱	哮喘	喘
嘔吐			欬逆	翻胃	嘈雜	翻格

癰氣		癰氣				
卷之十		痰熱門	瘰癧	癰	癰狂	驚悸怔忡
卷之十一		火門	火	風熱	吐血	咳血
火		咯血	衄血	溺血	下血	腸風脈毒
痔瘡		漏瘡	脫肛	淋	小便不通	
小便不禁		夢遺				
卷之十二		風熱門	斑疹	頭眩	頭痛	眉眶痛
眼目		耳聾	鼻病	口舌	牙齒	
卷之十三		燥門	消渴	燥結		
卷之十四		鬱門				

六鬱	氣滯	氣刺痛	諸氣
卷之十五	寒鬱門	心脾痛	腹痛
卷之十六	火鬱門	跌撲損傷	疥瘡
脇痛	凍瘡	脚上爛瘡	頭面瘡
乳癰	疔瘰	諸瘡	癰疽
卷之十七	濕鬱門	腰痛	腎著
心法附錄目錄	十	疝痛	木腎偏墜
脚氣	足跟痛	脚轉筋	腎囊濕瘡
卷之十八	積門	積聚痞塊	
卷之十九	虛損門	發熱	胸中煩熱
虛損門	虛熱	虛煩不眠	惡寒
向執圖寒	自汗	盜汗	痿
			厥

手足十指麻木	勞瘵	補損	諸虛
卷之二十	婦人門	經病	崩漏
卷之二十一	婦人門下	產前	產後
諸病	子嗣	補虛	斷子法
卷之二十二	小兒門上	小兒諸病	
心法附錄目錄	十一	卷之二十三	小兒門下
痘瘡	雜治門	倒倉法	吐法
救急諸方	十危病方	備用藥方	
體氣	汗癥	烏髭	駐顏
醫論	用藥大畧	製方之法	製造藥法
醫畧	丹溪先生墓表辭	丹溪翁傳	

丹溪心法附餘卷首

本草衍義補遺 凡一百五十三種

休寧東山古菴方 廣約之類集

石鍾乳為慄悍之劑經曰石鍾乳之氣悍仁哉言也天生斯民不厭藥則氣之偏可用於暫而不可以久夫石藥又偏之甚者也自唐時太平日久膏粱之家惑於方士服食致長生之說以石藥體厚氣厚習以成俗迨至宋及今猶未已也斯民何辜受此氣悍之禍而莫知能救哉本本草讚服有延年之切而柳子厚又從而述美之予不得不深言也○唐本註云不可輕

心法附餘卷首

服多發渴淋

硝屬陽金而有水與火土善消化驅逐而經言無毒化七十二種石不毒而能之乎以之治病以致其用病退則已若玄明粉者以火煨而成當性溫曰長服多服久服且輕身固胎顏益壽大能補益豈理也哉予觀見一二朋友不信予言而亡故書此為戒云○仙經以朴硝製伏為玄明粉硝是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥也

白滑石屬金而有土與水無甘草以和之勿用燥濕分水道實大府化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃

降妄火之要藥也○凡使有多般勿悞使有黃滑石綠滑石烏滑石冷滑石皆不入藥又青黑色者勿用殺人惟白滑石似方解石色白於石上畫有白膩文者佳

鉛丹屬金而有土與水火丹出於鉛而曰無毒又曰涼予觀竊有疑焉曾見中年一婦人因多子於月內服鉛丹二兩四肢冰冷強直食不入口時正仲冬急服理中湯加附子數帖而安謂之涼而無毒可乎○鉛丹本為之黃丹化鉛而成別有法唐本註炒錫作然經稱鉛丹則炒錫之說誤矣亦不為難辨蓋錫則色

心法附餘卷首

黯暗鉛則明白以此為異爾

藥水味甘酸而性涼善走化滯物解消煩渴○宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理臟腑婦人懷妊不可食之食譜所忌也

自然銅世以為接骨之藥然此等方儘多大抵骨折在補氣補血補胃俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煨不可用若新出火者其火毒金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之○石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐煞人



二木本草不分蒼白議論甚多四家本草言之詳矣○  
如古方平胃散蒼木爲最要之藥行義爲氣味辛烈  
發汗尤速其白木味亦微辛苦而不烈除濕之切爲  
勝又有汗則止無汗則發與黃芪同功味亦有辛能  
消虛痰

蓀無劍脊如非葉者是菖蒲有脊一如劍刃而絕無非  
葉之細未知孰是

山藥屬土而有金與水火補陽氣生者能消腫硬經曰  
虛之所在邪必湊之而不去其病爲實非腫硬之謂  
乎故補血氣則留滯自不容不行○山藥卽薯蕷也

心法附餘卷首

三

本草

本草不言山藥言薯蕷者蓋上一字犯今英廟諱下  
一字曰蕷

唐代宗名預故改下一字爲藥如此則盡失當日之  
本名恐以山藥爲別物故書之又乾之意者蓋生濕  
則滑不可入藥熟則只堪啗亦滯氣也

鞠花屬金而有土與水火能補陰瀆味甘者若山野苦  
者勿用大傷胃氣○一種青莖而大作蒿艾氣味苦  
不堪啖者名苦薏丹溪所言苦者勿用語曰苦如意  
是也惟單葉花小而黃味甘應候開者佳月令蒔有  
黃花者也

甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德載物之君子也下  
焦藥少用恐大緩不能直達此草能爲衆藥之王經  
方少不用者故號國老之名國老卽帝師之稱也爲  
君所宗是以能安和草石解百藥毒

人參入手太陰而能補陰火與梨蘆相反若服一兩參  
入蘆一錢其一兩參虛費矣戒之○海藏云用時須  
去蘆頭不去令人吐箭柄云人參和細辛密封經年  
不壞

薏苡仁寒則筋急熱則筋縮急因於堅強縮因於短促  
若受濕則弛弛因於寬而長然寒與濕未嘗不挾熱

心法附餘卷首

四

陳

二者皆因於濕熱外濕非內濕有以啓之不能成病  
故濕之病因酒麵爲多而魚與肉繼以成之者甘滑  
陳久燒炙辛香乾硬皆致濕之因宜戒哉○丹溪先  
生詳矣又若素問言因寒則筋急不可更用此也凡  
用之須倍於他藥此物力勢和緩須倍用卽見効蓋  
受寒使人筋急受熱使人筋攣若但熱而不曾受寒  
亦能使人筋緩受濕則又引長無力也

兔絲子未嘗與茯苓相共種類分明不相干涉女蘿附  
松而生遂成訛而言也○本草云續絕傷補不足強  
陰堅骨玉莖中寒精自出溺有餘瀝鬼交泄精

肉從蓉屬土而有水與火峻補精血驟用反致動大便

滑河西自從混一之后人方知其真形何曾有所謂

麟甲者○以酒洗淨去黑汁作羹黑汁既去氣味皆

盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不効

防風黃耆人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養

陽天主清故鼻不受有形而受無形爲多地主濁故

口受有形而兼乎無形王太后病風不言而脉沉其

事急若以有形之湯藥緩不及事令投以二物湯氣

薰蒸如霧滿室則口鼻俱受非智者通神不可迴也

藍屬水而有木能使散敗血分歸經絡

心法附餘卷首

五

新天理

決明子能解蛇毒○貼腦止鼻洪作枕勝黑豆治頭痛

明目也

芎久服致氣暴亡以其味辛性溫也辛甘發散之過歟

局方以沉麝檀腦丁桂諸香作湯較之芎散之禍孰

爲優劣試思之○若單服既久則走散真氣既使他

藥佐使又不可久服中病便已則烏能至此也春秋

註云麥麴鞠窮所以禦濕詳見楚子伐蕭

五味子屬水而有木與金今謂五味實所未曉以其大

能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非除熱乎補腎

非暖水藏乎食之多致虛熱蓋收補之驟也何惑之

有又云火熱嗽必用之○爾雅云味一名莖菹又五

味皮肉甘酸核中苦都有鹹味此五味具也

括蕒屬土而有水本草言治胃痺以味甘性潤甘能

補肺潤能降氣胃有痰者以肺受逼失降下之令今

得甘緩潤下之助則痰自降宜其爲治嗽之要藥也

又云洗滌胸膈中垢膩治消渴之細藥也○雷公云

括蕒凡使皮子莖根効各別其括并蕒樣全別若括

自圓黃皮厚蒂小苦其蕒唯形長赤皮蒂麗是陰人

服其實詩所謂果臝之實正謂此也根亦名白藥其

莖葉療中熱傷暑最効

心法附餘卷首

六

苦參屬木而有火能峻補陰氣或得之而致腰重者以

其氣降而不升也非傷腎之謂治大風有功况風熱

細疹乎

鬱金本草無香屬火屬土與水性輕揚能致達酒氣於

高遠也正如龍涎無香能散達諸香之氣耳因輕揚

之性古人用以治鬱遏不能散者恐命名因於此始

○周禮人凡祭祀之裸用鬱鬯又說文曰芳草也合

釀之以降神

肉苳蔻屬金與屬土溫中補脾爲丸曰華子稱其下氣

以其脾得補而善運化氣自下也非若陳皮香附之

駛泄行義不詳其實謾亦因之遂以爲不可多服○云多服則泄氣得中則和平其氣

大黃屬水屬火苦寒而善泄仲景用之以心氣不足而吐衄者名曰瀉心湯正是因少陰經不足本經之陽亢甚無輔著以致血妄行飛越故用大黃泄去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故救肺連救肝故肺者陰之主肝者心之母血之舍也肝肺之火既退宜其陰血復其舊衍義不明說而曰邪熱因不足而客之何以明仲景之意開後人之盲瞶也

心法附餘卷首

七

無元

葶藶屬火屬木性急善逐水病人稍涉虛者宜遠之且殺人甚捷何必久服而后致虛也○葶藶有甜苦兩等其形則一經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄爲用故不可久服

附子衍義論五等同一物以形像命名而爲用至哉斯言猶有未善仲景八味丸附子爲少陰之向導其補自是地黃後世因以附子爲補誤矣附子走而不守取健悍走下之性以行地黃之滯可致遠亦若烏頭天雄皆氣壯形偉可爲下部藥之佐無表證其害人之禍相習用爲治風之藥殺人多矣治寒治風有必

用者子每以童便煮而浸之以殺其毒且可助下行之力入鹽尤捷○又墮胎爲百藥之長慎之

半夏屬金屬土仲景用於小柴胡湯取其補陽明也豈非燥脾土之功○半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也○又諸血證禁服仲景傷寒渴者去之半夏燥津液故也又妊婦姜炒用之

常山屬金而有火與水性暴悍善驅逐能傷其真氣切不可假過多也病人稍近虛怯勿可用也惟雷公云老人與久病切忌之而不明言其害外臺秘要乃用三兩作一服煎頓服以治瘧子恐世人因秘要之言

心法附餘卷首

八

一

而不知雷公之意云○常山蜀漆苗也

羊蹄草屬水走血分葉似蕒甘而不苦多食亦令人大腑泄滑亦取爲菜○羊蹄經不言根圖經加根字今人生採根用摩塗癰疥立効俗呼爲禿菜又詩云言採其蓄正謂此草

芎藭水而有土與金大補肺金而行滯血方藥似未曾用故表而出之或惡其賤○其根善能安胎又汁療渴甚驗

牽牛屬火善走有兩種黑者屬水白者屬金若非病形與証俱實者勿用也稍涉虛以其驅逐之致虛先哲

深戒之不脹滿不大便秘者勿用

草蘇屬陰能出有形質之滯物故取胎產胞衣剩骨膠血者用之其葉治脚風腫○又油塗葉炙熱熨顙上止鼻衄効

荔子肉屬陽主散無形質之滯氣故消瘤癰赤腫者用之苟不明者則措用之而不應

燈心屬土火燒為灰取少許吹喉中治急喉痺甚捷○

小兒夜啼亦用燈心燒灰塗乳上與喫

葳靈仙屬木治痛之要藥量病稍涉虛者禁用採得流水聲響者知其性好走也採不聞水聲者佳○痛風

心法附餘卷首

九

在上者服之此藥去衆風通十二經脉朝服暮効衍

義治腸風根性快多服疏人五臟真氣

五倍子屬金與水禽口中善收頑痰有功且解諸熱毒

○口瘡以末摻之便可飲食即文蛤也其內多虫又名百虫倉

金櫻子屬土而有金與水經絡隧道以通暢為和平味

者取澁性為快遂熬為煎食之自不作請從將誰執

○沈存中云止遺泄取其溫且澁須十月熟時採不

爾復令人利

萱草屬木性下走陰分一名宜男寧無微意存焉○俗

謂之鹿葱又嵇康養生論云合歡蠲怒萱草忘憂

茯苓得松之餘氣而成屬金仲景利小便多用之此暴

新病之要藥也若陰虛者恐未為相宜○其上有兔

絲下有茯苓之說甚為輕信又宋王微茯苓讚皓苓

下居彤紛上薈中狀雞鳧具容龜蔡神伴少司保延

幼艾終志不移柔紅可佩

琥珀屬陽今古方用為利小便以燥脾土有功脾能運

化肺氣下降故小便可通若血少不利者反致其燥

急之苦○茯苓琥珀二物皆自松出而所稟各異茯

苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮

心法附餘卷首

十

而安心利水也云

松屬陽金用其節炒焦治筋骨間病能燥血中之濕也

花多食能發上焦熱病○其花上黃粉名松黃拂取

似蒲黃酒服輕身療病又樹皮綠衣名艾納合和諸

香燒之其煙團聚青白可愛

栢屬陰與金性善守故採其葉隨月建方以取得月合

之氣也此補陰之要藥其性多燥久得之大益脾土

以澁其肺其栢子仁出乾州者佳

桂虛能補此大法也仲景救表用桂枝非表有虛以桂

補之衛有風寒故病自汗以桂枝發其邪衛和則表

密汗自止非桂枝能收汗而治之今衍義乃謂仲景治表虛誤矣本草止言出汗正內經辛甘發散之義後人用桂止汗失經旨矣曰官桂者桂多品取其品之高者可以充用而名之貴之之辭也曰桂心者皮之肉厚去其麤厚而無味者止留近其木一層而味辛甘者故名之曰心美之之辭也何必真疑著此○桂固知三種之桂不取菌桂壯桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂經言甘辛大熱正合素問辛甘發散爲陽之說又別說云以菌桂養精神以牡桂利關節又有一種柳桂乃桂之嫩

心法附餘卷首

士

高公亮

小枝條也尤宜入治上焦藥用也

楓香屬金而有水與火性疎通故木易有虫穴其液名曰白膠香爲外科家要藥近世不知誤以松脂之清瑩者甚失本經初意也○楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之

竹瀝本草大寒之觀其意以與石膏芩連等同類而諸方治產後胎前諸病及金瘡口噤與血虛自汗消渴尿多皆陰虛之病無不用縮手待盡哀哉內經曰陰虛發熱大寒而能補正與病對薯蕷寒而能補世或用之惟竹瀝因大寒直疑是猶因盜嫂受金而棄陳

平之國士也竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者大寒者言其功也非以氣言幸相與可否若曰不然世人喫笋自幼至老者可無一人因笋寒而有病瀝卽笋之液也况假於火而成者何寒如此之甚

合歡屬上而有水與金補陰之有捷功也長肌肉續筋骨槩可見矣而外科家未曾錄用何也○又名夜合人家多植庭除間蠲人之忿

凌霄花治血中痛之要藥也且補陰捷甚蓋有守而獨行婦人方中多用何哉○云紫葳卽凌霄花也善治酒醴熱毒甚良

心法附餘卷首

士

高公亮

龍腦屬火世知其寒而通利然未達其暖而輕浮飛揚局方但喜其香而貴細動輒與麝同用爲桂附之助人身陽易於動陰易於虧幸思之

墨屬金而有火入藥甚助補性○墨當松煙爲之者入藥能止血及產後血運崩中卒下血醋磨服之又主眯目物芒入目磨點瞳子又鄰延界內有石油燃之煙甚濃其煤可爲墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

秦椒屬火而有水與金有下達之能所以其子名椒目者正行滲不行穀道世人服椒者無不被其毒以其

久久則火自水中起誰能禦之能下水腫濕○凡使以蜀椒為佳子謂椒目治盜汗尤効又能行水

杉材屬陽金而有火用節湯洗脚氣腫言用屑者似乎相近○又云削作槓煮洗漆瘡無不差

樞實屬土與金非火不可多啖則熱矣肺家果也引火

入肺則大腸受傷識者宜詳○其子治寸白虫又五痔人常如果食之愈過多則滑腸

訶子下氣以其味苦而性急喜降經曰肺苦急急食苦

以瀉之謂降而下走也氣實者宜之若氣虛者似難

輕服○訶子即訶梨勒也六路黑色肉厚者良此物

心法附餘卷首

十一

言今

雖瀉腸又泄氣蓋其味苦澁又其子未熟時風飄墮

者謂之隨風子尤珍貴小者益佳治痰嗽咽喉不利

含三五枚殊勝又云治肺氣因火傷極遂鬱遏脹滿

蓋其味酸苦有收斂降火之功也

胡椒屬火而有金性燥食之快膈喜食者大傷脾胃肺

氣積久而大氣則傷凡痛氣疾大其禍也○一云向

陰者澄茄向陽者胡椒也

椰子屬土而有水生海外極熱之地土人賴此解夏月

喝渴天之生物蓋可見矣○多食動氣也

髮補陰之功甚捷○此即亂髮也燒灰研末調方寸匕

治鼻衄欲死者立効更以末吹鼻中甚驗

人尿嘗見一老婦年逾八十貌似四十詢之有惡病人

教之服人尿此婦服之四十餘年且老健無他病而

何謂性寒不宜多服歟降火最速○人尿須童男者

良又產後即溫飲一盃厭下敗血惡物不致他病也

又熱勞方中亦用之

犀角屬陽性走散比諸角尤甚痘瘡後用此散餘毒俗

以為常若不有餘毒而血虛者或以燥熱發者用之

禍至人故不知○凡用須烏色未經湯水浸煮入藥

已經浸煮不入藥用鹿取茸犀取尖其精銳之力盡

心法附餘卷首

古

言今

在是矣湯散用則屑之為末取屑以紙裹於懷中良

久合諸色藥物絕為易搗

羚羊角屬木入厥陰經為捷紫雪方中用之近理○羚羊

角今昔取有掛痕者陳藏器云取其耳聰之集集

鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆

集集有聲不如掛痕一說盡矣然多偽不可不察之

也

犬世俗言虛損之病言陽虛而易治殊不知人身之虛

悉是陰虛若果虛損其死甚易敏者亦難措手夫病

在可治者皆陰虛也衍義書此方於犬條下以為習



俗所移之法惜哉○犬肉不可炙食恐致消渴不與  
絲同食必頓損人

雞風之爲病西北氣寒爲風所中者誠有之矣東南氣  
溫而地多濕有風病者非風也皆濕生痰痰生熱熱  
生風也經曰亢則害承乃制河間曰土極似木數千  
年得經意河間一人耳衍義云雞動風者習俗所疑  
也雞屬土而有金與木火性補助濕中之火病邪  
得之爲有助而病劇非雞而已與夫魚肉之類皆能  
助病者也衍義不暇及也又云雞屬巽助肝火

鯽魚諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故能入陽明而有調胃

心法附餘卷首

五

言

實腸之功若得之多者未嘗不起火也戒之又云諸  
魚之性無德之倫故能動火○鯽魚合蓴作羹王胃  
弱不下食作鱠主久赤白痢

白殭蚕屬火而有土屬火與木得金氣殭而不化治喉

痺者取其火中清化之氣從以治相火散濁逆結滯

之痰耳○殭蚕有兩三番惟頭番蚕白色而條直者

爲佳其蚕蛾則第二番者以其敏於生育四月取自

死者勿令中濕中濕有毒不可用

蝦蟆屬土與水味甘性寒南人多食之本草明言可食  
不患熱病由是病人喜食之矣本草之義蓋是或炙

或乾或燒或灰和在藥劑用之非若世人煮爲羹入  
鹽醬而啜其湯此物濕化火能發濕久則濕以化熱  
此七氣原自然有火也衍義謂解勞熱之謂也非羹  
之謂也戒之○凡用五月五日取東行者良又取眉  
間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上收  
之入藥又人患齒縫中血出以紙紵子蘸乾蟾酥少  
許於血出處按之立止

蚯蚓屬土而有水與木性寒大解諸熱毒行濕病○凡

使白頸自死者良然亦應候而鳴此物有毒人被其

毒以鹽水浸咬處又以鹽湯飲之立差若治腎臟風

心法附餘卷首

六

言

下產病不可闕也仍須鹽湯送王荊公所謂寡壤大

牢俱有味可能蚯蚓獨清廉者也

馬刀與蛤蚌蚰蜥大同小異屬金而有水木土衍義言

其冷而不言濕多食發痰以其濕中有火久則氣上

升而下降因生痰痰生熱熱生風矣何冷之有

葡萄屬土而有水與木火東南食之多病熱西北食之

無恙蓋性能下走滲道西北氣厚人之稟厚耳○俗

呼其苗爲木通逐水利小腸爲佳昔魏玄帝詔羣臣

說葡萄云醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢

冷而不寒味長汁多除煩解渴他方之果寧有匹之

杏仁屬土而有水與火能隆亦須細研用之其性熱因寒者可用○其實不可多食能傷筋骨

棗屬土而有火味甘性緩經曰甘先入脾衍義乃言益脾脾土也經言補脾未嘗用甘今得此味多者惟脾受病習俗移人行義亦或不免○小兒患秋痢與虫食之良

櫻桃屬火而有土性大熱而發濕本草調中益脾日華子言令人吐衍義發明其熱能致小兒之病舊有熱病與嗽喘得之立病且有死者矣○司馬相如賦云山朱櫻即櫻桃也又禮記謂之哈桃可薦宗廟又王

維詩云纔是纔園春薦後非干御苑鳥銜殘

橘柚屬木有土與水本草於條下敘功用至五十餘字皆言橘皮之能非橘柚之謂也橘柚并言穰有漿者而名橘之大者曰柚則厚於橘衍義以柚爲橘有無窮之患何至是之甚耶○其橘核炒去殼爲末酒調服治腎症腰痛膀胱氣痛甚良

柿屬金而有土爲陰有收之義焉止血治嗽亦可爲助○此物能除腹中宿血又乾餅治小兒痢尤佳

石蜜甘喜入脾其多之害必生於脾而西北人得之有益東南人得之未有不病者亦氣之厚薄不同耳雖

然東南地下多濕宜乎其得之爲害也西北地高多燥宜乎其得之爲益也○石蜜今謂之乳糖也川浙最便用牛乳汁沙糖相和煎之並作餅堅重○本草云石蜜除衆病和百藥

糖多食能生胃中之火此損齒之因也非土製水乃濕土生火熱也食棗多者齒病齲亦此意也

烏芋即經中菟茨以其菟喜食之茨草之別名故俗爲之勃臍語訛耳○有二等皮厚色黑肉硬白者謂猪勃臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂羊勃臍並下石淋効胡桃屬土而有火性熱本草言其平是無熱也下文云

能脫人眉動風非熱何傷肺乎○衍義云過夏至不堪食又其肉煮漿粥下石淋良

茄屬土故甘而喜降火府者也易種者忌之食之拆者燒灰治乳○本草言味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及癰疾又根煮湯淋洗脚瘡甚効拆蒂燒灰以治口瘡皆甘以緩火之急

石榴味酸病人須戒之性滯其汁戀膈成痰榴者留也○多食損肺其酸皮止下痢其東行根治蛇虫寸白又其花白葉者主心熱吐血及衄血等乾之爲末吹鼻中立差

梨味甘濁者甚宜之梨者利也流利下行之謂也食療  
謂產婦金瘡人忌之血虛戒之○衍義謂多食動脾  
惟酒病煩渴人食之佳

橄欖味澁而生甘醉飽宜之然其性熱多食能致上壅  
解魚毒○日華子云開胃下氣止瀉

冬瓜性走而急久病與陰虛者忌之衍義取其分散熱  
毒氣有取於走而性急也○九月勿食俟被霜食之  
不爾令人成反胃病又差五淋

苦丁香性急損胃氣吐藥不爲不多胃弱者勿用設有  
當吐之證以他藥代之可也病後產後宜深戒之仲

景有云諸亡血諸虛家不可與瓜蒂○花主心痛咳  
遙

苋本草分六種而馬齒在其數馬齒自是一種餘苋皆  
人所種者下血而又入血分且善走紅苋與馬齒同  
服下胎妙臨產時煮食易產○本草云利大小便然  
性寒滑故也又其節葉間有水銀

萊菔根屬土而有金與水本草言下氣速往往見煮食  
之多者停滯膈成溢飲病以其甘多而辛少也其子  
推牆倒壁之功○俗呼爲蘿蔔亦治肺癆吐血又其  
子水研服吐風痰甚驗衍義曰散氣用生薑下氣用

### 萊菔

並研取其汁冷飲細呷之可下膈中瘀血甚効以其屬  
金而有水與土且性急○並能充肝氣又多食則昏  
神其子止精滑甚良又未出糞土爲並黃最不宜食  
之滯氣蓋噎噎鬱未升之氣故如是孔子曰不時不  
食正謂此也又花食之動風戒之

香薷屬金與水而有微上微下之功治水甚捷肺得之  
則清化行而熱自下又云大葉香薷治傷暑利小便  
濃煎汁成膏爲丸服之以治水脹病効○本草言治  
霍亂不可缺也

大蒜性熱喜散善化肉故人喜食屬火多用於暑月其  
傷脾傷氣之禍積久自見化肉之功不足言也有志  
養生者宜自知之○久食傷肝氣損目令人面無顏  
色

香油須炒芝麻乃可取之人食之美且不致病若又煎  
煉食之與火無異戒之

飴屬土成於火大發濕中之熱衍義云動脾風是言其  
末而遺其本也○此卽飴糖乃云膠飴乃是濕糖用  
米麥而爲卽錫也

大麥初熟時人多炒而食之此等有火能生熱病人故

不知○大麥水浸之生芽為藥化宿食破冷氣去心腹脹滿又云藥微暖久食消腎不可多食戒之

粟屬水與土陳者難化衍義云生者難化熟者滯氣隔食生虫○所謂補腎者以其味鹹之故也

酒本草止言其熱而有毒不言其濕中發熱近於相火大醉後振寒戰慄者可見矣又云酒性善升氣必隨之痰鬱於上溺流於下肺受賊邪金體大燥恐飲寒涼其熱內鬱肺氣得熱必大傷耗其始也病淺或嘔吐或自汗或疼痒或鼻鼾或自泄或心脾痛尚可散而出也病深或消渴為內疽為肺痿為內痔為鼓脹

心法附餘卷首

三

二八

為失明為哮喘為勞嗽為癰癤為難明之病倘非具眼未易處治可不謹乎○陶云大寒凝海惟酒不冰大熱明矣方藥所用行藥勢故也

醋酸漿世以之調和儘可適口若魚肉其致病以漸人故不知酸收也人能遠之○醋亦謂之醯俗呼為苦酒即米醋也可入藥能消癰腫散水氣

麵熱而麤涼饑年用以代穀酒晒麥令燥以少水潤之煮去皮煮以為飯食之無麵熱之後患○治暴淋煎

小麥湯飲之

漆屬金而有水與火性急能飛補用為去積滯之藥若

有之中病積去後補性內行人不知也○生漆去長虫又漆葉見華陀傳同青粘服之去三尸虫利五臟輕身益氣使人頭不白彭城樊阿服之年五百餘歲桑寄生藥之要品也自圖經以下失之而醫人不諳其

的惜哉以於近海州邑及海外其地暖其地不蚕由是桑木得氣厚生意濃而無採掇之苦但葉上自然生出且所生處皆是光燥皮膚之上何曾有所為節間可容化樹子也此說得之於海南北道憲僉老的公云○衍義云以難得真者若得真桑寄生下燕必驗如神向承之吳山有求藥於諸邑乃遍令人搜摘卒不得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥周人鄰邑有人偽以他木寄生送之服之逾月而死哀哉

心法附餘卷首

三

二八

丁香屬火而有金補瀉能走口居上地氣出焉肺行清令與脾氣相和惟有閨而甘芳自適焉有所謂口氣病者令口氣有而已自嫌之以其脾有鬱火溢入肺中失其清和甘美之意而濁氣上干此口氣病也以丁香含之楊湯止沸耳惟香薷治之甚捷故錄之○如釘長三四分紫色中有麓大如茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根註中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也

身皮屬金而有水與火走手厥陰而有瀉火為補陰之功配細辛治口病有奇功

厚朴屬土而有火氣藥之溫而能散瀉胃中之實也而平胃散用之佐以蒼朮正為上焦之濕平胃土不使之太過而復其平以致於和而已非謂溫補脾胃習以成俗皆為之補衰哉又云厚朴能治腹脹因其味辛以提其氣

桔梗能開提氣血藥中宜用之○桔梗能載諸藥不能下沉為舟楫之劑耳

乾薑散肺氣與五味子同用治嗽見火則止而不移治

心法附餘卷首

二十三

建昌先生

血虛發熱該與補陰藥同用入肺中利肺氣入腎中燥下濕入氣分引血藥入血也象云治沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑附子為引用又云發散寒邪如多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也見火候故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不止也凡止血須炒令黑用之生尤良主胃滿溫脾燥胃取以理中其實主氣而泄脾又人言乾薑補脾今言泄脾而不言補者何也東垣謂泄之一字非泄脾之正氣是泄脾中寒濕之邪故以薑辛熱之劑燥之故曰泄脾也

縮砂安胎止痛行氣故也○日華子云治一切氣霍亂

心腹痛又云止休息痢其名縮砂蜜也

香附子必用童便浸凡血氣藥必用之引至氣分而生

血此陽生陰長之義也○卽莎草根也一名雀頭香

大能下氣除胃腹中熱又云長鬚眉

麥蘖行上焦之滯血腹中鳴者用之○化宿食破冷氣

良并見前

大麥蘖

神麴性溫入胃麴皮麴性涼入大腸俱消食積紅麴活

血消食○健脾暖胃赤白痢下水穀陳久者良

紅藍花破留血養血多用則破血少用則養血○本草

心法附餘卷首

二十四

李時珍

云產後血運口噤腹內惡血胎死腹中並酒煮服又其子吞數顆主天行瘡子不出又其臘脂治小兒疳

耳滴耳中妙

蒼朮治上中下濕疾皆可用之○一名山精經曰必欲

長生可服山精結陰陽之精氣故也

又見前

白芍藥酒浸炒與白朮同用則能補脾與川芎同用則

瀉肝與人參白朮同用則補氣治腹中痛而下痢者

必炒後重不炒又云白芍惟治血虛腹痛諸腹痛皆

不可治○芍藥白補赤瀉又云赤者利小便下氣白

者止痛散血又云血虛寒人禁此一物古人有言曰

減芍藥以避中寒誠不可忽

木香行肝經氣火煨用可實大腸○木香專泄胃腹間滯寒冷氣多則用之其崑崙青木香尤行氣又土青木香不入藥

梔子屈曲下行降火又能治塊中之火○本草云去熱毒風利五淋通小便又云梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液府臟無潤養內生虛熱非此物不可去之

黃芩安胎者乃上中二焦藥降火下行也縮砂安胎者治痛行氣也若血虛而胎不安者阿膠主之治痰熱

心法附餘卷首

三五

三百五十一

者假此以降其火也○堅實者名子苓為勝破者名片苓其腹中皆爛名腐腸可入肺經也其堅實條苓入大腸除熱也

黃連以姜汁炒辛散衝熱有功○日華子云治五勞七傷止心腹痛驚悸煩燥天行熱疾及目痛又宋王微云黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身縉雲昔御飛畢土曼不行而至吾聞其人又梁江淹云黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以宜順道則利

枳實瀉痰能衝墻倒壁滑竅瀉氣之藥○枳實枳殼一

物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決泄破結實之義

皂角刺治癰疽已潰能引至潰處甚驗○神仙傳云崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚瘡癰皆為惡疾勢不可救一道流不言名授其方曰皂角刺一二斤為九蒸九曬研為末食上濃煎大黃湯調一錢七服一旬鬚髮再生而愈又鐵礬以煨金銀雖百十年不壞以搥皂角則一夕破碎

心法附餘卷首

三六

三百五十二

射干屬金而有水與火水行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰濕氣因疲勞而發取射干三十與生薑同煎食前服利三兩行効又治喉痛切一片噙之効紫花者是紅花者非○此即烏翼根為射干葉為烏翼為烏扇又名草薑外臺云治喉痺甚捷

巴豆去胃中寒積無寒積者勿用

天南星欲其下行以黃柏引之○天南星今市人多以由跋小者似天南星但南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾

石膏膏觀樂命名固有不可曉者中間亦多有意義學者不可不察如以色而名者大黃紅花白前青黛烏梅之類是也以氣而名者木香沉香檀香麝香蘭香之類是也以質而名者厚朴乾薑茯苓生地黃之類是也以味而名者甘草苦參龍膽草淡竹葉苦酒之類是也以能而名者百合當歸升麻防風硝石之類是也石膏火煨細研醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非有膏焉能爲用此兼質兼能而得名正與石脂同意閻孝忠妄以方解石爲石膏況石膏甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入手太陰手少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已求其所謂石膏而可爲三經之主者焉在哉醫欲責効不其難乎又云軟石膏可研爲末醋和丸如菜豆大以瀉胃火痰火食積殊驗○生錢塘者如棋子白澈最佳彭城者亦好又有一種王火石醫家常用之云味甘微辛溫治傷寒發汗止頭痛目昏眩功與石膏等故附之白粉胡粉另是一種乃是錫粉非鉛粉也蓋古人以錫爲粉名胡粉不可入藥惟婦人用以附面喜其色類肌肉也又名鐵子粉卽是錫也

驚甲驚肉補陰○驚左傳云三足者爲之能不可食凡使須九助者佳藥性云治勞瘦除骨熱鹹醋炙黃用又治心腹癥瘕堅積尤効牛膝能引諸藥下行凡用土牛膝春夏用葉秋冬用根惟葉汁之効尤速○本草云男子陰消老人失溺及寒濕痿痺腰腿之疾不可缺也又竹木刺入肉塗之卽出芎藭子卽益母草產前產後諸疾行血養血難產作膏服○此草卽益母也其苗擣取汁服主浮腫下水其子入潔面藥令人光澤又毛詩云中谷有雉益母也又云臭穢臭穢卽芎藭也牛蒡子一名惡實潔古云主風腫毒利咽膈吞一粒可出癰疽頭王治祕訣云辛溫潤肺散氣搗碎用之東垣云味辛平甘溫主明目補中及皮膚風通十二經○其未去萼時又爲之鼠粘子根謂之牛菜作菜茹尤益人鎖陽味甘可啖羹粥彌佳補陰氣治虛而大便燥結者用虛而大便不燥結者勿用亦可代苳蓉也水萍浮萍發汗尤甚麻黃○此是水中大萍非今溝渠所生者昔楚王渡江所得非斯實也又高供奉採萍

時日歌不在山不在岸採我之時七月半選其癰風與緩風此小微風都不算豆林酒內下三九鐵牒頭上也出汗

青黛能收五臟之鬱火解熱毒為肝消食積○青黛殺惡虫物化為水又官氣方小兒疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘦麴困耽耽又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疳淀又却濃深一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒卧

心法附餘卷首

二十九

三頁

不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來看

馬鞭草治金瘡行血活血○通婦人月經及血氣肚痛効

木賊用發汗至易去節剉以水潤濕火上烘用○本草不言發汗至易傳寫之誤也又云味甘微苦無毒治目疾退翳膜益肝膽婦人月水不斷得禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白得槐葉桑耳腸風下血服之効夏枯草無臭味治瘰癧臭草有臭味方作潔面藥即芫蔚是也凡此兩物俱生於春但夏枯草先枯而無子

蔚臭草後枯而結黑子又云有補養血脈之功三月四月開花五月夏至時候復枯蓋稟純陽之氣得陰氣則枯也○本草云散癰結氣脚腫濕痺

燈籠草寒治熱痰嗽佛耳治寒嗽

蘭葉稟金水之清氣而似有火人知其花香之貴而不知為用有方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有刀入藥煎煮用之東垣方中嘗用矣東垣云味甘性寒其氣清香生津止渴益氣潤肌肉經云消諸痺治之以蘭是也消渴証非此不能涼膽痺必用○即今之人栽植座右花開時滿室盡香

心法附餘卷首

三十

三頁

蒲公草又名蒲公英屬土開黃花似菊花化熱毒消惡腫結核有奇功在處田間路側有之三月間黃花味甘解毒散滯氣可入陽明太陰經洗淨細判同忍冬藤煎濃湯入少酒佐之以治乳癰服罷隨手欲睡是其功也睡覺病已安矣○麥熟有之質甚脆有白汁四時常花花罷飛絮絮中有子落處即生即今之地丁也治丁腫有奇功故書之

樗木皮臭椿根其性涼而能瀉血○樗木臭踈椿木香實其樗用根葉莢故曰木見椿上有莢惟樗木上有莢以此為異又有樗雞故知命名不言椿雞而言樗



雞者以頭有雞者為樗無雞者為椿其義明矣

山查子消食行結氣健胃催瘡痛治婦人兒枕痛濃煎此藥入沙糖調服立効

杜仲潔古云性溫味辛甘氣味俱薄沉而降陽也其用壯筋骨及弱無力以行東垣云杜仲能使筋骨強○石思仙治腎冷暨腰痛患腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之

漏蘆東垣云是足陽明本經藥○大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽通小腸治泄精尿血乳癰及下乳汁俗名英蒿是也

薑黃東垣云味苦甘辛大寒無毒治癥瘕血塊癰腫通月經消腫毒○薑黃真者是經種三年已上老薑也其主治功力烈於鬱金又治氣為最

御米穀潔古云味酸澁主收固氣東垣云入腎治骨病尤佳○今人虛勞嗽者多用止嗽及濕熱泄痢者用止痢治病之功雖急殺人如劍深可戒之

烏柏木解蛇毒

鹵鹹一名鹹或作鹵去濕熱消痰磨積塊洗滌垢膩量虛實用之若過服則頓損人又云石鹵阿魏皆消磨積塊

繅絲湯口乾消渴者可用此吐之此物屬火有陰之用

能瀉膀胱水中相火以引清氣上朝於口按究原方治消渴以此湯飲之或以繅殼絲綿湯飲之効

麻沸湯成無已云瀉心湯以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱也

潦水成無已赤小豆湯用潦水者亦取其水味薄則不助濕氣

白馬脰骨煨過再研用味甘寒可代黃芩黃連中氣不足者用之○其白馬莖味鹹能主男子陰痿房中術偏用又陰乾者末和茯苓蜜丸空心酒下四十九

羊肉羊脰骨治牙齒疎豁須用之東垣云別錄○羊肉味甘熱日華子治腦風并大風開胃肥健補中益氣又羊頭涼治骨蒸腦熱凡治目疾以青羊肝為佳

敗龜板屬金而有水陰中陽也大有補陰之功而本草不言惜哉其補陰之功力猛而兼去瘀血續筋骨治勞倦其能補陰者蓋龜乃陰中至陰之物稟北方之

氣而生故能補陰治陰血不足止血治四肢無力酥酒猪脂皆可炙用○龜以其靈於物方家故用以補

心然甚有驗  
天雄潔古云非天雄不補上焦之陽虛

蛤粉治痰氣能降能消能軟能燥同香附末姜汁調服以治痛以蛤蜊殼火煨過研為粉不入煎劑

鯉魚善補氣○本草云補中益血又婦人產前有疾可食

五靈脂能行血止血○此即寒號虫糞也本草云治心腹冷氣婦人心痛血氣刺痛甚効又止血行經血有功不能生血

人中白能瀉肝火散陰火該置於風露下三年者始可用也

人中黃性涼治溫病日華子有方

### 新增補四十三種

心法附餘卷首

三十三

防己氣寒苦辛陽中之陰治腰以下至足濕熱腫盛補

膀胱去留熱通行十二經及治中風手脚攣急本草

云漢防己君木防己使如陶所註即是木防己體用

小同按木漢二防己即是根苗為名漢王水氣木主

風氣又云木防己不入藥古方亦通用之治肺痿咯

血多痰漢防己葶藶等分為末糯米飲調下一錢甚効

當歸氣溫味辛氣味俱輕陽也又陽中微陰大能和血

補血治血證通用雷公云若破血即使頭一節硬實

處若止痛止血即用尾若一槩用不如不使服之無

効易老以為頭破血身行血尾止血又云身養血若

全用和血別說云大補不足決取立効之藥氣血昏

亂服之而定氣血各有所歸之名故名當歸本草云

主欬逆上氣溫瘧及女子諸疾不足此說當歸之

用矣

升麻陽中微陰主脾胃解肌肉間熱脾痺非升麻稍不

能除手足陽明傷風引用之的藥及發解本經風邪

若元氣不足者用此於陰中升陽氣上行不可缺也

木草云治肺痿咳嗽膿血

心法附餘卷首

三十四

細辛氣溫味辛手少陰引經之藥治諸頂頭痛諸風通

用之藥獨活為使溫陰經去內寒故東垣治邪在裏

之表本草云主欬逆頭痛百節拘攣最能溫中下氣

破痰利水道若單服末不可過半錢七多即氣閉塞

不通者死故書于此

藜蘆味辛苦陽中微陰太陽經本藥治寒氣鬱結及顛

頂痛腦齒痛引諸藥上至顛頂及與木香同治霧露

之氣是各從其類也

蘇木味辛甘鹹乃陽中之陰主破血產後血脹滿欲死

排膿止痛消癰腫瘀血月經不調及血運口紫極効

天麻氣平和味苦一名定風草卽此是也其苗名赤箭  
主諸風濕痺四肢拘攣小兒癇驚及諸虛眩暈非此  
不能除也凡使勿悞用御風草與天麻相似悞服則  
令人有腸結之患戒之慎之

赤箭謹按今醫家見用天麻卽是此赤箭根今本草別  
是一物古方用天麻者不用赤箭用赤箭者卽無天  
麻方中諸藥皆同天麻赤箭本爲一物今所用不相  
達然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言  
根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則  
結子成熟而落從莖中而下至土而生似此粗可識

其外內主治之理

柴胡氣平味微苦陰中之陽乃少陽厥陰行經藥也去  
往來寒熱非柴胡稍予不能除本草治心腹去腸胃  
中結氣推陳致新除傷寒心下煩熱痰實主銀州者  
爲勝衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方  
中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一  
種真臟虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢  
也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿丸用柴  
胡正合宜爾服之無不効日華子又謂補五勞七傷  
藥性論亦謂治勞之羸瘦若有此等病苟無實熱醫

心法附錄卷首 三十六

者藥而用之不死何待註釋本草一字亦不可忽蓋  
萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自何處治中  
下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如  
張仲景治傷寒寒熱往來如瘧狀用柴胡正合其宜  
旋覆花甘微冷利有小毒主結氣脇下滿消胸上痰結  
唾如膠漆一名金沸草也衍義云行痰水去頭目風  
亦走散之藥病人涉虛者不宜多服利大腸戒之  
澤瀉鹹寒陰中微陽入足太陽少陰經之藥除濕行水  
之功尤捷治小便淋閉去陰間汗若無此疾服之令  
人眼疾誠爲行去其水故也仲景八味丸用之亦不  
過接引桂附歸就腎經別無他意服此未有不小便  
多者小便既多腎氣焉得復實今人止泄精多不敢  
用

熟地黃氣寒味苦陰中之陽入手足少陰厥陰一名苕  
一名芑大補血衰者須用之又能填骨髓長肌肉男  
子五勞七傷女中傷中胞漏下血破惡血溺血初採  
得以水浸有浮者名天黃不堪用半沉者名人黃爲  
次其沉者名地黃最佳也其花卽地髓花可單服延  
年凡蒸以木甑砂鍋不可犯鐵器令人腎消男子損  
榮女損衛生地黃大寒治婦人崩中血不止及產

後血上薄心悶絕胎動下血胎不落墮折傷瘀血留  
血衄血吐血皆可搗飲之病人虛而多熱者勿用慎  
之

前胡本草云主痰滿胃脇中痞心腹結氣推陳致新半  
夏爲之使

知母陰中微陽腎經之本藥主消渴熱中下水補不足  
益氣骨熱勞傳屍症病產後蓐勞消痰止嗽虛人口  
乾加而用之

貝母本草主傷寒煩熱淋瀝癰疽喉痺金瘡腹中心下  
結實滿咳嗽上氣日華子云消痰潤肺及燒灰油調

心法附餘卷首

三七

本草

數人惡瘡至能斂瘡口別說云能散心胃鬱結之氣  
殊有功則詩人所謂言采其蠶者是也蓋作詩者本  
以不得志而言之今用治心中氣不快多愁鬱者甚  
有功信矣

草薺氣熱味辛入足太陰陽明經治風寒客邪在胃  
痛及嘔吐一切冷氣麤裏煨用衍義云虛弱不能食  
者宜此

玄胡辛溫手足太陰經藥象云破血治婦人月水不調  
小腹痛及產後諸疾因血爲病皆可療之

茴香氣平味辛手足少陰太陽經藥也破一切臭氣調

中止嘔下食本草云主腎勞癰疽液云本治膀胱藥  
以其先丙故云小腸也能潤丙燥以其先戊故從丙  
至壬又手少陰二藥以開上下經之通道所以壬與  
丙交也○卽懷香子也

連翹苦陰中微陽升也入手少陰經瀉心火降脾胃濕  
熱及心經客熱非此不能除瘡癰癰腫不可缺也治  
血症以防風爲上使連翹爲中使地榆爲下使不可  
不知衍義治利有微血不可執以連翹爲苦燥劑虛  
者多致危因實者宜用之○連翹又名本經不見所  
註但仲景方註云卽連翹根也

心法附餘卷首

三八

本草

大戟甘寒有毒主下十二水腹滿急痛積聚利大小腸  
通月水治瘀血能墮胎孕其葉名澤漆味甘無毒主  
治頗同

甘遂甘寒有毒惟用連珠者然經中不言此藥專於行  
水攻決爲用入藥須斟酌之

麥門冬甘微寒陽中微陰治肺中伏火主肺保神強陰

益精又補肺中元氣不足及治血妄行衍義云治肺

熱及虛勞客熱若與地黃麻仁阿膠潤經益血復脉

通心

天門冬苦甘大寒藥性云主肺熱欬逆喘息促急保定

肺氣除寒熱通腎氣治肺痿生癰吐膿血止消渴利  
小便衍義云治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不  
專收寒多之人禁服

桑白皮氣寒味苦酸主傷中五勞羸瘦補虛益氣除肺  
中水氣止唾血消水腫利水道須炒而用之

牡丹皮苦辛陰中微陽厥陰足少陰之藥治腸胃積血  
及衄血吐血之要藥及治無汗骨蒸一名百兩金惟  
山中單葉花紅者爲佳

青皮苦辛鹹陰中之陽主氣滯破積滯結氣消食少陽  
經下藥也陳皮治高青皮治低氣虛弱少用治脇痛

心法附錄卷首  
三十九  
須醋炒爲佳

檳榔純陽破氣滯泄胃中至高之氣象云治後重如神  
性如鐵石之沉重墜諸藥於至下

桃仁苦重於甘陰中陽也治大便秘血結血秘血燥通潤  
大便破血不可無心云苦以泄滯血甘以生心血故

凝血須用又去血中之堅及通月經老人虛秘與栢  
子仁火麻仁松子仁等分同研鎔白蠟和凡如桐子

大以黃丹湯下仲景治中焦畜血用之

生姜辛溫俱輕陽也主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔  
吐之聖藥治咳嗽痰涎多用者此藥能行陽而散氣

故也又東垣曰生薑辛溫入肺如何是入胃口曰俗  
皆以心下爲胃口者非也咽門之下受有形之物系  
謂之系便爲胃口與肺同處故入肺而開胃口也又

問曰人云夜間勿食生薑食則令人閉氣何也曰生  
姜辛溫主開發夜則氣本收斂反食之開發其氣則

違天道是以不宜若有病則不然若破血調中去冷  
除痰開胃須熱即去皮若要冷即留皮

赤石脂氣溫味甘酸本草主養心氣明目益精治腹痛  
泄瀉下利赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩漏產難

胞衣不出其五色石脂各入五臟補益澁可以去  
心法附錄卷首  
四十

脫石脂爲收斂之劑胞衣不出澁劑可以下之是赤  
入丙白入庚也

玄參氣微寒味苦乃足少陰腎經之君藥也本草云主  
腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主

暴中風易老云玄參乃樞機之劑管領諸氣上下肅  
清而不濁以此論之治虛中氣虛之氣無根之火以

玄參爲聖藥也

欬久花氣溫味甘辛溫肺止嗽本草主咳逆上氣喘急

呼吸杏仁爲之使日華子消痰止嗽肺痿肺癰吐血  
心虛驚悸衍義云有人病嗽多日或教以燒欬花兩

三枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥數日効

蘆根氣寒味甘本草主消渴客熱止小便金匱玉函治

五噎隔氣煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三盞煮

二盞服無時甚効

廣茂氣溫味辛平主心膈痛飲食不消破瘕癖氣最良

止痛醋炒用

京三稜辛苦主老癖癥瘕結塊婦人血脈不調心腹刺

痛火炮用之

草龍膽苦寒治赤目腫痛睛脹肉高起痛不可忍以

柴胡爲主治眼疾必用之藥也酒浸上行

必法附餘卷首

聖

車前子氣寒味甘主氣癰閉利水道通小便除濕痺肝

中風熱衝目赤痛

麻黃苦甘陰中之陽泄衛中實去榮中寒發太陽少陽

之汗入手太陰經

郁李仁陰中之陽破血潤燥

豉苦鹹純陽去心中懊懣傷寒頭痛煩燥

瞿麥辛陽中微陰利小便爲君

牡蠣鹹炙店又治帶下溫瘡瘡腫爲炙堅收斂之劑

十二經見證

足太陽膀胱經見證

頭苦痛 目似脫 頭兩邊痛 淚出 臍反出

下腫使膿血 肌肉痿 項似拔 小腹脹痛按

之欲小便不得

足陽明胃見證

惡與火聞木聲則驚 狂上登而歌棄衣而走 頰

黑 不能言唇脣 嘔 呵欠 消穀善飲 頸

腫

膈乳冲股伏兔肝外廉足跗皆痛 胃旁過乳痛

必法附餘卷首

聖

口咽

腹大水腫 奔響腹脹 跗內廉胛痛

髀不可轉腰似結喘似裂 膝臍腫痛 遺溺失氣

善伸數欠 癰疾 濕浸 心欲動則閉戶獨處

驚

身熱身後寒慄

足少陽膽經見證

口苦 馬刀挾癭

胃中脇肋髀膝外至肝絕骨外踝前諸節痛 足外

熱

寢寒憎風 無膏澤 善大息

手太陽小腸經見證

面白 耳前熱苦寒 頤頰腫不可轉 腰似折

肩臑肘臂外後廉腫痛 臑臂內前廉痛

手陽明大腸經見證

手大指次指難用 耳聾輝輝燁燁耳鳴嘈嘈

耳後肩臑肘臂外皆痛 氣滿皮膚殼殼然堅而不

痛

足太陰脾經見證

五泄注下五色 大小便不通 面黃 舌本強痛

口甘

食即吐食不下咽 怠惰嗜卧 搶心

善飢善味不嗜食不化食 尻陰股膝臑胫足背痛

煩悶心下急痛 有動痛按之若牢痛當臍 心下

若痞

腹脹腸鳴飧泄不化 足不收行善癢脚下痛 九

竅不通

溲泄水下後出餘氣則快然 飲發中滿食減善噫

形醉皮膚潤而短氣肉痛 身體不能動搖 足胫

腫節水

足少陰腎經見證

面如漆 眇中清 面黑如炭 咳唾多血 渴

臍左

脇下背脊間痛 胃中滿大小腹痛 大便難

飢不欲食心懸如飢 腹大脰腫喘嗽 脊脊股後

痛

脊中痛脊股內後廉痛 腰冷如冰及腫 足痿厥

臍下氣逆小腹急痛泄 下腫足胫寒而逆 腸癰

陰下濕

四指正黑 手指清厥 足下熱嗜卧坐而欲起

凍瘡

下痢 善思 善恐 四肢不收四肢不舉

足厥陰肝經見證

頭痛 脫色善潔 耳無聞 頰腫 肝逆頰腫

面青

目赤腫痛 兩脇下痛引小腹 胃脘痛背下則兩脇

腫痛

婦人小腹腫 腰痛不可俛仰 四肢滿悶 挺長

熱 嘔逆

羣丸腫羣疝 暴痒 足逆寒 肝善癢節時腫

遺瀝淋洩便難癰疽疔瘡泄大人癰疽 眩胃 轉	筋	陰縮兩筋攣 善恐胃中喘罵詈 血在脇下喘	手太陰肺經見證	善噦 缺盆中痛 臍上 肩痛 肩背痛 臍右	小腹脹引腹痛 小便數 溇泄 皮膚痛及麻木	喘少氣頰上氣見 交兩手而脅 悲愁欲哭 洒	浙寒熱	手少陰心經見證	消渴 兩腎內痛 後廉腰背痛 浸淫 善笑善	驚善忘	上咳吐下氣泄 眩仆 身熱而腹痛 悲	手厥陰別脉經見證	笑不休 手心熱 心中大熱 面黃目赤 心中	動	手足陰陽經合生見證	頭頂痛足太陽手少陰 黃疸足太陰少陰	面赤手少陰厥陰手足陽明	目黃手陽明少陰太陽厥陰足太陽	耳聾手太陽陽明少陽太陰足少陰 喉痺手足陽
----------------------	---	---------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	-----	---------	----------------------	-----	-------------------	----------	----------------------	---	-----------	-------------------	-------------	----------------	----------------------

明手少陽	鼻衄衄手足陽明太陽 目眈眈無所見足少陰厥	陰	目瞳人痛足厥陰 面塵足厥陰少陽 咽腫足少	陰厥陰	嗌乾手太陰足少陰厥陰手少陰太陽 噦手少陽	足太陰	膈咽不通不食足陽明太陰 胃滿手太陰足厥陰	手厥陰	胃支滿手厥陰少陰 腋腫手厥陰足少陽	脇痛手少陰足少陽 胃中痛手少陰足少陽	善嘔苦汁足少陽足陽明逆	少氣咳嗽喘渴上氣手太陰足少陰	喘手陽明足少陰手太陰 臂外痛手太陽少陽	掌中熱手太陽陽明厥陰 肘攣急手厥陰太陰	腸滿脹足陽明太陰 心痛手少陰厥陰足少陰	痔足太陽手足太陰熱 凄然振寒足陽明少陽	如人將捕足少陰厥陰 瘡足太陰足三陽	汗出手太陽少陰足陽明少陽 身體重手太陰少	陰
------	----------------------	---	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	-------------------	--------------------	-------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---



論五篇

不治已病治未病

與其救療於有疾之後不若攝養於無疾之先蓋疾成而後藥者徒勞而已是故已病而不治所以爲醫家之法未病而先治所以明攝生之理夫如是則思患而預防之者何患之有哉此聖人不治已病治未病之意也嘗謂備土以防水也苟不以閉塞其洧洧之流則滔天之勢不能遏備水以防火也若不以撲滅其熒熒之光則燎原之焰不能止其水火既盛尚不能止過况病之已成豈能治歟故宜夜卧早起於

心法附餘卷首

四

發陳之春早起夜卧於蕃秀之夏以之緩形無怒而遂其志以之食涼食寒而養其陽聖人春夏治未病者如此與雜俱興於容平之秋必待日光於閉藏之冬以之斂神匿志而私其意以之食溫食熱而養其陰聖人秋冬治未病者如此或曰見肝之病先實其脾臟之虛則木邪不能傳見右頰之赤先瀉其肺經之熱則金邪不能盛此乃治未病之法今以順四時調養神志而爲治未病者是何意耶蓋保身長全者所以爲聖人之道治病十全者所以爲上工術不治已病治未病之說著於四氣調神大論厥有旨哉昔

黃帝與天師難疑答問之書未嘗不以攝養爲先始論乎天真次論乎調神既以法於陰陽而繼之以調於四氣既曰食飲有節而又繼之以起居有常諄諄然以養生爲急務者意欲治未然之病無使至於已病難圖也厥後秦緩達乎此見晉侯病在膏肓語之曰不可爲也扁鵲明乎此視秦侯病至骨髓斷之曰不可救也噫惜齊晉之侯不知治未病之理

亢則害承迺制

心法附餘卷首

四

氣之來也既以極而成災則氣之乘也必以復而得平物極則反理之自然也夫抵寒暑燥濕風火之氣木火土金水之形亢極則所以害其物承乘則所以制其極然則極而成災復而得平氣運之妙灼然而明矣此亢則害承迺制之意原夫天地陰陽之機寒極生熱熱極生寒至神不測有以斡旋宰制於其間也故木極而似金火極而似水土極而似木金極而似火水極而似土蓋氣之亢極所以承之者反勝於己也夫惟承其亢而制其害者造化之功可得而成也今夫相火之下水氣承而火無其變水位之下土氣承而水無其戕土位之下木承而土順風位之下金乘而風平火熱承其燥金自然金家之疾陰精承

其君火自然火家之候所謂亢而為害承而迺制者如斯而已且嘗考之六元正紀大論云少陽所至為火生終為蒸鬱火化以生則火生也是水化以承相火之意太陽所至為寒雪冰雹白埃是土化以承寒水之意也白埃下承土也以至太陰所至為雷霆驟注烈風雷驟注土也烈風下承木氣也厥陰所至為風生終為肅風化以生則風生也肅下承金氣也陽明所至為散落溫散落金也溫下承火氣也少陰所至為熱生中為寒熱化以生則熱生也陰精承上故中為寒也宣非亢為害則承迺制者歟昔者黃帝與岐伯上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難以作內經至於六微旨大論有及於六氣相承之言以為制則生化外別盛衰害則敗亂生化大病諸以所勝之氣來於下者皆折其標盛也不然曷以水發而雷雪土發而驟飄木發而毀折金發而清明火發而燠昧此皆鬱極迺發以承所亢之意也嗚呼通天地人曰儒醫家者流豈止治疾而已當思其不明天地之理不足以為醫工之語

審察病機無失氣宜

邪氣各有其屬也當窮其要於前治法各有所歸也當防其差於後蓋治病之要以窮其所屬為先苟不

知法之所歸未免於無差爾是故疾病之生不勝其眾要其所屬不出乎五運六氣而已誠能於此審察而得其機要然後為之治又必使之各應於運氣之宜而不至有一毫差誤之失若然則治病求屬之道庶乎其無愧矣至真要大論曰審察病機無失氣宜意蘊諸此嘗謂醫道有一言而可以盡其要者運氣是也天為陽地為陰陰陽二氣各分三品謂之三陰三陽然天非純陽而亦有三陰地非純陰而亦有三陽故天地上下各有風熱火濕燥寒之六氣其斡旋運動乎兩間者而有木火土金水之五運人生其中臟腑氣穴亦與天地相為流通是知眾疾之作而所屬之機無出乎是也然而醫之為治當如何哉惟當察乎此使無失其宜而後可若夫諸風痺眩皆屬肝木諸痛痺瘡皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣腫鬱皆屬肺金諸寒收引皆屬腎水此病屬於五運者也諸暴強直皆屬於風諸嘔吐酸皆屬於熱諸躁擾狂越皆屬於火諸痿痺皆屬於濕諸澀枯涸皆屬於燥諸病水液澄徹清冷皆屬於寒此病機屬於六氣者也夫惟病機之察雖曰既審而治病之施亦不可不詳故必別陰陽於疑似之間辨標本於隱微

之際有無之殊者求其有無之所以殊虛實之異者責其虛實之所以異爲汗吐下投其所當投寒熱濕涼用其所當用或逆之以制其微或從之以導其甚上焉以遠司氣之犯中焉以辨歲運之化下焉以審南北之宜使小大適中先後合度以是爲治又豈有差殊乖亂之失耶又考之內經曰治病必求其本本草曰欲療病者先察病機此審病機之意也六元正紀大論曰無失天信無逆氣宜五常大論曰必先歲氣無伐天和此皆無失氣宜之意也故素問靈樞之經未嘗不以氣運爲言既曰先立其年以明其氣復

心法附餘卷首

五十一

子 44-35

有以戒之曰治病者必明天道地理陰陽更勝既曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣諄諄然若有不能自己者是豈聖人私憂過計哉以醫道之要悉在乎此也觀乎原病式一書比類物象深明乎氣運造化之妙其於病機氣宜之理不可以有加矣

能合色脉可以萬全

欲知其內者當以觀乎外診於外者斯以知其內蓋有諸內者形諸外苟不以相參而斷其病邪之逆順不可得也爲工者深燭厥理故望其五色以青黃赤

白黑以合於五臟之脉窮其應與不應切其五脉急大緩當沉以合其五臟之色順與不順誠能察其精微之色診其微妙之脉內外相參而治之則萬舉萬全之功可坐而致矣素問曰能合色脉可以萬全其意如此原夫道之一氣判而爲陰陽散而爲五行而人之所稟皆備焉夫五脉者天之真行血氣通陰陽以榮於身五色者氣之華應五行合四時以彰於面惟其察色按脉而不偏廢然後察病之機斷之以寒熱歸之以臟腑隨證而療之而獲全濟之効者本於能合色脉而已假令肝色如翠羽之青其脉微弦而

心法附餘卷首

五十二

子 44-35

急所以爲生若浮濇而短色見如草滋者豈能生乎心色如雞冠之赤其脉當浮大而散所以爲順若沉濡而滑色見如衄血者豈能順乎脾色如蟹腹之黃其脉當中緩而大所以爲從若微弦而急色見如枳實者豈能從乎肺色如豕膏之白其脉當浮濇而短所以爲吉若浮大而散色見如枯骨者豈能吉乎以至腎色見如烏羽之黑其脉沉濡而滑所以爲生或脉來緩而大色見如始者死死生之理夫惟診視相參既以如此則樂証相對厥疾弗瘳者未之有也抑嘗論之容色所見左右上下各有其部脉息所動寸

關尺中皆有其位左頰者肝部以合左手關位肝膽之分應於風木為初之氣頰為心之部以合於左手寸口心與小腸之分應於君火為二之氣鼻為脾之部合於右手關脾胃之分應於濕土為四之氣右頰肺之部合於右手寸口肺與大腸之分應於燥金為五之氣頤為腎之部以合於左手尺中腎與膀胱之分應於寒水為終之氣至於相火為三之氣應於右手命門三焦之分也若夫陰陽五行相生相勝之理當以合之於色脉而推之也是故脉要精微論曰色合五行脉合陰陽十三難曰色之與脉當參相

心法附餘卷首 五十四

應然而治病萬全之功苟非合於色脉者莫之能也五藏生成篇云心之合脉也其榮色也夫脉之大小滑濇沉浮可以指別五色微甚可以目察繼之以能合色脉可以萬全謂夫赤脉之至也喘而堅白脉之至也喘而浮青脉之至也長而左右彈黃脉之至也大而虛黑脉之至也上堅而大此先言五色次言五脉欲後之學者望而切之以相合也厥後扁鵲明乎此術之曰望而知之謂之神切脉而知之謂之巧深得內經之理也下迨後世有立方者目之曰神巧萬全厥有旨哉

治病必求於本

將以施其療疾之法當以窮其受病之源蓋疾痰之原不離於陰陽之一邪也窮此而療之厥疾弗瘳者鮮矣良工知其然謂其風熱火之病所以屬乎陽邪之所客病既本於陽苟不求其本而治之則陽邪滋蔓而難制濕燥寒之病所以屬乎陰邪之所客病既本於陰苟不求其本而治之則陰邪滋蔓而難圖誠能窮原療疾各得其法萬舉萬全之功可坐而致也治病必求於本見以素問陰陽應象大論者如此夫邪氣之基久而傳化其變證不勝其衆也譬如水之有本故能洊至汪洋浩瀚派而趨下以漸大草之有本故能孳生莖葉實秀而在上以漸蕃若病之有本變化無窮苟非必求其本而治之欲去深感之患不可得也今夫厥陰為標風木為本其風邪傷於人也掉搖而眩轉側動而癢癢卒暴強直之病生矣少陰為標君火為本其熱邪傷於人也瘡瘍而痛痒暴注而下迫水液渾混之病生矣少陽為標相火為本其火邪傷於人也為熱而瞋瘰癧躁擾而狂越如喪神守之病生矣善為治者風淫所勝平以辛涼熱淫所勝平以鹹寒火淫所勝平以鹹冷以其病本於陽必求

心法附餘卷首 五十四

其陽而療之病之不愈者未之有也太陰為標濕土為本其濕邪傷於人也腹滿而身腫按之而沒指諸症強直之病生矣陽明為標燥金為本其燥邪傷於人也氣滯而臍鬱皮膚以皺揭諸澁枯涸之病生矣太陽為標寒水為本其寒邪傷於人也吐利而腥穢水液以清冷諸寒收引之病生矣善為治者濕淫所勝平以苦熱燥淫所勝平以苦溫寒淫所勝平以辛熱以其病本於陰必求其陰而治之病之不愈者未之有也豈非將以施其療疾之法當以窮其受病之源者哉抑嘗論之邪氣為病各有其候治之之法各有其要亦豈止於一端而已其在表者汗而發之其入裏者下而奪之其在高者因而越之謂可吐也慄悍者按而收之謂按摩也藏寒虛羸者治以灸炳脉病變痺者治以針刺血實畜結腫熱者治以砭石氣滯痿厥寒熱者治以導引經絡不通病生於不仁者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脉者治以熨藥始焉求其受病之本終焉蠲其為病之邪者無出於此也噫昔皇帝處於法宮之中坐於明堂之上受業於岐伯傳道於雷公曰陰陽者天地之道也綱紀萬物變化生殺之妙蓋有不測之神斡旋宰制於其間也人

心法附餘卷首

五十五

論

或受邪生病不離於陰陽也病既本於此為工者豈可他求哉必求於陰陽可也至真要大論曰有者求之無者求之此求其病機之說與夫求於本其理一也

心法附餘卷首

五十六

論

附劉河間風熱濕燥寒論 出宣明論

諸風 風本生熱以熱為本風為標言風者即風熱病也

諸熱 熱甚而生風或熱微風甚即無治風熱或風微熱甚但治其熱即風自消矣

諸濕 濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣行即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為無證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或附腫體寒而有水者以為蓄熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得濕而成也

心法附餘卷首

五十七

諸風

諸燥 燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛成風則皺揭風能勝濕熱耗液皆能成燥故經云風熱火無為陽寒濕燥同為陰又燥濕亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸澀枯涸乾動皺揭皆屬於燥也

諸寒 寒者上下所生水液澄徹清冷殺不化小便清

白不澀身涼不渴本末不經有見陽熱證其脉遲者是也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相併而反陽氣怫鬱不能宣散怫熱內作以成熱證者不可亦言為冷當以成證辯之夫濕熱吐瀉當見陽脉若亡液氣虛亦能反見諸陰脉也當以標本明之不可妄治或熱證誤服白朮調中湯溫藥亦能開發陽氣宣通而愈別無加害也

心法附餘卷首

五十八

諸風

附診家樞要

滑伯仁曰人之為病雖曰不過寒熱虛實四者而其脉多  
無見也 熱則流通凡浮大數長皆熱也 寒則堅凝  
凡沉小遲短皆寒也 實則形剛凡實滑弦緊皆實也  
虛則形柔凡虛濡緩皆虛也

細而推之浮為在表 沉為在裏 大數為熱 小遲  
為寒 長為熱流通 短為寒凝結 實為氣實 虛  
為氣虛 滑為血實為有痰 濡為血虛為有鬱 弦  
緊為痛 弦堅為積聚 濡緩為濕 緩大為濕熱  
浮沉以舉按重輕言浮甚為散沉甚為伏 大小以盈

心法附餘卷首

五十九

病機

虧言大以統洪小以該細 數遲以息至多少言數甚  
為疾數止為促 長短以部位之過與不及言 實滑  
弦緊以形狀有力言實以該牢革滑以統動弦甚為緊  
虛濡濡緩以形狀無力言虛以統弱微濡以該芤緩  
止為結結甚為代此又合三十脉也自此以往儘推無  
窮知者觀之思過半矣

附十二經脉歌

○手太陰肺中焦生下絡大腸出資門上膈屬肺從肺系  
系橫出腋膈中行肘臂寸口上魚際大指內側小甲根  
支絡還從腕後出接次指屬陽明經此經多氣而少血  
是動則病喘與咳肺脹膨缺盆痛兩手交替為臂厥  
所生病者為氣咳喘渴煩心胃滿結臍臂之外前廉痛  
小便頻數掌中熱氣虛肩背痛而寒氣盛亦疼風汗出  
欠伸少氣不足息遺失無度溺變別

○陽明之脉手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷  
兩筋岐骨循臂肘入肘外廉循臍外肩端前廉柱骨傍

心法附餘卷首

六十六

病機

從肩下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆上入頸  
斜貫頰前下齒當環出人中交左右上俠鼻孔注迎香  
此經血盛氣亦盛是動頸腫并齒痛所生病者為鼻衄  
目黃口乾喉痺生大指次指難為用肩膊外側痛相仍  
○胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出俠口繞承漿  
順後大迎頰車裏耳前髮際至額顙支下入迎缺盆底  
下膈入胃絡脾官直者缺盆下乳內一支幽門循腹中  
下行直合氣冲逢遂由髀關抵膝臍膈中指內關同  
一支下膝注三里前出中指外關通一支別走足跗指  
大指之端經盡矣此經多氣復多血是動欠伸面頰黑

惡寒畏見人忽聞木聲心振惕登高而歌棄衣走  
甚則腹脹乃責響凡此諸疾皆肝厥所生病者為狂瘡  
濕溫汗出鼻流血口喎唇裂又喉痺膝膕痠痛腹脹結  
氣膈伏兔漸外廉足跗中指俱痛微有餘消穀溺色黃  
不足身前寒振慄胃房脹滿食不消氣盛身前皆有熱

心法附錄卷首

六

通

太陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內踝前  
上循循胛脛膝裏股內前廉入腸中屬脾絡胃與膈通  
俠喉連舌散舌下支絡從胃注心宮此經氣盛而血衰  
是動且病氣所為食入即吐胃脘痛更無身體痛難移  
腹脹善噫舌本強得後與氣快然泉所生病者舌亦痛

體重不食亦如之煩心心中下仍急痛泄水瘡痂寒瘡隨  
不卧強立股膝腫疽發身黃大指痠  
○手少陰脉起心中下膈直與小腸通支者還從肺系走  
直上咽喉繫目瞳直者上肺出腋下膈後肘內少海從  
臂內後廉抵掌中兌骨之端注少冲多氣少血屬此經  
是動心脾痛難任渴欲飲水咽乾燥所生脇痛目如金  
脇臂之內後廉痛掌中有熱向經尋

○手太陽經小腸脉小指之端起少澤循手外廉出踝中  
循臂骨出肘內側上循膈外出後廉直過肩解繞肩甲  
交肩下入缺盆內向腋絡心循咽嗑下膈抵胃屬小腸

一支缺盆貫頸頰至目兌皆却入耳復從耳前仍上頰  
抵鼻升至目內眥斜絡於顙別絡接此經少氣還多血  
是動則病痛咽嗑頰下腫不可顧肩如拔少氣似折  
所生病者主肩膊耳聾目黃腫腮頰肘臂之外後廉痛  
部分猶當細分別

心法附錄卷首

六

通

○足經太陽膀胱脉目內眥上額額失支者顙上至耳角  
直者從顙腦後懸絡腦還出別下項仍循肩膊俠脊邊  
抵腰脊腎膀肱內一支下與後陰連貫臂斜入委中穴  
一支膊內左右別貫腋俠脊過髀樞臂內後廉臑中合  
下貫肱內外踝後京國之下指外側是經血多氣少也  
是動頭疼不可當項如拔兮腰似折髀強痛徹脊中央  
臑如結兮腦如裂是為蹠厥筋乃傷所生瘡痔小指痠  
頭顙項痛目色黃腰尻臑脚疼連背淚流鼻衄及顙狂  
○足經腎脉屬少陰小指斜透湧泉心然骨之下內踝後  
別入跟中膈內浸出膈內廉上股內貫脊屬腎膀肱臑  
直者屬腎貫肝膈入肺循喉舌本尋支者從肺絡心內  
仍至胃中部分深此經多氣而少血是動病譫不欲食  
喘嗽唾血喉中鳴坐而欲起面如垢目視眈眈氣不足  
心懸如飢常惕所生病者為舌乾口熱咽痛氣責通  
膈內後廉并脊疼心膈煩痛疽而游痿厥嗜卧體怠墮



足下熱痛皆腎厥

○手厥陰心主起胃屬包下膈三焦宮支者循胸出脇下脇下連腋三寸同仍上抵腋循膈內太陰少陰兩經中指透中冲支者別小指次指絡相通是經少氣原多血是動則病手心熱肘臂攣急腋下腫甚則胸脇支滿結心中澹澹或大動善笑目黃面赤色所生之者為心煩心痛掌熱病之則

○手經少陽三焦脉起自小指次指端兩指岐骨手腕表上出臂外兩骨間肘後臑外循肩少陽之後交別傳下入缺盆臆中分散絡心膈高裏穿支者臆中缺盆上

心法附餘卷首

六

三

上項耳後耳角旋屈下至頤仍注頰一支出耳入耳前却從上關交曲頰至目內眥乃盡焉斯經少血還多氣是動耳鳴喉腫脾所生病者汗自出耳後痛無目銳眥肩臑肘臂外皆疼小指次指亦如廢

○足脉少陽膽之經始從兩目銳眥上抵頭循角下耳後腦空風池次第行手少陽前至肩上交少陽右上缺盆支者耳後貫耳內出走耳前銳眥循一支銳眥大迎下合手少陽抵項根下加頰車缺盆合入胸貫膈絡肝經屬膽仍從脇裏過下入氣街毛際繫橫入髀厭環跳內直者缺盆下腋腋過季脇下髀厭內出膝外應是陽陵

外輔絕骨踝前過足跗小指次指分一支別從大指去三毛之際接肝經此經多氣乃少血是動口苦善太息心脇疼痛難轉移面塵足熱體無澤所生頭痛連銳眥缺盆腫痛併兩腋馬刀挾癭生兩旁汗出振寒瘡瘻疾胸脇髀膝至髀骨絕骨踝痛及諸節

○厥陰足脉肝所終大指之端毛際叢足跗上廉太冲分踝前一寸入中封上踝交出太陰後循臍內廉陰股充環遠陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽達上貫膈裏布脇肋俠喉項頰目繫同脉上巔會督脉出支者還生目系中下絡頰裏還唇內支者便從膈肺通是經血多氣少焉是動腰疼俛仰難男疝女入小腹腫面塵脫色及咽乾所生病者為胸滿嘔吐洞泄小便難或時遺溺并狐疝臨證還須子細者

心法附餘卷首

六

三

附古菴藥鑑

治風門 升生

風屬陽善行數變自外而入以鬱正氣故治風多行氣  
開表藥又風入久變熱熱能生痰宜用祛風化痰藥又  
熱極生風風能燥液宜用清熱潤燥藥

行氣開表藥

羌活 平 苦 甘 辛 獨活 同上 防風 溫 甘 辛 細辛 溫 大 辛

升麻 平 苦 甘 辛 麻黃 溫 苦 甘 白芷 溫 辛 藜蘆 溫 辛 苦

蔓荊實 溫 苦 甘 天麻 平 辛 甘 秦艽 平 苦 辛 威靈仙 溫 苦 辛

薄荷 辛 苦 荊芥 溫 辛 苦 惡實 平 苦 辛 紫蘇 溫 辛 苦

祛風化痰藥 天南星 平 苦 辛 何首烏 微 溫 甘 辛 白附子 溫 甘 辛 皂莢 溫 辛 苦

藜蘆 寒 辛 苦 瓜蒂 寒 苦 蟬蛻 寒 甘 辛 蠍 甘 辛 虎骨 微 溫 辛 苦

白僵蠶 平 苦 辛 白花蛇 溫 甘 辛 牛黃 平 苦 辛 虎骨 微 溫 辛 苦

清熱潤燥藥 菊花 平 苦 甘 密蒙花 平 甘 蒺藜子 微 苦 辛 女萎 平 甘 辛

青箱子 微 苦 寒 木賊 甘 微 苦 白薇 平 苦 寒 天竺黃 寒 甘 辛

巴戟天 微 溫 辛 甘 五加皮 微 寒 辛 苦

主治各經風藥

肝 川 辛

心 細 辛

脾 升 麻

肺 防 風

腎 獨 活

胃 升 麻

大 腸 白 芷

小 腸 藜 蘆

三 焦 黃 芪

膀 胱 羌 活

已上諸藥發散風寒升散鬱火兼治表濕之劑

治熱門 沉瀼

治熱以寒藥屬陰故治熱多陰藥又鬱火宜發散宜  
用風門藥火鬱則發之升陽散火也夫熱燥皆屬陽宜  
與治燥門通看

治上焦熱藥

黃芩 平 苦 寒 梔子 寒 苦 沙參 微 苦 甘 玄參 微 苦 寒

前胡 微 苦 寒 青黛 寒 苦 山豆根 寒 苦 白前 微 苦 寒

百部根 微 苦 寒 桑白皮 溫 甘 辛 丹參 微 苦 寒 桔梗 微 苦 溫

治中焦熱藥 黃連 寒 苦 胡黃連 平 苦 連翹 平 微 苦 寒 葛根 平 甘 辛

香薷 微 苦 寒 石斛 平 甘 滑石 寒 甘 辛 石膏 微 苦 寒 石膏 微 苦 寒

玄明粉 微 苦 寒 茵陳蒿 平 苦 辛 羚羊角 微 苦 寒 大黃 大 苦 寒

芒硝 寒 苦 犀角 寒 甘 辛 羚羊角 微 苦 寒

治下焦熱藥 藥木 微 苦 辛 柴胡 平 微 苦 寒 草龍膽 苦 寒 防己 平 苦 寒

車前子 寒 甘 微 苦 地膚子 寒 苦 石韋 平 微 苦 寒 通草 平 甘 辛

子 44-42

平苦甘寒  
文蛤  
平鹹

---

生白芍藥市氣石  
大黃月血施

三焦

方筆連起小腸氣  
血大黃小腸氣

**Abstract**

肺氣石

胃氣石  
血芒

卷之七

三焦

凡與台累兄

南九

八和氣陰濕藥又

然宜江龍宜用屬

寒門通看

一甘平

生寒熟溫

溫平

橘皮 溫辛 苦

厚朴  
温苦辛

神翅甘

阿魏辛熱

使君子溫甘

---

紫草  
寒苦

百合  
平甘

17

先花

---

脾胃水

小腸子車前

心包絡

和氣調氣之

---

卷之五

癰因血虛而然蓋血虛生熱熱生燔是也宜用解熱生

津藥及滋血潤燥藥夫燥熱皆屬陽宜與治熱門通看

解熱生津藥

天門冬 平大寒

麥門冬 平微寒

知母 寒平

貝母 平微寒

稻樓根 寒平

枇杷葉 平

五味子 溫酸

地骨皮 寒平

蘭草 平寒

梅實 平酸

馬兜鈴 寒平

款冬花 溫平

阿膠 平微溫

紫苑 溫平

淡竹瀝 寒平

遠志 溫平

葛蒲 溫平

酸棗仁 平酸

牡丹皮 寒平

訶梨勒 溫平

當歸 溫平

滋血潤燥藥

生地黃 大寒

熟地黃 微溫

當歸 溫平

芍藥 溫平

芍藥 微寒

杏核仁 溫平

麻子 平甘

桃核仁 平甘

蜀葵 寒平

郁李仁 平酸

牛膝 平酸

槐實 寒平

栢實 平甘

蒲黃 平甘

瑣陽 平甘

枸杞 寒平

鹿茸 溫平

肉從蓉 平甘

蘇方木 平甘

紅藍花 溫平

蘇方木 平甘

蘇方木 平甘

蘇方木 平甘

主治各經燥藥

肝當歸 心麥門冬

脾麻仁

肺杏仁

腎梔子仁

大腸硝石

小腸茴香

三焦山藥

膀胱茴香

心包絡桃仁

已上諸藥治上中下三焦內燥無補血和血之

劑

治寒門 浮長

治寒以熱熱藥屬陽故治寒多陽藥外寒宜汗散宜用風門藥寒從汗解也夫寒濕皆屬陰宜與治濕門通看

治上焦寒藥

附子 溫大熱

烏頭 溫辛甘

生薑 微溫

桂枝 溫平

治中焦寒藥

乾薑 溫大熱

桂枝 溫辛甘

高良薑 溫辛甘

草豆蔻 溫辛

白豆蔻 溫大熱

肉豆蔻 溫辛

沙草根 微寒

藿草 溫辛

縮砂蜜 溫辛

益智子 溫辛

薑黃 寒辛

五靈脂 平甘

丁香 溫辛

巴豆 溫辛

蜀椒 溫辛

胡椒 溫辛

艾葉 微溫

韭子 微溫

白芥子 溫辛

萊服子 溫辛

木香 溫辛

檳榔 溫辛

紫直檀 溫辛

沉香 溫辛

常山 寒辛

草菓 溫辛

延胡索 溫辛

鬱金 寒辛

治下焦寒藥

菟絲子 平溫

補骨脂 大溫

杜仲 平溫

懷香子 平辛

單解 平甘

烏藥 溫辛

山茱萸 平微溫

吳茱萸 溫大熱

主治各經寒藥

肝氣吳茱萸

心氣桂枝

脾氣吳茱萸

肺氣乾薑

腎氣細辛 大腸氣白芷 小腸氣茴香 膽氣生薑

三焦氣附子 膀胱氣麻黃 心包絡氣附子

已上諸藥治上中下三焦內寒無治濕寒之劑

治瘡門

瘡屬熱屬毒故治瘡多清熱解毒藥亦因氣逆血滯又宜行氣活血藥其內服藥已見於前五門下此惟贅其外傳藥而已又有各門載不盡者亦附於此焉

傳諸瘡藥

白芨平微寒 白斂平微寒 五倍子平微寒 商陸平微寒

芫薺子平微寒 蒲公草平微寒 狗脊平微寒 蕪荑平微寒

蛇床子平微寒 雷丸平微寒 松脂平微寒 乳香平微寒

楓香脂平微寒 沒藥平微寒 麒麟竭平微寒 蘆薈平微寒

龍腦香平微寒 麝香平微寒 樟腦平微寒 丹砂平微寒

雄黃平微寒 水銀平微寒 硃砂平微寒 蓬砂平微寒

無名異平微寒 凝水石平微寒 五石脂平微寒 礬石平微寒

石硫黃平微寒 砒霜平微寒 青礬石平微寒 伏龍肝平微寒

龍骨平微寒 牡蠣平微寒 斑蝥平微寒 蟾酥平微寒

鯨鯉甲平微寒 木蝨平微寒 烏賊魚骨平微寒

水蛭平微寒

已上諸藥傳貼瘡腫及理氣血之劑

右五品藥性乃治風熱濕燥寒五氣切要之劑除治

風門通用外治熱門宜與治燥門無用治濕門宜與

治寒門無用熱燥屬陽寒濕屬陰故也蓋瘦人血虛

多熱燥肥人氣虛多寒濕宜仔細分類治之

又按藥有寒熱溫涼平和之氣辛甘淡苦酸鹹之味

升降浮沉之性宜通瀉補之能經曰補瀉在味隨時

換氣故辛以散之 謂散其未甘以緩之 謂緩其大

以滲之 謂滲其內濕 謂苦以泄之 謂泄其火也 酸以收之

散之氣也 鹹以軟之 謂軟其燥結 春氣溫而宜涼藥

夏氣熱而宜寒藥 秋氣涼而宜溫藥 冬氣寒而宜熱

藥若病與時病在上而宜升藥 病在下而宜降藥 病

在外而宜浮藥 病在內而宜沉藥 故曰升降浮沉則

順之 謂順其藥之性也 寒熱溫涼則逆之 謂逆其時

之病也

附藥鑑何哉蓋欲人按病察方按方察藥俾藥性

與病情相對坦然無疑慨然藥服則藥無不効病

無不瘳者也夫醫之為道曰藥性曰脉理曰病機

曰治法曰經絡曰運氣六者不可缺一焉然學之

之序必先於藥性何以言之良醫之用藥如良將

之用兵良醫知藥之性則可以處方而愈疾良將

知兵之法則可以破敵而取勝其理一也

丹溪心法附餘卷首終

心法附餘卷首

十一

丹溪心法附餘卷之一

休寧東山古庵方廣約之類集

# 外感門

上

## 中風

一 附中氣 預防中風

丹溪心法

○中風大率主血虛有痰治痰為先次養血行血或屬虛  
挾火一作痰與濕又須分氣虛血虛○半身不遂大率多痰  
在左屬死血少一作痰血在右屬痰有熱併氣虛○左以四

中風

心法附餘卷之一

一

如天附用

物湯加桃仁紅花竹瀝姜汁 右以二陳湯四君子等湯  
加竹瀝姜汁 痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當用  
吐法一吐不已再吐輕者用瓜蒂一錢或稀涎散或鯁汁  
以鯁半斤入醬葱姜等料物水煮先喫鯁次飲汁後以鯁  
翎探引吐痰用鯁者蓋引其風出耳重者用藜蘆半錢或  
三分加麝香少許薑汁調若口噤昏迷者灌入鼻內吐之  
虛者不可吐 初昏倒急搗人中至醒然後用痰藥以二  
陳湯四君子湯四物湯加減用之 氣虛卒倒者用參芪  
補之有痰濃煎參湯加竹瀝姜汁 血虛用四物湯俱用  
姜汁炒恐泥痰故也有痰再加竹瀝姜汁入內服能食者

去竹瀝加荆瀝 肥白人多濕少用烏頭附子行經凡用  
烏附必用童便煮過以殺其毒 瘦人陰虛火熱用四物  
湯加牛膝竹瀝黃芩黃柏有痰者加痰藥 治痰氣實而  
能食用荆瀝氣虛少食用竹瀝此二味開經絡行血氣故  
也入四物湯必用姜汁助之 遺尿屬氣虛以參芪補之  
筋枯者舉動則痛是無血不能滋養其筋不治之 脉訣  
內言諸不治證口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡  
內脫筋痛髮直搖頭上竄面赤如裝或頭面青黑汗綴如  
珠皆不可治

○案內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊不可一  
中風 心法附餘卷之一  
途而論惟劉守真作將息失宜水不能制火極是由今言  
之西北二方亦有真為風所中者但極少爾東南之人多  
是濕土生痰痰生熱熱生風也邪之所襲其氣必虛風之  
傷人在肺臟為多 許學士謂氣中者亦有此七情所傷  
脉微而數或浮而緊緩而遲必也脉遲浮可治大數而極  
者死 若果外中者則東垣所謂中血脉中府中藏之理  
其於四肢不舉亦有與痿相類者當細分之局方風痿同  
治大謬發揮甚詳子和用二法如的係邪氣卒中痰盛實  
熱者可用否則不可  
入方

肥人中風口喎手足麻木左右俱作瘓治

貝母 七分 瓜蒌仁 六分 南星 製六分 荆芥穗 七分

防風 七分 羌活 五分 黃柏 炒六分 黃芩 炒六分

黃連 炒六分 白朮 八分 陳皮 去白 半夏 製七分

薄桂 四分 甘草 四分 威靈仙 五分 天花粉 五分

右共作一服水鍾半加竹瀝姜汁煎服

一婦手足左癱口不能言

防風 七分 荆芥 六分 羌活 六分 南星 六分

沒藥 六分 乳香 六分 木通 六分 茯苓 八分

厚朴 六分 桔梗 六分 麻黃 六分 甘草 三分

中風 心法附餘卷之一 三

全蝎 三箇

右為末湯酒下不効時春脉伏漸以淡鹽湯蘆汁每早

一碗吐五日仍以白朮陳皮茯苓甘草厚朴菖蒲日二

三貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂葉豆粉蘆汁鹽湯吐之

吐甚快不食後以四君子湯服之以當歸酒芩紅花木

通粘子蒼朮姜南星牛膝茯苓為末酒糊丸服十日後

夜間微汗手足動而能言

一人癱左

酒連 酒芩 酒栢 防風

羌活 川芎 當歸 半兩 南星

蒼朮 人參一兩 麻黃 甘草三錢

附子三片

右九如彈子酒化下

一人體肥中風先吐後以藥

蒼朮 八分 南星 七分 酒苓 七分 酒栢 七分

木通 七分 茯苓 十分 牛膝 七分 紅花 六分

升麻 四分 厚朴 一分 甘草 二分

右共作一服姜三片水煎服

附諸賢論

神洄集曰人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不舉或不知人

或死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治之

余嘗攷諸內經則曰風者百病之始也又曰風者百病

之長也至其變化乃為他病無常方又曰風者善行而

數變又曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中

或為癰風或為偏枯或為風其卒暴僵仆不知人四肢

不舉者並無所論止有偏枯一語而已及觀千金方則

引岐伯曰中風大法有四一曰偏枯一曰風痲三曰風

懿四曰風痺解之者曰偏枯者半身不隨風痲者身無

痛四肢不收風懿者奄忽不知人風痺者諸痺類風狀

金匱要畧中風篇曰寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為

虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉

或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪

在於絡肌膚不仁邪在於經即克不勝邪入於腑即不

識人邪入於臟舌即難言口吐涎沫由是觀之知卒暴

僵仆不知人偏枯四肢不舉等證固為因風而致者矣

故用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及

近代劉河間李東垣朱彥修三子者出所論始與昔人

異矣河間曰中風癰瘧者非謂肝木之風實甚而卒中

之亦非外中於風由乎將息失宜心火暴甚腎水虛衰

不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不

用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐五志有所過極

而卒中者由五志過極皆為熱甚故也俗云風者言末

而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本氣病也

凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其志者多

有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛

氣衰而如此彥修曰西北氣寒為風所中誠有之矣東

南氣溫而地多濕有風病者非風也皆濕土生痰痰生

熱熱生風也三子之論河間主乎火東垣主乎氣彥修

主乎濕反以風為虛象而大異於昔人矣吁昔人也三

子也果孰是歟果孰非歟以三子為是昔人為非則三



子未出之前固有從昔人而治愈者矣以昔人爲是三子爲非則三子已出之後亦有從三子而治愈者矣故不善讀其書者往往致亂以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢但三子以相類中風之病視爲中風而立論故使後人狐疑而不能決殊不知因于風者真中風也因于火因于氣因于濕者類中風而非中風也三子所論者自是因火因氣因濕而爲暴病暴死之證與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病爲偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必因于風而後能也夫風火氣濕之殊望問問切之間豈無所辨乎辨之爲風則從昔人以治辨之爲火氣濕則從三子以治如此庶乎析理明而用治當矣惟其以因火因氣因濕之證強引風而合論之以真僞不分而名實相紊若以因火因氣因濕證分出之則真中風病彰矣所謂西北有中風東南無中風者其然歟否歟

### 附脉理

脉訣舉要曰中風脉浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危瀝痰風未可疎

### 附諸方

通關散 治卒中風邪昏悶不醒牙關緊閉湯水不下

細辛洗去土 猪牙皂角去子各一錢  
右爲末每用少許搐入鼻內候噴涕服藥 一方加半夏一錢

不卧散 治中風卒倒不知人事用此搐鼻即甦

川芎一兩半 石膏七錢半 藜蘆半兩 生甘草二錢半

右爲細末口噙水搐之

通頂散 治中風中氣昏憤不知人事急用吹鼻即甦

藜蘆 生甘草 川芎 細辛

人參各一錢 石膏五錢

右爲末吹入鼻中一字就提頭頂中髮立甦有嚏者可

治無嚏者不可治

搐鼻通天散 治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎 細辛 藜蘆 白芷

防風 薄荷各一錢 猪牙皂角刮去皮三箇

右爲細末用蘆筒納藥每用少許吹入鼻中

破棺散經驗方 治中風牙關已緊無門下藥

天南星末錢半 龍腦少許

右五月五日午時合每用半錢頻擦令熱牙自開

奪命散楊氏家藏方 治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼

上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風証並皆治之

甜葶藶

香白芷

天南星

半夏

巴豆去殼不去油各等分

右為細末每服半錢用生薑自然汁一呷調下牙關緊

急湯劑不下者此藥輒能治之小兒以利痰或吐為愈

解毒雄黃丸和劑方治中風卒然倒臥牙關緊急不醒

人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒

鬱金二錢半巴豆去皮油雄黃研飛二錢半

右為末醋煮麵糊丸如菉豆大每服七丸用熱茶清下

吐出頑涎立甦未吐再服如牙關急驟幹開灌下

稀涎散治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮搐

獨氣閉不通

光明晉磐一兩

猪牙皂角四箇肥實不

右為末每服半錢溫水調下風涎自出又云每服一錢

至二錢不妨須要研勻調服吐出痰涎便醒時醫官

獨聖散

二聖散

三聖散

四靈散已上四方並治痰涎壅盛口眼喎斜不能言者

用此吐出痰涎稍醒方可進藥其四靈散又吐虛痰之

劑也方見吐法

○已上諸方開闢竅之劑

麻黃膏宣明方治中風不省人事卒然倒地

右須王相日乙卯者採麻黃一秤揀去根一寸長取東

流水三石三斗以無油膩鐵量大小盛五七斗者可先

煮五沸掠去滓逐旋添水盡至三五斗以來漉去麻黃

淘在盆中澄定良久用細羅子濾去滓取清者鑑內再

熬至一斗再澄再慮取汁再熬至升半以來為度只是

動攪勿令着底恐焦了熬時忌雞犬陰人澄時須蓋覆

不得飛入塵土其藥放一二年不妨如膏稠用水解熬

再勻凡中風卒倒用此膏加入湯藥內服或用此膏

丸藥

小續命湯拔粹方經云陽之氣以天地之疾風名之此中

風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰之

際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有

也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此治法當和

臟腑通經絡便是治風然亦有賊風襲虛傷之者也治

法輕重有三治各不同中血脉外有六經之形證則從

小續命加減中府內有便溺之阻隔宜三化湯等通利

之外無六經之形証內無便溺之阻隔宜養血通氣大

秦芫湯羌活愈風湯主之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之

類鎮墜若中血脉中腑之病初不宜用龍射牛黃蓋射  
香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深  
入骨髓如油入麵莫之能出又不可一禁用大戟芫花  
甘遂瀉大腸大便損其陰血真氣愈虛和劑方云此藥  
治邪在血脉最妙

麻黃去節 人參去蘆 黃芩去腐 芍藥八分

甘草四分 川芎七分 附子炮去皮 防已七分

肉桂七分 防風去蘆 杏仁去皮尖

右咬咀共作一貼生薑三片水二盞煎至二盞去滓通  
口服如治中風不審六經之形証加減雖治與不治無

中風 心法附餘卷之一 十一

異也開則洒然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加  
減續命湯隨証治之

麻黃續命湯按草方 治中風無汗惡寒

麻黃 防風 杏仁

依本方加一倍宜針太陽經至陰出血崑崙舉蹻

桂枝續命湯按草方 治中風有汗惡風

桂枝 芍藥 杏仁

依本方加一倍宜針風府此二証太陽中風也

白虎續命湯按草方 治中風身熱無汗不惡寒

石膏 知母 一料中各加二兩 甘草

依本方加一倍 一方去附子

葛根續命湯按草方 治中風身熱有汗不惡風

葛根 桂枝 黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之  
賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二証陽明中風也

附子續命湯按草方 治中風無汗身涼

附子加一倍 乾薑加二兩 甘草加二兩

宜針隱白穴去太陰之賊也此一証太陰經中風也

桂附續命湯按草方 治中風有汗無熱

桂枝 附子 甘草

中風 心法附餘卷之一 十一

依本方加一倍宜針大谿此一証少陰經中風也

羌活連翹續命湯按草方 無此四証六經混淆繫於少

陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜服

小續命八兩 羌活四兩 連翹六兩

右古之續命混淆無經今立分經治療又分各經針刺

無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經

絕骨灸以引其熱此通經引熱是針灸同象治法之大

體也服法並如前

三化湯按草方 治中風外有六經之形証先以加減續

命湯隨証治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴姜製 大黃 枳實 羌活等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

潤腸丸 治証同前老人宜服

麻子仁另研 大黃酒燉各一兩半 桃仁泥 當歸尾

枳實去穢炒 白芍藥 升麻各半兩 人參

生甘草 陳皮各三錢 木香 枳郎各二錢

中風心法附餘卷之一

右除麻仁桃仁外為末却入二仁泥蜜丸梧子大每服

七八十九溫水食前下

大秦朮湯援萃方 治中風外無六經之形証內無便溺之

阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運動舌強不

能言宜養血而筋自榮

秦朮 石膏各三兩 甘草 川芎

當歸 羌活 獨活 防風去蘆

黃芩 白芍藥 吳白芷 白朮

生地黃 熟地黃 白茯苓各二兩 細辛五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天

陰雨加生薑七八片如心下痞加枳實一錢煎

羌活愈風湯援萃方 治肝腎虛筋骨弱語重難精神昏憤

及治風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半

身不遂心亂則百病生靜則萬病息此藥能安心養神

調陰陽無偏勝

羌活 甘草炙 防風去蘆 黃芪去蘆

人參去蘆 蔓荊子 川芎 細辛去蘆

枳殼去穢炒 地骨皮 麻黃去根 知母去皮

獨活 白芷 杜仲炒斷絲 秦朮去蘆

柴胡去苗 半夏湯洗 厚朴姜製 防己

中風心法附餘卷之一

熟地黃 前胡各二兩 芍藥 黃芩去腐

白茯苓各三兩 石膏 生地黃 蒼朮各四兩

桂一兩

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服如遇天陰

加生薑三片煎空心一服臨卧再煎渣服 常服之藥

不可失四時之輔如望春大寒之後加半夏柴胡人參

各二兩望夏穀雨之後加石膏黃芩知母各二兩季夏

之月加防己白朮茯苓各二兩望秋大暑之後加厚朴

藿香各二兩桂一兩望冬霜降之後加附子官桂各一

兩當歸二兩

祛風至寶丹 治風中臟痰涎昏冒及治諸風熱

防風 芍藥 各一兩 石膏 黃芩

桔梗 熟地黃 天麻 人參

羌活 獨活 各一兩 川芎 當歸 各一兩

滑石 三兩 甘草 二兩 白朮 一兩 三連翹

荊芥穗 薄荷 麻黃 去根不 芒硝

黃連 大黃 黃柏 細辛

全蠍 各五錢 梔子 六錢

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下

臨卧溫服

中風 心法附餘卷之一

排風湯 和劑方 治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精

神錯亂以至手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮 一兩 當歸 去蘆二兩 肉桂 去粗皮 芍藥

杏仁 去皮尖 芎藭 二兩 麻黃 三兩 甘草

防風 去蘆各二兩 白朮 二兩 獨活 茯苓 去皮各

右咬咀每服五錢水一鍾姜四片同煎溫服不拘時

○廣按此方已上治風中血脉中腑中臟之劑也

防風天麻散 宣明方 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯

或暴瘖難語內外風熱壅滯鮮頭目昏眩

天麻 防風 草烏頭 甘草

川芎 羌活 當歸尾 香白芷

白附子 荊芥穗 各半 滑石 二兩

右為末熟酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行

微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熟酒化下一丸或半

丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宣氣道如甚者更服防

風通聖散

○廣按此方已下開鬱行氣散風泛治之劑也

疎風湯 和劑方 治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃 去蘆二兩 益智仁 杏仁 各一兩 甘草 炙

升麻 各五兩

中風 心法附餘卷之一

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服脚登

熱水葫蘆以大汗出去葫蘆冬月不去

御風丹 聖惠方 治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎

斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

川芎 白芍藥 桔梗 細辛

白僵蚕 川羌活 天南星 姜製各半兩

麻黃 去根節 防風 去蘆 白芷 各一兩 乾生姜

甘草 炒各七 硃砂 二錢半

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸熟酒化下食

前日三服神昏有涎者加朱砂二錢半

續命黃散 大令良方 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口

眼瞶動或時搖擗亡失津液渴欲飲水此藥能扶榮衛

去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風 獨活 當歸 人參

細辛 葛根 芍藥 川芎

甘草 熟地黃 遠志 去心 荊芥 各五錢

官桂 七錢半 半夏 五錢 汗多不止加牡蠣粉

右咬咀每服一兩生姜二片水二盞煎至一盞去渣通

口服

獨活湯 大令良方 治虛風昏憤不自知覺手足痠癢坐卧

中風 心法附餘卷之一 十六

不寧或發寒熱若血虛不能服發汗藥及中風自汗尤

宜服之

川獨活 羌活 人參 去蘆 防風

當歸 細辛 茯神 去木 半夏

桂心 白微 遠志 菖蒲 去毛

川芎 各三錢 甘草 五錢

右咬咀每服一兩水一盞生姜五片煎至八分去渣食

後溫服

防風湯 本事方 治中風內虛語言蹇澀

石斛 酒炒 兩半 乾地黄 杜仲 去皮切 丹參 各兩三錢五分

防風 去蘆 川芎 麥門冬 去心 桂心

川獨活 各一兩

右咬咀每服八錢水二盞棗子二枚煎至八分去渣溫

服不拘時

大防風湯 和劑方 去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩

弱不能行履名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯惜名曰鶴

膝風

熟地黃 酒洗 二兩 白朮 二兩 羌活 去蘆 一兩 人參 去蘆 一兩

川芎 酒洗 附子 炮去皮 各一兩半 防風 去蘆 二兩

牛膝 去蘆 酒洗 二兩 甘草 炙 一兩 川當歸 酒洗 二兩 黃芪 去蘆 二兩

中風 心法附餘卷之一 十七

白芍藥 二兩 杜仲 去粗皮 炒 令 二兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎至八

分食後溫服

芎歸飲 治中風後人事虛弱

芎藭 當歸 去蘆 酒 防風 去蘆 各 等分

右咬咀每服五錢水一鍾煎至半鍾不拘時服

○已上諸方散風之劑

蘇合香丸 療傳尸骨蒸瘧帶肺癰症忤鬼氣卒心痛霍

亂吐痢時氣鬼魅瘴痞赤白暴痢疔血月閉瘕癖丁腫

驚癇及小兒吐乳大人狐狸等病 小兒用大緋絹袋

<p>盛當心帶之一切邪鬼不敢近 凡人痰氣及中風痰涎壅上喉中有聲不能下者用青州白丸子同凡生薑自然汁化下立效 產婦中風小兒驚風牙關緊硬不開及不省者擦牙即開然後用風藥治之 小兒吐瀉驚疳先用火焙此藥然後用生薑葱白自然汁化開白湯調灌 腳氣衝心用草蘇子去殼槌碎和丸敷貼脚心疼痛立止 心復絞痛中滿嘔吐姜湯化下 大人小兒傷風咳嗽姜葱汁白湯調下 中風狂亂如見鬼神者白湯調下</p>	<p>白木 青木香 硃砂 研水飛 烏犀屑</p>	<p>中風 心法附餘卷之一 十八</p>	<p>安息香 另為末用無灰酒 草撥 白檀香</p>	<p>沉香 麝香 研 訶梨勒 煨取 丁香</p>	<p>香附子 各二兩 龍腦 研 薰陸香 另研</p>	<p>蘇合香油 各一兩 入安息香膏內</p>	<p>右為末研勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大取井花水溫冷任意下四九老人小兒服一丸溫酒化服</p>	<p>烏藥順氣散 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻手足癱瘓言語蹇澁者宜先服此藥疎通氣道然後進以風藥</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

<p>麻黃 去根節 陳皮 去白 烏藥 各二兩 僵蚕 去絲</p>	<p>川芎 枳殼 去穢 甘草 白芷</p>	<p>桔梗 各一兩 乾姜 炮半兩 右咬咀姜水煎服</p>	<p>八味順氣散 凡中風之人先服此藥順氣後進風藥</p>	<p>白木 一錢 白茯苓 八分 青皮 七分 陳皮 七分</p>	<p>白芷 六分 烏藥 六分 人參 八分 甘草 四分</p>	<p>每服六錢水一盞煎半盞溫服仍以酒化蘇合香丸間服妙</p>	<p>人參順氣散 和劑方治感風頭疼鼻塞聲重及一應中風宜先服此藥疎通氣道然後進以風藥</p>	<p>中風 心法附餘卷之一 十九</p>	<p>乾姜 人參 各一兩 川芎 去蘆 甘草 炙</p>	<p>桔梗 去穢 厚朴 去皮姜 白朮 去梗 陳皮 去白</p>	<p>白芷 麻黃 去節 各 葛根 三兩半</p>	<p>右咬咀每五錢水一盞姜三片棗一枚薄荷五葉煎至七分溫服</p>	<p>勻氣散 治腰腿疼痛手足攣拳及治中風不語口眼喎斜半身不遂等証前代曾服有效</p>	<p>白朮 二兩 煨 天台烏藥 兩 天麻 半兩 沉香</p>	<p>青皮 一兩 白芷 人參 去蘆 甘草</p>	<p>紫蘇 木瓜 各二錢半</p>
----------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------

右咬咀作十服每服水一盞生姜三片煎至半盞去渣溫服

○廣按中風中氣之症乃痰火鬱滯便用散風瀉火豁痰之劑卒不能開宜先用此等開鬱行氣之藥治之鬱開氣行其病自已

○已上諸方順氣之劑中風先宜服此

川芎石膏湯宣明方治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘

嗽鼻塞口瘡煩渴淋閉眼生翳膜此藥清神爽志宣通

氣血治中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎 芍藥 當歸 山梔子

中風心法附餘卷之一 二十

黃芩 大黃 菊花 荊芥穗

人參 白朮已上各半兩 滑石四兩 寒水石二兩

甘草三兩 桔梗二兩 砂仁二錢半 石膏一兩

防風 連翹 薄荷葉各一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服水調

亦得忌姜醋發熱物

防風通聖散宣明方論曰風寒熱諸疾之始生也人之藏

府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也

眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風火生於熱以

熱為本而風為標凡言風者即風熱病也氣壅滯筋脉

拘倦肢體焦癢頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌

乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱

結便溺淋閉或夜臥驚汗咬牙睡語筋惕驚悸或腸胃

拂鬱結水液不能浸潤於周身而但為小便多出者或

濕熱內餘而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或

因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停濕而泄或燥

濕往來而時結時泄者或表之陽和正氣是也與邪熱

相合并入於裏陽極似陰而戰煩渴者是也與邪熱

虛氣又不已者經言邪熱與衛氣并八於裏則寒戰也

已或風熱走注疼痛麻痺者或腎水真陰衰虛心火邪

中風心法附餘卷之一 二十一

熱暴甚而僂仆或卒中久不語或一切暴瘖而不語語

不出聲或暗風癰者或洗頭風或破傷風或中風諸潮

搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫厲不能辨者

或熱甚拂結而反出不快者或熱極黑陷將死或大人

小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑偏身黑紫紫白

斑駁或面鼻生紫赤風刺癢疹俗呼為肺風者或成厲

風世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒蕪解

利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身體痠痛者并

兩感諸証無治產後血虛損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱

甚為諸熱証腹滿澀痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生



風而熱燥鬱舌強口噤筋惕肉瞤一切風熱燥証鬱而惡物不下腹滿振痛而昏者惡物過多而不吐者不宜服之兼消除太小瘡及惡毒無治墮馬打撲傷損疼痛或因熱結大小便澀滯不通或腹急痛腹滿喘悶者並皆治之

防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 薄荷葉 麻黃 連翹

芒硝將硝製過者是 石膏 黃芩

桔梗各一兩 滑石三兩 甘草二兩 荆芥

白木 梔子各二錢五分

右為末每服三錢水一大盞生姜三片煎至六分溫服

中風 心法附餘卷之一 三十一 三百三十四

涎嗽加半夏半兩姜製此藥不可無生姜同煎 劉廷

瑞方有宿砂無芒硝其餘皆同

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是

風熱煩燥之故也

當歸 川芎 梔子 羌活

大黃 防風 龍膽草等分

右為末蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

○廣按此劑乃瀉肝火之藥蓋肝主風風動則木搖故

以此藥主之又子嘗見中風之証多是老年因怒而

成蓋老年腎水真陰衰虛火寡子畏適因怒動肝火

火無所制得以上升心火得助邪熱暴甚所以僣仆

不知人事也火載痰上所引舌強不語口眼喎斜痰

涎壅盛也治法先吐痰火以治其標次則豁痰瀉火

以治其本豁痰用星附湯省風湯瀉火用防風通聖

散瀉青丸之類是也 左癱右瘓者因氣血虛而痰

火流注也血虛則痰火流注於左而為左癱氣虛則

痰火流注於右而為右瘓治法左癱宜補血藥無散

痰火藥右瘓宜補氣藥無散痰火藥急治則可久則

痰火鬱結難治也

愈風丹 治風疾常宜服此調理

中風 心法附餘卷之一 三十一 美麻言

防風 連翹 麻黃 黃柏

黃連各半兩 川芎 當歸 赤芍藥

薄荷葉 石膏 桔梗 何首烏各一兩

熟地黃 羌活 細辛 甘菊花

天麻各一兩 黃芩一兩半 白木 荆芥各二錢

梔子七錢半 滑石五兩 甘草二兩 僵蚕半兩

熱甚加大黃朴硝各一兩 朱砂金箔為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒化

下

龍皇丹 治諸風熱壅痰涎盛

牛膽南星	朱砂	片腦	防風	薄荷	黃芩	黃連	加青黛	右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸噙化	○廣按此方既治風熱又無理痰之劑夫中風之証多是濕土生痰痰生熱熱生風也若是瀉熱散風而不豁痰則病何由而止哉此方但是風熱無痰為病無不治也	清涼丹	治風熱壅實上攻頭面口眼喎斜語言不正肌肉攣動面若虫行及治傷寒熱盛狂言昏冒剛症及一切風熱並皆治之	中風	心法附餘卷之一	片腦	牛黃	蠅稍	石膏	甘草	珍珠末	大黃	南星	右為細末研勻煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸薄荷湯化下食後臨卧服	千金保命丹	治諸風痙瘓不能語言心忪健忘恍惚去來頭目暈眩胸中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心精神昏憤又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘感
------	----	----	----	----	----	----	-----	--------------------	------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------	----	---------	----	----	----	----	----	-----	----	----	-------------------------------	-------	---------------------------------------------------------

虛煩少睡喜怒不時或發狂顛精神昏亂及小兒驚癇驚風抽搐不定及大人暗風并羊顛猪顛發叫	珠砂	珍珠	南星	麻黃	白附子	雄黃	龍腦	琥珀	僵蚕	犀角	麥門冬	枳殼	地骨皮	神曲	茯神	遠志	人參	柴胡	金箔	牛黃	天麻	腦子	麝香	膽礬	牙硝	毫車	天竺黃	防風	甘草	桔梗	白木	升麻	中風	心法附餘卷之一	蟬蛻	黃芩	荊芥	右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下不拘時服忌猪羊鰕蟹桃動風引痰之物及猪羊血更加大川烏炮去皮臍姜製半夏白芷川芎猪牙皂角各一兩和前藥丸服尤妙	真珠丸	治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守舍狀若驚悸	真珠母	熟地黃	人參	酸棗仁	栢子仁	犀角	茯神	沉香
-----------------------------------------	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	---------	----	----	----	--------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------	-----	-----	----	-----	-----	----	----	----

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五

十九金錢薄荷湯食後吞下日三服

活命金丹 治中風神不清

涼膈散加青黛藍根

右為細末煉蜜為丸如彈子大硃砂為衣金箔蓋每服

一丸茶清化開食後臨卧服

涼膈散見傷寒類

稀茶丸 清生方 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澁手

足緩弱

稀茶草 一名火欬草生於沃間帶露氣者是

右五月五日六月六日收採洗去土摘其葉不拘多少

中風

心法附餘卷之一

下六

三百三十六

九蒸九暴每蒸用酒蜜水酒之蒸一飯久暴乾為末煉

蜜丸如梧桐子大每服百九空心溫酒米飲任下

清陽湯 按草方 治中風口喎頰顙急緊胃中火盛必汗不

止小便頻數

升麻 黃耆

當歸身 葛根 錢半

紅花 一分

蘇木 五分

炙甘草 一錢 酒黃柏 一錢

生甘草 五分 桂枝 一分

右咬咀作一服酒三盞煎至一盞三分去渣溫服

正舌散 聖惠方 專治中風舌本強硬語言不正

蝎梢 去毒二分 茯神 去木微炒 薄荷 焙一兩一方無茯神

右為末每服一二錢溫酒調下或以擦牙頰間亦好

轉舌膏 治中風痙瘓舌強不語

涼膈加石菖蒲遠志

右為末煉蜜為丸如彈子大硃砂為衣每服一丸薄荷

湯化開食後或臨卧服

涼膈散見傷寒類

柯子湯 治諸風失音不語

柯子 四箇半 桔梗 半兩半 甘草 一寸半

右為末每服五錢用童子小便一鍾煎至七沸調服甚

者不過三服

竹瀝飲 治中風不語

中風 心法附餘卷之一

三七

備

用淡竹或苦竹或青水竹去枝葉截作一尺餘長劈作

二片每用不拘多少或五六十片以新汲井水浸一宿

如用急只浸一二時却以磚二片側立閣竹仰於磚上

磚內以熟火烘竹青熱磚外以碗盛竹流下清水以瓦

瓶收貯外以冷水浸瓶收用或沉井底亦好每用半鍾

與病人服之或入煎藥內服亦可

一方 治中風面目舉引口偏不能言

獨活 竹瀝 生地黃汁

右等分水二盞煎至一盞通口食後服

一方 治肝臟中風心神煩熱言語蹇澁不得卧

竹瀝

荊瀝

葛根汁

生姜汁

白蜜 各一兩

右五味汁和勻頻頻服不拘時加童子小便尤妙

○已上諸方瀉火之劑瘦人宜此

蘇青丹 治風痰壅盛手足癱瘓及小兒驚風

青州白丸末 三兩

蘇合香丸末 一兩

右二末和勻用姜汁麵糊為丸如梧桐子大淡姜湯吞

下三四十丸

星香湯 易簡方 治中風痰盛服熱藥不得者

南星 八錢 木香 一錢

中風 心法附餘卷之一

右咬咀每服四錢姜十片水一大盞煎七分溫服

星附湯 治中風痰壅六脉沉伏昏不知人

附子 生用去皮 南星 生用各一兩 木香 半兩 見火

右咬咀每服四錢水一大盞姜九片煎七分去渣溫服

虛寒甚者加天雄川烏名三建湯痰涎壅盛聲如牽鋸

服藥不下者宜於關元丹田二穴多灸之

○廣按風本於熱而生豈有虛寒之理用附子取効者

因肥白人多濕故中節耳正丹溪所謂肥白人多濕

少用烏頭附子行經是也非肥白人決不可用夫三

建湯只可用於中寒陰毒之症豈可施於中風陽熱

之症乎學者詳之

星附散 本事方 治中風雖能言口不喝斜而手足彈曳者

天南星 姜製半夏 姜製 人參

白附子 炮 白茯苓 去皮 川烏 炮 去皮 黑附子 炮 去皮

沒藥 各等分

右咬咀每服五錢水酒各一盞煎至八分熱服併進得

汗為度

大醒風湯 和劑方 治中風痰涎壅盛身不遂及歷節痛

風筋脉拘急

天南星 生用 防風 生用 獨活 生用

中風 心法附餘卷之一 附子 生用 去皮

全蝎 微炒 甘草 生用各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜十片煎七分溫服

三生飲 治卒中風昏迷痰涎壅併口眼歪斜脉沉無熱

者可服

天南星 生用 川烏 生用 附子 生用 去皮 木香 二錢半

右咬咀每服五錢水二盞姜十片煎八分溫服

省風湯 治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不遂

半夏 生用 防風 各一兩 甘草 炙半兩 全蝎 去毒二兩

白附子 生用 川烏 生用 木香 天南星 生用 各半兩

右咬咀每服半兩水一盞姜十片煎七分溫服

省風湯 和濟方 治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋

脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憤一切風證可服

防風 去蘆 大南星 生用 各半夏 白好者湯泡七次

生甘草 黃芩 去腐各

右吹咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣溫

服不拘時服時醫屢驗効加天麻六錢

與導痰湯相合煎服尤妙 導痰湯 見痰類

○廣按此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也

中風 心法附餘卷之一 三十

絲痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星 姜製 半夏 湯泡七次 枳實 錢二

茯苓 錢二 橘紅 一錢半 石菖蒲 人參 各一錢

竹茹 七分 甘草 半錢

右作一服水一鍾生姜五片煎至一鍾食後通口服

○廣按中風不語雖是痰火上壅如此多有挾虛者此

藥豁痰清熱利氣補虛無備可謂簡而當者也

三生丸 治痰厥頭痛中風痰涎壅盛者

半夏 白附子 天南星 各等分

右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸如菜豆大每服四五

十丸食後姜湯下

青州白丸子 和劑方 治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎

沫及小兒驚風並皆治之

半夏 生用 天南星 生用 白附子 生用

川烏 頭去皮臍生

右搗羅為末以生絹袋盛於井花水內攪出木出者更

以手揉令出以滓更研再入絹袋攪盡為度於篋盆中

日晒夜露每日一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬

十日去水晒乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為丸如

菜豆大常服二十丸生薑湯下不拘時如癱瘓風以溫

酒送下如小兒驚風薄荷湯下三五丸

加味青州白丸子 百一選方 治卒中風邪半身不遂口眼

喎斜痰涎閉塞及小兒諸風並皆治之

白附子 天南星 半夏 川姜 各二兩

天麻 白僵蚕 全蝎 各一兩 川烏 頭去皮臍生

右並生用為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三五十

丸生薑湯下不拘時如癱瘓風溫酒下小兒驚風薄荷

湯下

真方白丸子 和劑方 治中風痰涎壅盛口喎不語半身不

遂及小兒驚風潮搐初覺中風可常服之永無風痰壅

隔之患

大半夏湯炮七次白附子洗淨天南星累炮川烏頭去皮

天麻全蝎去毒炒木香枳殼去穢

右為細末生薑汁打糊丸如梧桐子大每二十九食後

臨卧茶清熱水下癰瘰風酒下日三服小兒驚風薄荷

湯下二丸

○廣按此方既是散風豁痰又能利氣此上二方尤為

得之

上清白附子丸 治諸風痰甚頭目眩暈欲倒嘔噦

惡心恍惚不寧神思昏憤肢體倦痛頭項強硬手足頑

麻常服除風化痰清利頭目

白附子炮半夏湯洗川芎 菊花

南星炮僵蚕炒陳皮去白旋覆花

天麻各一兩全蝎炒半兩

右為細末用生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三

十九食遠生薑湯下

半夏飲 治風痰心腹煩滿嘔吐不欲飲食

半夏湯洗麥門冬去心赤茯苓去皮白朮

桔梗 青皮去白前胡 枇杷葉去毛

防風 大腹皮各二分係厚朴姜製一

右咬咀每服三錢水一盞生薑二片煎至六分去滓不

拘時熱服

龍腦丸 治中風身如角弓反張不語昏悶

龍腦細研一錢麝香細研蟬殼 牛黃細研各

乾蝎炒南星炮硃砂研阿膠炒

香墨 白附子炮裂防風去蘆羚羊角屑

肉桂去皮羌活各半兩烏蛇肉酒浸去皮骨

右為末入別研藥和勻煉蜜和搗三五百杵丸如菉豆

大每服十丸用水酒下不拘時

牛黃定志丸 治心經中風精神不寧此藥壓驚鎮心化

中風 心法附餘卷之一 三十一

涎安神 牛黃研龍腦研乾蝎炒僵蚕炒

白附子炮各半兩雄黃研一兩丹砂研二兩天麻酒浸焙

甘草炙各三錢琥珀研七錢半夏湯洗七次焙乾

麝香研半錢烏蛇酒浸去皮骨炙一兩南星牛膽製

右為細末煉蜜為丸如雞頭子大每服一丸細嚼荊芥

人參湯下食後臨卧服

琥珀壽星丸 寧神定志去風化痰

天南星一斤掘坑深二尺用炭火三十斤於坑內燒紅

取出炭掃淨用好酒五升澆之將南星趁熱下坑內用

<p>益急蓋記泥壅合經一宿開取出焙乾為末入琥珀末一兩硃砂末五錢和勻以生薑汁煮糊熟然後入猪心血三具攪勻和末為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸人參湯空心送下日三服神効時醫用屢効</p> <p>搜風丸 治風熱上攻目昏耳鳴鼻塞頭痛眩暈及治躁熱上壅痰涎涎嗽心腹痞痛大小便結滯</p> <p>人參 茯苓 天南星 薄荷 各半兩</p> <p>藿香葉 二錢 乾生薑 白礬 生 寒水石</p> <p>半夏 各一兩 蛤粉 黃芩 大黃 各二兩</p> <p>滑石 牽牛 各四兩</p> <p>中風 心法附錄卷之一 三四</p> <p>右為末滴水為丸如小豆大每服十丸生薑湯下加至二十九日三服</p> <p>○廣按此方治痰與熱兼利大小二便老年常服之藥也</p> <p>不換金丹 治中風口喎</p> <p>荊芥穗 白僵蚕 甘草 防風 各一兩</p> <p>天麻 一兩 川烏頭 生用 白附子 生用 羌活 去蘆 各半兩</p> <p>細辛 去葉 川芎 蝎稍 去毒炒 藿香 各半兩</p> <p>薄荷 三兩</p> <p>右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>下如口喎向左用此藥右腮上塗之便正</p> <p>三蛇散 治諸風口眼喎斜</p> <p>蜈蚣 三條用蜜炙一條酒浸</p> <p>南星 三箇每箇切作四塊 白芷 半兩</p> <p>右為細末入真麝香少許熱酒調一錢食後服</p> <p>牽正散 楊氏方 治中風口眼喎斜半身不遂</p> <p>白附子 白僵蚕 全蝎 去毒並 生用</p> <p>右等分為末每服二錢熱酒調下不拘時</p> <p>天仙膏 仁存方 治卒暴中風口眼喎斜</p> <p>天南星 大 一 白芨 二錢 大草烏頭 一箇 僵蚕 七箇</p> <p>中風 心法附錄卷之一 三五</p> <p>右為末用生鮮血調成膏傳喎處覺正洗去</p> <p>天南星膏 仁存方 治証同前</p> <p>天南星 不拘多少 為末</p> <p>右用生薑自然汁調左喎貼右右喎貼左如正洗去</p> <p>一方用草麻子去殼爛搗右喎塗左左喎塗右 或鱧魚血入麝香少許塗之即正</p> <p>治中風口喎灸法</p> <p>以筆管五寸長插入耳內外以麪塞四圍勿使透風一頭以艾灸七七壯右喎灸左左喎灸右耳痛亦灸得又灸法 仁存方 治口喎即効</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

耳垂不用麥粒大艾炷灸三壯左喎灸右右喎灸左

○已上諸方豁痰之劑肥人宜此

○廣按中風之証有因外感有因內傷昔人言風者外感也東垣言氣河間言火丹溪言痰者內傷也外感者其人內有鬱熱以致腠理疎豁適遇暴風而卒中之內傷者其人膈間有痰下元水虧適因忿怒傷肝肝氣上升為火火無所制火載痰壅遂致不救矣氣也火也痰也其實一源流也為治之法外感者分中血脉中腑中臟之異而治之內傷者論是氣是火是痰之的而理之先用開關竅之藥次用治本病之中風

心法附餘卷之一 三十一

劑是也 又按中氣之証亦與中風相類但中風之証身溫有痰涎多不能治中氣之証身涼無痰涎須臾便醒其故何也夫中風中氣一源流也皆由忿怒所致致人之喜怒思悲恐五志惟怒為其所以為病之暴也蓋少壯之人氣血未虛真水未竭適因怒動肝火火畏於水不能上升所以身涼無痰涎然須臾便醒者水旺足以降火也此名為中氣老衰之人氣血俱虛真水已竭適因怒動肝火火寡於畏得以上升所以身溫有痰涎然多不能治者水竭無以降火也此名為中風 雖然亦有少壯之人而中風不治者

男子乃色慾過多下元水虧不能制火女人乃經後產後去血過多不能配氣適因忿怒動火而陽氣無所依附則隨火而發越矣陰也血也豈不為陽氣之根本乎

大烏藥順氣散 治諸風氣手足癱瘓

歸芍地黃芩 烏藥陳地龍 香附縮砂枳

芩半與防風 蘇桔并甘草 乳沒沉香停

姜棗均煎服 諸風氣立通

當歸 芍藥 生地黃 川芎

烏藥 陳皮 地龍 香附子

砂仁 枳殼 黃芩 半夏

防風 紫蘇 桔梗 甘草 各半兩

乳香 沒藥 沉香 各二錢五分此三味為末煎熟藥加內服

右用姜棗同煎每一貼一兩後入乳沒沉香調下

換骨丹 治癱瘓風中風口眼喎斜半身不遂并一切風癱暗風並宜服之

我有換骨丹傳之極幽秘疎開病者心扶起衰翁臂

氣壯即延年神清目不睡南山張仙翁三百八十歲

槐皮芩朮並仙人防首蔓十件各停勻苦味香減半

龍麝即少許硃砂作衣纏麻黃煎膏九大小如指彈



修合在深房勿令陰人見夜卧服一粒遍身汗津滿  
萬病自消除神仙為侶伴

麻黃煎膏 仙木 槐角子取子 桑白皮

川芎 香白芷 威靈仙 人參

防風 何首烏 蔓荊子各二兩 苦參

五味子 廣木香各半兩 麝香少許 龍腦少許

硃砂研為衣不

右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千下

每兩分作十丸每服一丸以硬物擊碎溫酒半盞浸以

物蓋不可透氣食後臨卧一咽嚥之衣蓋覆當自出汗

中風心法附餘卷之一 即差和胃湯及避風寒茶下半丸蓋出汗入膏時如稠

再入水少許煎勦入藥唯少為妙其麻黃膏不可多其

麻黃膏煉法見前

續命丹 一名神授保生丹

治男婦人左癱右瘓口眼喎斜半身不遂失音不語

遍身疼痛打撲傷損外感風邪及諸風癰暗風角弓反

張目睛上視搖擗無時但患風疾皆可服之

天南星用米泔水浸七日每日換水去

川烏頭用米泔水浸七日每日換水去

草烏頭用米泔水浸七日每日換水去

皮臍法與前同去

五靈脂清水淘去沙石

地龍去土水洗淨 乳香研 沒藥

白殭蚕去足嘴 羌活 天麻各二兩

全蝎去毒 白附子生用 辰砂研 輕粉研

雄黃研各一兩 麝香研一兩

右為細末用生薑自然汁煮糯米飯攪和作劑於石臼

內杵五千下丸成錠子晒乾以瓦罐收貯每服一錠生

姜自然汁和好酒一處磨化臨卧通口熱服以衣被厚

蓋汗出為度服藥後忌諸動風之物三七日

○廣按癰瘕之証因虛而痰火流注為病當時遇治為

中風心法附餘卷之一 妙若失之於初痰火停久便成癰瘕久便生火火能

傷氣耗血而病猶難治矣若疼痛則為實用疎通關

節之藥而以腦麝少許為引經如劉河間換骨丹之

類可取効也其續命丹雖相倣換骨丹然麝香似乎

太多耗散真氣必矣後人修合此藥當知減去麝香

為美若不疼痛則為虛服此疎通關節之藥亦要無

眼補氣血藥如左癱每日服四物湯一劑右瘓每日

服四君子湯一劑如此則攻補兼施而癰瘕可愈矣

其腦麝乃非經之藥龍腦既是一錢五分想

麝香只是一錢二分五厘恐傳寫之誤也

腦麝祛風丸 治左癱右瘓最効

神効活絡丹	治風濕諸痺肩臂腰膝筋骨疼痛口眼喎	斜半身不遂行步艱辛筋脉拘攣能清心明目寬膈宣	通氣血年逾四十預服十數丸至老不生風病
川芎	防風 <small>各十二兩</small>	滑石 <small>一斤</small>	草烏 <small>十兩</small>
兩頭尖 <small>炮</small>	甘草 <small>各八兩</small>	川烏 <small>炮去皮尖</small>	桔梗
寒水石 <small>各四兩</small>	何首烏 <small>二兩</small>	茴香 <small>一兩七錢</small>	廣木香
地骨皮 <small>一兩七錢</small>	白芨 <small>一兩四錢</small>	藁本	甘松
白芷	香附子	良姜	薄荷
當歸	白芍藥	薤活	川椒 <small>去子炒</small>
廣零陵香	藿香葉	全蝎 <small>不炒</small>	細辛
荊芥穗	甘菊花	麻黃 <small>去根各一兩</small>	人參
升麻	天麻	僵蚕 <small>炒斷絲</small>	乾葛 <small>各七錢</small>
蘄州白花蛇	<small>一條去頭尾酒浸三日</small>	烏梢蛇 <small>一條</small>	<small>同上</small>
中風	<small>心法附錄卷之一</small>	白麵 <small>半斤</small>	酒
麝香 <small>一錢同清石為末</small>	豆粉 <small>四兩為糊出</small>	白麵 <small>半斤</small>	酒
右四十一味為末	蛇酒打糊為丸	如彈子大	滑石為衣
晒乾收用	每服一丸	臨卧茶清或酒化服	忌諸熱性物
○廣按丹溪曰	予每治病用東垣之藥	効仲景處方	庶
品味數少則藥力專精	今白龍丹用四十一品藥可	謂大繁矣	幸而有君臣佐使之分
有二蛇可仗	似可		
用爾			

麻黃 粉草炙各五錢 甘菊花去梗 北細辛去苗  
白茯苓去皮各二兩  
右咬咀每五錢水一盞半姜三片棗一枚煎服不拘時  
○廣按用藥治病之法寒因熱用熱因寒用正治也今  
中風癰瘕之証本風火陽邪而用烏附等熱藥治之  
何哉蓋中風癰瘕乃濕痰死血結滯於臟腑經絡之  
間非烏附等熱藥而能開散流通之乎此非正治乃  
從治也書云從少從多各觀其事則從治之藥只可  
為引經而已丹溪云肥白人多濕少用烏附行經是  
也此方既用附子又用側子官桂助之其理安在哉  
中風 心法附餘卷之一 四十一  
本欲削去姑存以待肥白多濕之人減而用之中病  
則已不可過服非肥白多濕之人不可用也  
烏荊丸和劑方 治諸風緩縱言語蹇澁遍身頑麻皮膚瘙  
痒又治婦人血風頭疼眩暈如腸風臟毒下血不止服  
之効  
川烏炮去皮臍一兩 荊芥穗二兩  
右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸溫酒熱  
水任下  
烏附丸瀝藥方 去風踈氣  
川烏二十箇炮去皮 香附子半斤姜汁浸一宿炒

右焙為末酒糊為丸梧子大每服十數丸酒下肌體肥壯及有風疾宜服

烏龍丸 治諸風

烏頭 三兩炮 天南星 炮 半夏 麩炒

烏藥 白膠香 另研各半兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服四九空心酒下

四生丸 簡易方 治中風左癱右瘓口眼喎斜

川烏 去皮 五靈脂 當歸尾 骨碎補 各等分

右為末用無灰酒打糊丸如梧桐子大每服十九加至十五丸溫酒下服此藥不可服靈寶丹

中風 心法附錄卷之一 四十四

如聖散 治左癱右瘓半身不遂口眼喎斜腰膝疼痛手足頑麻語言蹇澁行步艱難偏身瘡癰上攻頭目耳內

蟬鳴痰涎不利皮膚瘙癢偏正頭疼一切諸風及破傷風角弓反張蛇傷犬咬金瘡諸風濕等瘡並皆治之

川烏 炮 草烏 炮 蒼朮 各四兩 金釵石斛 兩

白芷 川芎 細辛 當歸

防風 麻黃 荊芥 何首烏

全蝎 天麻 藁本 各五錢 甘草 三兩

人參 三錢 兩頭尖 二錢

右為細末每服一錢臨卧用溫茶或溫酒少許調下切

不可多飲酒服藥後忌一切熱物飲食一時恐動風氣服藥覺有麻是効也亦可敷貼

神仙飛步丹 治諸風濕癱等証

蒼朮 八兩 草烏 四兩不 杜若 各一

右用生薑連鬚葱各四兩搗爛和藥末拌勻以磁器蒸

藥於內紙封勿令出氣春三夏二秋五冬七日取出晒

乾或焙乾與姜葱同為細末醋糊丸如梧桐子大每服

十五丸空心茶酒任下忌發熱之物加至二十九孕婦

勿用

仙傳黑虎丹 治男子婦人虛弱血氣衰敗筋骨寒冷外

中風 心法附錄卷之一 四十五

感風濕傳於經絡手足麻木腰腿疼痛久則偏枯左癱

右瘓口眼喎斜諸中風氣不能行履並皆治之

蒼朮 米泔水浸二宿 草烏 洗淨去皮

生薑 洗淨切作片 葱 連鬚切半斤

右四味和一處拌勻燉之春五日夏三日秋七日冬十

日每日一番拌勻候日數足晒乾

五靈脂 洗淨 乳香 研 沒藥 研各五錢 穿山甲 炮去灰

自然銅 火煨醋淬

右同前藥為末用好醋糊為丸如梧桐子大每服三十

丸空心熱酒送下間日服尤妙婦人血海虛冷肚腹疼

痛臨卧醋湯下止服二三十丸不可多服服後不可飲冷水冷物但覺麻木為効孕婦不可服

虎脰骨酒濟生方治中風偏枯四肢不隨一切諸風學拳者並治之

石斛去根

石楠葉

防風去蘆

虎脰骨炙

當歸去蘆

茵芋葉

杜仲去粗皮

牛膝川者去蘆

川續斷

川芎藭

金毛狗脊燎去毛

川巴戟去心各一兩

右件對如豆大以絹囊盛藥用無灰好臘酒一斗漬之十日後每服一盞有量服二三盞溫服

中風

心法附餘卷之一

四十六

○廣按中風之証本風火陽邪宜用辛涼之劑以治之

而中風成癱瘓既久者乃痰火拂鬱於辛涼藥中若

無香熱之藥為之向導則將杆格而不能入也古方

中或用腦麝或用烏附或用酒浸正此意耳後人不

諳方中既有烏附腦麝而又用酒浸不無積薪救火

乎夫大寒凍海惟酒不冰其性寒熱數今觀虎脰

骨酒用藥辛涼最合其宜故特錄之以為矜式若夫

治風藥與補虛藥中如無烏附腦麝皆可用浸酒假

酒行藥勢及便於服餌也

舒筋保安散 治左癱右瘓筋脉拘攣身體不遂脚腿少

力乾濕脚氣及濕滯經絡走注疼痛久不能去用此宣通則愈

木瓜五兩

草薢

五靈脂

牛膝酒浸

續斷

白蠟炒

松節

白芍藥

烏藥去木

天麻

威靈仙

黃耆

當歸

防風

虎骨酒炙各兩

右用無灰酒一斗浸上藥二七日緊封扎罈口待日數

足取藥焙乾搗為細末每服一錢用藥酒半盞調下如

酒盡用米湯調下 又方金毛狗脊一兩却將乳香白

膠香各一兩同研入乾藥末內

中風

心法附餘卷之一

四十七

一方 治風癱不能行動

防風去蘆

草薢

當歸

桔梗

敗龜板

虎骨

川牛膝

枸杞

秦艽

晚桑沙炒黃

羌活

乾茄根飯上蒸過

蒼木炒七次

蒼耳子

五加皮各二兩

右判碎用絹袋盛藥以無灰酒一斗浸罈內密固煮滾

封七日開取時不可向罈口恐藥氣冲眼每日早午

晚間病人自取酒一小盞服之不許多服病痊藥盡以

藥粗晒乾研為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十

丸酒送下日三服忌食動風物

○廣按已上二方浸酒亦妙亦不讓於虎脰骨之酒矣  
靈應丹 治癰瘡四肢不舉風痺等疾

用麻黃五斤去根節剉一寸取河水五斗以無油膩鍋  
煮至一斗以來漉去麻黃冷定用細羅子濾去滓取清  
者鍋內再熬成膏

白芷 桑白皮 蒼朮 甘松

浮萍 各二兩 川芎 苦參 各三兩

右為細末以麻黃膏為丸如彈子大每服一丸溫酒化  
下臨卧服隔二三日再服手足即時輕快及治卒中風  
邪涎潮不利小兒驚風服之立効但熬時要動攪勿令

中風 心法附餘卷之一 四十八  
着底焦了熬膏時忌雞犬婦人見之

全生虎骨散 簡易方 治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌  
用麻黃發汗恐津液枯竭惟當潤筋去風

當歸 一兩半 赤芍藥 川續斷 白朮

藥本 虎骨 各一兩 烏蛇肉 半兩

右為末每服二錢溫酒食後調下骨中疼痛加生地黃  
一兩膩寒自利者加天雄半兩

安魂琥珀丹 治中風左癱右瘓口眼喎斜心神不寧

天麻 川芎 防風 細辛

白芷 羌活 川烏 炮去皮 荊芥穗

僵蚕 各一兩 薄荷葉 三兩 全蝎 粉草

藿香 硃砂 各半兩 麝香

珍珠 琥珀 各一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣空心茶清或  
酒化下一丸若蛇傷狗咬破傷風牙關緊急先用一丸  
擦牙後用茶清調下一丸如小兒初覺出痘疹即用茶  
清調一丸與服大能安魂定魄及疎風順氣

○已上諸方治癰瘡之劑

○預防中風 新增 出乾坤生意

附諸賢論

中風 心法附餘卷之一 四十九

夫聖人治未病之病知未來之疾此其良也其中風者必  
有先兆之證覺大姆指及次指麻木不仁或手足少力  
或肌肉微掣者此先兆也三年內必有大風之至經云  
急則治其標緩則治其本宜調其榮衛先服八風散愈  
風湯天麻丸各一料為効宜常服加減防風通聖散預  
防其病則風疾不作而獲其安矣

愈風湯 初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之聖藥  
也 又治中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以行  
導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之  
然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一句之

通利如此乃常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

羌活

甘草

防風

當歸

蔓荊子

川芎

細辛

黃耆

枳殼

人參

麻黃

香白芷

甘菊花

薄荷

枸杞

柴胡

知母

地骨皮

獨活

杜仲

秦朮

黃芩

芍藥各三兩

石膏

蒼朮

生地黄各四兩

肉桂一兩

右剉每服

兩水二鍾生姜三片煎空心服臨卧煎滓

服空心

服吞下二丹丸謂之重劑臨卧一服吞下

中風

心法附餘卷之一

五十一

假

四白丹謂之輕劑立其法是動以安神靜以清肺

今一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服

加生姜空心服以粥投之得微汗則佳如一旬之通

利用愈風湯三兩加大黃一兩亦勻作四服如前服臨

卧服得利為度此藥常服之不可失四時之輔如望

春大寒之後本方中加半夏人參柴胡各二兩通前四

兩謂迎而奪少陽之氣也如望夏穀雨之後本方中

加石膏黃芩知母各二兩通前四兩謂迎而奪陽明之

氣也季夏之月本方中加防己白朮茯苓各二兩通

前四兩謂勝脾土之濕也望秋大暑之後本方中加

厚朴二兩藿香二兩桂一兩通前四兩謂迎而奪太陰

之氣也望冬霜降之後本方中加附子官桂各一兩

當歸二兩通前四兩謂勝少陰之氣也如得春氣候

減冬所加四時類此此雖立四時加減更宜臨病之際

審察虛實寒熱土地之宜邪氣多少此藥具七情六欲

四氣無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之永不

結滯此藥與天麻九相為表裏治未病之聖藥也若已

病者更宜常服無問男女老幼驚癇搐搦急慢驚風四

時傷寒等病服之神効

四白丹能清肺氣養魂謂中風者多昏冒氣不清利也

中風

心法附餘卷之一

五十一

白木

砂仁

白茯苓

香附

防風

川芎

甘草

人參各半兩

白芷一兩

羌活

獨活

薄荷各二錢

藿香

白檀香各一錢

細辛

知母各一錢

甜竹葉三兩

麝香一錢

另研

牛黃

另研

右為末煉蜜丸每兩作十丸臨卧嚼一丸分五七次細

嚼之前愈風湯嚥下能上清肺氣下強骨髓

二丹丸治健忘養神定志和血內以安神外華腠理

丹參

天門冬

熟地各兩半

甘草

麥門冬 白茯苓 <small>各一兩</small> 人參 遠志		菖蒲 硃砂 <small>各半兩</small>		右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九至百九空心服食前煎愈風湯送下		天麻丸 治風因熱而生熱勝則動宜以靜勝其躁是養血也		天麻 牛膝 <small>二味用酒同浸三日</small> 萆薢		玄參 各六兩 杜仲 <small>炒斷絲</small> 附子 <small>炮一兩</small> 菟活 <small>十四兩</small>		川歸 十兩 主芋 一斤		一方有獨活五兩去腎間風		中風 心法附錄卷之一 五十二		右為末蜜丸如梧桐子大每服五七十九空心溫酒白湯皆可下		加減防風通聖散 預防風疾常服取効		防風 川芎 當歸 芍藥		薄荷 麻黃 連翹 <small>各半兩</small> 黃芩		桔梗 各二兩 甘草 一兩 荆芥 白朮 <small>各二錢</small>		烏藥 羌活 天麻 僵蚕 <small>各一錢</small>		體虛氣弱者磨木香 痰涎壅盛者加南星半夏枳實		每服六錢水一盞半生薑三片煎服	
----------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------	--	-------------	--	-------------	--	----------------	--	---------------------------	--	------------------	--	-------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------------	--

牛黃清心丸 和劑方治諸風緩縱不隨語言寒澁心怔健忘恍惚去來頭目眩冒胃中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘感虛煩少睡喜怒無時或發狂顛神情昏亂		白芍藥 一兩 羚羊角 兩 人參 去蘆二錢 芩藺 一兩二錢		白茯苓 二錢 防風 兩 阿膠 七錢		乾姜 炮七錢 白朮 一兩半 牛黃 一兩二錢 麝香 研一兩		犀角末 二兩 雄黃 研飛八錢 龍腦 研一兩 當歸 去蘆一兩		金箔 一千二百片 內 柴胡 去苗一兩		甘草 兩 乾山藥 七兩 麥門冬 去心一兩		中風 心法附錄卷之一 五十三		桔梗 一兩二錢 杏仁 去皮尖取仁 <small>炒黃</small> 黃芩 去腐一兩		神麝 半兩 大棗 一百箇 <small>蒸熟去核研成膏</small> 白欬 七錢半		蒲黃 二兩半 大豆黃卷 一兩七錢 肉桂 一兩七錢		右除棗杏金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味別為細末入餘藥和勻煉蜜棗膏為丸每兩作十丸以金箔為衣每服一丸食後溫水化下小兒驚癇即酌度多少以竹葉湯或溫酒化下		金箔牛黃丸 治風邪除熱中		金箔 十片 研 牛黃 研 龍腦 研各一 犀角 鎊		琥珀 研 人參 各二錢 丹砂 研水飛 白茯苓 去皮	
--------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	----------------	--	--------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	--------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--------------	--	--------------------------	--	---------------------------	--



天麻

白化蛇酒浸去皮骨

白附子炮

僵蚕炒

右為細末入別研藥和勻煉蜜和搗一千杵丸如櫻桃大以金箔為衣每服一丸細嚼溫酒或溫薄荷湯下茶湯亦可常服半丸不拘時候

一方治風病不愈者此藥寧心定志

人參

菖蒲

茯神去木各等分

每服五錢水一鍾生姜三片煎六分溫服

搜風順氣凡

聖惠方

治腸胃積熱以致膈間痞悶大便結

燥小便赤澀腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓

中風

心法附餘卷之一

五十五

看症

行步艱辛語言蹇澀三十六般風及七十二般氣無不治之此藥宣通氣血清熱潤燥通利大小便則諸病自愈

車前子一兩

白檳榔

大麻子

微炒去

兔絲子

酒浸

牛膝酒浸

乾山藥

各二兩

枳殼去穢

防風

去蘆

獨活各一兩

郁李仁

湯泡去

大黃

五錢半生

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九茶酒米飲任下早晨臨卧各一服久覺大腸微動以羊肚

腫痛

老人大腸無血大便結燥最宜

選奇湯治眉骨痛不可忍此乃風疾先兆也

羌活

防風各三錢

甘草二錢夏月生冬月炒

黃芩

酒製冬月不可用熱其可用

右吹咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食後時時溫服免致風動倒仆

八風散

見風熱

灸法

風池百會曲池合谷肩髃風市絕骨環跳三里等穴皆可灸之

傷風

心法附餘卷之一

五十五

看症

傷風

二

冒風同治

丹溪心法

○傷風屬肺者多宜辛溫或辛涼之劑散之

戴云新咳嗽鼻塞聲重者是也

附諸方

桂枝湯治太陽經傷風頭疼身痛或翕翕發熱或洒洒惡風自汗無汗者不可服

桂枝

芍藥

各三兩

甘草炙一兩

右吹咀每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去滓

溫服不拘時候惟春初可依此方自春末夏至已前宜加黃芩半兩夏至後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒不用加減

神木散 和劑方 治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼朮 米泔浸五兩 藁本 去土 香白芷 細辛 去葉土

羌活 去蘆 川芎 甘草 炙各二兩

右為細末每服三錢水一盞姜三片葱白三寸煎七分

溫服不拘時如傷風鼻塞用葱茶調下二錢

定風餅子 簡易方 治風客陽經邪傷腰理背脊強直言語

蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞶筋惕手顫鼻淵及飲酒

傷風 心法附餘卷之一 辛木

過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川烏 炮 南星 炮 川芎 乾薑 炮

甘草 半夏 製 天麻 白茯苓 各等分

加白附子 炮

右為末姜汁丸如龍眼大作餅子以硃砂為衣每服一

餅細嚼熟生姜湯下不拘時

荊芥丸 楊氏方 治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風

發熱頭疼鼻塞聲重並皆治之

荊芥穗 一兩 天麻 附子 炮 白附子 炮

烏藥 當歸 酒洗 川芎 各一兩

右為末煉蜜丸每一兩作十九硃砂為衣食後細嚼茶吞下

○廣按已上二方治風邪客於經絡既久正邪交攻遂

成風痰鬱熱變見諸症故用辛溫之劑以開發之乃

從治之法也

○已上數方辛溫發散之劑

金沸草散 和劑方 治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾

稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花 去梗 荊芥穗 四兩 麻黃 去節 前胡 去蘆各二兩

甘草 炙 赤芍藥 半夏 湯洗七次姜汁浸各一兩

傷風 心法附餘卷之一 五十七

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎八分溫服

參蘇飲 和劑方 治感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠

粘此藥大解肌熱寬中快膈或欲或勞瘵潮熱往來並

能治之

木香 紫蘇葉 乾葛 半夏 湯炮七次姜製

前胡 去苗 人參 去蘆 茯苓 去皮各七錢半 枳殼 炒 陳皮 去白各半兩

桔梗 去蘆 甘草 炙 陳皮 去白各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚煎六分

去滓熱服不拘時易簡方以氣盛不用木香

沖和散 簡易方 治感冒風濕之氣頭目不清鼻塞聲重肢

體倦怠欠伸出淚

蒼朮米泔浸荊芥穗二兩 甘草一兩一錢半

右咬咀每服五錢水一盞煎八分去滓熱服不拘時

消風百解散和劑方治四時傷寒頭痛發熱惡寒及風癢咳嗽鼻塞聲重

荊芥 白芷 陳皮去白 麻黃去節

蒼朮各四兩 甘草炙二兩

右咬咀每服五錢水一盞姜三片葱白三莖煎七分不拘時如咳嗽再加烏梅煎

川芎茶調散和劑方治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻

傷風必法附餘卷之一 塞聲重

薄荷去梗不見 川芎四兩 羌活二兩

甘草二兩 細辛去葉一兩 防風去蘆一兩 白芷二兩

荊芥去梗四兩 右為細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目一

無細辛

消風散和劑方治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲

重耳作蟬鳴及皮膚頑麻癢痒癰疹婦人血風頭皮腫

痒並皆治之

荊芥穗 甘草炒各二兩 陳皮去穢洗 人參去蘆

茯苓去皮用 白僵蚕炒 防風去蘆 羌活

藿香葉去梗 蟬蛻去土炒 厚朴去粗皮半

羌活一兩

右為細末每服二錢感風頭痛鼻流清涕者用荊芥湯

茶清調下遍身瘡癬溫酒下

大辰砂丸 清頭目化痰涎及感冒風寒聲重頭

目昏眩項背拘急皮膚癢痒並皆治之

天麻去苗一兩 防風去蘆二兩 細辛去苗葉 薄荷葉半兩

川芎二兩 甘草炙一兩 吳白芷一兩 硃砂一兩

右以七味為細末煉蜜丸如彈子大硃砂為衣每服一

丸細嚼食後生薑湯下茶清亦可

○已上數方辛平發散之劑

人參敗毒散和劑方治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽

鼻塞聲重如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩

柴胡去苗 甘草炙 桔梗 人參去蘆

羌活去苗 芩窮 茯苓去皮 枳殼去穢

前胡去苗洗 獨活去蘆各

右咬咀每服三錢水一盞姜三片薄荷少許同煎七分

去渣溫服

葱白散和劑方治四時傷寒頭痛壯熱肢體煩疼小便赤

磁及傷風鼻塞咳嗽痰涎山嵐瘴氣並皆治之

川芎 蒼朮 米泔浸 白朮 各二兩 麻黃 去根節 三兩

甘草 炙 石膏 煨 乾葛 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞姜三片葱白二寸煎七分熱服不拘時如欲汗并進數服

羌活散 和劑方 治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘

急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨預覺不安

前胡 去蘆 羌活 去蘆 麻黃 去根節 白茯苓 去皮

川芎 黃芩 甘草 炙 蔓荊子 去白 傷風 心法附餘卷之一

枳殼 去穢 細辛 去苗 石膏 另研 菊花 去穢

防風 去蘆 各一兩

右咬咀每服一兩姜四片薄荷三葉水二盞煎至一盞

去渣溫服

羌活丸 御藥院方 治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身

拘急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰

先覺不安

羌活 去蘆 甘菊 花 去梗 麻黃 去根節 川芎

防風 去蘆 石膏 前胡 去蘆 黃芩

細辛 去蘆 甘草 炙 枳殼 去穢 白茯苓 去皮

蔓荊子 去白皮 各一兩

右為末水糊丸梧子大每服四十九丸食後姜湯下

○已上數方辛涼發散之劑

### 中寒之三

丹溪心法

○主乎溫散 有卒中天地之寒氣者有口得寒物者從補中益氣湯中加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所湊其氣必虛只用前湯中從所見之証出入加減必先用參芪托住正氣 氣虛甚者少加附子以行參芪

中寒

心法附餘卷之一

六十一

三言子四十八

之劑如果氣虛者方可用此法 胃氣大虛必當溫散理中湯相宜甚者加附子 倉卒感受大寒之氣其病即發非若傷寒之邪循經以漸而深也

戴云此傷寒謂身受肅殺之氣口傷生冷之物因胃氣

大虛膚腠疎豁病者脉沉細手足厥冷息微身倦雖身

熱亦不渴倦言動者是也宜急溫之遲則不救矣與熱

証若相似而實不同凡脉數者或飲水者煩燥動搖者

皆熱病寒熱二証若水火然不可得而同治誤則殺人

附諸方

生料五積散 和劑方 治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡

寒嘔吐或腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生  
冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚酸疼及婦人經帶  
腹痛並皆治之

蒼朮 米泔水浸去粗皮二十四兩 桔梗 去蘆十兩 陳皮 去白

麻黃 去根節只殼去穢炒 厚朴

乾姜 各四兩 白芷 川芎 甘草 炙

茯苓 去皮 肉桂 去粗皮 芍藥 當歸各三兩

半夏 湯泡七次二兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜三片葱白三根煎七分  
分熱服冒寒用煨姜挾氣加吳茱萸婦人調經則入艾

醋

○廣按此藥氣味辛溫發表溫中開鬱行氣有殊功去

寒濕之聖藥也夫寒濕屬陰熱燥屬陽人之為病不

過二者而已矣善用藥者以苦寒而瀉其陽以辛溫

而散其陰病之不愈者未之有也予嘗以防風通聖

散為瀉熱燥之藥也生料五積散為散寒濕之藥也

不識明括以為何如

正氣散 和劑方 治傷寒陰証憎寒惡風正氣遂冷

半夏 姜製 厚朴 各三兩並為末以生薑四兩

甘草 炒七錢 藿香葉 白木 陳皮 各一兩

右為細末每服三錢生姜三片棗一枚水一盞煎七分

食前稍熱服常服順氣寬中辟除瘟疫

理中湯 和劑方 治臟腑中寒口噤失音四肢強直兼治胃

脘停痰冷氣刺痛

人參 乾姜 炮 甘草 炙 白木 各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎服三因方加附子名附子

理中湯

美附湯 和劑方 治中寒昏不知人身體強直口噤不語逆

冷及腹臍冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾姜 一兩 附子 生去皮臍細切一枚

中寒 心法附餘卷之一 右咬咀每服三錢水一盞半煎七分食前溫服 挾氣

不仁加防風一錢 挾濕加白木 筋脉牽急加木瓜

肢節痛加桂二錢

四逆湯 和劑方 治傷寒自利脉微欲絕手足厥冷 四逆各

也 逆冷 甘草 炙二兩 乾姜 一兩半 附子 去皮臍炮半兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分溫服不拘時

白木散 和劑方 治陰毒傷寒心間煩燥四肢逆冷

川烏 炮去皮 桔梗 去蘆 白木 附子 炮去皮

細辛 各一兩 乾姜 炮半兩

右為末每服二錢水一盞煎六分熟服不拘時

三建湯

大川烏炮

附子炮

天雄並炮等

右剉每四錢水二盞姜十五片煎服

霹靂散

用附子一枚及半兩者炮熟取出用冷灰培之細研入

真臘茶一大錢同和分二服每服水一盞煎六分臨熟

入蜜半匙放溫服之

真武湯

治傷生冷飲食數日以後發熱腹痛頭目昏沉

四肢痠痛大便自利小便或利或澀或嘔或咳並宜服

口呿

心法附餘卷之一

六十四

卷四

之或已經發汗不解仍發熱者心下悸頭眩暈肉瞤動

振振欲躓地者此由飲食停留中脘所致

白茯苓

白芍藥

白朮名一兩附子一枚炮

每服五錢水一鍾姜五片煎食前溫服小便利者去茯苓

苓大便利者去芍藥加乾姜咳加五味子細辛乾姜嘔

去附子加生姜汁

搖鼻奪命散

德生堂方

治陰証及中風不省人事大効

一方無細辛名通神散

蘇盧

錢去川芎二錢半

穀精草

石菖蒲

東手薄荷

頭荊葉

各二錢半

細辛二錢半

右為細末先令患者喫蔥茶一盞後噴水在口次以

管吹藥入鼻中即時痰唾涕噴見効

一方葱熨法

秘方

治陰証用葱白一大握如茶盞大用紙

捲緊却以快刀切齊一指厚片安於臍中以熱熨斗熨

之待汗出為度一片未効再切一片熨之服後藥

胡椒五錢

滑石五錢

麝香一錢

右為末酒調服之神効

治陰毒傷寒

用烏豆一合炒令黑烟起入水中煎三五

沸服候汗出回陽立瘥

灸法

臍下一寸五分氣海二寸右關三寸關元皆可灸

中寒

心法附餘卷之一

本五

神中益氣湯

見內傷

# 傷寒

四

新增

附冒寒

溫熱病

附諸賢論

心法曰凡証與傷寒相類者極多皆雜証也其詳出內經

熱論自長沙以下諸家推明甚至千世之下能得其粹

者東垣也其曰內傷極多外傷間而有之此發前人之

所未發後人徇俗不能真切雷同指為外傷極謬其或

可者蓋亦因其不敢放肆而多用和解及平和之藥散

之爾若粗率者則必殺人切有感冒等輕証不可便認

作傷寒安治西北二方極寒肅殺之地故外感甚多東南二方溫和之地外傷極少雜病亦有六經所見之証故世俗混而難別

○廣按真傷寒証自冬至已後春分已前天氣嚴肅人之內有鬱熱者以致腠理踈豁加以不謹則傷於寒然謂之傷寒者乃寒氣自表入中自中入裏即病之名也何以明之入之平時榮衛周流無少間斷一日邪氣入內阻礙正氣不得流行鬱而為熱仲景先師治此證在表發汗在中和解在裏攻下隨其所而驅散之不過使邪熱退而正氣復行也况人之經絡三陽三陰分布一身太陽少陰經在身後陽明太陰經在身前少陽厥陰經在身之側傷寒之邪所入於陽經或中於陰絡孰為之先孰為之後傷人可專以太陽為受邪之始故各經皆能受邪但太陽經受邪居多為差等爾以此觀之六經皆能受邪故取仲景六經見証七方發散以先之夫陰經受邪不復傳變惟用前方溫經散寒而已陽經受邪傳入半表半裏又取小柴胡湯一方和解以繼之邪傳於裏理宜攻下入取大柴胡湯調胃承氣大小承氣湯四方以繼之此治真傷寒表中裏三証之大畧也然

真傷寒証傳變不一其數滿百此外有傷風有兩感有三陽合病三陽併病春溫夏熱暑寒時疫剛瘧柔瘧風溫濕溫風濕中濕溫毒中暍瘴氣溫瘧諸証諸方及傷寒六經傳盡七日當愈然猶未愈者謂之雜証不可枚舉仲景先師治傷寒三百九十七法一百一十三方變故無窮豈曰易哉學者宜於陸氏傷寒類証便覽陶氏傷寒六書求之此非廣所能周知亦非此書所能悉載也歟

附脉理

脉訣舉要曰寒傷太陽浮緊而濇及傳而變名狀難悉陽明則長少陽則弦太陰入裏遲沉必無及入少陰其脉遂緊厥陰熱深脉伏厥冷在陽當汗次利小便表裏裏病其脉實堅此其大畧治法之正至於大法自有仲景傷寒有五脉非一端陰陽俱盛緊濇者寒陽浮而滑陰濡而弱此名傷風勿用寒藥陽濡而弱陰小而急此非風寒乃濕溫脉陽脉浮滑陰脉濡弱或過於風變成風濕陽脉洪數陰脉實大更遇濕熱變成溫毒陽脉濡弱陰脉弦緊更遇濕氣變為濕溫陰陽俱盛重感於寒變為溫瘧同病異名同脉異經

附諸方

麻黃湯 治傷寒惡風寒發熱身疼無汗

麻黃 六錢 桂枝 四錢 甘草 炙三錢 杏仁 二十箇

右咬咀水煎如法服

按此太陽經藥也

葛根湯 治傷寒惡寒項背強几几無汗惡風或下利

葛根 四錢 麻黃 生薑 各三錢 桂枝

芍藥 各二錢 甘草 炙二錢 大棗 三枚

右咬咀水煎如法服之

按此出太陽例陽明藥也

此胡桂枝湯 治傷寒發熱潮熱脉弦自汗或渴或利

傷寒 心法附餘卷之一 六十八 桂枝 二錢 黃芩 人參 白芍 各一錢

甘草 炙 半夏 生薑 各一錢 茈胡 四錢

大棗 二枚

右咬咀每服五錢水一鍾煎七分服

按此出太陽例少陽經藥也

桂枝湯 治傷風寒發熱自汗鼻鳴乾嘔者

桂枝 白芍 生薑 各三錢 甘草 炙二錢

大棗 二枚

右咬咀每服五錢水一鍾煎七分服

按此出太陽例太陰經藥也

麻黃附子細辛湯 治感寒脉沉或微細反發熱或但欲寐者

寐者

麻黃 細辛 各四錢 附子 炮二錢 半去皮

右咬咀每服五錢水一鍾煎七分服

按此少陰經藥也

當歸四逆湯 治感寒手足厥冷脉細欲絕者

當歸 桂枝 白芍 細辛 各三錢

大棗 三枚 甘草 炙 通草 各二錢

右咬咀每服五錢水一鍾煎七分服

按此厥陰經藥也 已上六經治寒之例隨脉證加減變

傷寒 心法附餘卷之一 六十九 法自有仲景論例茲不詳錄

桂枝麻黃各半湯 治傷寒見風脉發熱自汗或無汗

桂枝 二錢 白芍 生薑 甘草 炙

麻黃 各一錢 大棗 二枚 杏仁 十一箇 去皮尖

右咬咀水煎

按此足太陽手足太陰手少陰經藥出太陽例治風寒

之劑也 夫仲景論已上六經藥然其中有發表解肌溫

經不同蓋風寒有淺深榮衛有虛實故也學者審此則

用藥湯液之源可得而悉

小柴胡湯 宣明方 治傷寒中風其病半在表半在裏筋脉



拘急身體疼痛寒熱往來或嘔或欬胃脘痞滿硬痛下  
之前後無間日數及汗後餘熱不解或無間瘟疫傷寒  
雜病蒸熱作發并兩感可和解者肌體羸瘦倦怠少力

柴胡 三兩 洗 黃芩

甘草

人參 各三錢

半夏 一兩 洗

右剉如麻豆大每服五錢水一鍾煎至半鍾姜棗同煎

不計時溫服

大柴胡湯 宣明方

治諸服小柴胡湯證後病不解表裏熱

勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出不解心下痞硬  
嘔吐下利上屬太陽或陽明病多汗或少陰病下利清

傷寒

心法附餘卷之一

七十

水心下痛而口乾或太陰病腹滿或無表裏證但發熱

七八日脉浮而數脉在肌肉實而滑數者及兩感諸證  
可微者下雙除表裏之熱并陽明少陽合病下利日脯

發熱如瘧

柴胡 去苗半 黃芩

芍藥 各二錢 大黃 半兩

半夏 湯洗七次切

枳實 三錢生用小者是也

右剉如麻豆大分作三服水一盞半生薑棗子同煎至半

盞溫服如未利再服

調胃承氣湯 宣明方

治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸

然者或日深心下兀兀欲吐胃中痛便溲腹滿鬱鬱微

煩先此時吐下者或日深裏熱諸語法當下之以銀粉

巴豆燥熱大毒丸藥下之致使真陰損虛邪熱轉甚因

而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成

結胃但為熱利不止心下滿硬或痛煩渴咽乾滑數而

實諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便秘脉滑實緊

大黃

芒硝

甘草 各等分

右剉每服臨期斟酌多少先煮二味熟去渣下硝上火

煮二三沸頓服之以利為度未利再服

小承氣湯 宣明方

治傷寒日深恐有燥屎腹中轉失氣乃

可攻之不轉失氣者必初硬後溏未可攻之攻之則腹

傷寒

心法附餘卷之一

七十一

滿不能食飲水而噦其後發熱大便復硬若腹大滿不

通或陽明多汗津液外出腸胃燥熱大便必硬而譫語

脉滑吐下微煩小便數大便結或下利譫語自得病二

三日脉弱無太陽證柴胡證煩心下結至四五日雖

能食少與小承氣湯和之令小安

大黃 半兩

厚朴 去皮

枳實 去穢各

右剉如麻豆大分作二服水一盞姜三片煎至半盞絞

汁服未利再服

大承氣湯 宣明方

治表裏俱熱病勢更甚者陽明脉遲汗

出不惡寒反惡熱身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則

不識人循衣摸床惕而不安微喘直視陽明裏熱極甚  
或吐下後不解不大便五六日至十餘日日晡潮熱心  
胃燥熱而懊懷復如瘧狀脉沉實或小便不利大便乍  
難乍易喘冒不能卧或腹滿實痛煩渴膽妄脉實數而  
沉裏熱燥甚腸胃沸鬱留飲不散胃腹高起痛不可忍  
但嘔冷液大渴反不能飲強飲不能止喘急悶亂者  
大黃酒洗 厚朴姜製 枳實 芒硝各等分  
右判每服看証斟酌多少先煮厚朴枳實二物至七分  
納大黃煮至五分去渣納芒硝煎一二沸通口服以利  
為度不利再服

傷寒 心法附餘卷之一 七十二  
○冒寒新增

附諸方

九味羌活湯 治發熱惡寒無汗或自汗頭痛項強或傷

風見寒脉傷寒見風脉並宜服之此藥不犯三陽禁忌為四時發散之通劑也

羌活 防風 蒼朮 甘草

川芎 白芷 生地黃 黃芩

細辛 各一錢一云細辛只用五分

每服水一鍾半生薑三片葱白三根煎至一鍾溫服食  
後取微汗為度如無汗啜稀粥助之

六神通解散 治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒

脉洪數先用九味羌活湯不愈後服此藥

麻黃一錢 甘草三分 黃芩七分 石膏八分

滑石八分 蒼朮八分 加川芎八分 羌活八分

細辛五分

水二鍾姜三片豆豉一撮葱白二莖煎之熱服取汗中  
病則已時醫官經驗定就分兩

喝起散 治秋冬傷風傷寒發散

麻黃一錢 葛根八分 石膏八分 川芎八分

升麻十分 甘草三分 羌活六分 防風六分

春去麻黃加薄荷夏去麻黃加荊芥

傷寒 心法附餘卷之一 七十三

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

麻黃湯 治嚴冬傷寒頭痛發熱惡寒骨節疼痛喘滿無汗

麻黃一兩半 桂枝一兩 甘草半兩 杏仁二十箇湯

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計

時候衣覆以取汗 加石膏大棗生薑名大青龍湯治

傷寒頭痛發熱惡寒無汗煩燥六脉浮緊者

○已上數方發表之劑

人參養胃湯和劑方治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭  
目昏疼不問風寒二證夾食停痰俱能治之但感風寒  
以微汗為度

半夏 <small>湯泡去</small>	厚朴 <small>去皮姜製</small>	蒼朮 <small>米泔浸一宿去粗皮切各一兩</small>
人參 <small>半兩去蘆</small>	橘紅 <small>七錢半</small>	藿香葉 <small>去土</small>
茯苓 <small>半兩去皮各</small>	甘草 <small>炙二錢</small>	草果 <small>去殼</small>
右咬咀每服四錢水盪半姜七片烏梅一箇煎六分熱服兼治飲食傷脾証為痰瘧寒多者加附子各十味不換金散		
藿香正氣散 傷寒頭疼增寒作熱上喘咳嗽反胃嘔惡氣瀉霍亂臟腑虛鳴山嵐瘴氣		
大腹皮 <small>洗</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	白芷 <small>各一兩</small>
厚朴 <small>姜製炒</small>	桔梗	甘草 <small>炙</small>
藿香	陳皮 <small>三兩</small>	半夏 <small>湯泡洗七</small>
每服水一鍾半生姜三片棗一枚同煎熱服如欲汗加葱白三莖以衣被蓋再煎服冷嗽喘滿加入杏仁五枚子心腹痛加木香玄胡索嘔惡甚加生薑五片名順氣木香散		
不換金正氣散 和劑方治四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服若出遠方不伏水土者宜常服之		
厚朴 <small>去皮姜製</small>	藿香 <small>去粗土</small>	甘草
半夏 <small>製</small>	蒼朮 <small>水泔水浸去粗皮各等分</small>	陳皮 <small>去白</small>

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片棗二枚煎七分去滓食前熱服		
僧伽應夢人參散 <small>和劑方</small> 治傷寒體熱頭痛及風壅痰嗽咯血等証		
甘草 <small>炙六兩</small>	人參	桔梗 <small>微炒</small>
白芷	乾葛	白木 <small>各三兩</small>
一方加豆豉		乾姜 <small>炮五錢半</small>
右咬咀每服三錢水一盞姜二片棗一枚煎七分去滓熱服		
香蘇散 <small>和劑方</small> 治四時傷寒頭疼發熱惡寒		
傷寒	心法附錄卷之一	七十五
紫蘇葉	香附子 <small>各二兩</small>	陳皮 <small>一兩</small>
右咬咀每服四錢水一盞姜葱煎七分空心熱服如頭疼加川芎白芷各名香蘇散		
和鮮散 <small>和劑方</small> 治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐痢		
陳皮 <small>洗</small>	厚朴 <small>去皮製</small>	桔梗
甘草 <small>炙各半</small>	蒼朮 <small>去皮一</small>	
右為粗末每服三錢水盪半姜棗煎七分不拘時熱服		
八鮮散 <small>和劑方</small> 治四時傷寒頭疼體熱惡風多汗嘔吐惡心咳嗽喘滿痞悶		
人參 <small>去蘆</small>	茯苓 <small>去皮</small>	甘草 <small>炙</small>
		陳皮 <small>去白</small>

藿香 去土

白木 去蘆

厚朴 去皮姜

半夏 湯洗

甘草 炙

右咬咀每服五錢水一盞姜三片葱葉同煎不拘時服

十味和解散 楊氏方 治外感內傷寒邪頭痛發熱

白木 二兩

桔梗 一兩

人參 去蘆

甘草 炙

當歸 酒洗

陳皮 去白

枳殼 去穢

赤芍藥

防風

厚朴 姜製各半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片葱白三根煎熱服

○已上數方發表和中之劑

大柴胡湯 治外感風寒內傷飲食鬱結在裏身熱煩燥

語言謔妄大便不通繞臍刺痛

傷寒

心法附餘卷之一

主六

黃芩 炙

枳實 去穢

柴胡 去蘆

大黃 一兩

芍藥

黃芩 各三兩

半夏 湯洗七次

右咬咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分溫服

微利為度此藥治傷寒內熱裏實以此下之若身體疼

痛是表証未解不可服之

調中湯 治夏秋之間暴寒折於盛熱熱結於四肢

則壯熱頭痛傷寒於胃則下利或血或水脉數宜用此

下之

大黃 去皮

葛根

黃芩

葉本 炙

白木

芍藥

桔梗

茯苓 去皮

甘草 炙各半

右咬咀每服五錢水盞半煎八分移時再服得利即止

防風通聖散 治風寒暑濕饑飽勞役及傷寒表不解半

入於裏下証未全下後燥熱怫結於心內煩懊懷不得

眠臟腑積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉痺目赤耳閉口舌

生瘡咳嗽稠粘譫語狂妄腸胃燥澀秘結及風熱隱疹

壅滯並皆治之

○已上數方發表攻裏之劑

溫熱病 新增 夏至前發為溫夏至後發為熱謂之伏

附論

傷寒

心法附餘卷之一

主七

黃芩 炙

○廣按經曰春傷於風夏必泄瀉夏傷於暑秋必瘧疾

秋傷於濕冬必咳嗽冬傷於寒春必病溫此言感時

氣不即發藏於膚腠之間過期遇觸動而發也且以

即病傷寒傷風與伏氣溫熱病三者而言之傷寒則

身熱無汗惡寒傷風則身熱有汗惡風二者皆邪自

外入故表病裏和鼻塞而口不渴溫熱病則邪自內

出故身熱或有汗或無汗鼻不塞而口渴也傷寒傷

風之邪循經而入以漸而深故治法要分三陽三陰

清切表裏寒熱虛實明白方可施治不可一毫而少

差也溫熱之邪自內而出不過發攻表中裏三者之

熱而已何難之有哉

附脉理

脉訣舉要曰陰陽俱盛病熱之極浮之而滑沉之散濇惟  
有溫病脉散諸經各隨所在不可指名

附諸方

十神湯和劑方治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出  
疹此藥不問陰陽兩感風寒並宜治之

川芎 八分

甘草 三分 炙麻黃 錢一 乾葛 一錢

紫蘇 二錢

升麻 七分 赤芍藥 七分 白芷 七分

陳皮 七分

香附子 八分

傷寒

必法附錄卷之一

十八

傷寒

右咬咀每服三錢水一盞半姜五片煎七分去滓溫服  
不以時候如發熱頭痛加連翹葱白中滿氣實加枳殼

同煎時醫官定分兩有君臣佐使

葛根解肌湯和劑方治傷寒頭痛發熱惡寒肢體拘急胃

膈煩悶

葛根 四兩

麻黃 兩 去節 三兩 肉桂 兩 去皮 一兩 甘草 炙

黃芩

芍藥 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞棗一枚煎八分去滓溫服

十味芩蘇散

治四時傷寒發熱頭痛

川芎 七錢

紫蘇葉

乾葛 兩 各半

桔梗 生 二錢

柴胡

茯苓 半兩 甘草 三錢 炙 半夏 六錢 湯

枳殼

陳皮 三錢 半

右咬咀每服三錢姜棗煎服

升麻葛根湯和劑方治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及

瘡疹已發未發疑似之間並宜服之

川升麻

白芍藥 甘草 炙 各一兩 葛根 一兩 半

右咬咀每服三錢水一盞煎七分熱服

柴胡升麻湯和劑方治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻

塞咽乾痰盛咳嗽涕唾稠粘

柴胡 去蘆

前胡 去蘆 乾葛 各一兩 荆芥 去根 一兩 半

傷寒

必法附錄卷之一

七十一

傷寒

赤芍藥

石膏 兩 各一兩 升麻 半兩 桑白皮

黃芩

去皮 各

右咬咀每服五錢水一盞姜三片豉十餘粒煎熱服

香葛湯治四時感冒不正之氣頭痛身疼項強寒熱嘔

惡痰嗽腹痛泄瀉不問陰陽兩感風寒濕瘴並宜服之

紫蘇

白芍藥 香附子 川升麻

白乾葛

薄荷 陳皮 去白 各一兩 白芷

大川芎

甘草 各半兩 蒼朮 製 一兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜二片煎熱服不拘時

青葛解肌湯

治傷寒瘟疫天行頭痛壯熱

葛根一兩 黃芩

芍藥

甘草各半

右咬咀每服五錢水一盞半棗一枚煎七分溫服日二  
公如三四日不解脈浮者宜重服發汗脈沉實宜下之

已上數方發表之劑

小柴胡湯

傷寒四五日寒熱往來胸脇滿痛或脇下痞

硬身有微熱或過經未解潮熱未除半表半裏非汗非

下之證瘧後勞復昏沉婦人傷風經水適斷此為熱入

血室故如瘧狀產後傷寒頭痛發熱小兒寒熱並治

柴胡

二兩

半夏

湯炮七

錢

黃芩

人參

甘草

炙各七

傷寒

錢半

心法附錄卷之一

八十

右剉每服五錢水盞半生薑五片棗一枚煎食前服

咳嗽加五味子

胸中煩加括蕒根

渴加括蕒

下痞硬加枳實

鼻衄加生地黃白茅花 痰盛或喘

加桑白皮烏梅

涼膈散

一名連翹飲子

宣明方

治傷寒表不解半入於

裏下證未全下後燥熱怫結於內心煩懊憹不得眠臟

腑積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉痺目赤煩燥口古生瘡

咳唾稠粘謔語狂妄腸胃燥澀便溺閉結風熱壅滯瘡

疹發斑驚風熱極黑陷將死

連翹

一兩

山梔子

大黃

薄荷葉

黃芩各半兩

甘草一兩半

朴硝

二錢半

右為粗末每服五錢水一盞蜜少許煎七分溫服量

實加減 咽喉痛涎嗽加桔梗一兩荊芥半兩 咳而

嘔者加半夏半兩生薑三片煎 衄血嘔血加當歸芍

藥各半兩生地黃一兩 淋者加滑石四兩茯苓一兩

風眩加川芎防風各半兩石膏三兩 酒毒加葛根一

兩 斑疹加葛根一兩荊芥赤芍藥川芎防風桔梗各

半兩三歲小兒可服七八分 或痘熱甚黑陷腹滿喘

急小便赤色而將死者此服更加大承氣湯約以下

之得利者立効 凡言加者皆以本方加也 以意消息

傷寒

心法附錄卷之一

八十

加減 退表裏熱加益原散効速一方熱加竹葉蜜煎

○已上數方和解半表半裏之劑

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便

秘澀腹滿脹痛語言譫妄心中痞硬飲食不下口生白

胎不大便五六日繞臍刺痛時發煩燥及汗後如瘧日

晚發熱或發熱汗出脈有力者可服之 方見前

雙解散

即防風通聖散與益元散相合

宣明方

治風寒暑濕饑飽勞役內外諸邪所傷以致氣血怫鬱

變成積熱發為汗病雜病非此不除但覺不快便可

此通解小兒生瘡疹用此解出尤快 其大黃芒硝麻

黃三味對証旋入自利去大黃芒硝自汗出麻黃

防風 川芎 當歸 赤芍藥

大黃 麻黃 薄荷 連翹

芒硝 石膏 黃芩 桔梗 各五分

滑石 一錢半 甘草 一錢 荊芥 白朮

梔子 各一分 已上共六錢六分二厘半係防風通聖散

滑石 三錢 甘草 五分 已上三錢五分係益元散

右以咀作一服水二盞生姜三片葱白一莖豆豉三十

粒同煎一盞去滓熱服

○廣按溫熱之病皆因秋冬之時外感風寒內傷飲食

傷寒 其時天氣收藏不能即發以致氣血怫鬱變成積熱

至春夏之際又因外感內傷觸動積熱其時天氣升

浮故能發出其熱自內達外用雙解散者正所以發

攻表裏之熱也然表裏俱實者用此最妙如表裏或

虛者尤未當也夫自汗屬表虛裏實宜用雙解散去

麻黃若裏實甚者宜用大柴胡湯若表裏俱虛者宜

用人參白虎湯夫泄瀉屬裏虛宜用雙解散去大黃

芒硝或用五苓散若裏虛甚者宜用柴苓湯此雖予

淺見之言亦未嘗外於理也 柴苓湯即小柴胡湯

五苓散相同是也

○已上數方發攻表裏之劑

人參白虎湯 治發熱自汗表虛者

石膏 五錢 知母 二錢 甘草 七分 人參 一錢

右用水二盞加粳米五十粒煎至一盞溫服

柴苓湯 治發熱泄瀉裏虛者

柴胡 一錢 半夏 湯泡七分 黃芩 人參

甘草 各六分 白朮 猪苓 茯苓 各七分

澤瀉 一錢 桂 五分

右用水二盞生姜三片煎至一盞溫服

○廣按此方即小柴胡湯五苓散相合是也除傷寒表

証不治外邪傳半表半裏及內傷發熱雜病發熱無

傷寒 不治也

○已上數方補虛散邪之劑

濕熱病治例 出傷寒直格心要論

夫傷寒者前三日法當汗一可用雙解散連進數服必愈

若不解者已傳變

後三日在裏法當下殊不知下之太早則表邪乘虛入裏

遂成結胃虛痞懊憹斑疹發黃之証輕者必危危者必

死但當以平和之藥宣散其表和解其裏病勢或有汗

而未愈或無汗而愈二當用小柴胡涼膈天水三藥合

而服之

病若半在表半在裏去亦當和解三小柴胡涼膈二藥主之  
若裏熱微者則當微下四大柴胡合解毒湯主之熱勢未  
退五又以大柴胡合三一承氣下之兩除表裏之熱病  
至七八日裏証已甚表熱漸微脉雖浮數六則以三一  
承氣合解毒下之

其病胸膈滿悶或喘或嘔陽脉緊甚者七可用瓜蒂散以  
涌之

汗吐下三法之後別無異証者八涼膈散調之

病熱已去微熱者九以益元散服之無令再病此傷寒治  
法之大要也

傷寒

心法附餘卷之一

八

或傷風自汗脉浮緩者十雙解去麻黃以汗之

其病半表半裏十一白虎湯和解之

病在裏脉沉細者無問風寒暑濕或表裏証俱不見或內

外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿諸語煩燥畜熱內盛

但是脉沉者十二並用承氣合解毒下之

或中暑自汗十三解以白虎湯直格云夏至前為溫夏至

虎宜乎局方云立秋後不用白虎子和云

若白虎証亦不用手却用詳審之耳

白虎解後十四以五苓合天水調之多進數服無妨

或腹脹滿脉沉者十五亦當承氣合解毒微下之

或發汗之後熱不解脉尚浮者十六白虎加蒼朮再解之

或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此証以致身冷脉

微昏憒將死切不得以寒藥下之誤下即死又一輩庸

醫妄言是陰厥便欲換易用玄武四逆溫熱之劑投之

下咽立死殊不知此証乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗

陽厥極深謂之竭畜熱怫鬱將欲絕者當此之証寒劑

熱劑俱不可投但進十七涼膈解毒二藥以養陰退陽

宜散畜熱脉氣漸生得大汗而愈有無汗氣和而愈者

未愈十八加解毒合承氣下之次以十九解毒涼膈天水

合而為一調合陰陽洗滌臟腑則其他別証自不生矣

有大下之後熱不退再三下之熱愈盛若下之不愈脉微

傷寒

心法附餘卷之一

全

氣虛力弱不加以法則無可生之理若輟而不下則邪

熱極盛陰氣極衰脉息斷絕必不可救似此之証是下

之亦死不下亦死醫者到此殺人活人一彈指間其不

至手足失措者幾希矣直格云傷寒汗後汗出不解或

湯再解之又按餘論云傷寒下後自汗虛熱不已白虎

則汗下之後熱不退如神汗止身涼此通仙之法也如此

蒼朮解之又加人參亦妙仍服涼膈解毒調之

經云三下而熱不退者即死後人有四五次下加至十數

行而生者此乃偶誤中耳活者未一二死者已千百後

學切不可以為法但當依前用解毒合涼膈調之使陽

熱徐退陰脉漸生庶不失人命



若傷飲不解散成結胸之証臨時擇用二十大小陷胸湯

丸累下之脉浮者不可下是表証未出二十一小柴胡

合小陷胸湯投之脉雖浮而熱大極者二十二承氣徐

徐疎利之

或有留飲過度濕熱内生自利不止其熱未退二十三解

毒湯治之

陽毒生斑二十四涼膈加當歸

拂鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裏不能發於外相搏遂

成發黃二十五茵陳湯調五苓散甚者二十六茵陳合

承氣下之

傷寒

心法附餘卷之一

八十六

煩心不得卧二十七梔子湯

又名梔子豆豉湯

悞下太早遂成結胸虛痞二十八涼膈加枳殼桔梗剛柔

二症謔語發狂踰垣赴井皆陽熱極盛二十九承氣合

解毒下之

汗下之後煩渴飲水三十則涼膈減桂五苓甘露益元選

而用之小便不通五苓泄之大便閉結承氣下之更有

外証加減通聖散方內隨證用藥

婦人證治皆然惟孕婦三四月并七八月不用硝其餘月

分用之無妨小兒減劑服之

其中有古人治傷寒不傳之妙後之學者其慎實之

防風通聖散 見中風類

歌曰

防芎歸芍大黃黃

薄翹芒硝半兩強

荊芥白朮山梔子

滑三草二要相當

右大黃芒硝麻黃三味對証旋入自利去大黃芒硝自

汗去麻黃

孟元散

宣明方 又名天水散六一散

治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白癰閉淋瀝利小便偏

主石淋蕩胃中積聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液

傷寒

心法附餘卷之一

八十七

去留結消畜水止渴寬中除煩熱心燥腹脹痛悶補益

五臟大養脾胃之氣理內傷陰痿安魂定魄補五勞七

傷一切虛損主痢瘕驚悸健忘止煩滿短氣臟傷咳嗽

飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒痛明耳目壯筋骨

通經脉和血氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐勞

役饑渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延

壽及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮患怒驚恐

傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能令遍身

結滯宣通氣和而愈及婦人不乳催生產後損傷血衰

陰虛熱甚一切熱証無吹妳乳癰此神驗之仙藥也惟

孕婦不宜服滑胎也

桂府賦白滑石

甘草 炙一兩

右為末每服三錢

蜜少許

溫水調下

亦得

日三服

飲者新汲水調下

解利傷寒發汗煎

白湯下

四錢

水一鍾葱白五十粒

豆豉五

併三服

為度此藥是寒涼

解散鬱熱若病甚不解多服此藥無害但有

而無損

俗惡性寒無易得之賤物而不明素問

造化之理故不

取本草神驗之言而多不用焉若以隨証驗之乃凡人

之仙藥也

不可闕之

雙解散

見前

即防風通聖散與益元散相合

傷寒

心法附餘卷之一

小柴胡湯

見前

涼膈散

見前

大柴胡湯

見前

黃連解毒湯

宣明方

治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘

滿陽厥極深蓄熱內甚世俗妄傳為陰毒者及汗吐下

後寒涼諸藥不能退其熱勢者兩感証同治

黃芩

黃連

黃蘗

大梔子

各等

右咬咀每服一兩水二鍾煎一鍾如腹滿嘔吐或欲作

利者每服加半夏三枚生全用厚朴二錢茯苓二錢生

姜三片煎熱服名曰半夏黃連解毒湯

三一承氣湯 宣明方 治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹

滿咽乾煩渴譫妄心下按之硬痛小便赤澀大便結滯

或濕熱內甚而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂顛目疾

口瘡舌腫喉痺癰瘍陽明胃熱發癰脉沉可下者小兒

熱極驚風潮搐煩喘昏塞并癰疹黑陷小便不通腹滿

欲死或斑疹後熱不退久不作痂或作斑癰瘡癰久不

已者佛熱內成疹癰堅積黃瘦瘡疾久新卒暴心痛風

痰酒膈腸垢積滯久壅風熱暴傷酒食煩心悶亂脉數

沉實或腎水陰虛陽熱甚而僵仆卒中一切暴瘡不

語一名失音畜熱內傷陽厥極深脉反沉細欲絕或表

傷寒 心法附餘卷之一

之冲和正氣與邪熱并之於裏則裏熱亢極陽極似陰

反為寒戰脉微而絕或風熱燥甚客於下焦而大小便

澀滯不通者或產婦死胎不下及兩感表裏熱甚煩可

下者

大黃 錦文者 芒硝 厚朴 去皮 枳實 各半兩

甘草 一兩

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至一鍾內芒硝

再煎一沸去滓通口服不拘時

瓜蒂散 宣明方 治傷寒表証罷邪熱入裏結於胸中煩滿

不得息而饑不能食四肢微厥而脉乍緊者宜以此吐

之經云在上吐之在下洩之

瓜蒂炒黃 赤小豆等分

右為末香豉半合豆豉水一鍾半煮取汁半鍾調下一錢不吐加服亡血體虛者不可服

白虎湯宣明方 治傷風自汗村枝証表未解半入於裏中

暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實表裏俱熱三陽合病腹滿身重口燥面垢譫語發黃厥逆自汗和解兩感鮮頭痛止自汗雜病時疫煩渴發癰兼治小兒痘瘡瘡疹伏熱

知母一兩半 石膏四兩為末 甘草一兩炙 粳米一合

傷寒心法附餘卷之一 九十一

右剉如麻豆大抄五錢水一鍾煎至六分去滓溫服無時候日三四服或眩欬嘔者加半夏兩橘紅半兩每服生姜三片煎服 傷寒發汗不解脉浮者加蒼木半兩名蒼木白虎湯 或汗吐下後煩渴口乾舌燥脉洪大加人參半兩名人參白虎湯 此藥立夏後立秋前可服春秋後并亡血虛家並不可服不惡寒反惡熱大便不祕者亦可服

五苓散宣明方 治傷寒中暑大汗後胃中乾煩燥不得眠脉浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲水反吐各日水逆 或攻表不解當汗而反下之利不止脉浮表不解自利

或一切留飲不散水停心下并兩感中濕而昏躁霍亂吐瀉驚風

猪苓去皮 茯苓去皮 白朮各半兩 澤瀉一兩

桂枝去皮二錢半

右為末每服二錢熱湯調下加滑石二兩尤佳喘嗽煩心不得眠者加阿膠半兩炒夏月大暑新水調服立愈○廣按西北之地高燥又無居人多食葱蒜油烙麵食及煎炒魚肉燒酒以致內火熾盛至春夏升浮之時適因所感而鬱火遂得以發於外發則煩渴飲水以致水停心下宜用此藥治之如無涉虛用柴苓湯尤妙柴苓湯見前

傷寒心法附餘卷之一 九十一

大陷胸湯宣明方 治汗下之後不大便五六日舌乾而渴日晡潮熱從心至小腹脹滿而痛不可近脉當沉緊滑數或但胸結則無大段熱頭微汗出脉沉澀者水結也 大黃去皮三錢半 芒硝三錢半 甘遂末五分

右剉如麻豆大分作二服每服水一鍾煎大黃至六分納硝一二沸絞汁調甘遂末二分半溫服未快利再服勢惡不能利以意加服

大陷胸丸宣明方 治發熱而下之太早熱入內作結胸者項亦強如柔痙狀下之則和也

大黃半兩 芒硝二錢半 杏仁十二個去皮尖雙仁者灰炒變色

葶藶三錢微

右大黃為末下葶藶杵羅研杏仁爛如泥和彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一鍾煮半鍾溫服當一宿許乃下未利再服

小陷胸湯宣明方治小結胸心下按之痛脉浮而滑無大

段熱表未罷不可下之下之即死水結胸亦宜服此

半夏四錢湯洗全用不到生薑二錢切黃連二錢剉

栝樓實大者半兩惟剉其殼子則不對若對其子者非也

右水三鍾煮栝樓汁一鍾半納藥至一鍾絞汁兩次溫

服以微吐黃涎為愈

傷寒

茵陳湯宣明方治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以

致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利

渴引水漿身必發黃宜茵陳湯調下五苓散利大小便

茵陳蒿一名山茵陳一兩去莖

川大黃半兩

右剉如麻豆大水二鍾半慢火煮至一鍾絞汁溫服以

利為度甚者再服當下如爛魚肚及膿血膠膠等物及

小便多出金色如皂莢汁或見証將欲發黃此一劑分

作四服調五苓散三錢凡治發黃者無越此法妙

梔子豆豉湯宣明方治汗吐下後胸滿頭痛微汗虛煩不

得眠反覆顛倒心內懊憹乃燥熱怫鬱於內而氣不宜通故也

大梔子七箇剉碎如小者用十箇豆豉半合俗言鹽豉少氣者加甘草二錢半

唯考誤以九藥下之者加生薑半兩或用溫湯攪手足使心胸結熱宣通而已

右剉如麻豆大或先以水二盞煮梔子至一鍾半納豉

煮至半鍾絞汁溫服凡加者皆用梔子先煮或吐止後

其燥熱鬱結之甚而藥煩攻之不能開通則發熱而吐因其嘔吐候達鬱結則氣通津液宣行而已故不煩再

服也

桂苓甘露散宣明方治傷寒中暑冒風飲食中外一切所

傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利間小便赤

傷寒

瀉大便秘痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚

風

茯苓一兩去皮甘草二兩炙白朮半兩澤瀉一兩

桂半兩去皮石膏二兩寒水石一兩滑石四兩

猪苓半兩

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良小

兒每服一錢同上法

右共一十八方并舊本白虎湯義如無大承氣以三一承氣代

之尤妙通三十九藥味調理傷寒曲盡其妙百發百中

後之學者詳辨脉証審而用之起沉痾於及掌策奇功

以活人方知其妙也

○已上諸方治溫熱病切要之劑

小青龍湯 宣明方 治傷寒表未罷心下有水氣乾嘔發熱

而咳或渴利或小便不利小腹滿喘

麻黃 去節湯泡去黃汁焙乾三錢○利者去麻黃加

四錢○喘者去麻黃加杏仁三錢去皮尖

桂枝 三錢去芍藥三錢 半夏二錢湯泡○渴者去

細辛三錢 五味子二錢 甘草三錢 乾姜三錢

右剉如麻豆大每服五錢水一鍾半生薑四片煎至七

分去滓溫服

傷寒 心法附餘卷之一 九十四

真武湯 活人方 治傷寒數日已後發熱腹痛頭目昏沉大

便利小便或利或澀或嘔或咳或已經汗不解仍腹

發熱心下忪悸頭目眩暈皆由渴後飲水停留中脘所

致並皆治之

芍藥 七錢半下利者可 生薑 七錢半

附子 七錢半去之加乾姜半兩 白朮 五錢

茯苓 七錢半去皮小 咳者加五味子一錢半細辛乾姜各二錢半

右咬咀每服五錢水一鍾半煎八分溫服不拘時

十棗湯 宣明方 治太陽中風不利嘔逆短氣不惡寒熱熱

汗出發作有時頭痛心下痞硬引痛無下水腫腹脹并

酒食積腸垢積滯痞癖堅積畜熱暴痛瘧氣久不已或

表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入

裏陽厥極深脉微而絕并風熱燥甚結於下焦大小便

不通實熱腰痛及小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮搐

斑疹熱毒不能了絕者

芫花 慢火炒變色仲景鄉俗異語也 大戟

甘遂 各等分

右為末水一鍾棗十枚切開煮取汁半鍾調半錢實人

每服一錢

傷寒 心法附餘卷之一 九十五

三黃瀉心湯 治傷寒陰証下之太早致心下痞按之軟

其脉關上浮者主之若未解未可攻宜先隨風寒二証

投桂枝麻黃湯表解即服此藥

大黃 黃連 黃芩 各等分

每服一兩剉如麻豆大沸湯二鍾熟漬之一時久去粗

分二服溫服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合同服

名附子瀉心湯

半夏瀉心湯 治心下痞滿而不痛者

乾姜 兩半 黃連 半兩 人參 去蘆 甘草 炙

每服五錢水一鍾生姜五片棗一枚煎半鍾溫服或傷

寒傷風反下之日利數十行穀不化腹中鳴心下痞硬

乾嘔心煩者加甘草人參名甘草瀉心湯或汗出解後

胃中不和心下痞硬乾嘔食臭脇下水鳴下利者加生

姜減乾姜名生姜瀉心湯

檳榔散宣明方治傷寒陰病下之太早心下痞滿而不痛

按之軟虛也

檳榔 枳殼 等分

右為末每服三錢煎黃連湯調下不計時候溫服

旋覆代赭湯傷寒論治傷寒發汗若吐下解後心下痞硬

傷寒 心法附餘卷之一 九十六 三白汗餘

噫氣不除者

旋覆花 甘草炙各三兩 人參二兩 生姜五兩

代赭石一兩 大棗十二箇 半夏半升 湯洗

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服

枳實理中丸三因方治傷寒曾經吐利後胸痞欲絕膈高

起急痛者

枳實去穢 茯苓去皮 人參 白朮

乾姜炮 甘草炙各等分

右為末蜜和一兩作四丸米湯化下渴加栝樓根下痢

加牡蠣一方只用枳實麩炒為末米飲調服三錢日三

服加桔梗等分尤妙

近效方 陽証結胸垂死

用活蚯蚓十條搗爛入水半碗蜜半鍾灌下

結胸灸法

巴豆十四粒 黃連大者七

右為末用津唾和成膏填入臍心以艾炷不拘壯數灸

其上候腹中有聲為度灸畢湯浸用帛拭淨恐生瘡

丁香柿蒂湯 治欬逆噎汗陰証者

丁香 柿蒂各一錢 甘草炙 良姜各半兩

右為末每服二錢用熱湯點服不拘時

橘皮竹茹湯活人方治陽証噦逆惡寒及吐利後胃虛膈

熱而欬者

橘皮一升 竹茹一升半 甘草三兩半 人參半兩

右咬咀每服五錢水一鍾半生姜七片棗二枚煎至八

分溫服

小柴胡加生薑橘皮竹茹湯 治陽証咳逆潮熱

小柴胡湯 生薑 橘皮 竹茹

右咬咀每服五錢水 鍾半煎至七分溫服

咳逆灸法活人方

其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈夫及乳小者

以一指為率以男左女右與乳相直間陷中動脈是穴  
艾炷如小豆大灸三壯

化斑湯 治斑毒

人參

石膏 各半兩

玄參

知母

甘草 各一兩

右咬咀每服五錢水一鍾半入糯米一合煎溫服

梔子蘗皮湯

宣明方

治頭微汗小便利而微發黃者濕熱

相搏故也微者宜此甚者宜茵陳湯下五苓散 見前

黃蘗 半兩

甘草 二錢半

大梔子 十五箇

右剉如麻豆大水三鍾煮至一鍾絞汁分次作一日三

傷寒

心法附餘卷之一

九十九

溫服之

桃仁承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自

下但小腹脹結者是 方見吐血類

抵當湯 宣明方 治傷寒日深表証仍在畜熱下焦脈微沉

下結胸發狂者小腹脹而硬小便利者瘀血証也小

便不利無血也或陽明畜熱內甚而喜忘或狂大便雖

硬而反易其色黑者有畜血也無表裏証但發熱日深

脈雖浮者亦可下之或已下後脈數胃熱消穀善饑數

日不大便有瘀血也

桃仁 七箇

大黃 二錢半 水蛭 炒

蟅虫 各十箇 去翅足炒

右剉如麻豆大分作二服水一鍾煮半鍾絞去滓溫服  
未下再服

抵當丸 宣明方 治傷寒有熱小腹滿小便不利者為瘀血

也當下之不可餘藥

桃仁 八箇

大黃 二錢半

水蛭 炒

蟅虫 各七箇 依前炒

右為末蜜和作二丸用水一小鍾煮一丸至六分溫服

晡時血未下再服

辰砂五苓散

和劑方

治傷寒表裏未解頭疼發熱心胸鬱

悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見神鬼

五苓散內加辰砂末如桂分兩方見前

傷寒

心法附餘卷之一

九十九

犀角地黃湯

治傷寒及溫病應發而不發汗內有瘀血

鼻衄吐血面黃大便黑者 方見吐血類

竹葉石膏湯

傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶

得汗已解內無津液虛羸少氣欲吐及諸虛煩熱與寒

相似但不惡寒身不疼頭不痛不可汗下者

石膏 一兩六錢半

洗七次

人參 二錢 去蘖

麥門冬 五錢半

去心

甘草 二錢

右咬咀每服五錢水一鍾入青竹葉生薑各五片煎至

半鍾去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米溫服不拘時

又云竹葉十片

人參石膏湯 宣明方 治傷寒咳嗽不已心煩及風濕頭痛  
精神不利昏憤宜服

人參一錢半 半夏湯泡洗 大梔子 黃芩各三錢

川芎 白朮 茯苓去皮 知母各五錢

甘草一兩 石膏三兩

右咬咀每服一兩水二鍾姜三片煎至一鍾去滓溫服

酸棗湯 治傷寒吐下後心煩之氣晝夜不眠

酸棗仁 炒 麥門冬一錢 甘草三分 知母八分

茯苓八分 川芎七分 乾姜炮三分

右用五錢水一鍾煎七分溫服

傷寒

心法附餘卷之一 一百 溫膽湯 易簡方 治傷寒一切病後虛煩不得睡卧無治心

膽虛怯

半夏 枳實去穢 橘紅一兩半 茯苓五錢半

甘草四錢

右咬咀每服四錢水鍾半生薑七片棗一枚竹茹一塊

煎七分去滓食前服

加味溫膽湯 秘方 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不詳異象

惑惑迷心驚悸氣鬱生涎涎與氣搏亦生諸證或短

氣悸之或復目汗四肢浮腫飲食無味

枳實 炒 半夏湯泡七 竹茹炙八兩 橘紅十二兩

白茯苓六兩 甘草四兩 香附子一斤 人參

柴胡去蘆 麥門冬去心 桔梗各六兩

右咬咀每服一兩生薑五片棗二枚水二鍾煎至一鍾

溫服不拘時

枳實梔子湯 下金方 治大病瘥後食復勞復者

枳實二枚 梔子十四箇 豆豉一升

右咬咀每服一兩用清漿水二鍾煎至一鍾去滓溫服

不拘時如有宿食加大黃如棊子大五六片

白朮散 和劑方 治傷寒病後氣脉不和食復勞復病証如

初者

傷寒

心法附餘卷之一 一百一 桔梗三兩 茯苓去皮三 乾姜泡二兩 白朮四兩

白芷 陳皮去白 香附子 甘草炙

青皮去白 山藥各三兩

右咬咀每服五錢水一鍾姜三片棗三枚乾木瓜一片

紫蘇二葉煎七分食前服 若吐瀉入白梅 喘入桑

白皮杏仁 傷寒勞復入薄荷 膈氣入木通三寸射

香少許 中暑嘔逆入香薷 產後血氣不和入荊芥

霍亂入藿香煎 氣厥為末入鹽湯調下

增損白朮散 傷寒雜病後一切吐瀉煩渴虛

損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦



白木一兩	人參一兩	茯苓一兩	甘草半兩
木香半兩	藿香一兩	陳皮一兩	乾生薑半兩
右咬咀每服四錢水一鍾煎七分去滓溫服 <small>酒積加葛根一兩</small>	茯苓半夏湯 <small>宣明方</small>	治傷寒雜病一切嘔吐或喘嗽疼痛	痞滿頭痛者
茯苓 <small>去皮二錢半</small>	半夏一錢	生薑二錢半	取汁
一方加黃芩二錢半去	甘草二錢	陳皮半兩	治白二錢
右剉如麻豆大水一鍾煎至四分絞汁下生薑汁溫服	不計時候	赤茯苓湯	治胸膈滿悶頭痛已得汗者
傷寒	心法附餘卷之一	一百一	三
陳皮	甘草	人參	半夏
川芎	白木等分	右剉每服五錢水一鍾半生薑三片煎一鍾溫服	梔子厚朴湯 <small>宣明方</small>
梔子厚朴湯	治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者	大梔子七箇	厚朴 <small>姜汁製</small> 二錢
右咬咀水一鍾煎七分去滓通口服不拘時	五味子湯	治汗下後氣閉咳嗽	五味子半兩
麥門冬 <small>去心</small> 人參	杏仁 <small>去皮尖</small>	陳皮	生薑 <small>各一錢</small> 棗子 <small>一核</small>
右剉每服五錢水二鍾作二服			

桔梗湯	治咽痛	桔梗五錢	甘草三錢
右用水一鍾半煎至八分通口服	大橘皮湯	治汗後胃虛	陳皮
甘草各二兩	人參一兩	右剉每服五錢水鍾半姜二片煎至一鍾溫服	四逆湯 <small>宣明方</small>
治傷寒表熱未入裏誤以寒藥下之大早	表熱不已又裏寒下利不止因表熱裏寒自利急以溫	裏利止又治少陰病脉沉下利厥逆煩渴嘔吐	甘草一錢炙
乾姜二錢半	附子 <small>半箇生去皮臍附子以半兩者佳</small>	傷寒	心法附餘卷之一
一百一	三	弱大者性惡非古人之宜也不但	以美其大者要知古人之有則也
右剉如麻豆大水二鍾煮至一鍾絞汁溫服 <small>或高熱極</small>	方當以下之	壞證奪命散	治傷寒汗下後不解或投藥錯誤致患人
困重垂死昏沉或陰陽二証不明七日以後皆可服	好人參一兩	右為片水二鍾於銀石器內熬至一鍾溫服病人喜冷	以新水沉冷服之粗再煎服連進數服服至鼻尖上潤
汗出是其應也	此藥不拘男子婦人傷寒時氣疫証二	汗出是其應也	七三七不鮮不知人事者並宜服之
○已上數方治傷寒溫熱病汗下後雜証之劑			

蜜煎導法 陽明病汗下後體虛氣弱津液枯竭臟腑閉塞大便不行須宜蜜導

右用蜜一兩銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦可丸入皂角末鹽少許捻作挺子如指許長二寸當令頭銳納穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁導法 以大猪膽一枚瀉汁和醋少許灌穀道中如一食頃當大便 一方用蘿蔔子一勺研爛取汁入

蜜調服

溫粉撲汗法 凡發汗不欲多多即亡陽用此撲之即愈

白朮

藁本

川芎

白芷

傷寒

心法附餘卷之一

二百四

三百七十一

右為末一兩入米粉三兩勻和撲之

蒸法 以薪火燒地良久掃除去火以水洒之取蚕沙和

葉糠麩相和鋪地上一寸厚以草席令病人當上卧溫

覆之夏月熱只被單覆之汗移時立至俟周身至脚心

皆汗如汗出不止乃用溫粉撲之移於寢處

水漬法 以青綿布數層將水漬之稍拭去水搭於胸脇

上須更蒸熱又漬冷如前用之仍數易新水日數拾

易熱甚者置病人於水中熱勢漸退則已

湯漬法 以菹豆豉湯一鍋候稍溫用青綿布數層蘸湯

搭於胸脇冷則再蘸再搭日數拾易用被少覆移時病

人得汗而愈蓋熱則腠理開通使內熱得以外達氣血

宣通汗自出而病解矣又菹豆豉布性涼能退熱故也

發汗法 凡發汗務要以衣被厚蓋汗出欲令手足俱周

澈澈然一時許為佳不欲如水淋漓服藥中病即已不

必盡劑三日內者可汗病在表惡寒者可汗

取汗法 傷寒初覺頭疼惡寒發熱身體疼痛脉洪者用

葱白一握姜豉一兩以水煮熱服以被蓋暖取汗如不

汗更用葛根升麻煎服必汗若不汗更加麻黃取汗

轉下法 凡轉下須體認得合下之証明白在陽明胃經

則不拘日數過時失下則氣血不通四肢便厥不識反

傷寒

心法附餘卷之一

二百五

四百十二

疑是陰厥復進熱藥禍如反掌若少陰腎經太陰脾經

下証悉用藥已大便利者止不須盡劑陽明病得利瘥

取吐法 凡取吐服吐藥後不大吐當以手指探之便吐

不吐稍增藥以吐為度若吐少病不除明日再服吐藥

可至再三但人虛宜少吐藥力過時不吐者吸熱湯一

升以助藥力不必盡劑吐訖稍待氣定方可食若服藥

過多者飲水解之

○廣按溫熱之病因外感內傷觸動鬱火自內而發之

於外初則表裏俱熱宜用涼膈散雙解散之類辛涼

之劑兩除表裏之熱久則表熱微而裏熱甚又宜用

大柴胡湯承氣湯之類苦寒之劑以瀉之則熱退身涼而病自已也今人不諳伏氣溫熱之証表裏俱熱認作即病傷寒之証表熱裏和便用麻黃湯桂枝湯五積散聖散子辛溫之劑以發表則內熱愈甚而斑黃狂亂之証起矣或未用辛涼之劑以發表使月承氣湯苦寒之劑以攻裏則表熱未去而結胸虛痞之証作矣嗚呼傷寒溫熱之源流發表攻裏之先後不可一毫而少差也

傷寒

心法附餘卷之一

二頁

一百六十八

丹溪心法附餘卷之一終

丹溪心法附餘卷之二

沐寧東山古庵方廣約

類集

# 外感門下

## 中暑

五

附暑風

注夏

丹溪心法

○暑證用黃連香薷飲 挾痰加半夏南星 如虛加參

芪 暑病內傷者用清暑益氣湯 暑氣一作是痰用吐

注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼脚軟食少體熱

中暑

心法附餘卷之二

一

暑風挾痰挾火

者是宜補中益氣湯去柴胡升麻加炒栝白芍藥挾痰者加南星半夏陳皮煎服又或用生脈湯 暑風挾痰挾火實者可用吐法

暑乃夏月炎暑也盛熱之氣着人也有冒有傷有中三者有輕重之分虛實之辯或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黃連香薷飲清暑益氣湯益黃連退暑熱香薷消蓄水或身熱頭疼燥亂不寧者或身如針刺者此為熱傷在肉分也當以解毒湯白虎湯加柴胡如氣虛者加人參此為傷暑或咳嗽發寒熱盜汗出不止脈數者熱在肺經用清

肺湯柴胡湯天水散之類急治則可遲則不放盛火乘金也此為中暑凡治病須要明白辯別慎勿混同施治

春秋間亦或有之切莫執一隨病處方為妙

戴云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也內外合而炎燔所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞礙心之竅道則手足不知動躍而卒倒也此二者皆可吐內經曰火鬱則發之吐即發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

入方 治暑渴

中暑

心法附餘卷之二

二

生芩一錢

麥門冬一錢

牛膝一錢

炒栢一錢半

知母八分

葛根八分

甘草三分

右剉作一服水一鍾煎七分溫服

附脉理

脉訣舉要曰暑傷於氣所以脉虛弦細孔遲體狀無餘

附諸方

黃龍丸 治伏暑發熱煩渴嘔吐惡心

黃連二斤

右以好酒五升煮乾為末麵糊丸梧子大熱湯下三十

丸

王露散 張子和方 治暑渴

寒水石

滑石

石膏

枯樓根各一兩

甘草一兩

右為細末每服五錢新水調服

枇杷葉散

和劑方

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

昏眩

枇杷葉

去毛炙

香薷七錢半

白茅根

麥門冬

去心

甘草炙

乾木瓜各一兩

丁香

陳皮

去白

厚朴去皮姜汁炙

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎服

如止渴燥去

丁香

加知母冷水調下

○已上諸方止渴之劑

生脉湯

生津止渴

人參一錢

麥門冬二錢

五味子八分

右剉水一鍾煎七分服不拘時

人參白虎湯

徐同知方

治伏暑發渴嘔吐身熱脉虛自汗

人參一錢半

知母二錢

石膏半兩

甘草多一錢

右咬咀入梗米一合水一鍾煎至一鍾不拘時熱服如

伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水

沐浴或喫冷物清氣在脾不覺散令日晡作寒慄壯熱

渾身酒漸宜加桂煎服出汗便解

竹葉石膏湯 治伏暑內外發熱煩燥大渴

見濕熱類

○已上諸方補虛止渴之劑

香薷飲 和劑方 治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治

之 一方加黃連四兩用姜汁同炒令老黃色名黃連

香薷飲 如有搖擗加羌活煎服

厚朴 去皮姜汁炙

白扁豆 微炒 香薷 去土一

右咬咀每服三錢水一鍾入酒少許煎七分沉冷不拘

時服熱則作瀉香薷須陳者加

五物香薷飲 直指方 驅暑和中通用

中暑

心法附錄卷之二

香薷 去土二 白扁豆 煨汁 厚朴 去皮姜 白茯苓 去皮各

甘草 五分

右咬咀每服五錢水二鍾煎至一鍾去滓溫服

二香散 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

見霍亂類

香薷縮脾飲 直指方 驅暑和中除煩止渴

縮砂仁

草果仁

烏梅肉

香薷

甘草 炒各兩

白乾葛

白扁豆 各一

右判每服三錢生姜五片水煎去滓微溫服

縮脾飲 和劑方 消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁 四兩

乾葛 二兩

白扁豆 二兩 烏梅肉

草果 炒去殼 甘草 炙各四 一方無乾葛有乾姜

右咬咀每服四錢水二大碗煎七分以水沉冷服

卻暑散 治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄痢煩渴背寒面

垢

赤茯苓

生甘草 各四

寒食麵

生薑 各一斤

右為末每服二錢白湯調下

大順散 和劑方 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不

分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草 三斤

乾姜

杏仁

去皮肉桂各六

右先將甘草用白砂蜜炒及八分黃熟次入乾姜同炒

中暑

心法附錄卷之二

五

白豆蔻

却入杏仁候杏仁不作聲為度用篩篩淨後入肉桂一

處搗羅為末每服三錢水一鍾煎五七分溫服如煩燥

井花水調下不拘時候以沸湯點服亦可

○廣按寒則傷形熱則傷氣何以言之人與天地同一

索驚夏月天之氣浮於地表則人之氣浮於肌表况

被盛暑所傷膚腠疎豁氣液為汗發泄於外是表裏

之氣俱虛矣不善攝生者暑熱傷於外生於中

若之何而能運化也是以水穀停積而為濕熱發為

嘔吐為泄瀉甚則吐瀉俱作而揮霍悶亂也若不即

病濕熱怫鬱於內他日為瘡為痢之所由矣今大順

散非治暑熱之藥乃治暑月飲涼過多為病之劑也

○已上諸方消導之劑

香朴飲子 聖惠方 治大人小兒伏熱吐瀉虛煩作亂

人參 去蘆八分 茯苓 去皮一分 甘草 炙三分 紫蘇葉 七分

木瓜 七分 澤瀉 六分 香薷 去土一分 半夏 湯泡七分

白扁豆 七分 陳皮 七分 烏梅肉 七分 厚朴 七分

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片棗一箇煎至一鍾食前熱服

六和湯 和劑方 治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄

中暑 心法附餘卷之二 六 瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫

嗜臥倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶

或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎產中亦可服

縮砂仁 半夏湯炮七分 杏仁 去皮尖 人參

甘草 炙各一分 赤茯苓 去皮 藿香葉 去土 白扁豆 薑汁

木瓜 各二分 香薷 厚朴薑汁製 厚朴 各四分

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片棗子一枚煎至一鍾溫服

十味香薷飲 百一 消暑氣和脾胃

香薷 兩 人參 去蘆 陳皮 去白 白木

右咬咀每服四錢水一鍾生薑五片燈心十莖煎八分不

黃芪 去蘆 白扁豆 炒去 甘草 炙 厚朴 去皮薑汁

乾木瓜 白茯苓 去皮各半兩

右為末每服二錢熱湯冷水任調下

清暑益氣湯 東垣方 治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦

精神感少懶於動作胸滿氣促支節疼痛或氣高而喘

身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便澀而頻或痢或

渴不思飲食自汗體虛

黃芪 蒼朮 米泔製 升麻 各一錢 人參

白木 神麴 陳皮 澤瀉 各五分

甘草 炙 酒栢 麥門冬 當歸 各五分

中暑 心法附餘卷之二 七 葛根 二分 五味子 九粒 青皮 二分半

右咬咀作一服水二大鍾煎至一鍾去滓大溫服食遠

○已上諸方補虛消導之劑

消暑丸 和劑方 治伏暑引飲脾胃不和

半夏 一斤 甘草 生用 茯苓 去皮各半斤

右為末姜汁煮糊為丸如梧桐子每服五十丸熱湯下

解暑三白飲 和劑方 治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭

目昏眩

澤瀉 白木 白茯苓 各等分

右咬咀每服四錢水一鍾生薑五片燈心十莖煎八分不

拘時服

五苓散 和劑方 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤

少如心神恍惚加辰砂如桂分兩又名辰砂五苓散

見濕

加味五苓散 濟生方 治伏暑熱二氣及冒濕泄瀉注下或

煩或渴或小便不利

赤茯苓 去皮 澤瀉

猪苓 去皮

白朮 各一兩

官桂 不見火 車前子 各半

右以咀每服四錢水一鍾姜五片燈心十莖煎八分不

拘時溫服

中暑

益元散 御藥院方 治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃

脫積熱又淡能滲濕故利小便而散濕熱也

見濕熱

任苓甘露飲 御藥院方 治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂

瀉利

白茯苓 去皮 白朮

猪苓 去皮

滑石 研各二

寒水石 研 甘草 炙

澤瀉 各一兩 肉桂 去皮半

右為末拌勻每服二錢熱湯冷水任下入蜜少許尤好

桂苓甘露散 張子和方

官桂 半兩 人參 去蘆半

藿香 半兩

茯苓 去皮

白朮 甘草 炙

葛根

澤瀉

石膏

寒水石 各一兩 滑石 二兩 木香 二錢

右為細末每服二錢白湯下新汲水或生薑湯亦好

可服

官桂 去皮 白朮

猪苓 各五錢

茯苓 去皮

澤瀉 各一兩 甘草 炙

石膏

寒水石 各二

滑石 四兩

右為末每服二錢熱湯新汲水或生薑湯調下劉廷瑞方不用猪苓

○已上諸方利濕清熱之劑

中暑

肥兒散 一名甘草散 聖惠方 治中暑迷悶不省人事及

泄瀉霍亂渴一服即愈亦能解暑毒

白礬 生一兩

五倍子 生一作五

烏梅 連去核

甘草 生用 一兩半 炙一方

飛羅麵 一兩一方用清

明

右為末入飛羅麵拌勻每服二錢新水調下 一方加

柯子肉滴水為丸如彈子大細嚼水下名龍涎丸

二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脫痞結或泄或嘔

硝石

硫黃 各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊為丸

如梧桐子大每服四十丸新汲井花水下

來復丹和劑方治上盛下虛伏暑泄瀉如水

硝石一兩同硫黃為末入銚內以微火炒用柳條攪

船上硫黃不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末

五靈脂一兩登過晒乾 陳皮去白二兩 青皮去白二兩

右先用五靈脂陳皮青皮為末次入玄精石末及二氣末拌勻好醋打糊為丸如豌豆大每服三十丸空心米飲送下

大黃龍丸百一選方治中暑身熱頭疼壯如癰疾或煩渴

嘔吐昏悶不食

船上硫黃 硝石 各一兩 白礬 滑石 各半兩

中暑心法附餘卷之二 十

雄黃半兩 白麵四兩

右五味研末入麵和勻滴水丸如梧子大每服三十丸

新水下

○廣按已上三方皆劫劑也夫暑熱流金燦石人到其時膚腠開豁氣液耗散而煩渴縱飲寒涼而不顧况氣液為汗發泄于外其中虛矣所以不能化水穀而停積膠固于內發為嘔吐泄瀉腹痛頭疼身熱諸証非石藥其性慄悍而能開散之乎

○已上諸方攻散暑毒之劑

暑病治例 出明醫雜著

王節齋曰夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏月

人感之自口齒而入傷心包絡之經其脉虛或浮大而

散或弦細花遲蓋熱傷氣則氣消而脉虛弱其為症汗

煩則喘渴靜則多言身熱而煩心痛大渴引飲頭疼自

汗倦怠少氣或下血發黃生斑甚者火熱制金不能平

木搖擗不省人事治暑之法清心利小便最好者傷氣

宜補真氣為要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省

而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉痢此則非暑傷人乃

因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然

治發不同也

中暑心法附餘卷之二 十二

若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之陽証

也其病必苦頭痛發燥熱惡熱捫之肌膚火熱必大渴

引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益

氣用香薷黃連扁豆人參黃芪五味知母石膏之類

暑熱發渴脉虛用人參白虎湯見前或用竹葉石膏湯

亦好見濕熱

東垣清暑益氣湯治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦

精神少胸滿氣促肢節痛或氣高而喘身熱而煩心

下痞悶小便黃而數大便溏而頻或痢或渴不思飲

食自汗體虛此湯最好見前



若暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大廈涼

臺冷館大扇風車得之者是靜而得之陰証也其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗此為陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾葛藿香羌活蒼朮之類若外既受寒內復傷冰水生冷瓜果之類前藥再加乾姜縮砂神麴之類此非治暑也治因暑而致之病也

若外不受寒止是內傷冰水冷水腹痛泄瀉或霍亂吐

逆宜縮脾飲見前或理中湯見中寒類加神麴麥芽

中暑心法附餘卷之二十二  
縮砂蒼朮此專治內溫中消食也

若吐瀉脉沉微甚者不可用涼藥可用大順散見前加

熟附子等分或附子理中加炒芍藥

夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治

暑藥多用溫脾消食治濕利小便之藥醫者要識此意

若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消

食次治其外清暑補氣而以理脾為主於前陰陽二

條內相兼取用東垣清暑益氣湯已無此意其用黃

芪升麻人參白朮甘草麥門冬當歸五味黃柏葛根

是清暑補氣也蒼朮神麴陳皮澤瀉青皮是治內補脾也

治暑風卒倒法 凡人中暑先着於心一時昏迷切不可與冷水飲并卧濕地其法先以熱湯灌或童便灌及用布蘸熱湯熨臍并氣海續續令暖氣透徹臍腹俟其甦省然後進藥若旅途中卒然暈倒急扶在陰涼處搦路中熱灰土作窩於臍中令人尿其內即甦却灌以人尿或攪地漿飲之半碗或車輪土五錢冷水調澄清服皆可 一方用大蒜三兩瓣細嚼溫湯送下禁冷水即愈

補中益氣湯 見內傷類  
清肺湯 見咳嗽類  
中暑 心法附餘卷之二 十三

# 中濕

陰濕熱六

丹溪心法

本草云蒼朮治濕上下部皆可用 二陳湯中加酒苓薤活蒼朮散風行濕 脾胃受濕沉困無力怠惰好卧去濕痰瀆用白朮 上部濕蒼朮功烈 下部濕宜升麻提之外濕宜表散 內濕宜淡滲 若燥濕以羌活勝濕湯平胃散之類 若風濕相搏一身盡痛以黃芪防己湯若濕勝氣實者以神佑丸舟車丸服之氣虛者桑皮茯苓

大麥蘆木香之類 凡肥人沉困怠惰是濕熱宜蒼朮  
 茯苓滑石 凡肥白之人沉困怠惰是氣虛宜二朮人參  
 半夏草薢厚朴芍藥 凡黑瘦而沉困怠惰者是熱宜白  
 朮黃芩 凡飲食不節脾胃受傷不能通送宜枳朮丸  
 去上焦濕及熱須用黃芩瀉肺火故也又如肺有濕亦宜  
 黃芩如肺有虛熱宜天門冬麥門冬知母用黃芩多則損  
 脾 去中焦濕與痛熱用黃連瀉心火故也如中焦有實  
 熱亦用黃連若脾胃虛弱不能運轉而鬱悶宜黃芩白朮  
 乾葛若中焦濕熱積久而痛乃熱勢甚盛宜黃連用姜汁  
 炒 去下焦濕腫及痛併膀胱有火邪者必須酒洗防已  
 中濕 心法附餘卷之二 十四  
 黃柏知母草龍膽又云凡下焦有濕草龍膽防已為君甘  
 草黃柏為佐如下焦腫及痛者是濕熱宜酒防已草龍膽  
 黃柏蒼朮 若肥白氣虛之人腫痛宜二朮南星滑石茯  
 苓 黑瘦之人下焦腫痛宜當歸桃仁紅花牛膝楸榔黃  
 柏  
 戴云濕有自外入者有自內出者必審其方土之致病  
 源東南地下多陰雨地濕凡受必從外入多自下起以  
 重腿脚氣者多治當汗散久者宜疎通滲泄西北地高  
 人多食生冷濕麵乳酪或飲酒後寒氣怫鬱濕不能越  
 作致腹皮脹痛甚則水鼓脹滿或通身浮腫按之如泥

不起此皆自內而出也辨其元氣多少而通利其二便  
 責其根在內也此方土內外亦互相有之但多少不同  
 須對證施治不可執一  
 附脉理  
 脉訣舉要曰或濇或細或濡或緩是皆中濕可得而斷  
 附諸方  
 麻黃白朮散 治感風濕身體煩疼無汗發熱者  
 麻黃 去節三兩 白朮 四兩 甘草 炙二兩 桂心 一兩  
 杏仁 去皮尖 十六箇  
 右吹咀每服四錢水一鍾煎七分空心服  
 中濕 心法附餘卷之二 十五  
 羌活勝濕湯 拔粹方 治脊痛項強腰似折項似拔上街頭  
 痛及足太陽經不行  
 羌活 去蘆 獨活 去蘆 各一錢 藁本 防風 去蘆 各  
 蔓荊子 二分 川芎 二分 甘草 五分 炙  
 如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃柏一錢附子  
 半錢蒼朮二錢水二鍾煎至一鍾去渣溫服食後  
 平胃散 和劑方 治脾胃不和進飲食常服暖胃消痰  
 蒼朮 米泔浸厚朴 姜製妙 陳皮 各三斤 甘草 炒三十  
 右為末每服五錢姜三片棗一枚煎服入鹽一捻沸湯  
 點服亦得

一方加草果名平胃草果散

一方 治風濕

用蒼木一斤米泔浸竹刀刮去皮晒乾為片以半斤用童便浸一宿半斤用酒浸一宿焙乾為末每服一錢空心塩湯或酒調下常服除濕壯筋骨明目

防已黃芪湯 治風濕相搏客在皮膚四肢少力關節煩疼脉浮身重汗出惡風

防已一兩 甘草炙半兩 白朮七錢半 黃芪一兩二分

右咬咀每服一兩入姜棗煎 喘者加麻黃 胃氣不和加芍藥 氣上衝加桂枝 下有寒加細辛

中濕 心法附餘卷之二 治風濕相搏腰膝疼痛四肢重者不嘔不渴大便堅硬小便自利

白朮四兩 附子炮去皮臍

右咬咀每服三錢水一鍾姜棗煎熱服

生附湯 直指方 治受濕腰痛腿疼

附子生二錢 蒼朮炒 杜仲姜炒半 牛膝酒浸焙

厚朴姜製 乾姜生 白朮 茯苓去皮

甘草炙各三錢半

右咬咀每服五錢姜三片棗一枚水一鍾半食前煎服 羌附湯 濟生方 治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微

浮腫

羌活去蘆 附子炮去皮 白朮 甘草炙各等

右咬咀每服五錢姜五片水一鍾煎七分溫服

除濕湯 百一選方 治寒濕所傷身體重著脚腰酸疼大便

溏泄小便或澀或利

半夏麴炒 厚朴姜製 蒼朮米泔製 藿香葉

陳皮去白 白茯苓去皮各一兩 甘草炙七錢

白朮生用一兩

右咬咀每服五錢水一鍾姜七片棗一枚煎七分食前溫服

中濕 心法附餘卷之二 十七 已上治外濕表散之劑

神仙飛步丹 治諸風濕癱瘓等証 見中風類

仙傳黑虎丹 治感風濕傳於經絡手足麻木骨節遍身

疼痛腰腿疼痛 見中風類

乳香黑虎丹 治諸風寒濕客於經絡渾身骨節疼痛

蒼朮三兩 草烏五兩 白芷 五靈脂

羌活 川芎 自然銅醋淬各二兩

乳香一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大百草霜為衣每服五十七九臨卧溫酒下忌熱物

○已上治外濕客于經絡既久疏通之劑

五苓散

治內傷飲食有濕小便赤少大便溏瀉方見中暑類

赤茯苓丸

聖惠方治內濕大過四肢腫滿腹脹喘急氣不

宣通小便赤澀

葶藶四兩

防己二兩

赤茯苓一兩 木香半兩

右為末棗肉丸如梧桐子大每服五十九丸桑白皮湯下

茯苓湯秘方

治脾氣不實手足浮腫小便赤澀氣急喘滿

赤茯苓

澤瀉

香附子

陳皮

桑白皮

大腹皮

乾姜各等分

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

中濕

心法附餘卷之二

十九

消腫丸

三因方治水腫喘滿小便不利

白朮

黑牽牛炒

滑石

陳皮各一錢

木通

茯苓去木

半夏湯泡七次

通脫木

木香

各一錢二分半茯苓

瞿麥穗

丁香各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九丸燈草麥門冬

湯下

○已上治內濕痰滲之劑

三花神佑丸

宣明方

治一切水濕腫病大腹實脹喘滿

輕粉一錢

大黃一兩

牽牛二兩

芫花醋拌炒

甘遂

大戟各半兩

右為末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下無時日三服

○廣按世傳銀粉為治水腫鼓脹之藥以其善開濕熱

佛鬱故也俱可少用為引經而已多則耗氣戒之戒

之

舟車丸

大黃二兩

甘遂

大戟

芫花

青皮

陳皮各一兩

牽牛頭末四兩

木香半兩

右為細末水丸如梧桐子大每服六七十丸白湯下隨

証加減

中濕

心法附餘卷之二

十九

○已上治濕勝氣實者之劑

枳朮丸

治飲食不節脾胃受傷不能通送

見唐類

升陽除濕湯

治脾虛不能運化濕勝泄瀉

見世壽類

大安丸

治脾胃有濕飲食減少

見傷食

白朮和胃丸

治脾虛有濕不能飲食

見調胃

○已上健脾燥濕之劑

濕熱新增

附論

○廣按濕熱之原蓋因寒溫饑飽失常喜怒勞役過度以傷脾胃夫脾胃乃水穀之海也今脾胃受傷而動

火火則薰蒸水穀而為濕熱者也又按胃司納受脾  
司運化今脾不能運化飲食飲食停積而生濕熱亦  
良多矣為治之法入壯實則專攻其濕熱人弱虛則  
攻補並施而補脾消穀導水二者不可闕一也

附脉理

脉理提綱曰濕熱脉緩大

附諸方

神芳導水丸 宣明方治一切熱証常服保養除痰飲消酒

食清頭目利咽膈能令偏身結滯宣通氣和而愈神強  
體健耐傷者病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛小

中濕

心法附餘卷之二

二十

元

兒積熱驚風潮搐名曰藏用丸亦曰顯仁丸加黃連薄  
荷川芎各半兩名曰神芳丸

大黃

錦紋者

黃芩

中枯者

牽牛

滑石

各四兩

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十九至十五丸  
每服加十九日二服冷水下亦得煉蜜丸愈佳或久病  
熱鬱無問瘦悴老弱并一切証可下者始自十九每服  
加十九以利為度如常服此藥但除腸垢積滯不傷和  
氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損  
頗遂病人心意或熱甚必須急下者便服四五十丸未  
利再服以意消息一五歲孩兒丸火麻子大凡此一法

此藥至善常服二三十丸不利臟腑但有益無損或婦  
人血下惡物加桂枝半兩病微者常服病重者亦取利  
因而結滯開通惡物自下也此方除臟腑滑泄者或裏  
寒脉遲者或婦人經病產後血下不止者但孕婦等則  
不宜服除此以外一切風熱雜病煩悶壅塞神氣不和  
或平人保養常服自顯其功若以効驗觀其藥味則非  
明本草造化之理者不可得而知其然也猶孔子讚易  
道明顯應化萬仁之善而不見其大道之用功故曰顯  
諸仁藏諸用因以云藏用丸亦其義也無以世訛之文  
矣而反不善此等妙方不肯服之每有久獲大効而誠  
懇求其方不得已而授之既見其方及生疑懼不復用  
焉亦有効而志信求其方務以廣傳救疾因眾議百端  
擬疑妄生謗說致使俗醫皆畏之致道不能神但有妨  
病者後之君子但行其藥明顯諸人勿示其方而密藏  
諸用耳或以一法加黃連川芎薄荷等各半兩治一切  
頭目昏眩者愈加

○廣按此方瀉濕熱通利大小二便之藥也然濕熱內  
甚不從二便而疎導之何能使之去乎蓋諸病皆生  
於熱臟腑為本經絡為標臟腑之熱既去經絡之熱  
豈能留乎此河間劉先生議此方誠千載治熱病之

釜蹄也果能依此方所云九如小豆大每服十九至十五九以次而加以通利為度何患之有哉但有益而無損也又嘗論之地土有南北下濕高燥之殊人之賦質有肥白黑瘦之異所養有膏粱淡食之別所病有寒濕熱燥之差不可不詳審而明辨也若夫高燥之地黑瘦之人膏粱之家熱燥之病此藥切當若夫下濕之地肥白之人淡食之家寒濕之病此藥猶未當也古人所立之方君臣佐用主治引經範圍已定不可分毫移易但後人不善於用所施不當反生疑議良可嘆息

中濕

心法附錄卷之二

二十三

玄青丸

宣明方

治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不能須此下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣血宣通而愈無宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹脹無療小兒驚疳積熱乳癖諸証惟泄瀉者勿服

見痢類

除濕丹

按華方

治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝澁便弱不利目赤癰疹疽癰發背疥癬走注脚氣無首尾瘡癰不可盡述

脚氣無首尾瘡癰不可盡述

檳榔

甘遂

歲靈仙

赤芍藥

葶藶

各二兩

沒藥

各一兩

牽牛

大戟

炒三兩

陳皮

去白四兩

為末麵糊丸如梧桐子大每服五十丸加至七八十九溫水下食前得便衣止如服藥前後忌酒二日藥後亦忌濕麵兩三日食溫淡粥補胃尤佳經驗良方有澤瀉青皮無等藥

## 瘟疫

七

附大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣証治

丹溪心法

瘟疫眾人一般病者是又謂之天行時疫治有三法宜補宜散宜降 熱甚者加童便三法中 入方宜

大黃

中

黃連

上

黃芩

上

人參

瘟疫

心法附錄卷之二

二十三

桔梗

中

防風

中

蒼朮

中

香附

中

人中黃

下

右為末神麴糊丸每服六七十丸分氣血與痰作湯使氣虛者四君子湯 血虛者四物湯 痰多者二陳湯

送下 熱甚者童便下

又方溫病亦治食積痰熱降陰火

人中黃

飯為丸葉豆大下十五丸

又時病

半夏

中

川芎

上

茯苓

上

陳皮

中

山查中	白木上	蒼朮上	甘草下
如頭痛加酒苓	口渴加乾葛	身痛加羌活	薄桂防
風芍藥			
○大頭天行病此為濕氣在顛高之上切勿用降藥東垣有方			
羌活中	酒黃芩上	酒蒸大黃中	
○冬溫為病非其時而有其氣也冬時嚴寒當君子閉藏而反發泄於外專用補藥而帶表藥如補中益氣之類作人中黃法			
以竹筒兩頭留一節作一竅納甘草於中仍以竹木釘			
瘧疾	心法附錄卷之二	二十四	
開竅於大糞缸中浸一月取出晒乾大治疫毒			
左手脉大於右手浮緩而盛按之無力			
大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生陰長故也不可用附子止可多服人參			
附諸方			
十神湯	治時令不正瘟疫妄行		
升麻葛根湯	治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱		
柴胡升麻湯	治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽		
乾咳嗽涕唾稠粘			
清熱解肌湯	治傷寒瘟疫天行頭痛壯熱	俱見溫熱	

黃連橘皮湯	瘟疫發斑
黃連	四兩去土
陳橘皮	杏仁去皮尖
枳實	
麻黃	去節湯葛根各二兩厚朴姜汁炙
甘草	
每服五錢水一鍾煎溫服	
小柴胡湯	治瘟疫內虛發熱胃脇痞悶
渴加瓜蒌仁	
竹葉石膏湯	傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胃煩悶得汗已解內無津液虛羸少氣欲吐
俱見溫熱類	
化癰湯	治斑毒
見濕熱	
黃連解毒湯	治時疫三日已汗解或因飲酒復劇若煩
瘧疾	心法附錄卷之二
二十四	
悶乾嘔口燥呻吟錯語不睡	見濕熱
漏蘆湯	治臟腑積熱發為腫毒時疫疔瘡頭面洪腫咽
噤填塞水藥不下一切危惡疫癘	
漏蘆上	升麻下
大黃中	黃芩中
藍葉中	玄參下
右咬咀每服二錢水煎服	腫熱甚加芒硝二錢
消毒丸	治時毒疔瘡惡証
大黃上	牡蠣中
僵蚕中炒	
右為末煉蜜丸如彈子大新水化一丸	內加桔梗大
力子湯尤妙	

潔古雄黃丸 辟時疾可與病人同床傳著衣服亦不相染

雄黃一兩研 赤小豆炒 丹參 鬼箭羽各二兩

右為細末蜜丸每服五丸空心溫水下

治大頭病兼治喉痺歌

人間治疫有仙方 一兩殭蚕二大黃

姜汁為丸如彈子 井花調蜜便清涼

四君子湯

四物湯 俱見補損類

二陳湯 見痰類

瘟疫 心法附餘卷之二 王六

補中益氣湯 見內傷類

○嶺南諸病 新增 出明醫雜著

附諸方

春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣發寒熱腦膈飽悶不思飲食此毒氣從鼻口入內也治當清上焦解內毒行氣降

痰不宜發汗

黃連一錢 黃芩一錢 升麻一錢 生甘草七分

木香一錢 蒼朮一錢 厚朴一錢 柴胡一錢

枳實一錢 半夏一錢 桔梗一錢 木通一錢

右生姜五片水一鍾半煎七分食前熱服渣煎四分繼服

寒溫不節汗身脫衣巾感冒風寒之氣氣閉發熱頭疼此

傷寒類也但嶺南氣溫易出汗故多類瘧重則寒熱不

退輕則為瘧南方氣升故嶺南人得此病者多皆胃滿

痰涎壅塞飲食不進與北方傷寒只傷表而裏自和者

不同治當解表清熱降氣行痰此方用於寒涼時月及

雖在溫暖時而感冒風寒者

羌活一錢 蒼朮一錢 柴胡一錢 黃芩一錢

橘紅一錢 半夏一錢 枳實一錢 甘草一錢

川芎一錢 心法附餘卷之二 二十七

右生姜五片水一鍾半煎七分食前溫服渣煎四分隨

再服取汗出止服

瘧瘧時瘧寒熱往來

柴胡一錢 知母一錢 蒼朮一錢 黃芩一錢

乾葛一錢 陳皮一錢 半夏一錢 川芎一錢

甘草七分

右生姜二大片烏梅肉二箇水一鍾半煎七分食前清

晨服渣煎四分午前服

瘧久者加人參一錢 當歸一錢 汗多者去蒼朮換



白朮加酒炒白芍藥各一錢半

後變成痢疾瘡後之痢從虛治用補脾胃藥

黃連一錢 木香一錢 縮砂一錢 黃芩一錢炒

橘皮一錢 白朮一錢半 白芍藥二錢 甘草五分炙

當歸一錢酒洗

右生薑三片水二鍾煎八分食前熱服

溫暑之月民病天行瘟疫熱病治宜清熱解毒無治內外

枯黃芩一錢 知母一錢酒炒 石膏一錢半 升麻一錢

黃連五分酒炒 生甘草七分 羌活三分 白芍藥一錢

生地黃五分 人參一錢半 乾葛一錢

右生薑三片水一鍾半煎七分食前熱服渣煎四分繼

服若胸膈痞悶痰涎壅塞者加枳實半夏各一錢生

薑汁四五匙若脾胃不實加白朮一錢半

時氣發熱變為黃病所謂瘟疫也宜治內瀉濕熱

茵陳一錢 黃連一錢 山梔仁一錢 白朮一錢

白茯苓一錢 厚朴一錢 木通一錢 木香七分

白芍藥一錢 乾葛一錢 人參一錢

用生薑三片水二鍾煎七分食前溫服渣煎四分繼服

○運氣證治 新增 出乾坤生意

附諸賢論

運氣証治者所以參天地陰陽之理明五行衰旺之機

氣候之寒溫察民病之凶吉惟加臨補瀉之法施寒熱溫

涼之劑古人云治時病不知運氣如涉海問津誠哉言也

今遵先賢圖訣撮其要領使人一覽而知其悉也矣

五運配十干之年

甲巳得合為土運 乙庚得合為金運 丁壬得合為

木運 丙辛得合為水運 戊癸得合為火運

六氣為司天之歲

子午少陰君火 丑未太陰濕土 寅申少陽相火

卯酉陽明燥金 辰戌太陽寒水 巳亥厥陰風木

瘟疫 心法附餘卷之二 三

南政北政

甲巳土運為南政蓋土居中央君尊南面而行餘四運

以臣事之面北而受令所以有別也

十二支年分運氣

子午年少陰君火司天歲氣熱化之候

司天者天之氣候也

君火者手少陰心經也心者君主之官神明出焉君

火乃主宰陽氣之本餘象生土乃發生萬物之源

陽明燥金在泉

在泉者地之氣候也

初之氣厥陰風木用事子上父下益辛瀉苦

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 寒風切冽霜雪水冰蟄虫伏藏

民病 關節禁固腰腿疼中外瘡瘍

二之氣少陰君火用事火盛金衰補肺瀉心

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 風雨時寒雨生羽蟲

民病 淋氣鬱於上而熱令人目赤

三之氣少陽相火用事君相二火瀉苦辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

瘟疫 心法附餘卷之二 三十一

天時 大行熱氣生羽蟲不鳴燕百舌杜宇之

類

民病 厥熱心痛寒更作咳嗽目赤

四之氣太陰濕土用事子母相順瀉肺補腎

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 大雨時行寒熱互作

民病 黃蘊劫血咽乾嘔吐痰飲

五之氣陽明燥金用事心盛肺衰火怕水復

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 溫氣乃至初冬亢暖萬物尚榮

民病 寒熱伏邪於春為瘡

六之氣太陽寒水用事火衰心病瀉鹹益苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 暴寒勁切火邪恣毒寒氣暴止

民病 生腫咳嗽甚則血溢下連小腹而作寒中

丑未年太陰濕土司天歲氣濕化之候

太陰濕土者足太陰脾經也脾屬中央戊己土每季

寄旺一十八日合為七十二日以應一歲六六三百

六十日之成數也

太陽寒水在泉

瘟疫 心法附餘卷之二 三十一

初之氣厥陰風木用事主旺客衰瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至閏二月驚蟄終止

天時 大風發榮雨生毛虫

民病 血溢經絡拘強關節不利身重筋痛

二之氣少陰君火用事以下生上瀉甘補鹹

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 太火至疫癘君令宜行濕蒸相搏暴雨時

降

民病 瘟疫盛行遠近咸若

三之氣少陽相火用事土旺壯水補腎瀉脾

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 雷雨電雹地氣騰濕氣降

民病 身重跗腫胸腹滿感冒濕氣

四之氣太陰濕土用事甘旺鹹衰補腎益膀胱

自六月大暑節起至八月白露止

天時 炎熱沸騰地氣升濕化不流

民病 腠理熱血暴溢寒瘧心腹脹浮腫

五之氣陽明燥金用事土能生金益肝瀉肺

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 大涼霧露降

瘧疾 心法附餘卷之二

民病 皮胃寒瘧痢甚行

六之氣太陽寒水用事以上尅下瀉脾補腎

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 大寒凝冽

民病 關節禁固腰腿拘痛

寅申年少陽相火司天歲氣火化之候

少陽相火者三焦浮沉之火火邪炎上上尅肺金金

受尅腎水失母則上盛下虛虛陽上攻變生諸疾致

傷元氣

厥陰風木在泉

初之厥陰風木用事子父相逢瀉苦益辛

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 熱風傷人時氣流行

民病 寒熱交作咳逆頭痛血氣不調心腹不快

二之氣少陰君火用事肺衰心盛制苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 暴風疾雨溫濕相蒸

民病 上熱咳逆胸膈不利頭痛寒熱

三之氣少陽相火用事夏旺火熾補肺益大腸

自四月小滿節起至六月小暑終止

瘧疾 心法附餘卷之二

天時 炎暑亢旱草萎河輸

民病 煩熱目赤喉閉失血熱渴風邪人多暴死

四之氣太陰濕土用事火能生土瀉甘補鹹

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 風雨時降炎暑未去

民病 癰痢交作寒熱頭疼

五之氣陽明燥金用事肺金受邪瀉苦補辛

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 炎熱風雨草木黃落

民病 寒邪風熱君子周密

六之氣太陽寒水用事心火受尅瀉鹹補苦

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 寒溫無時地氣正寒霜露乃降

民病 感冒寒邪關節不利心腹痛

卯酉年陽明燥金司天歲氣燥化之候

陽明燥金者肺與大腸之氣象庚辛金也

少陰君火在泉

初之氣厥陰風木用事金木相尅補酸瀉辛

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 陰始凝風始肅水乃冰寒雨多花開遲

瘟疫 心法附餘卷之二

民病 寒熱浮腫失血嘔吐小便赤淋

二之氣少陰君火用事火盛金衰瀉苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 臣居君位大熱早行

民病 疫癘流行人多卒暴

三之氣少陽相火用事主盛客衰瀉心補肺

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 燥熱交合風雨暴至

民病 寒熱頭疼心煩作渴

四之氣太陰濕土用事以下土上瀉辛益酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 早秋寒雨有傷苗稼

民病 卒暴寒熱風邪傷人心疼浮腫瘡瘍失血

五之氣陽明燥金用事金盛木衰瀉肺補肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 冬行春令草木生青風雨生虫

民病 寒熱作痢氣血不和

六之氣太陽寒水用事客來助主益苦瀉鹹

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 氣候反溫蟄虫出現反行春令

瘟疫 心法附餘卷之二

民病 疫癘溫毒寒熱伏邪

辰戌年太陽寒水司天歲氣寒化之候

太陽寒水者足膀胱經也與足少陰腎經合為表裏

屬北方壬癸水

太陰濕土在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉鹹助甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 氣早暖草早榮溫風至

民病 瘟疫寒熱頭疼嘔吐瘡瘍

二之氣少陰君火用事心火受邪瀉鹹補甘

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 春寒多雨寒濕無時

民病 氣鬱中病浮腫寒熱

三之氣少陽相火用事以上尅下瀉鹹助苦

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 暴熱乍涼疾風暴雨

民病 寒熱吐利心煩悶亂癰疽瘡瘍

四之氣太陰濕土用事木旺土衰瀉甘補酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 風濕交爭雨生羽蟲暴風疾雨

五之氣陽明燥金用事金生水旺制鹹益苦

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 濕熱而行客行主令

民病 氣虛客熱血熱妄行肺氣壅盛

六之氣太陽寒水用事水盛火衰瀉鹹助苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 凝寒雨雪地氣正濕令行

民病 病乃凄慘孕婦多災脾受濕肺旺肝衰

己亥年厥陰風木司天歲氣風化之候

厥陰風木者是厥陰肝經也肝屬東方甲乙木春旺

七十二日也

少陽相火在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 寒始肅客行主令殺氣方至

民病 寒居右脇氣滯脾胃虛壅

二之氣少陰君火用事火旺金衰瀉心補肺

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 寒不去霜雪冰殺氣施草木焦寒雨至

三之氣少陽相火用事肺經受邪瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 風熱大作雨生羽蟲

民病 淚出耳鳴掉眩

四之氣太陰濕土用事木土相刑瀉酸益甘

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 熱氣返用山澤浮雲暴雨溽濕

民病 心受邪黃疸面為浮腫

五之氣陽明燥金用事以金刑木瀉肺益肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 燥濕更勝陰乃布風雨乃行

民病 寒氣及體肺受風脾受濕發為瘡

六之氣太陽寒水用事主助客勝瀉酸補甘

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 畏火司令陽乃火化蟄虫出現流水不冰

地氣大發草乃生

民病 瘟疫心腎相制

○廣按運氣之說內經言之詳矣夫人在氣交之中與

天地相為流通苟不先立其年以明其氣臨病施治

瘟疫

心法附餘卷之三

三

之際烏乎以用補瀉之藥哉此運氣證治不可不知

也又嘗按而驗之多有不應何則陰陽之消長寒暑

之更易或失其常在智者通其活變豈可膠柱鼓瑟

按圖索驥也耶○又按時氣流行或有病者不病者

蓋邪之所轉其氣必虛故虛者感邪而實者邪難入

也又有一家傳洙者蓋家有病人則憂患而飲食少

飲食少則氣餒矣時與病人相近感其氣從鼻口入

也

丹溪心法附餘卷之二終

丹溪心法附餘卷之三

休寧東山古庵方廣約之類集

## 內傷門

### 內傷八

丹溪心法

○內傷東垣內外傷辨甚詳世之病此者為多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱於內而發者皆以補元氣為主者所挾而兼用藥如挾痰者則以補中益氣湯加半夏竹瀝

內傷

心法附餘卷之三

一

仍少入姜汁傳送 凡內傷發斑因胃氣虛甚是火遊行

於外亦痰熱所致火則補而降之痰熱則微汗以散之切

不可下恐生危證 內傷病退後燥渴不解者有餘熱在

肺家可用參苓甘草少許姜汁冷服或茶匙挑姜汁與之

虛者可用人參

○廣按外感內傷病之關鍵於此時焉何足云醫夫外

感張長沙已言之矣內傷李東垣已言之矣至於內

傷挾外感未有言之者也况外感風寒則身熱鼻塞

聲重左手脉洪盛乃有餘之症當發不當補內傷喜

怒饑飽勞役則身熱口苦聲微右手脉洪盛乃不足

之證當補不當發至於內傷挾外感之症又當補發  
兼施辨之不可不詳施之不可不當也予懷是論久  
矣及觀丹溪心法內傷條云東垣內外傷辨甚詳世  
之病此者為多有挾外邪者有挾熱鬱於內而發者  
有挾痰者皆以補元氣為主者所挾而兼用藥此得  
吾心之同然者也但先生之言引而未發今予補之  
如內傷挾外感者則於補中益氣湯內春加川芎防  
風柴胡荆芥紫蘇薄荷之類夏加葛根石膏甘草薄  
荷升麻柴胡之類秋加羌活防風蒼朮荆芥之類冬  
加麻黃桂枝乾姜附子之類兩手脈俱洪盛而身熱  
內傷

心法附餘卷之三

鼻塞口苦無見也如內傷挾熱鬱於內而發者則於

補中益氣湯內加火鬱湯之類其人平素心胸膈悶

手足心發熱小便赤脈沉數今脈洪數身熱是也如

內傷挾痰者則於補中益氣湯內加半夏竹瀝姜汁  
之類其人肥白平素喘滿吐痰脈沉滑今脈洪滑身  
熱是也噫噎外感內傷不同發表補中有異如水炭  
之相反天壤之懸隔學者苟無定見于中臨症投劑  
鮮不眩惑也矣

火鬱湯

見發熱類

附諸賢論

東垣曰甚哉陰陽之證不可不詳也偏觀內經中所說  
化百病其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役  
所傷而然夫元氣穀氣營氣清氣衛氣生發諸陽上升  
之氣此六者皆飲食入胃穀氣上行胃氣之異名其實  
一也既脾胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑陽氣  
皆絕於外故經言五藏之氣已絕於外者是六腑之元  
氣病也氣傷臟乃病臟病則形乃應是五臟六腑真氣  
皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故營衛失守諸病生  
焉其中變化皆由中氣不足乃生發耳後有脾胃已受  
勞役之疾飲食又復失節耽病日久事息心安飽食太  
內傷

心法附餘卷之三

甚病乃大作槩其外傷風寒六淫客邪皆有餘之病當

瀉不當補飲食失節中氣不足之病當補不當瀉舉世

醫者皆以飲食失節勞役所傷中氣不足當補之證認

作外感風寒有餘客邪之病重瀉其表使榮衛之氣外  
絕其死只在旬日之間所謂差之毫厘謬以千里可不  
詳辨乎夫外感有餘之症寒熱甚而齊作鼻塞聲重頭  
常痛手背熱內傷不足之症寒熱微而間作口渴聲輕  
頭間痛手心熱於此可以稽驗矣始受飲食勞倦所  
傷之病必氣高而喘身熱而煩及短氣上逆鼻息不調  
怠惰嗜卧四肢困倦不收無氣以動亦無氣以言皆為

熱傷元氣以甘溫之劑以補元氣即是瀉火之藥凡所受病捫摸之肌膚間必大熱必燥熱悶亂心煩不安或渴久病必不渴或表虛惡風寒慎不可以寒涼藥與之經言勞者溫之損者溫之惟以補中益氣湯溫藥以補元氣而瀉火邪內經云溫能除大熱正此謂也

王節齋曰東垣論飲食勞倦為內傷不足之證治用補中益氣湯迺河集中又論不足之中又當分別飲食傷為有餘勞倦傷為不足予謂傷飲食而留積不化以致宿食鬱熱發於外此為有餘之證法當消導東垣自有枳朮丸等方治法具於飲食門矣其補中益氣方論却

內傷

心法附餘卷之三

四

附錄

謂人因傷饑失飽致損脾胃非有積滯者也故只用補藥蓋脾胃全賴飲食之養今因饑飽不時失其所養則脾胃虛矣又脾主四肢若勞力辛苦傷其四肢則根本竭矣或專因飲食不調或專因勞力過度或飲食不調之後加之勞力或勞力過度之後繼以不調故皆謂之內傷元氣不足之證而宜用補藥也但須於此四者之間審察明白累為加減則無不効矣

附脉理

東垣曰古人以脉上辨內外傷於人迎氣口人迎脉大於氣口為外傷氣口脉大於人迎為內傷此辨固是但其

說有所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪來也其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲食及飲食不節勞役所傷皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脉浮緊按之洪大緊者急甚於弦是足太陽寒水之脉按之洪大而有力量中見手少陰心火之脉丁與壬合內顯洪大乃傷寒脉也若外感風邪則人迎脉緩而大或大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脉大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脉若飲食不節勞

內傷

心法附餘卷之三

五

附錄

附諸方



補中益氣湯 治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而煩脈洪大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

黃芪半錢 人參 甘草各一錢 白朮

當歸身 柴胡 升麻 陳皮各半錢

渴加葛根五分 嗽加麥門冬一錢

五味子十五粒

一方有白芍藥半錢秋冬不用 黃柏三分以滋腎水瀉伏

火紅花三分入心養血

右作一服水煎午前稍熱服

內傷 心法附餘卷之三 六

按立方本指云夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗上喘氣短損其元氣人參以補之心火乘脾炙甘草之甘溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之經云急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰膝間血胃中清氣在下升麻柴胡以引之引黃芪甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶脉之縮急二味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胸中為清濁相干用陳皮

以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛為用也脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧營氣不榮陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰恍惚者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之劑生陽氣陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃柏以救腎水能瀉陰中之伏火如煩不止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之則愈若病日久者以權立加減法 若頭痛加蔓荊子三分痛甚加川芎五分頂疼腦痛者加藁本五分細辛三分諸頭痛併用此藥四味頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰厥陰頭疼加半夏半錢或一錢生姜三片 若耳鳴目黃頰頰腫頸肩膊肘臂外後廉痛面赤脈洪者加羌活一錢防風七分甘草三分藁本五分通其經血加黃芩黃連各三分消其腫 噤痛頰腫脈洪大面赤加黃芩三分桔梗七分甘草三分 口乾噤乾或渴者加葛根五分升胃氣上行以潤之 心下痞痞悶者加芍藥黃連各一錢如痞腹脹加枳實三分厚朴七分木香砂仁各三分如天寒加乾姜 腹中痛者加白芍藥炒半錢炙甘草三分如惡寒覺冷痛加桂心半錢夏月腹中痛

不惡寒反惡熱者加黃芩五分芍藥一錢甘草五分以治時熱 臍下痛者加真熟地黃半錢 如胸中滯氣加四花青皮一分或二分壅滯可用氣促少氣者去之如身體重疼乃風濕相搏加羌活半錢防風半錢升麻一錢柴胡半錢藥本根半錢蒼朮一錢如病去勿再服 若大便秘澀加歸稍一錢 若久病痰嗽者去人參冬月加不去節麻黃秋涼亦加不去根節麻黃春月天溫加佛耳草三分欬花一分勿加麻黃 若初病之人雖痰嗽不去人參必不增添若久病肺中伏火者去人參以防痰嗽增益耳 長夏濕土客邪大旺加蒼朮白木澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消故食減不知穀味則加麴以消之加五味子麥門冬助人參瀉火益肺氣助秋損也在三伏中為聖藥 脇下急或痛俱加柴胡甘草人參 多唾或唾白沫胃口上停寒也加益智仁 若胃脘當心痛加草豆蔻仁三分疲甚之人參或白朮有用至一兩二兩者朱砂安神丸 治心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似懊懷狀

黃連 一錢 生地黃 當歸身 甘草 各錢  
朱砂 一錢 分 研為末

右為末蒸餅丸黍米大每服十丸或十五二十丸噍津下

升陽順氣湯 治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口無味遇夏雖熱猶寒饑常如飽不喜食冷

升麻 柴胡 各一錢 黃芪 一兩 半夏 三錢  
甘草 炙半錢 陳皮 一錢 人參 一錢 神麴 一錢 炒  
歸身 一錢 黃柏 半錢 草豆蔻仁 二錢

右咬咀每服三錢或半兩水煎入生姜三片

按論云脾胃不足之證須用升麻柴胡苦平味之薄者陰中之陽引脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽

內傷 心法附餘卷之三 九

之氣以滋春氣之和也又引黃芪人參甘草甘溫之氣味上行充實腠理使陽氣得衛外而為固也凡治脾胃之藥多以升陽補氣名之者也

參朮調中湯 瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃芪 四分 桑白皮 五分 人參 甘草 炙  
白茯苓 各二 五味子 二十 白朮 三分 地骨皮 各  
麥門冬 陳皮 各一分 青皮 一分

右咬咀作一服水煎大溫服早飯後忌多言語勞役

按論云內經曰火位之主其瀉以甘以黃芪甘溫瀉熱補氣桑白皮苦微寒瀉肺火定喘故以為君肺欲收急

食酸以收之以五味子之酸收耗散之氣止咳噎脾胃  
不足以甘補之白朮人參炙甘草苦甘溫補脾緩中為  
臣地骨皮苦微寒善解肌熱茯苓甘平降肺火麥門冬  
甘微寒保肺氣為佐青陳皮苦辛溫散胃中滯氣為使  
也

升陽益胃湯 治脾胃虛則怠惰嗜卧四肢不收時值秋

燥今行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便

不調小便頻數食不消無見肺病洒淅惡寒慄慄不樂

面色惡而不和乃陽氣不伸故也當以升陽益胃名之

柴胡 白朮 茯苓 澤瀉 各三錢

內傷 心法附餘卷之三 十一

羌活 獨活 防風 黃芪 各二兩

人參 半夏 甘草 各一兩 黃連 一錢

陳皮 四錢 白芍 五錢

何故秋旺用參朮為藥之類反補蓋脾胃虛則肺俱

受邪故因時而補易為力也

右每服三錢水煎入薑棗早飯後溫服或加至半兩服

藥後如小便罷而病加劇是不宜利小便當先去茯苓

澤瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚

少胃氣不得轉運升發也須薄味之食或美食助其藥

力益外浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損力而助

邪氣之降沉也可以少役形體使胃與藥得轉運升發  
慎勿大勞役使氣復之若脾胃得安靜為佳若胃氣稍  
強少食果以助穀藥之力經云五穀為養五果為助者  
也

○此類諸方俱是補益之劑

### 傷食九

丹溪心法

○傷食惡食者胃中有物宜導痰補脾用二陳湯加白朮

山查川芎蒼朮服之

傷食 心法附餘卷之三 十二

○漫抑傷脾不思飲食炒黃連酒芍藥香附同清六九末

用薑汁浸蒸餅丸服

入方

治氣抑痰倦不思飲食

白蒼二朮 半夏 陳皮 黃連

黃柏 各二兩 香附 白芍 各一兩 扁柏 七錢

右為末薑汁麴糊丸每服五十丸滾白水下姜湯下更効

治心腹膨脹 內多食積所致

南星 一兩 半夏 一兩 瓜蒌仁 研碎 香附 一兩 連翹 半兩

黃連 三兩 礞石 煅 羅蔔子 連翹 半兩

<p>麝香 <small>少許</small> 又方加陳皮半兩</p>		<p>右為末麴糊丸</p>		<p>一人因喫麵內傷吐熱頭痛</p>		<p>白朮 <small>半錢</small> 白芍 陳皮 蒼朮 <small>各一錢</small></p>		<p>茯苓 黃連 人參 甘草 <small>各半錢</small></p>		<p>右作一服薑二片煎服如口渴加乾葛二錢再調理</p>		<p>補脾丸</p>		<p>白朮 <small>半斤</small> 蒼朮 茯苓 陳皮 <small>各三兩</small></p>		<p>粥為丸如梧子大每服五十丸白滾水下</p>		<p>二陳湯 <small>見痰類</small></p>		<p>清六丸 <small>傷食 心法附餘卷之三 見泄瀉類</small></p>		<p>附脉理</p>		<p>脉訣舉要曰氣口緊盛為傷於食食不消化浮滑而疾</p>		<p>心法附錄曰傷食之証右手氣口必緊盛胃膈痞塞噎氣</p>		<p>如敗卵臭亦有頭痛發熱但身不痛為異耳</p>		<p>附諸方</p>		<p>蒼朮橘紅散 <small>楊氏家藏方</small> 溫脾養胃升降陰陽和三焦化</p>		<p>宿食</p>		<p>丁香 木香 <small>各一兩</small> 白芷 薤仁 人參</p>		<p>厚朴 神麴 乾薑 半夏 麴</p>	
-------------------------------------	--	---------------	--	--------------------	--	---------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------------------------	--	------------	--	---------------------------------------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------------------	--	------------	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------	--	------------	--	------------------------------------------------	--	-----------	--	------------------------------------------	--	----------------------	--

<p>橘紅 <small>去白</small> 甘草 <small>炙</small> 藿香葉 <small>去土</small> 白朮 <small>各半兩</small></p>		<p>右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去渣溫服</p>		<p>紅丸子 <small>和劑方</small> 壯脾胃消宿食并治冷瘧</p>		<p>京三稜 <small>水浸</small> 義朮 陳皮 <small>去白</small> 青皮 <small>去白</small></p>		<p>乾薑 <small>炮</small> 胡椒 <small>各二斤</small></p>		<p>右為末醋煮糊丸如梧子大以礬紅為衣每服一十丸食後薑湯下</p>		<p>丁香爛飯丸 <small>按按方</small> 治食傷又治卒心痛</p>		<p>丁香皮 甘草 <small>炙</small> 各二砂仁 三錢 益智仁 二錢</p>		<p>傷食 <small>心法附餘卷之三</small></p>		<p>香附子 <small>半兩</small> 甘松 三錢 丁香 京三稜 <small>炮</small></p>		<p>木香 廣木 <small>炮</small> 各一錢</p>		<p>右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每三十丸白湯下或細嚼亦可不拘時候</p>		<p>木香當歸散 實脾順氣消食</p>		<p>川芎 當歸 人參 官桂</p>		<p>三稜 <small>炮</small> 義朮 <small>炮</small> 青皮 <small>炒</small> 厚朴</p>		<p>麥蘖 乾薑 <small>炮</small> 小茴香 <small>炒</small> 木香</p>		<p>陳皮 甘草 神麴 枳殼 <small>各等分</small></p>		<p>右咬咀每服八錢水二盞生薑三片棗子一枚葱白三</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------	--	-----------------------------------	--	------------------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	-----------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--	------------------------------	--

煎至一盞溫服大便閉倍加枳殼加枳榔一兩炒去  
乾薑食前服

○已上辛溫消導宿食之劑

麴藥枳木丸 治為人所勉強食之故心腹滿悶不快

白朮二兩 枳實 神麴炒 麥藥麴炒各一兩

右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服五十九溫水下

消食化氣香殼散 醒脾去積順氣化痰

青皮炒 陳皮炒各四兩 蘿蔔子炒 木香

三稜炒 蓬朮炒 神麴炒 麥藥炒各一兩

枳殼炒二兩 半夏二兩半 枳實炒一兩 香附子炒二兩半

傷食 心法附餘卷之三 十四

枳榔 山查 草果各一兩

陳倉米 一升用巴豆二十粒炒黃色去巴豆不用

右為末醋糊丸如桐子大每服四五十丸漸加至七八

十丸食後米湯或白湯下

一方 治食過飽滿悶

青橘皮二兩湯浸去 葛根一兩 縮砂半兩

右為細末濃煎茶調一二錢服乾酥喫亦可常服消食

化氣醒酒

寬中丸 丹溪秘方 治脾胃痞悶停滯飲食

山查 不以多少蒸熟晒乾

右為末作丸服

大安丸 丹溪秘方 脾經消導之藥

山查二兩 神麴炒 半夏 茯苓各一兩

陳皮 蘿蔔子 連翹各半兩 白朮二兩

右為細末粥糊丸服滾白水或米湯送下

○已上辛平消導宿食之劑

除濕益氣丸 治傷濕麴心腹滿悶肢體沉重

枳實炒 白朮 黃芩各一兩 蘿蔔子炒熟去

神麴炒一兩 紅花三錢

右為細末荷葉燒飯丸如菉豆大每五六十丸白湯

傷食 心法附餘卷之三 十五

下或薑湯下

二黃丸 治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩 黃連酒浸一升麻 柴胡各三錢

甘草二錢 枳實半兩炒

右為極細末湯浸蒸餅丸如菉豆大每五七十丸白湯

下或薑湯下

白朮丸 治傷風粉濕麴油膩之物

白朮 半夏湯洗 神麴炒 枳實炒各一兩

橘皮七錢 黃芩半兩 白礬一錢

右為細末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每五十九丸白

湯下量所傷加減服

Q 已上辛涼消導宿食之劑

木香見睨丸 治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜 半錢 荆三錢 神麴炒一 木香 二錢

香附 半兩 炒 石三稜 半兩 升麻 三錢 柴胡 二錢

草豆蔻 麴暴煨 半兩

右為末湯浸餅丸如菉豆大一倍每二十丸白湯下量所傷服之

三稜消積丸 治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

丁皮 益智 各三 陳皮 青皮 各五

傷食 心法附餘卷之三 其

茴香 兩半 炒麴 廣木 炮 京三稜 炮 各

巴豆 和米炒去 米五錢

右為細末醋糊丸如梧桐子大每十九至二十丸溫薑

湯下食前看虛實加減如更不止後服

如意丸 濟生方 治氣虛積冷停食不消心下堅痞噫宿腐

氣及霍亂吐瀉水穀不消一切食積之疾並皆治之

半夏 湯洗七 三稜 枳殼 去穢 枳榔

陳皮 乾薑 黃連 蓬朮 各二兩

巴豆 用三十七粒連殼

右除巴豆外餘藥坐如豆大用好酒煮乾用巴豆同藥

焙為末薄糊丸如菉豆大每服十九加至二十九用茶

清薑湯任下食後溫服孕婦不宜服之

阿魏丸 濟生方 治脾胃怯弱過食肉麴生果之物停滯中

焦不能消化以致腹脹刺痛嘔惡不食或利或秘並皆

治之 百草霜 三錢 巴豆 去皮心膜 阿魏 酒浸 官桂 不見火

蓬朮 炒 麥藥 炒 神麴 炒 青皮 去白

蘿蔔子 炒 白朮 乾薑 炮 各半

右為末和勻用薄糊丸如菉豆大每服二十丸不拘時

麵傷用麵湯下生果傷用麝香湯下

傷食 心法附餘卷之三 其

混元鄧山房神効感應丸 常服消食除積滯不動藏府

丁香 木香 檀香 陳皮

角沉香 不見火 青皮 黃連 砂仁

香附 去毛 三稜 煨 半夏 湯炮七 莪朮 十分大者

已上藥各一兩淨研為細末外用肥烏梅有肉者一百

枚去核巴豆三百粒肥白者去皮膜心右用磁器一隻

盛巴豆以烏梅肉蓋之却用陳米醋浸與烏梅肉平於

甑上蒸以巴豆紅色為度却搗二件令極爛次用糯米

粽和前件諸藥搜勻搗千百下以黑為度眾手丸如羅

蔔子大每服十九丸飲食不消陳皮湯下氣滯茴香湯下

酒後嘔吐痰涎生薑湯下

秘方化滯丸 理一切氣化一切積奪造化有通塞之功  
調陰陽有補瀉之妙久堅沉痾磨之自消暴積乍留導  
之立去

南木香 堅實者 丁香 去節不 青皮 四花者

紅橘皮 水濕去 黃連 大者各 京三稜 慢火煨

義木 慢火煨 各半 夏 燥白淨半 研末搗生薑自

前八味 晒乾和研為細末

巴豆 去殼浸湯炮過一指慢火熬至醋乾秤六錢重細將

醋浸過一指慢火熬至醋乾秤六錢重細將

傷食 心法附餘卷之三 大 烏梅 用肉厚者打碎去核細剉火焙乾為細末秤五

右通和勻了用白麵八錢重水調得所慢火調糊為丸

如粟米大每服五七丸人盛者十九五更空心用橘皮

湯下 常服磨滯不欲通泄津液嚙下 停食飽悶枳

殼湯下 但有所積物取本汁冷下 因食吐不止津

液嚙下即止 食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下

赤痢冷甘草湯下 白痢冷乾薑湯下 心痛石薑湯

湯下 赤白痢冷甘草乾薑湯下 諸氣痛生薑橘皮

湯下 小腸氣痛茴香酒下 婦人血氣當歸湯下

若欲宣積滾薑湯下 仍加丸數未利再服利多飲冷

水一口補住 小兒量歲數加減丸服疳積常服米飲

下不拘時服 孕婦勿服此藥得熱則行得冷則止

海藏神應丸 治因一切冷物冷水及潼乳酪水腹痛腸

鳴水穀不化

巴豆 杏仁 乾薑 白草霜 各半

丁香 木香 各二錢 黃蠟 一兩

右先將黃蠟用好醋煮去粗將巴豆杏仁同炒黑烟盡

研如泥將蠟再上火入麻油半兩溶開入在杏仁等泥

子內同攪旋下丁香等藥末研勻搓作挺子油紙裹了

旋丸每用三五十九溫米飲下食前服

傷食 心法附餘卷之三 九

○巴上辛溫推逐宿食之劑

大柴胡湯 治內傷飲食鬱結在裏身熱煩燥日晡發熱

如癰脉實而滑數者用此微利 方見胃寒類

黃枳木丸 治傷肉食濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂

不安 黃芩 二兩 黃連 大黃 煨 神麴 炒

白木 橘皮 各一兩 枳實 炒半兩

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每五十丸白湯下

量所傷服之

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不得施化而作痞悶不安

茯苓	澤瀉	右為細末如上法丸服至七十九	大枳殼丸	不消兩脇刺痛嘔逆惡心並皆治之	蓬莪朮	黑牽牛	陳皮	半夏	一方有乾生薑五錢	傷食	右為末姜汁糊丸如梧桐子大每服三四十丸姜湯下	常服美食	木香枳榔丸	結滯不利者並亦服之	木香	枳殼	香附	右為末滴水丸如豌豆大每服三五十丸食後生薑湯送下加至以利為度	木香和中丸
黃芩	二錢	枳實	御藥院方	厚朴	炒	炒	去白	湯炮七次		心法附錄卷之三			治一切滯氣心腹痛滿脇肋脹悶大小便		枳榔	枳殼	入黃		
白朮	兩	神麴	治一切酒食傷胸膈悶悶疼痛飲食	去粗皮	熟	去	各一	微炒		干				並亦服之	青皮	煨切	炒各三		
黃連		各伍錢		人參	枳殼	茯苓	枳榔	神麴							去白	黃連	黑牽牛		
各三錢				去芦	炒	去皮		炒黃							陳皮	各一兩	生取頭末		
															去白	黃柏	各三兩		
																去粗皮			
																一兩			

飲食									
木香	黃芩	青礞石	枳殼						
枳榔	青皮	橘紅	各半	滑石	二兩				
沉香	二錢	大黃	一兩	黑牽牛	頭末二兩				
右為末水丸如梧桐子大每服五十丸姜湯或茶清下									
○已上辛涼推逐宿食之劑									
○廣按已上方中用巴豆大黃者蓋取其推逐積滯積									
滯去而正氣自復矣如用石灰於田中殺狼莠狼莠									
死而禾苗自茂也夫巴豆性大熱號為斬關奪門之									
將若傷生冷硬物不能消化用之推逐可也若施之									
傷食	心法附錄卷之三	三							
於傷濕熱之物則是以火濟火而反助病邪矣大黃									
性大寒號為將軍若傷濕熱之物不能轉運用之推									
逐可也若施之於傷生冷之物則是以寒治寒而扞									
格不入矣又常論之人有虛實病有新久若夫少壯									
新病者固當用藥推逐急去為美若夫衰老久病者									
又當用藥消導漸去為佳東垣所謂輕則損其穀重									
則逐其滯是也雖然病之新久要分而用藥寒溫不									
可不察丹溪所謂明知身受寒氣口喫寒物而得病									
者於初得之時當與溫散溫利之藥若曰病得之稍									
久則成鬱久鬱即蒸熱熱久心生火若欲行溫散溫									



利之藥寧無助火添病耶惟當用辛涼以發表辛寒以理中則邪易伏病易退正易復而病安矣

葛花解醒湯 按方治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻 砂仁 葛花 各半兩 木香 半錢

青皮 三錢 陳皮 白茯苓 猪苓

人參 各一錢 白朮 神麴 炒 澤瀉

乾生薑 各二錢

右為細末和勻每三錢白湯調下但得微汗酒病去矣論云此蓋不得已用之豈可恃賴日日飲酒耶是方氣

傷食 心法附餘卷之三 主

味辛溫偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也

若頻服之損人天年也

○廣按藥乃氣之偏可用於暫而不可用於久有病則病當之無病則正氣當之所以不可久也

除濕散 治傷馬乳并牛駱水一切冷病

車前子 炒 澤瀉 各半兩 神麴 炒 一兩 半夏 湯炮 七錢

乾生薑 各三錢 紅花 甘草 各二錢 茯苓 七錢

右為細末每三錢白湯調食前服

五苓散 見中藥類

○廣按酒作濕熱治之之法或發汗或利小便使上下

分消其濕是也已上三方並滲利之劑也

益脾丸 治飲酒不醉又益脾胃

葛花 二兩 小豆蔻 一兩 萊豆蔻 五錢 木香 二錢半

一方加草豆蔻 去皮

右件為末蜜丸如梧子大葛花湯下十九或夜飲津液

下五丸最妙

葛花散 御藥院方 治飲酒令人不醉

葛花 小豆蔻 各一兩

右件為末每服三錢水仍進葛汁及枇杷葉飲倍能飲

酒 又九月九日甘菊花末飲酒時先服方寸匕 又

傷食 心法附餘卷之三 主

小豆蔻葉陰乾百日為末服之能消酒

烏梅丸 消酒食

神麴 炒 烏梅 麥蘖 龍腦葉

右以甘草膏子為丸

礪砂丸 消酒清膈

礪砂 三錢 片腦 五分 射香 半錢 薄荷葉 一錢

右以甘草膏子為丸礪砂為衣每服一丸噙化

不醉方

萊豆 赤豆 葛根 等分

右為末當米飲酒之前用冷水調一匙或二匙服之令

人不醉

又方雞胚乾葛等分為末麵糊丸如梧桐子大每服五十九酒送下

神妙列仙散 治飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強跛手足頑麻胃脘疼痛胸膈滿悶肚腹膨脹嘔吐瀉利及酒食停久成一應積聚黃疸熱鼓並皆治之

木香 沉香各一錢 茴香微炒 枳榔各一錢 篇蓄三錢 大黃一兩微炒 麥蘖一兩 瞿麥五錢

右為末每服三錢或五錢五更熱酒調下能飲者多飲二三盃不妨仰面卧手叉胸前至天明取下大便如魚腦小便如血為効忌生冷硬物及葷腥止啖米粥

○已上消導宿酒之劑

備急大黃丸 療心腹諸痛卒暴百病

大黃 乾薑 巴豆去皮各一兩

右精擇藥品為末蜜和更搗一千杵丸如小豆大每服三丸大小量之若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤尸厥卒死者以執水或酒服之或口噤用木棰撐起牙關令下咽須臾差未差更與三丸以腹中鳴轉即吐下便愈若口噤須折齒灌之令入為妙忌蘆筍猪肉冷水肥膩之物易水張先生又名獨行丸乃急

劑也

瓜蒂散 治上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死謂也下部無脉此所謂木鬱也飲食過飽填塞胸中者大陰之分內經云氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱即達之吐者是也

瓜蒂 赤小豆

右二味為極細末每服一錢七溫漿水調下取吐為度若不兩手尺脉絕無者不宜用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如是食不得去者方用調胃

此藥去之○已上二方刮奪壅滯之劑

# 調補脾胃

十 新增

附論

廣按內經曰胃者五藏六府之海也水穀皆入於胃五藏六府皆稟氣於胃胃者五藏之本六府之大源也又曰胃為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以為常也以此論之若夫飲食有節寒溫適宜則脾胃壯實而能

納受水穀運化精微充溢五藏六府榮衛四肢百骸以供給日用動作云為若夫飲食失節寒溫不適則脾胃虛弱不能納受水穀運化氣液則五藏六府失其所稟受四肢百骸失其所榮衛而日用動作云為失其所供給也況土為五行之本萬物藉土而生古人以扶持脾胃為王道之藥厥有旨哉今於調補脾胃條下謹述內經之旨及予解見欲人知節飲食適寒溫為養脾胃之本倘脾胃虛弱又當以後開諸方擇而用之苟得脾胃壯實則外邪不能侵內邪不能起固本澄源之事也

附諸方

調中益氣湯 夫脉弦洪緩而沉按之中指下得一溢其證四肢滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味大小便清利而數或上飲下便或大便滯滯不行一二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣咽膈不通安卧嗜睡無力不思飲食

升麻 二分 黃芪 一錢 甘草 半錢 蒼朮 四分  
木香 一分 人參 五分 柴胡 二分 橘皮 二分  
右咬咀作一處水煎食前熱服

如特顯熱躁是下元蒸蒸發也加生地黃黃柏如大便虛坐不得或大便秘了而不了腹常逼迫血虛無溢也加歸身

白朮和胃丸 治久病不能食而臟腑或結或滯此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕和脾胃進飲食

厚朴 製 半夏 各一兩 白朮 一兩二錢 陳皮 八錢

枳實 各二錢 木香 錢 人參 七錢

甘草 炙 三錢

右為末生薑汁浸蒸餅丸如梧桐子大每三十九丸溫水食遠服

調胃 心法附餘卷之三 有脾虛而惡湯藥者製此丸用湯吞省

補脾丸 心法秘方 口苦而易於從也

白朮 半斤 蒼朮 茯苓 陳皮 各三兩

芍藥 半兩

右為末粥糊丸加潤下丸可作催主用上熟甚者加清

金丸尤妙與此藥必無產患

潤下丸 見痰類

青金丸 見咳嗽

白朮丸 心法秘方 同前

白朮 一兩 白芍藥 半兩

冬月不用芍藥加肉豆蔻泄者炒丸服

右為末粥丸

一方枯礬半夏各一錢半治脾泄

養脾丸 和劑方 治脾胃虛冷心腹脹悶嘔逆惡心泄瀉

大麥蘖 炒 白茯苓 去皮 人參 去芦 白朮 半斤

乾姜 炮 縮砂 去皮 甘草 炙 一斤

右為末煉蜜為丸每兩作八丸每服一丸細嚼姜湯下

思食調中丸 御藥院方 治脾胃久弱三焦不調氣滯胸膈

痞悶不食嘔逆惡心或吐痰水

神麴 炒 麥蘖 炒 陳皮 去白 半夏 麴炒

調胃 心法附餘卷之三 烏藥 各一兩 枳榔 人參各七錢 白朮 一兩半

木香 沉香 各半兩

右為末蜜調白麴打糊丸如梧桐子大每服三十丸米

飲吞下

治中湯 和劑方 治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉

人參 去芦 甘草 炙 乾姜 炮 白朮

青皮 去白 陳皮 去白 各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去渣空心溫服嘔吐

不已加半夏等分丁香減半名丁香溫中湯

補脾湯 三因方 治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不

消

人參 去芦 茯苓 去皮 草果 去皮 乾姜 炮 各一

麥蘖 炒 甘草 炙 各一兩 厚朴 去皮 陳皮 去白

白朮 各一錢

右咬咀每服四錢水一盞煎七分去渣空心溫服

溫脾散 本事方 開胃進食利氣散寒濕溫中

青皮 去白 陳皮 去白 縮砂仁 舶上茴香 炒

良姜 桔梗 白芷 厚朴 各一兩

木香 麥蘖 香附 白朮 各半兩

甘草 兩半 紅豆 乾薑 各三錢

調胃 心法附餘卷之三 右咬咀每服三錢水一盞煎七分去渣空心服

生胃丹 生胃消痰沫開胸膈進飲食

粟米 四兩 溫水浸透炊作飯焙乾乘熱用生薑自然

天南星 二兩 薑汁浸一宿次日用生薑自然汁和紙

取出南星用

人參 白朮 茯苓 各二兩 陳皮

白豆蔻 縮砂 麥蘖 炒 半夏 麴

青皮 萆薢 石蓮肉 各一兩 南木香 三錢

右為末米粉糊丸如菜豆大每服五十丸姜湯送下

○廣按脾胃氣虛則不能運化水穀水穀停積則為濕

痰曰補氣曰消食曰燥濕痰三者不可偏廢也此方  
中人參白朮以補氣麥蘖砂仁以消食南星半夏以  
燥濕痰其餘茯苓滲濕陳皮青皮利氣白豆蔻華澄  
茄開膈南木香調氣石蓮肉清心可謂周而且備矣  
肥白人氣虛有濕尤宜服之

道寧純陽丹 治真元虛損心腎不安精神耗散脾土濕  
敗不能化食所食五味之物不成精液乃成痰涎聚於  
中脘不能傳導以致大腸燥澀小便又多而赤或時嘔  
吐酸水久成翻胃結腸之證

蒼朮 堅實者米泔水浸三日再換淨水  
浸洗切曬乾以清鹽水浸一宿

調胃 心法附餘卷之三

蓮肉 好者去心皮淨酒  
浸一宿各四兩

右大公猪肚一箇壁上捺洗浸納入前二味以綿縫密  
用無灰酒者爛取起入石臼中搗爛捏成小餅烘乾研  
為細末入後藥

南星 四兩淨切細以姜汁一小鍾浸  
一宿以竈心土同炒去土不用

大半夏 四兩湯洗去涎曬乾為末以好醋  
浸七日蒸熟不麻為度入藥中

橘紅 四兩對以竈心  
土炒去不用 穀芽炒 厚朴

白朮 麥芽炒 甘草 人參

茯苓 白豆蔻 二稜 莢朮

縮砂 華澄茄各一兩 木香 丁香

沉香 各半兩 粟米 四兩姜  
汁浸炒

右為細末稀麪糊為丸如梧桐子大每服六七十丸空  
心米飲下

八味理中丸 百一選方 治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶  
或嘔吐痰水或腸鳴泄瀉

縮砂仁 川姜 麥蘖 各二兩 白茯苓

神麪 炒 人參 各一兩 白朮 四兩 甘草 各一兩

右為末煉蜜丸每兩分作十丸空心用一丸姜湯嚼下  
或加半夏麪一兩為末入鹽點服亦可

大藿香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛泄瀉

調胃 心法附餘卷之三

不已最宜服之 方見泄瀉類

養胃湯 三因方 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄  
瀉或有外感寒熱如瘧骨節煩疼並皆治之

藿香 去梗 厚朴 姜炒 半夏 湯洗 茯苓 各一兩

草果 附子 炮 甘草 炙 陳皮 去白

人參 各一錢 白朮 半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚烏梅半個  
煎溫服

煎溫服

天下受拜平胃散 治脾胃不和嘔吐痰水胸膈痞  
滯不美飲食竝治

厚朴 去皮 陳皮 湯洗存 生薑 甘草 炙各二兩

茅山蒼朮 米泔水浸一宿去 皮晒乾五兩 到南京小棗二百枚

右用水五升煮乾搗作餅子晒乾再研為末每服二錢鹽湯點服泄瀉姜五片烏梅二個水盞半煎服

平胃散 御藥院方 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿

刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿

黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎入痞膈氣反胃宜服

厚朴 製 橘皮 各五兩 蒼朮 兩 甘草

茯苓 各二兩 人參 二兩

調胃 心法附餘卷之三 三

右咬咀水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去渣溫服

不拘時一方棗肉丸小豆大服五十丸姜湯下空心常

服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之

氣

加減平胃散 按粹方 治脾胃不和進飲食常服暖胃消

痰

蒼朮 米泔浸 厚朴 姜制炒 陳皮 各五兩 甘草 炒 三兩

右為末每服五錢姜三片棗一枚煎服 入鹽一捻沸

湯點服亦可 若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散

一法加藿香半夏 若加乾姜為厚朴湯 若瘟疫時

氣二毒傷寒頭痛壯熱加連根葱白五寸豆豉三十粒

煎二三沸微出汗愈 若五勞七傷手脚心熱煩燥不

安百節酸疼加柴胡 若痰嗽瘧疾加姜製半夏 若

本臟氣痛加茴香 若水氣腫滿加桑白皮 若婦人

赤白帶下加黃芩 若酒傷加丁香 若飲冷傷食加

高良姜 若滑脫泄瀉加肉豆蔻 若風痠四肢沉困

加荊芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛癢拘急加

地骨皮 若腿膝溫痺加兔絲子 若白痢加吳茱萸

若赤痢加黃連 若頭風加藁本 若轉筋霍亂加橘

木皮 若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重膝腿酸

調胃 心法附餘卷之三 三

疼及婦人宮臟久冷月脉不調者加桂 若胃寒嘔吐

多加生薑一法加茯苓丁香各三兩共成六味 若氣

不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各三兩生薑煎服

若五苓散相伴為對金飲子 若與六一散相合為

黃白散 若與錢氏異功散相合為調胃散 若欲進

飲食加神麴麥蘖吳茱萸蜀椒乾姜桂為吳茱萸湯

若加藁本桔梗為和鮮散治傷寒吐痢 若加藿香半

夏為不換金正氣散 若瘧疾寒熱加柴胡 若小腸

氣加苦練茴香 五苓散六一散 方見 異功散 方見本

調胃散 御藥院方 療陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷山

嵐瘴氣八般瘡疾四時傷寒頭目肢節疼痛腹脹滿嘔吐惡心痰嗽手足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水瀉諸痢脾胃不和飲食減少並皆治之

藿香 甘草 陳皮 去白

厚朴 去皮每兩用 半夏 麴 每兩用生薑 二兩半製

右五味各二兩同為細末每服四錢水一盞生薑三片煎至半盞食前溫服

異功散 拔粹方 治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食

人參 茯苓 白朮 甘草

橘皮 各等分

調胃 心法附餘卷之三 五 知朝事七

右咬咀每服五錢生薑三片棗一枚水一盞煎八分溫服

六君子湯 聖惠方 治脾臟不和不進飲食上燥下寒脈熱

藥不得者

人參 白朮 各一兩 橘紅 半夏 湯炮七

枳殼 炒 甘草 各半

右咬咀每服一兩生薑七片棗一枚水二盞煎至一盞

去渣溫服

枳朮丸 拔粹方 治痞消食強胃 見痞類

橘皮枳朮丸 衛生寶鑑 治老幼元氣虛弱飲食不消或臍

腑不調心下痞悶 見痞類

半夏枳朮丸 拔粹方 治因飲食內傷

白朮 枳實 麴 炒 半夏 湯泡十次各等分

右為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下

木香乾姜枳朮丸 蘭室秘藏 破除寒滯氣消寒飲食

木香 三錢 乾姜 半兩炮 枳實 一兩炒 白朮 一兩半

右件為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服三十丸溫水送下食前服

木香人參生薑枳朮丸 拔粹方 開胃進食

調胃 心法附餘卷之三 五 知朝事七

木香 三錢 人參 三錢半 乾生薑 一錢 枳實 一兩炒 白朮 一兩半 橘皮 四錢

右件為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服三五十

丸溫水送下食前服

藿香安胃散 衛生寶鑑 治脾胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熟

藿香 丁香 人參 各二錢 橘紅 半兩

右咬咀水二盞生薑三片煎至一盞溫服不拘時

和中丸 拔粹方 治病久虛弱厭厭不能食而臍腹或秘或

澹此胃氣虛也常服則和中理氣消痰去濕厚腸進飲

食

厚朴製一兩	白朮一兩二錢	半夏制一兩	陳皮去白八錢
枳榔四錢半	木香二錢半	甘草炙二錢	枳實炒三錢
右為末姜汁浸餅為丸如梧桐子大每服三五十丸溫水下			
枳縮二陳湯	理脾胃順氣寬膈消痰飲		
砂仁	枳實	茯苓	半夏
陳皮	甘草炙等分		
右判每服六錢水一盞半生薑五片煎八分溫服			
寬中進食丸	滋形氣美飲食		
神麴炒四錢	甘草炙一錢	木香五分	草豆蔻仁錢五
調胃	心法附餘卷之三	主	新三
枳實炒四錢	半夏七錢	人參一錢	乾生薑一錢
青皮一錢	陳皮	白朮	白茯苓
澤瀉各二錢	猪苓一錢	砂仁一錢半	大麥芽一兩
右為細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三四十九溫			
米飲下食遠服之			
參香散	三因方	治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心	
志去脾胃寒濕進飲食			
蓮肉去心	甘草炙七錢	人參	白朮
白茯苓	丁香	乾姜炮各半	山藥
烏藥	砂仁	沉香各二錢	橘紅

黃芪	南木香	檀香各二錢	
右每服四錢水一盞生薑三片棗一枚煎食前服一方			
加附子一枚			
○廣按脾惡濕而好燥古方中多用燥藥為脾濕故也			
然胃火亢甚口燥咽乾嘔噦不食又當以潤劑治之			
已上諸方治脾濕之劑已下諸方治胃火之劑也			
參苓白朮散	和劑方	治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃此藥最好	
白朮	人參	甘草	山藥
白茯苓去皮各二斤	白扁豆一斤半去皮姜汁炒		
調胃	心法附餘卷之三	主	新三
蓮子肉	薏苡仁	砂仁	桔梗炒一斤
右為末每服二錢棗湯調下			
七珍散	本事方	開胃養氣溫脾進食	
人參	白朮	黃芪	山芋
茯苓	粟米	甘草	
一斗加白扁豆一兩蒸用名八珍散			
右為末每服三錢水一盞姜棗煎服			
橘皮竹茹湯	治胃熱多渴嘔噦不食		
赤茯苓去皮	橘皮去白	枇杷葉去毛	麥門冬去心
青竹茹	半夏湯炮各一兩	甘草炙	人參各半兩



右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至七分不拘時服  
八珍湯 御藥院方 和血氣理脾胃

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黃

人參 白茯苓 甘草 砂仁 各等分

右咬咀每服三錢水一盞姜七片棗三枚煎至七分空  
心溫服

和中散 直指方 和胃氣止吐瀉

石蓮肉 茯苓 各二錢 藿香 人參

甘草 炙 白扁豆 天麻 木香

白朮 各半兩

調胃 心法附錄卷之三 三

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分去渣溫服

增損白朮散 御藥院方 生津止渴順氣下痰

白朮 葛根 茯苓 藿香葉

人參 木香 已上各 陳皮 二兩 乾生薑 一錢

右咬咀每服一兩用水二盞煎至一盞溫服不拘時

生薑和中湯 按粹方 治食不下口乾虛渴四肢困倦

柴胡 二分 升麻 三分 藁本 半錢 羌活 七分

蒼朮 一錢 黃芩 一錢 生酒黃芩 一分 葛根 半錢

甘草 一分 生甘草 炙 一分 橘皮 二分 白朮 五分

右咬咀作一服水二盞生薑五片棗二枚煎至一盞去

渣溫服

凝神散 病後收斂胃氣清涼肌表

人參 白朮 茯苓 山藥 各一兩

粳米 扁豆 炒 知母 生苳

甘草 炙 各五 淡竹葉 地骨皮 麥門冬 各二

右咬咀每服五錢水盞半姜二片棗一枚煎至一盞去  
渣溫服

加減枳朮丸 明醫雜著 論曰人之一身脾胃為主胃陽主

氣脾陰主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣

津液上升糟粕下降斯無病矣人惟飲食不節起居不

調胃 心法附錄卷之三 三

時損傷脾胃胃損則不能納脾損則不能化脾胃俱損

納化皆難元氣斯弱百邪易侵而飽悶痞積關格吐逆

腹痛泄痢等證作矣況人於飲食豈能一一節調一或

有傷脾胃便損飲食減常元氣漸憊矣故潔古製枳朮

之丸東垣發脾胃之論使人常以調理脾胃為主後人

稱為醫中王道厥有旨哉近世論治脾胃者不分陰陽

氣血而率皆理胃所用之藥又皆辛溫燥熱助火消陰

之劑遂致胃火益旺脾陰愈傷清純中和之氣變為燥

熱胃脘乾枯大腸燥結脾脈漸絕而死期迫矣殊不知

脾胃屬土屬濕位居長夏故濕熱之病十居七八況土

居四季寒熱溫涼各依其時豈可偏用辛熱之劑哉全  
舉枳木丸方立加減法於後

白木二兩  
去梗

枳實一兩  
麩炒

右為細末荷葉包飯燒取出杵爛和藥杵勻丸如菉豆  
大每服五六十丸清米湯下此法一補一消取飲食緩  
化不令有傷東垣加陳皮一兩名橘皮枳木丸治老幼  
元氣衰弱飲食少進又服令人多食而不傷

若元氣素弱飲食難化食多即腹中不和疼痛泄瀉此

虛寒也加人參白芍藥酒炒神麩炒大麥芽炒杵去皮  
各一兩

縮砂木香各五錢

調胃心法附餘卷之三 罕

若素有痰火胸膈鬱塞噎酸噎氣及素有吞酸吐酸之

證或有酒積瀉結痛此皆濕熱也加黃連姜汁白芍

藥酒炒陳皮各石膏生甘草各五錢縮砂木香各二兩

芎四錢

若傷食飽悶痞塞不消加神麩大麥芽山查子各一兩有

食積痞塊在腹者再加黃連厚朴瓜蒌製各五錢積堅者

再加蓬朮醋昆布各二錢

若傷冷食不消腹痛泄泄加半夏姜製一兩縮砂乾姜各神

麩大麥芽各五錢

若人性多氣惱夾氣傷食氣滯不通加川芎香附米各

兩木香黃連姜製各五錢

若胸膈不利人過服辛香燥熱之藥以致上焦受傷胃

脘乾燥嘔吐膈噎反胃加黃連姜炒山梔子炒各五錢白芍

藥當歸各一兩桔梗生甘草石膏各五錢胸膈頑痰膠結

及大便燥秘再加芒硝五錢

若素有痰者加半夏姜炒橘紅白茯苓各一兩黃芩炒黃連

姜炒各五錢

若人能食好食但食後反飽難化此胃火旺脾陰虛也

加白芍藥酒炒一兩人參七錢石膏火煨一兩生甘草五錢黃連

炒香附米炒木香各四錢

調胃心法附餘卷之三 罕

若年高脾虛血燥易飢易飽大便燥難加白芍藥當

歸各一兩人參七錢升麻甘草各四錢山查子大麥芽桃仁

去皮尖此老人常服藥也

加減保和丸 消痰利氣扶脾胃進飲食古庵方

山查

神麩炒半夏湯洗七次茯苓去皮各三兩

陳皮洗連翹 蘿蔔子各二兩白朮五兩

蒼朮米泔浸枳實去皮各一兩香附酒浸厚朴姜製各

黃芩去腐黃連各一兩

右為細末姜汁麩糊為丸如梧桐子大每服五十丸漸

加至七八十丸食後茶湯下

橘連枳木丸 古方 健脾消痞清熱 見痞類

○廣按脾胃虛弱不能運化水穀初時則為寒濕宜用  
辛香燥熱之劑以散之丹溪曰局方用燥藥為劫濕  
病也濕得燥則豁然而收正猶久雨山川溼濛地土  
厭浥不能生物必須杲日普照然後山川精明地土  
和爽方能生物也苟飲食停積日久濕能生熱熱化  
為火火能傷氣耗血則為熱燥宜用辛甘苦寒之劑  
以潤之正猶久旱山川蒸海地土乾焦不能成物必  
須甘霖遍及然後山川清涼地土滋潤方能成物也  
故調補脾胃之劑知新久之異燥潤之宜可也  
調胃 心法附餘卷之三 聖一  
○此類諸方一補一消之劑  
○廣按內傷用藥曰補益之劑調補脾胃用藥曰一補  
一消之劑傷食用藥曰消導之劑曰推逐之劑其實  
一源流也

丹溪心法附餘卷三終

丹溪心法附餘卷之四

休寧東山古庵方 廣約之類集

# 風門

## 破傷風 十一

丹溪心法

○破傷風多死 防風全蝎之類 非全蝎不開十個為  
末酒調日三次 破傷風血凝心鴉翎燒灰存性研細酒

調一錢

破傷 心法附餘卷之四

入方 破傷風發熱

瓜蒌子九錢 滑石一錢半 南星 蒼朮

赤芍 陳皮一錢 黃連 炒柏

黃芩 白芷半錢 甘草小

右姜一片煎服

附諸方

防風湯 振粹方 治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜急服

如藥

防風 羌活 獨活 川芎 各等分

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服不

拘時候服後宜調蜈蚣散大效

蜈蚣散 拔粹方

蜈蚣 一隻 江鱧 五錢 左盤龍 五錢 炒

右為末每服二錢用防風湯調下如前藥鮮不已覺轉入裏當服左龍丸服之漸漸看臟腑硬軟加巴豆霜

左龍丸 拔粹方 治直視在裏者

左盤龍 炒 蠶蚕 炒 江鱧 炒 各五錢 雄黃 一錢

右為末燒飯丸桐子大服十九酒下如裏証不已當於

左龍丸內一半末入巴豆霜半錢燒飯丸桐子大同左

龍丸一處每服加一丸漸加服至利為度若利後更服

破傷 心法附餘卷之四

後藥若搐症不已亦宜服後藥羌活湯

羌活湯 拔粹方

羌活 獨活 地榆 防風 各一兩

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服有

熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃

全氣養血為度

養血當歸地黃湯 拔粹方

當歸 地黃 芍藥 川芎

藁本 防風 白芷 各二兩 細辛 五錢

右為末每服一兩水一盞煎至一盞通口服食前

○已上五方治破傷風自表入裏之劑

羌活防風湯 拔粹方 治破傷風邪初傷在表

羌活 防風 川芎 藁本

當歸 芍藥 甘草 各四兩 地榆

細辛 各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

量緊慢加減用之熱加黃芩二兩大便秘加大黃一兩

緩緩令過

白朮防風湯 拔粹方 若服前藥過多有自汗者

白朮 黃耆 各一兩 防風 二兩

破傷 心法附餘卷之四

右咬咀每服五六錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘

時候破傷風臟腑秘小便赤用熱藥自汗不休故知無

寒也宜速下之先用芍黃湯三二服後用大芍黃湯下

之

芍黃湯 拔粹方

川芎 一兩 黃芩 六錢 甘草 一錢

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘

時候

大芍黃湯 拔粹方 下藥

川芎 半兩 羌活 黃芩 大黃 各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時  
羌活湯按粹方治半在表半在裏

羌活去芦 菊花去梗 麻黃去根節 白茯苓去皮

川芎 防風去芦 石膏研 前胡去芦

黃芩 蔓荊子 細辛去葉 枳殼各一兩

甘草炙一錢 薄荷 香白芷各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞去渣通

口服食後渣再煎服

白木湯按粹方治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白木 葛根 芍藥 升麻

破傷心法附餘卷之四 四

黃芩各五錢 甘草三錢半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

江鰮丸按粹方治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在裏

可用下藥 江鰮剉炒 野鴿糞炒 白姜各五錢 雄黃一兩

蜈蚣一對 天麻一兩

右為末作二分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣一分

巴豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃衣丸三十丸

加巴豆霜丸一丸第二服加二丸加至利為度再服硃

砂丸病愈止

○已上七方亦治破傷風邪表裏之劑  
玉真散瑞竹堂方治破傷風及金刃傷打撲傷損

天南星 防風等分

右為末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調一錢如

牙關緊急角弓反張用藥二錢童子小便調下或因毆

打內有損傷以藥一錢溫酒調下打傷欲死但心頭微

溫以童便灌下二錢併進二服天南星為防風所製服

之不麻衛生寶鑑名定風散治癩狗咬破先口噤漿水

洗淨用綿乾貼藥更不再發無膿大有効

如聖散聖惠方治破傷風止血定疼

破傷心法附餘卷之四 五

蒼朮六兩 川烏頭炮去皮 防風 草烏頭炮去皮

細辛各二兩 兩頭尖炮去皮 天麻 川芎

白芷各兩半 蝎稍微炒 雄黃各半兩

損骨加乳香半兩

右為細末每服一錢酒調下不拘時服

一方治破傷風手足顫掉不已者

人手足指甲炒絕爛 硃砂另研 天南星姜製

獨活各二錢

右為末分作三服酒調下不拘時候

保命丹 治破傷風

辰砂 射香 川烏 <small>去皮尖</small> 大半夏 <small>生</small>		藜蘆 <small>去土三</small> 雄黃 <small>半兩</small>		右為末棗肉丸如雞頭實大每一丸嚼細溫酒下若牙關急幹開灌下吐涎為効如吐不止生葱湯止之不吐更用半九大効		一字散 如前		金頭蜈蚣 <small>一條去頭足炙</small> 天麻 <small>半兩</small> 草烏頭 <small>去半兩</small>		全蝎 <small>十個</small> 香白芷 <small>少許</small>		右為末每服一字發熱茶清下發寒溫酒或半夏茯苓湯下 <small>見溫熱</small>		破傷風 心法附餘卷之四 六		天麻丸 治破傷風神効		天麻 川烏 <small>生去皮</small> 草烏 <small>生</small> 雄黃 <small>各一錢</small>		右為末酒糊丸桐子大每服十丸溫酒下無時		元戎方治破傷風欲死者		川烏 南星 半夏 <small>並生</small> 天麻 <small>去毒等</small>		右為細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次以酒三盞投之		奪命散 治破傷風角弓反張牙關緊急		天麻 白芷 川烏 <small>去皮各</small> 草烏		雄黃 <small>各一錢</small>	
--------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	--------------------------------------------------	--	--------	--	------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	---------------	--	------------	--	--------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--	------------	--	--------------------------------------------------	--	-------------------------	--	------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------	--

右為末酒糊丸梧子大每服十丸溫酒送下不拘時		蜈蚣散 治破傷風搐搦角弓反張		蜈蚣 <small>一條去毒炒</small> 全蝎 <small>一對炒</small>		右為細末如發時用一字或二字擦牙縫內或吹鼻中		烏稍散 治破傷風及洗頭風		烏稍蛇 <small>酒浸一宿</small> 麻黃 <small>一兩</small> 草烏		乾姜 附子 <small>炮</small> 川芎 白附子		天麻 各半兩 蝎稍 <small>二錢半</small>		右為末每服一錢熱酒調下日三服重者三五日見効		治破傷風方 極有神効		破傷風 心法附餘卷之四 七		初覺有風時急取熱糞堆內蟻螬虫一二個用手捏住待虫口中吐些小水就抹在破傷處身穿稍厚衣裳待片時瘡口覺麻兩脇微汗風出立効 如風緊急速取此虫三五個剪去尾將肚內黃水塗瘡口再滴些小水熱酒內飲之汗出立効		○已上諸方攻散風毒之劑		胃風 十二		丹溪心法		○此因初飲食訖乘風涼而致其証脹滿食飲不下形瘦	
----------------------	--	----------------	--	-----------------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	-------------------------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------	--	------------	--	---------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	--	-------	--	------	--	------------------------	--

腹大惡風頭汗隔塞不通胃風湯正始此然亦看挾證  
加減脉右關弦而緩帶浮

附諸方

胃風湯 按粹方 治虛風證能食麻木牙關急搐目內蠕動  
胃風面腫

白芷 一錢二分 升麻 二錢 葛根 一錢 蒼朮 一錢

甘草 半錢 柴胡 藁本 羌活

黃栢 草豆蔻 各三分 麻黃 半錢 蔓荊子 一分

當歸身 一錢

右咬咀水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去渣溫服

胃風

心法附餘卷之四

八

胃風湯 治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如

豆汁或瘀血

人參 茯苓 川芎 當歸

桂 白朮 白芍 等分

右剉水煎入粟米百餘粒同煎腹痛加木香

痛風 十三 附肢節痛 肩背痛

丹溪心法

四肢百節走痛是也他方謂之白虎歷節風証大率有痰  
風熱風濕 血虛 因於風者小續命湯 因於濕者蒼

朮白朮之類佐以竹瀝 因於痰者二陳湯加酒炒黃芩

羌活蒼朮 因於血虛者用芎歸之類佐以紅花桃仁

大法之方蒼朮川芎白芷南星當歸酒黃芩在上者加羌

活威靈仙桂枝 在下者加牛膝防已木通黃栢 血虛

格致餘論詳言多用川芎當歸佐以桃仁紅花薄桂威靈

仙 治痛風取薄桂味薄者獨此能橫行手臂領南星蒼

朮等藥至痛處

入方

治上中下疼痛

南星 美製 蒼朮 酒浸 黃栢 酒炒 各一兩

痛風 心法附餘卷之四 九

白芷 半兩 神麴 炒一兩 桃仁 半兩 威靈仙 酒洗

羌活 三錢 走 防已 半兩 下 桂枝 三錢 枳殼 紅花 酒洗

草龍膽 半錢 下行

右為末麴糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下

張子元血氣虛有痰白濁陰火痛風

人參 一兩 白朮 熟半 川黃栢 炒黑各

山藥 海石 南星 各一兩 敗龜板 酒炙

瑣陽 半兩 乾姜 煨灰半兩 取其不走

右為末粥丸一云酒糊丸

臂痛方

蒼朮 一錢半 半夏 半錢 南星 半錢 白朮 半錢	酒苓 炒 各一錢 香附 各一錢 陳皮 各一錢 茯苓 各半錢	威靈仙 三錢 甘草 少許 別本加羌活 一錢	右吹咀作一服入生姜二三片水煎服	二妙散 治筋骨疼痛因濕熱者有氣加氣藥血虛者加補血藥痛甚者加生姜汁熱服之	黃柏 炒 各一錢 蒼朮 炒 各一錢	右二味為末沸湯入姜汁調服二物皆有雄壯之氣表實氣實者加酒心許佐之 若痰熱者先以舟車丸或導水丸神芩丸下伐後以越痛散服之	越痛散 心法附餘卷之四	乳香 七分 沒藥 七分 桃仁 去皮尖 五分 紅花 五分	當歸 八分 地龍 酒炒 六分 牛膝 酒浸 五分 羌活 六分	甘草 四分 五靈脂 酒淘 六分 香附 童便浸 一錢	或加酒苓炒酒栢各七分	右為末酒調二錢服	八珍丸 治痛風走注脚疾	乳香 沒藥 代赭石 穿山甲 生用各二錢	羌活 草烏 生用各五錢 全蝎 二十一箇 川烏 生用一箇 不去皮尖	右為末醋糊丸如梧子大每服二十一丸溫酒送下
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------	------------	----------	-------------	---------------------	-------------------------------------------	----------------------

四妙散 痛風走注	威靈仙 酒浸 五錢 羊角灰 二錢 白芥子 一錢 蒼朮 一錢半	右為末每服一錢生薑一大片搗汁入湯調服 又二妙散同調服	又方 治酒濕痰痛風	黃柏 酒炒 各一錢 威靈仙 酒炒 各一錢 蒼朮 各一錢 羌活 各一錢	甘草 三錢 陳皮 一錢 芍藥 一錢	右為末每服一錢或二錢沸湯入姜汁調下	治氣實表實骨節痛方	滑石 六錢 甘草 一錢 香附 一錢 片苓 各三錢	痛風 心法附餘卷之四	右為末姜汁糊丸如梧子大每服五七十九丸白湯吞下	又方	糯米 一盞 黃礬 蠲根 一握 黑豆 半合	右用酒水各一椀煎徐徐服大吐大瀉一服便能行動	治食積肩腿痛	龜板 酒浸 炙 酒栢葉 香附 半兩 辣芥子 二錢	凌霄花 一錢半	右為末酒糊丸如梧子大煎四物湯加陳皮甘草湯下	附諸方	控涎丹 治一身及兩脇走痛痰挾死血者
----------	-----------------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------------	------------	------------------------	----	----------------------------	-----------------------	--------	-----------------------------	---------	-----------------------	-----	-------------------



甘遂面果煨 大戟制 真白芥菜子炒各等分

右為末加桃仁泥糊丸如梧子大每服五七丸漸加至  
十九臨卧姜湯下

龍虎丹 治走注疼痛或麻木不遂或半身痛

草烏 蒼朮 白芷各一兩 獨活各一兩 牛膝各五錢

乳香 沒藥各三錢 當歸 牛膝各五錢

右為末酒糊丸如彈子大每服一丸溫酒化下

乳香丸

白附子炮 南星 白芷 沒藥

赤小豆 荊芥 藿香去土 骨碎補去毛

乳香各一兩 五靈脂 川烏炮去皮 糯米炒各二兩

草烏炮去皮 京墨各五兩 松脂半兩 研

右為末酒糊丸梧子大每服十九至十五丸冷酒吞下

茶亦得不拘時忌熱物

一粒金丹 治一切風疾走注疼痛手足癱瘓麻木不仁

及白虎歷節等風

射香二錢半 好真墨燒烟盡 乳香

當歸酒洗 沒藥各七錢 白膠香另研 草烏去皮

地龍去 木鱉子去 五靈脂各一兩

右為細末與前藥和勻用糯米糊為丸如鷄頭實大每

服一丸溫酒化下遠年近日寒濕脚氣臨發時空心服

一丸脚面黑汗出為効初中風不醒人事牙關不開研

二丸酒調灌下立醒

天麻丹 治諸風癱瘓及白虎歷節風

烏頭八兩 蒼朮四兩 全蝎一兩 荊芥

防風 天麻各二兩

右為細末用豆腐和勻作餅入銅鈔以水滿煮藥至半

沉半浮存性為度取出待半乾為丸如梧桐子大以硃

砂為衣臨卧時先嚼木瓜一片以好酒吞下二三十九

服後覺昏沉吐涎痰一二時為効

痛風 治一切風疾等証

金棗丹 治一切風疾等証

川烏去皮 防風生用 兩頭尖 香白芷

獨活 荊芥 蔓荊子各四兩 白朮

羌活 細辛去土各 全蝎 威靈仙

天麻 僵蚕各二兩 木香 雄黃各一兩

蒼朮八兩 川芎五兩 乳香一兩 何首烏一兩

沒藥 草烏各一兩 藥本二兩五錢 當歸三兩

右為細末以糯米糊丸如棗樣大每服一錠

傷風流涕好酒調服 諸般頭風細茶調服薄荷湯亦

可 中風不語生姜湯調下 左癱右瘓好酒調下

白虎歷節風遍身走痛生姜湯或好酒調服 破傷風	昏倒在地牙關緊急用好酒調服仍將數患處 雷頭	風并乾癬麻痺溫酒調服 洗頭風溫酒調服 偏正	頭疼及夾腦風研為末吹鼻孔中吐涎再用生薑汁調	藥塗兩太陽穴仍用茶清調服 風狗咬傷斃水洗淨	敷之 蜈蚣傷口斃水洗過敷之 蛇傷人白礬少許	敷患處以津唾調搽亦可 蝎傷唾調搽 痔漏口漱	漿水洗過敷之 多年惡瘡口不合者口漱鹽水洗過	敷徐合 嗽喘桑白皮湯調服 紅絲魚眼褲脚腦疽	發背疔瘡裏外膿瘡用自已小便洗過并水調敷薄紙	痛風 心法附餘卷之四 齒 散	貼上再用裏外搽之 丹瘤并花水調藥毛翎掃三二	次 不發灸瘡口斃水洗過貼三二次知大方可止	乳香黑虎膏 治諸風寒濕骨節渾身疼痛 見中濕類	虎骨散 和刺方 治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛無常	處晝靜夜甚筋脉拘攣不得屈伸	蒼耳子 微炒 五加皮 一兩 骨碎補 二兩 虎脰骨 二兩	沒藥 三兩 當歸 去苗 三兩 天麻 一兩 自然銅 細研	防風 去苗 肉桂 去粗皮 各三兩 敗龜板 二兩 麒麟竭 細研	白芷 赤芍藥 白附子 各三兩 枳榔 一兩	羌活 去苗 一兩 牛膝 去苗 二兩
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時	赴痛丸 治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷	損	草烏頭 三兩 不 熟地黃 或用 南星	半夏麴 白礬 烏藥 各半兩	右為末酒糊丸如梧桐子大晒乾每服五七丸空心溫	酒下如跌撲傷損姜汁和酒研十數丸塗傷處如卒中	倒地姜汁茶清研五七丸灌下立醒	虎骨丸 治經絡凝滯骨節疼痛筋脉攣急遇陰	寒愈痛	痛風 心法附餘卷之四 十五	乳香 另研 沒藥 另研 赤芍藥 當歸	熟地黃 虎骨 一兩 血竭 二錢半	右為末用木瓜一枚切破去子入乳香一錢末在內麻	纏定毋令透氣好酒二升煮酒盡取木瓜去皮研入蜜	杵和丸如梧桐子大每服三五十丸酒下	麒麟竭散 治寒濕搏於經絡以致氣血凝泣疼痛不可	忍若 按粹方	血竭 乳香 沒藥 白芍藥	當歸 水蛭 炒令爛 射香 各二錢 虎脰骨 半兩	右為末每三錢溫酒調下食前
---------------------	----------------------	---	--------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------------	-----	---------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	------------------------	--------	--------------	-------------------------	--------------

透骨丹 治風濕腰腿筋骨疼痛

天麻散 秘方 治風濕疼痛黃腫

天麻 全蝎 各四兩 地黃 木瓜 各二兩

沒藥 乳香 川山甲 各一錢 川芎

烏頭 各二錢 牛膝 二錢 酒當歸 三錢

右為末每服三錢空心溫酒調服

○廣按風寒濕入於經絡以致氣血凝泣津液稽留又

則佛鬱堅牢阻礙榮衛難行正邪交戰故作痛也須

氣味辛烈暴悍之藥開鬱行氣破血豁痰則佛鬱開

榮衛行而病方已也又嘗論之成佛鬱乃有形之物

痛風 心法附錄卷之四 去

不過痰與血也已上方中有偏於豁痰者有偏於破

血者有均治痰血者在人對証施治不差可也

小續命湯 見中風類

二陳湯 見痰類

舟車丸 見中濕類

神芎導水丸 見濕熱類

○肢節痛

丹溪心法

肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之 如肥人肢節痛

多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏 如瘦

人肢節痛是血虛宜四物湯加防風羌活 如瘦人

急燥而肢節痛發熱是血熱宜四物湯加黃芩酒炒黃

柏 如肢節腫痛脈滑者當用燥濕宜蒼朮南星燕行

氣藥木香枳殼檳榔在下者加漢防已 若肢節腫痛

脈澀數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微

利之 如倦怠無力而肢節痛此是氣虛兼有痰飲流

注宜參朮星半

○肩背痛 丹溪無肢節痛條此文又純似丹溪語姑書以俟

附諸方 新增

痛風

通氣防風湯 心法附錄卷之四 去

不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔者此足太

陽經不通也

羌活 獨活 各一錢 桑本 防風

甘草 各半錢 川芎 荆子 各三分 水煎服

當歸拈痛方 按秘方 治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸

膈不利及遍身疼痛下症於足胫痛腫不可忍 見肺氣類

蒼朮復前散 按秘方 治寒濕相合腦痛惡寒煩悶脊骨脚

眼痛膝腫痛脈沉洪

蒼朮 四兩水二升煎至一碗去渣 羌活

升麻	一方無澤瀉	柴胡	藁本
白朮	各半錢	黃柏	三錢
紅花	少許		
右為末先煎蒼朮三分之一後下眾藥同煎切忌酒麪			
加減當歸飲子	聖惠方	治肩忽痛	
防風	當歸	柴胡	各一兩
生地黃	一兩	黃芩	一兩
甘草	一兩	滑石	六兩
大黃	一兩半		
右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣食後通口服			
人參益肺散	振華方	治肩背痛汗出小便數而少者風熱	
乘脾脾氣鬱脹也當瀉風熱則愈			
痛風	心法附餘卷之四	大	
柴胡	升麻	黃耆	各一錢
羌活			
防風	人參	甘草	陳皮
白豆蔻	各半錢		
藁本	三分	青皮	黃芩
白豆蔻	各二		
右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣通口服如面			
色白脫色氣短者不可服			
舒經湯	濟寧方	治臂痛不能舉有人常善左臂痛或以為	
飲或以為風為濕諸藥悉投繼以針艾俱不効得此方			
而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非飲非濕腰			
以下食前服腰以上食後服一名通氣飲子			
片子姜黃	四兩無則用	甘草炙	羌活
各一兩			

海桐皮	去外當歸	赤芍藥	白朮
右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片磨沉香少許			
煎至一盞去渣通口服			
治背痛			
姜黃	四兩	甘草炙	羌活
白朮	一兩		
右咬咀水二盞煎隨意至一盞去滓溫服食後			
痺	十四	新增	
附諸賢論			
袖珍方曰凡痺病目有五種皮痺脉痺肌痺骨痺筋痺是			
也多由體虛之人腠理空疎為風寒濕三氣侵入於皮			
脉肌筋骨不能隨時驅散留滯於內久而為痺其為病			
也寒多則掣痛風多則引注濕多則重著爾			
附脉理			
脉訣舉要曰風寒濕氣合而為痺浮瀋而緊三脉乃備			
附諸方			
防風湯	宣明方	風寒濕三氣合為痺風氣勝者行痺上下	
左右無留隨所至作防風湯主之			
治行痺行走無定			
防風	甘草	當歸	赤茯苓
去皮炒	桂	各二兩	黃芩
秦艽			

葛根 各二錢 麻黃 半兩 去

右為末每服五錢酒水各一盞棗三枚姜五片煎至一盞溫服

茯苓湯 宣明方 寒氣勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜

通氣溫經而愈茯苓湯加減主之 治痛痺四肢疼痛拘攣浮腫

赤茯苓 去皮 桑白皮 各一兩 防風 官桂

川芎 芍藥 麻黃 去節 各半

右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分溫服以薑粥投之汗泄為度効矣

五痺 心法附餘卷之四 三

茯苓川芎湯 宣明方 濕氣勝者為著痺濕地水氣甚重著而不去多汗而濡者茯苓川芎湯主之 治著痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫

赤茯苓 桑白皮 防風 官桂

川芎 麻黃 芍藥 當歸

甘草 各五分

右為末每服四錢半水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心溫服如欲出汗以粥投之

升麻湯 宣明方 陽氣多陰氣少陽熱共陰寒故痺藏府熱熿然而悶也升麻湯主之 治熱痺肌肉熱極體上如

鼠走唇口及縱皮色變兼諸風皆治

升麻 三兩 茯苓 去皮 人參 防風

犀角 鎔 羚羊角 鎔 羌活 各一兩 官桂 半兩

右為末每服四錢水二盞生薑一塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服

五痺湯 和劑方 治風寒濕之氣客留肌體手足緩弱麻頑不仁

片子姜黃 一兩 洗 羌活 白朮

防己 各二兩 甘草 微炙 半

右咬咀每服四錢水一盞半姜七片煎八分去粗病在五痺 心法附餘卷之四 三

上食後服病在下食前服

蠲痺湯 濟生方 治手足冷痺腰腿沉重及身體煩疼背項拘急

當歸 酒洗 赤芍藥 黃芪 去蘆 防風 去蘆

片子姜黃 羌活 各一兩 甘草 炙 半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分去粗溫服

防風湯 濟生方 治血痺皮膚不仁

川當歸 去蘆 赤茯苓 去皮 川獨活 各一兩 甘草 炙 半兩

防風 二兩 赤芍藥 黃芪 各一兩 杏仁 去皮 尖

秦朮去芦 桂心不見火

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗溫服不拘時

茯苓湯治停蓄支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯洗七次 赤茯苓去皮 陳皮各一兩 枳實去穢炒

桔梗去芦 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜七片煎七分溫服

羌活湯治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

定

羌活去芦 附子泡皮臍 秦朮去芦 桂心

五痺心法附餘卷之四

木香不見火 川芎 當歸去芦 牛膝州者去酒浸

甘草炙各半兩 桃仁去皮尖 骨碎補 防風去芦各

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分溫服

虎骨散治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨酥炙二兩 甘草炙 全蝎去毒各半兩 射香一分

天麻 防風去芦 川牛膝去芦酒浸 白姜去穢

川當歸酒浸乳香另研 桂心不見火 白花蛇酒浸取肉二兩

右為末每服三錢豆淋酒調服

○廣按已上二方治白虎歷節風骨節疼痛即宣明所謂痛痺也蓋風寒濕三氣客於經絡為病不一或為

痛或為痺或為麻痺不仁或為手足緩弱所以然者

有新久輕重之分有濕痰死血之異濟生防風湯

苓湯所治已露訛倪也學者宜細心求之丹溪不言

痺病蓋已該於痛風腎著痿厥條內矣但丹溪所言

病之見証古人所治病之原因即中庸費隱之義也

續斷丸本事方 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸炒 川續斷 草薢各一兩 川芎七錢半

乳香半兩 天麻 防風 附子各一兩

沒藥半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸溫酒米飲下

五痺心法附餘卷之四

下

○廣按用附子大黃之劑多有所嫌者殊不知寒濕充

滿經絡四肢浮腫非附子性浮而不沉而能散之乎

熱燥銷燬腸胃二便秘結非大黃性走而不守而能

潤之乎故善用藥者天下無棄物善用兵者天下無

棄人况大黃附子乃藥中之元首用其所當用何嫌

之有哉

增損續斷丸本事方 治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛

人參 防風 鹿角膠 白朮炮各七兩

麥門冬 乾地黄 黃芪 續斷

薏苡仁	山芋	牡丹皮	桂心
山茱萸	白茯苓	石斛	
右為末蜜丸如梧桐子大每服五十九溫酒空心下			
三痺湯 <small>危氏方</small>	治血氣滯滯手足拘攣風痺等疾皆療		
川續斷	杜仲 <small>去皮姜炒</small>	防風	桂心
人參	白茯苓	當歸	白芍藥
甘草 <small>各一兩</small>	秦艽	生地黃	川芎
川獨活 <small>各半</small>	黃芪	川牛膝	細辛 <small>各一兩</small>
右咬咀每服五錢水二盞生姜三片棗一枚煎一盞去滓熱服			
黃耆酒 <small>濟生方</small>	治風濕痺痛筋脉攣急或身體頑麻		
當歸	雲母粉	茵芋葉	白朮
虎骨	草薢	木香 <small>不見火</small>	仙靈皮
川續斷	甘草 <small>炙</small>	白芍藥	黃芪 <small>去蘆</small>
防風 <small>去蘆</small>	官桂 <small>不見火</small>	天麻	石斛 <small>去根各一兩</small>
右咬咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞溫服之常令酒氣相續為佳			
防風天麻散 <small>宣明方</small>	治風麻痺走注肢節疼痛 <small>見中風類</small>		
癰風	十五	附血風瘡	身上虛痒
應疹			

丹溪心法

○大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癰風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出所出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意者其疣瘡與瘡若上先見者上體多者在上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此癰風

心法附錄卷之四 三五

夫從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治病已全然脫體若不能絕味絕色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟一婦人得免以其負甚且寡無物可喫也餘四人三兩年後皆再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈

醉仙散

胡麻仁 牛旁子 蔓荊子 枸杞子各半兩同炒黑色

防風

瓜萋根

白蒺藜

苦參

各半兩

右為末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人每用一錢空

心日午臨卧各服茶湯調下喫後五七日間先於牙縫

內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭屎為度量太

小虛實加減與之證候重而急者須先以再造散下之

候補養得還復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般肉魚腥椒

料水果煨燒炙燂及茄子等物只宜淡粥煮熟時菜并

烏稍菜花蛇用淡酒煮熟食之以助藥力也

再造散

錦紋大黃

一兩半獨主

兩

皂角刺

一兩半獨主

經年黑大者

鬱金

半兩生

白牽牛

頭末六錢

半生半炒

一本無鬱金牽牛二味

臨卧冷酒調服

右為細末每服二錢一云五錢

以淨桶伺候泄出虫如虫黑色乃是多年赤色是為方

近三四日又進一服直候無虫則絕根矣後用通聖散

調理可用三稜針刺委中出血終身不得食牛馬驢騾

等肉大忌房事犯者必不救

黃精丸

蒼耳葉

紫背浮萍

大力子

各等分

黃精

倍前三味生搗汁

和四味研細焙乾

烏蛇肉

去皮骨

右為末神馳糊丸如梧子大每服五七十丸溫酒下

一方加炒栝生半甘草節

又方

蒼耳葉

浮萍

鼠粘子

烏蛇肉

等分

右用豆淋酒炒等分為末每服一二錢豆淋酒調下

治麻風脉大而虛者

苦參

七錢半

蒼耳

牛旁子

酒蒸栝

一作酒浸

各二兩

黃精

浮萍

各一兩

右為末用烏蛇肉酒煮如無蛇以烏龜魚亦可糊丸服

之候脉實再用通天再造散取虫

治麻風

四物湯

加羌活防風陳皮甘草

又方

又方

大黃

黃芩

雄黃

二兩

右為末用樟樹葉濃煎湯入藥蒸洗

附論

廣按大風證者所因不一或因色慾當風或因醉卧

濕地或乘熱脫衣或汗出入水或空心饑餓山行感

山嵐瘴氣或勞役奔走途中冒寒雨陰露皆由內傷

形體不知避忌外感風濕毒氣入於皮毛血脉肌肉

筋骨之間當時固覺失於驅散停積既久以致榮衛



不行內外薰蒸內則生虫外則生瘡而臟腑經絡皆受患矣古人謂大風疾三因五死三因者一曰風毒二曰濕毒三曰傳染五死者一曰皮死麻木不仁二曰脉死血潰成膿三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼昏唇翻聲噎甚可畏也所以然者蓋由邪正交攻氣血沸騰而濕痰死血充滿於經絡之中故生虫生瘡痛痒麻木也治療大法內通臟腑外發經絡而虫瘡痛痒麻木自出矣亦須首尾斷酒戒色忌食發風動氣葷腥鹽醬炙煨生冷之物清心寡慾方保無虞也今將所用

藥方

次序開具于後

三

附諸方

消風散 第一日服

香白芷 全蝎

人參 各一兩

右為細末每服二錢先一日午間宜喫粥忌生姜胡椒葱蒜一切熱性之物晚間不可飲食次日空心溫酒調下覺身漸潰燥為妙

追風散 第二日服

大黃 六兩 鬱金 兩 皂角刺 一兩

右為末初服六錢或七錢大楓油一錢半淨朴硝少許

入內好酒一碗調化五更空心溫服直待辰時又如前調藥一碗入熟蜜少許勿令患人知先以水與患人盥漱淨然後服藥必以蜜餅口忌人與患者同坐卧良久腹中疼為妙候瀉十數次以薄粥補之凡老弱者難治五十歲以下者可治精壯者十日三服謂初一日服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸損弱者十日內一服稍痊如壯健人十日內三服每月後二十日一服須要記其日數

磨風丸 第三日服日進二次

川當歸

羌活

獨活

川芎

天麻

細辛

防風

荊芥

威靈仙

麻黃

何首烏

石京子

牛蒡子

車前子

皺面草

蒼耳草

右皆不見火晒乾為細末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每服三十九食前溫酒下服後煎藥薰洗

洗藥

地骨皮 荊芥 苦參 細辛 各等分

右剉片每用二兩以水煎薰洗遍身血出為効如洗務要湯寬浸洗良久方佳

敷藥 第四日治瘡大爛遍身塗之

黑狗脊 <small>一兩如無以杜仲代之</small>	蛇床子 <small>一兩</small>	寒水石
硫黃	白礬 <small>各二兩</small>	朴硝
右為細末用臘猪油或香油調敷不爛不必敷		
一方		
蜜陀僧	白附子	蒼耳子
香白芷 <small>各等分</small>		細辛
右為細末用生姜汁調搽患處		
一方		
蛇床子根 <small>燒灰存性</small>	雄黃	硫黃
白礬	草烏 <small>各等分</small>	
癰風	心法附餘卷之四	三十
右為細末用香油或蜜水調敷患處		
○已上諸方治大風次第之劑		
加減大造苦參丸	治大風瘡及諸風赤白癰風	
苦參 <small>一斤</small>	防風	荊芥
胡麻子 <small>半生</small>	皂角刺 <small>各十兩</small>	蔓荊子
黃荊子	枸杞子	何首烏
蛇床子 <small>各三兩</small>	香白芷 <small>一兩</small>	禹餘糧
右為細末用皂角搗爛熬膏入前藥勻為丸丸如梧桐子大每服五十九茶酒任下		
一方		
治大風肌頑麻木皮膚癢痒遍身疥癩應疹面上		

遊風或如虫行紫白癰風或賊風攻注腿脚生瘡者	川烏	白芷	苦參	胡麻
荊芥	防風 <small>各三兩</small>	當歸	川芎	
獨活	羌活	白蒺藜	赤芍藥	
白附子	山梔子 <small>各一兩</small>	蔓荊子 <small>一兩</small>	何首烏	
大楓子 <small>去殼</small>	藏靈仙 <small>各二兩</small>	地龍		
右為細末先取烏蛇一條用好酒浸煮熟去骨取肉晒乾或焙同為末酒糊丸如梧桐子大每服四十九茶湯下				
一方				
癰風	心法附餘卷之四	三十		
藏靈仙	何首烏	地松 <small>即黧皮</small>	防風	
蔓荊子	荊芥	車前子	細辛	
牛旁子 <small>酒浸</small>	猪牙皂角	當歸	蒼耳草	
天麻	甘草	羌活	獨活	
麻黃	澤蘭	川芎	苦參 <small>各等分</small>	
右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十九茶酒任下				
一方				
用蒼耳草於五月五日或六月六日五更時帶露採搗絞取汁熬成膏作錠子取一斤半重鯉魚一箇剖開不去肚腸入藥一錠在內以線縫之用酒二碗慢火煮乾				

為度令患人喫盡魚不過三五個即愈忌鹽百日

一方

用白花蛇一條先蒸糯米二斗缸底先用酒麴次將蛇以絹袋盛之頓於麴上然後以糯米飯和勻頓於蛇上用紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每服溫酒一盞調蛇末少許服之仍以酒脚并糟做餅食之

一方

用蒼耳為末以大楓子油丸如梧桐子大每服三四十丸荊芥湯送下茶湯亦可

瘡風

心法附餘卷之四

主

瘡

一方 治大風眼昏不辯人物眉髮自落鼻梁崩塌肌膚生瘡如癬

用皂角刺一二斤蒸晒為末食後煎大黃湯調服一錢服一旬後眉髮再生肌膚光潤眼目復明

一方

治大風瘡令眉髮再生  
用栢葉九蒸九曝為末煉蜜為丸如梧桐子大日三服夜一服白湯下每服五六十九百日後生眉髮

一方

治大風後生眉毛  
皂角筴焙乾

鹿角

煨乾各等分

右為細末生薑汁調塗眉上一日二次則生

一方 治大風眉毛脫落肌膚拆裂

用防風通聖散加苦參天麻蟬蛻早晚各一服至百貼必愈忌房事鹽醬葷腥生冷油膩之物

一方 治大風後斷根

於脚大拇指肋骨縫間約半寸灸三壯以出毒氣

四物湯

見補損類

通聖散

見斑疹類

防風通聖散

見中風類

○血風瘡

新增

附諸方

瘡風

心法附餘卷之四

主

瘡

馬齒莧膏 治兩足血風瘡并兩肩背風濕瘡疥癬至骨  
馬齒莧 切碎焙乾五錢 黃丹 飛 黃柏

枯白礬

孩兒茶 各三錢 輕粉 一錢

右為細末和勻後入輕粉用生桐油調攤於厚桐油紙上用葱椒湯洗淨患處貼之

一方 治血風瘡

川椒

貝母

白芷

蛇床子

炒

黃丹 飛

枯白礬

黃連 各三錢

輕粉 五錢

右為細末生桐油調攤厚油紙上貼瘡處定七日方開忌胡椒生薑蔥蒜一切生毒物

當歸拈痛湯 治兩足血風瘡痛痒等証 見脚氣類

○癰瘡 新增

附諸方

胡麻散 和劑方 治脾肺風毒攻衝遍身皮膚癢痒或生瘡疥或生癰瘡用手搔時浸淫成瘡久而不差愈而復作面上遊風或如虫行紫白癰頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡宜服

胡麻 錢一兩二

荊芥穗 錢各一

苦參 錢各八

何首烏 炮一兩

甘草 錢一

威靈仙 錢各一

右為末每服二錢薄荷茶或酒或蜜湯調服服後頻

痛風

心法附餘卷之四

手

類浴自得汗出立効

蒼耳丸 治諸風及諸風癰疹白紫癰風

五月五日割取蒼耳草葉洗淨晒乾為末煉蜜丸如梧

桐子大每服十九日三服若身體有風處或如麻豆粒

此為風毒出也可以針刺黃汁出盡乃愈

靈草丹 治一切風疾及癰疹紫白癰風痛痒頑麻

採紫背浮萍草攤於竹篩內下著水晒乾為細末煉蜜

丸如彈子大每服一九用黑豆淋酒化下及治脚氣打

撲傷損渾身麻痺

一方

用乾浮萍四兩漢防已五錢濃煎熱湯洗白癰風一切癰疹疥癬神効

丹溪心法

○身上虛痒血不榮於腠理所以痒也

右用四物湯加黃芩煎調浮萍末服之 見補損類

又方

凌霄花一錢酒調下

附諸方

燥洗方 御藥院方 治一切風疾燥痒淋洗

威靈仙 去土

零陵香

茅香 各一斤

乾荷葉

藟本 去土

藿香葉

香白芷

甘松 各半斤

右咬咀每用四兩生絹袋盛用水三桶熬數沸故續

於無風房內沐浴避風勿令風吹光膩皮膚去癢痒

丹溪心法附餘卷之四 終

# 寒門

## 咳嗽

十六 附肺癰 肺癰

丹溪心法

○咳嗽有風寒 痰飲 大鬱 勞嗽 肺脹 春作是

春升之氣用清涼藥二陳加薄荊之類 夏是火氣炎上

最重用芩連 秋是濕熱傷肺 冬是風寒外來以樂發

咳嗽

心法附餘卷之五

散之後用半夏逐痰必不再來 風寒行痰開腠理用二

陳湯加麻黃桔梗杏仁 逐痰飲降痰隨証加藥

火主清金化痰降火 勞嗽四物湯加竹瀝姜汁補陰為

主 乾咳嗽難治此係火鬱之證乃痰鬱其火邪在中用

苦搜開之下用補陰降火之劑四物加炒柏竹瀝之類不

已則成勞此不得志者有之倒倉法好 肺虛嗽甚此好

色腎虛者有之用麥膏以陳皮生薑佐之大藥有痰加痰

藥 上半日多嗽者此屬胃中有火用貝母石膏降胃火

午後嗽多者屬陰虛必用四物湯加炒柏知母降火

黃昏嗽者是火氣浮於肺不宜用涼藥宜五味子五倍子

而降之 五更嗽多者此屬胃中有食積至此時火氣

入肺以知母地骨皮降肺火 肺脹而嗽或左或右不

得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎

肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝姜汁之類 嗽

而脇下痛宜疎肝氣以青皮枳實樂實者白芥子之類在

後以二陳湯加南星香附子青黛青皮姜汁 血碍氣作

嗽者桃仁去皮尖太黃酒炒姜汁丸服 治嗽多用生薑

以其辛散故也 痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰

以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分火 治嗽多

用藥般不必疑但要先去病根此乃收後藥也治痢亦同

咳嗽

心法附餘卷之五

二

四時氣

勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹

滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石

童便浸附瓜萸青黛杏仁半夏麴之類姜蜜調噙化必以

補陰為主 治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在

三椎骨下兩膀各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之 有嗽而肺脹壅遏不

得眠者難治 肺癰專主養肺氣養血清金 嗽而肺氣

有餘者宜瀉之桑白皮為主半夏茯苓佐之瀉其有餘補

其不足 肺燥者當潤之屬熱者桔梗大力知母鷄清

聲啞者屬寒宜細辛半夏 辛以散之肺虛者人參膏

膠為主陰不足者一服黃九為要藥或知母茯苓  
為妙 陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草小以降其氣  
其陰白芍藥須用酒浸晒乾 濕痰帶風喘嗽者不可一  
槩苦寒折之如千緡湯墮痰九更以皂角蘿蔔子杏仁百  
藥煎姜汁九噙化 濕痰帶風以千緡湯墮痰九固捷  
痰積嗽非青黛瓜萆不除有食積人面青白黃色不常面  
上有如蟹爪路一黃一白者是 以逆嗽非蛤粉青黛瓜  
萆貝母不除 口燥咽乾有痰者不用半夏南星用瓜萆  
貝母飲水者不用瓜萆恐泥膈不鬆快 知母止嗽清肺  
滋陰降火 杏仁瀉肺氣虛久嗽者一二服即止 治  
咳嗽 心法附錄卷之五 三 二五至七 天  
酒嗽青黛瓜萆蜜丸噙化肺 食積痰作嗽發熱者半夏  
南星為君瓜萆蘿蔔子為臣青黛石減為使  
戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面  
赤者是也勞者盜汗出無痰者多作寒熱肺脹者動則  
喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大  
槩耳亦當明其是否也

入方

杏仁 去皮尖

蘿蔔子 各半兩

右為末粥丸服

消化丸 治肺鬱痰喘睡不安寧

貝母一兩 杏仁五錢 青黛三錢  
右為末沙糖入姜汁泡蒸餅丸如彈子大噙化  
治久嗽風入肺

鴉管石一錢 雄黃一錢 鬱金一錢 款花三錢

右為末和艾中以生姜片安舌上灸之以烟入喉中

為度

治飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入薑汁就吞瓜萆香連  
丸

治欬嗽切藥

五味子 五錢 甘草 二錢半 五倍子 風化硝

右為末蜜丸噙化 心法附錄卷之五 四 二五至七 天

治欬嗽聲嘶者此血虛火多

青黛中 蛤粉上

右為末蜜調噙化

治嗽喘去濕痰

白木 半夏 蒼朮 香附 各一兩

貝母 杏仁 去皮尖 黃芩 各半兩

右為末姜汁打糊丸

治婦人形瘦有時夜熱痰嗽月經不調

青黛下 瓜萆仁中 香附 童便浸 曬乾上

右為末姜蜜調噙化豆大一丸

治一人風熱痰嗽

南星

海粉各一兩

半夏

兩製青黛

黃連

瓜蒌子

石碱

蘿蔔子各半兩

防風

皂角炭各三錢

右為末神麴糊丸服姜湯下

治勞嗽吐血

人參中

白朮上

茯苓上

百合上

紅花下

細辛下

五味子中

官桂下

阿膠上

黃芪中

半夏製中

杏仁去皮尖

甘草下

白芍中

天門冬上

右對水煎

若熱去桂芪用桑白皮麻黃不去節杏仁

不去皮同煎

又方 治嗽血

紅花中

杏仁去皮尖

枇杷葉去毛

紫苑茸上

鹿茸炙中

木通中

桑白皮上

又云加大黃

右為末煉蜜丸噙化一錢作一丸

嗽烟筒 治痰嗽久遠者

佛耳草

款花二錢

穗管石

雄黃半錢

右為末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽切藥

訶子中

百藥煎上

荊芥穗中

右為末姜蜜丸噙化一錢作一丸

又方 治心煩欬嗽等証

六一散加辰砂服溫水調下

青金丸

治食積火鬱嗽切藥

貝母

知母各半兩

巴豆去油膜

右為末姜泥丸辰砂為衣食後服每五丸白湯下一云

青黛為衣

青金丸一名與點丸與清化丸同用瀉肺火降膈上熱痰

片子黃芩炒

右為末糊丸或蒸餅丸梧桐子大服五十丸滾白水下

青化丸 與青金丸同用專治熱嗽及咽痛故苦能燥熱

濕輕能治上

燈籠草沙

右為末蒸餅丸

又細末醋調敷咽喉間痛處

又方 治痰嗽

礞石半兩煨

風化硝半錢

半夏二兩製

白朮一兩

茯苓

陳皮各七錢

黃芩半兩炒

右為末粥丸

又方	治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之	粟殼	四兩蜜炒去毛	烏梅	一兩	人參	半兩
欬花	半兩	桔梗	半兩	兜鈴	一兩	南星	姜製一兩
右為末蜜丸	彈子大含化						
蒼沙丸	調中散鬱						
管木	香附子	各四兩	黃芩	二兩			
右為末蒸餅丸	梧桐子大每服五十丸食後姜湯下						
人參清肺散	治痰嗽咽乾聲不出						
人參	陳皮	各一錢半	半夏	一錢	桔梗	各一錢	
麥門冬	五分	五味子	十箇	茯苓	一錢	甘草	五分
玄散	心法附餘卷之五	七					
桑白皮	知母	各一錢	地骨皮	五分	枳殼	一錢	
貝母	一錢半	杏仁	一錢	欬花	七分	黃連	一錢
右水煎生薑三片	如法煎服						
四物湯	見補損						
六味地黃丸	見補損						
知母茯苓湯	見肺痿						
千縉湯							
隆痰丸							
二陳湯	俱見痰類						
開肺理							

<p>肺訣舉要曰欬嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞滑精有          關滿者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當          欬嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑多          痰弦滑少血形盛脉細不足以息沉少伏匿皆是死脉          惟有浮大而嗽者生外證内脉參考稱停</p>									
<p>附諸方</p>									
<p>華蓋散 <small>和劑方</small> 治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩悶頭目昏          眩</p>									
<p>紫蘇子 <small>炒</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 陳皮 <small>去白</small> 桑白皮</p>									
<p>杏仁 <small>炒</small> 麻黃 <small>去根節</small> 甘草 <small>炙半兩</small></p>									
<p><small>心法附餘卷之五</small> 八</p>									
<p>右為末每服二錢水一盞煎七分食後溫服</p>									
<p>敗毒散 治傷寒發熱咳嗽頭疼</p>									
<p>麥蘇飲 治上膈有熱咳嗽聲重</p>									
<p>金沸草散 治感冒寒邪鼻塞聲重咳嗽不已 <small>並見傷風</small></p>									
<p>小青龍湯 <small>和劑方</small> 治感寒咳嗽喘急不得睡卧及治傷寒</p>									
<p>表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽喘急 <small>見溫熱</small></p>									
<p>五拗湯 <small>治風寒咳嗽肺氣喘急</small></p>									
<p>麻黃 <small>不去節</small> 杏仁 <small>不去皮</small> 甘草 <small>生用</small> 荆芥穗</p>									
<p>桔梗 <small>各一錢</small></p>									
<p>右以咀生薑三片同煎溫服咽痛甚者煎熟後加朴硝</p>									



少許 一方去桔梗荆芥用半夏枳實等分		加味理中湯 仁齋直指 治脾胃俱寒咳嗽不已		甘草 炙 半夏 湯泡 茯苓 去皮 乾姜 不炒	白木 橘紅 細辛 北五味	人參 各等	右咬咀每服三錢姜棗煎食前服	易簡杏子湯 蘇軾方 治咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰	飲停積悉治	人參 去芦 半夏 湯泡 茯苓 去皮 甘草 炙	芍藥 五味子 各二 細辛 乾姜	咳嗽 心法附餘卷之五 九	官桂 各五錢	右咬咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五片烏梅一個煎至七分去滓服 若新感冒加麻黃等分	橘蘇散 蘇生方 治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱	服杏子湯不得者	紫蘇葉 杏仁 去皮各 甘草 炙半兩 白木	橘紅 半夏 洗七次 桑白皮 炒 貝母 去心	五味子 各一	右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時	紫蘇飲子 按粹方 治脾肺虛寒痰涎咳嗽
-------------------	--	----------------------	--	------------------------	--------------	-------	---------------	--------------------------	-------	------------------------	-----------------	--------------	--------	---------------------------------------------	--------------------------	---------	----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	--------------------

紫蘇葉 桑白皮 青皮 去白 五味子		杏仁 麻黃 甘草 陳皮 各五錢	人參 半夏 湯泡各	右咬咀每服一兩生薑三片水二盞煎八分食後溫服	人參荆芥散 濟生方 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言	語不出咽乾項強鼻流清涕	陳皮 去白 荆芥穗 桔梗 半夏 湯泡七	細辛 洗去土 甘草 炙 人參 杏仁 去皮生	通草 麻黃 去根節	右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎八分食後溫服	咳嗽 心法附餘卷之五 十	人參潤肺湯 聖惠方 治肺氣不足喘咳嗽不已并傷寒壯	熱頭疼身痛	人參 乾葛 桔梗 白芷	麻黃 去節各 乾姜 五錢 白木 甘草 炙各一	右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片葱白二莖煎至	八分溫服	橘皮湯 聖惠方 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中有聲上	氣頭痛	陳皮 紫苑 麻黃 去根 杏仁 炒	當歸 官桂 甘草 炙 黃芩 各等分
-------------------	--	-----------------	-----------	-----------------------	--------------------------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	--------------	--------------------------	-------	-------------	------------------------	-----------------------	------	--------------------------	-----	------------------	-------------------

右吹咀每服一兩水二盞煎八分去滓溫服食後  
蠟煎散 御藥院方 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花 茶花 甘草 五味子 各半兩

桑白皮 桔梗 杏仁 紫蘇葉 各一兩

右吹咀每服四錢水二盞入黃蠟少許同煎臨卧服

柯子散 咳嗽聲音不出

柯子 三錢 甘草 二錢 桔梗 五錢 木通 三錢 各半生

右每服水一盞半煎至八分入生地黃汁一小盞攪勻

臨卧徐徐嚥

咳嗽 心法附餘卷之五 十一

四聖散 聖惠方 治咳嗽有失聲音

晉鹽 葛根 槐花子 山梔子 等分

右吹咀水二盞加烏梅甘草少許煎一盞入蜜少許食

後通口服

八味款冬花散 御藥院方 治肺經寒熱不調涎嗽不已

款冬花 洗焙 紫苑茸 五味子 甘草 各半兩

桑白皮 炒 麻黃 去節 杏仁 湯泡去 紫蘇葉 各一兩

右為粗末每服五錢水盞半入黃蠟皂角子大煎至一

盞熱服

○已上各方治感冒風寒新咳嗽之劑

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急  
方見喘類

杏參散 治胸膈脹滿上氣喘急咳嗽不得睡卧

杏仁 去皮炒 人參 桑白皮 蜜炙 各等分

杏仁 各等分

右吹咀每服四錢水一盞姜棗煎不拘時服

蘇沉九寶湯 簡易方 治老幼素有喘急遇寒膈不常發則

連綿不已咳嗽哮喘夜不得眠

桑白皮 甘草 大腹皮 官桂 麻黃 薄荷 陳皮 紫蘇 各等分

杏仁 各六分

右吹咀每服三錢水盞半姜三片烏梅半個煎六分服

平肺散 簡易方 治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口

燥

陳皮 一兩 半夏 洗七次 苦梗 炒 薄荷 各七錢

紫蘇 烏梅 去核 紫苑 知母 桑白皮 蜜炒 杏仁 炒 五味子 各錢 甘草 半兩

罌粟殼 蜜炒 七

右吹咀每服五錢水一盞姜三片煎六分食後溫服

鷹白散 治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽喘急

不

利		桔梗 <small>去芦炒</small>	地骨皮 <small>去木</small>	甘草 <small>炙</small>	瓜蒌子
升麻		半夏 <small>湯泡七次</small>	杏仁 <small>去皮尖</small>	桑白皮 <small>炙各等分</small>	
右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後溫服					
加減瀉白散 <small>按料方</small>		治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促			
桑白皮 <small>一兩</small>		地骨皮 <small>七錢</small>	甘草	陳皮 <small>去白</small>	
青皮		五味子	人參 <small>各五錢</small>	白茯苓 <small>三錢</small>	
右咬咀每服一兩水二盞加粳米煎至一盞食後溫服					
青龍散 <small>御藥院方</small>		治咳嗽上氣不得卧			
人參 <small>去芦</small>		陳皮 <small>去白</small>	五味子	紫蘇 <small>各一兩</small>	
右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至八分去滓食後溫服					
加減三奇湯 <small>按料方</small>		治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利			
桔梗 <small>五錢去芦</small>		半夏 <small>洗七錢</small>	陳皮 <small>去白</small>	甘草	
青皮 <small>半兩</small>		杏仁 <small>三錢</small>	五味子 <small>四錢</small>	人參	
桑白皮		蘇葉 <small>各五錢</small>			
右咬咀每服八錢姜三片水二盞煎至八分去滓通口					
解食後					
人參		肺散 <small>直指方</small>	治嗽喘急痰壅鼻塞		

麻黃	<small>去根節</small>	杏仁	<small>去皮尖</small>	桔梗	<small>半兩</small>	人參	<small>去黃二兩</small>
阿膠	<small>炒半兩</small>	甘草	<small>炙一兩</small>	橘紅	<small>二錢半</small>	貝母	<small>去心</small>
右咬咀每服八錢水二盞紫蘇二葉煎至八分去渣溫服食後							
杏仁煎丸 <small>瑞竹堂方</small> 治老人久患肺喘咳嗽不已睡卧不安服之立効							
杏仁	<small>去皮尖</small>	胡桃肉	<small>湯泡去皮衣</small>				
右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如彈子大							
每服一二丸食後臨卧細嚼姜湯送下							
紫蘇半夏湯 <small>按料方</small> 治喘嗽痰涎寒熱往來							
桑白皮	<small>二兩</small>	陳皮	<small>去白</small>	五味子	<small>各五錢</small>	紫苑茸	<small>玉錢</small>
杏仁	<small>去皮尖</small>	半夏	<small>湯泡七次</small>	紫蘇	<small>各五錢</small>		
右為粗末每服五錢生薑三片煎日進三服							
清金湯 <small>聖惠方</small> 治男婦遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸膈滿氣逆坐卧不安飲食不下							
粟殼	<small>蜜炒半兩</small>	甘草	<small>炙五錢</small>	陳皮	<small>去白</small>	茯苓	<small>去皮</small>
杏仁	<small>去皮尖</small>	阿膠	<small>炒</small>	五味子		桑白去	<small>炒</small>
薏苡仁		紫蘇		貝母	<small>去心</small>	半夏麴	
加百合		款冬花	<small>各一兩</small>	人參	<small>五錢</small>		
右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片烏梅一個煎至							

分食後服

潤肺膏 治咳嗽痰喘

紫苑

杏仁 去皮尖

款冬花 各一兩

麻黃

桔梗

細辛

柯子 各五錢

枯礬 一錢

生薑

二兩取清油半斤

蜜一斤

核桃肉 一兩

右先將油煉香熟次入蜜又煉去沫却下末藥攪勻每

服二三匙臨卧白湯調服

奪命丹 上氣喘急經歲咳嗽數月不愈者

信石 一錢

白礬 二錢

白附子 三錢

南星 四錢

半夏 五錢

咳

嗽 心法附餘卷之五

五

三

右先用信石與白礬一處於石器內火煨紅出火黃色

為度切不可犯鐵器却和半夏南星白附子為細末生

姜汁麴糊為丸如黍米大硃砂為衣每服七丸小兒三

丸井花水吞下忌食諸惡毒熱物

○廣按此方治咳嗽痰喘刮劑也蓋肺受火邪氣從火

化有升無降加以脾濕生痰則上壅而為喘嗽滿悶

不得安卧矣病作之時固宜用此藥以劫痰然病安

之後即當用知母茯苓湯或人參五味子散寧肺湯

以補虛可也

一方 治咳嗽痰喘

南星 炮

半夏 湯泡各一兩

甘草 三錢

陳皮 去白一兩

杏仁 五錢

款冬花 二錢

五味子 三錢

人參 一錢

每服水一鍾半生薑五片煎臨卧溫服忌生冷油膩

○廣按此方治咳嗽痰喘攻補兼施也

烟筒喘嗽方

款冬花

佛耳草

凝水石

人參

白芷

金精石

銀精石 等分

甘草 少用

右為末不以多少用香爐燒烟蘆筒吸入肺管用米飲

下

○已上數方治咳嗽喘急肺脹之劑

咳

嗽 心法附餘卷之五

十六

百十四

半夏 九

治肺臟鬱熱痰嗽胸膈塞滿

瓜蒌子

去殼

另研半夏 湯泡七次焙

取末各一兩

右二件和勻姜汁打麴糊丸梧桐子大每服五十丸食

後姜湯下

玉液丸

和清方

治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止

煩熱

寒水石

燒令赤出火毒

水飛過三十兩

半夏 洗焙為末

白礬 細研

右合研麴糊丸如梧子大每服三十丸食後淡姜湯下

玉芝丸

和清方

治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽喉不

利

人參 <small>去芦</small>	乾薄荷	白茯苓 <small>去皮</small>	白礬 <small>枯</small>
天南星 <small>米泔浸焙</small>	半夏 <small>湯洗七次姜汁和作餅六十兩</small>		
右為末生薑汁煮麴糊丸如梧桐子每服三十九丸食後			
姜湯下如痰盛燥熱薄荷湯下			
祛痰丸 <small>瑞竹堂方</small>	治風痰喘嗽		
人參 <small>去芦</small>	木香	天麻 <small>各一兩</small>	槐角子 <small>七錢</small>
陳皮 <small>去白</small>	茯苓 <small>去皮</small>	青皮 <small>去穢</small>	白朮 <small>煨各一兩</small>
半夏 <small>七錢半</small>	牙皂角 <small>去皮弦酥炙九錢</small>		
右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五			
七十丸食後臨卧溫酒送下姜湯亦可			
咳嗽 <small>心法附餘卷之五</small>	治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻		
利膈丸 <small>拔粹方</small>			
牽牛 <small>四兩</small>	半夏 <small>湯洗</small>	小香 <small>半兩</small>	青皮 <small>去白二兩</small>
槐角 <small>一兩</small>	皂角 <small>去皮弦酥炙二兩</small>	加枳榔	
大黃 <small>各五錢</small>			
右為細末生薑麴糊為丸如梧桐子大每服五十九生			
姜湯下			
星香丸	治諸氣嗽生痰		
南星	半夏 <small>各三兩</small>	用白礬 <small>一兩研同</small>	
陳皮 <small>五兩</small>	時去白取三兩	香附子 <small>三兩</small>	浸一兩時晒
右四味不見火為末生薑汁糊丸梧桐子大每服五十九			

臨卧姜湯下			
此方家傳秘方累驗			
星辛丸	治諸般咳嗽		
南星 <small>姜製</small>	半夏 <small>麵</small>	凝水石	枯礬
姜蚕 <small>炒</small>	乾生姜 <small>各一兩</small>		
右為末生薑汁糊丸如梧子每服五十九丸姜湯下食後			
瓜蒌 <small>半夏丸</small>	治咳嗽喘滿		
瓜蒌	杏仁 <small>去皮尖</small>	枯礬 <small>各一兩</small>	半夏 <small>湯洗二兩</small>
款冬花 <small>半兩</small>	麻黃 <small>去根節</small>		
右為末用瓜蒌汁生薑自然汁用水糊為丸如梧桐子			
大每服三十九丸食後臨卧淡茶湯下忌生冷鹹酸			
咳嗽 <small>心法附餘卷之五</small>			
王壺丸	治風痰吐逆咳嗽		
南星 <small>生用</small>	半夏 <small>生用</small>	天麻 <small>生用各一兩</small>	白麴 <small>三兩</small>
右為細末同白麴和均滴水丸如梧桐子大晒乾每服			
三十九丸以水一大鍾先煎令沸下之煮五七次候藥浮			
起即漉出晾乾用姜湯下			
透羅丹	治痰實咳嗽胸膈不利		
皂角 <small>酥炙</small>	黑牽牛 <small>炒</small>	半夏 <small>各一兩</small>	大黃 <small>濕紙包</small>
巴豆 <small>錢去</small>	杏仁 <small>去皮尖</small>		
右為細末生薑自然汁丸如梧桐子大每服三十九丸姜			

湯下咳嗽甚者三四服立効

一方 取痰

藜蘆

人參

用芦各二錢

牙皂角

去皮一錢

防風

去皮

細辛

去土各一錢半

右用酸漿水一碗食後溫服候吐痰覺胸中痰盡用冷

葱湯時呷飲止為度

人參散

直指方

治咳嗽痰壅通用

人參

去芦

桔梗

半夏麴

五味子

細辛

去葉

枳殼

製

赤茯苓

去皮

杏仁

各一分

甘草

炙半分

咳嗽

心法附餘卷之五

九

二百三十七

右父咀每服一兩生薑五片烏梅半個水二盞煎至八

分服食後一方無杏仁烏梅不用痰嗽加紫苑添甘草

人參飲

治痰嗽

半夏

湯泡七次

南星

寒水石

柴胡

去芦

款冬花

五味子

猪牙皂角

甘草

款冬花

熟加黃芩

各等分

右咬咀每服八錢生薑五片水一盞半煎至八分臨卧

通口服

人參飲子

百一選方

治痰嗽寒熱難盛

人參

去芦

桔梗

半夏

五味子

赤茯苓

白朮

枳殼

甘草

各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜五片煎十分空心服治寒

壅者加杏仁不去皮紫蘇各半兩

辰砂半夏丸

治一切痰飲咳嗽

用大半夏一斤湯泡七次晒乾為末用生絹袋盛貯於

磁盆內用淨水洗出去麤渣將洗出半夏末就於盆內

日晒夜露每日換新水七日七夜澄去水將半夏粉晒

乾每半夏粉一兩入飛過細硃砂末一錢用生薑汁糊

為丸如梧桐子大每七十九用淡生薑湯下食後服

黃芩半夏丸

治上焦有熱咳嗽生痰

咳嗽

心法附餘卷之五

千

二百三十七

黃芩末

一錢製過半夏粉一兩

右二味和勻用生薑汁為丸如梧桐子大每服七十九

用淡生薑湯送下食後服

天竺黃餅子

治一切痰嗽上焦有熱心神不寧其効甚

驗

牛膽南星

三錢薄荷葉二錢

天竺黃

二錢

硃砂

二錢

片腦

三分

茯苓

一錢

甘草

一錢

天花粉

一錢

右為末煉蜜入生地黄汁和藥作餅子每用一餅噙化

下食後服

白朮湯

治五臟受濕咳嗽痰多氣喘身體重著脉

宋高祖

白木二兩 五味子 半夏湯泡七次 白茯苓大

橘紅各二兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

○已上數方治痰飲咳嗽之劑

欬花散和劑方 治肺感寒邪咳嗽喘滿胸膈煩悶痰涎

雍盛喉中哮喘鼻塞涕咽喉腫痛

杏仁 阿膠炒 麻黃去根節 半夏湯洗

欬花各一兩 桑葉 知母 甘草炙

貝母各二兩

心法附餘卷之五

右咬咀每服二錢水一盞姜三片煎食前溫服

洗肺散 治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩二錢 半夏三錢 天門冬去心 麥門冬去心

五味子各一兩半 甘草半錢 杏仁去皮尖

右咬咀作一服水二鍾生薑五片煎至七分食後服渣

再煎服

百花膏濟生方 治喘咳嗽不已或痰中有血

欬花 百合蒸焙各等分

右為細末煉蜜為丸龍眼大每服一丸食後細嚼姜湯

下嚥化尤佳

貝母散御藥院方 治咳嗽多日不愈

貝母去心五錢 桑白皮五錢 五味子五錢 甘草半兩

知母五錢 欬花二兩 杏仁三兩去皮

右咬咀每服一兩水一盞半生薑三片煎至八分去滓

溫服食後

人參散聖惠方 治諸咳嗽喘急不出言語年久五服日近

三服効

人參 知母 貝母 半夏

杏仁 馬兜鈴去皮 麻黃不去節 天仙藤二兩

右咬咀每服八錢水二盞烏梅一個蜜一匙煎至八分

去滓溫服食後臨卧服忌酒醋雞麪鹹酸生冷

○廣按古方治火鬱乾咳嗽者甚少治風寒濕咳嗽者

甚多蓋由不分內外所因新久之異故也夫形寒飲

冷新咳嗽有痰固當以溫寒散濕為主如人參半夏

之類可也若夫氣動火炎久咳嗽無痰又當以清熱

潤燥為先然人參半夏之類又在所禁如天門冬門

知母貝母石膏瓜蒌之類可也世人徒知肺主皮毛

外感風寒為寒殊不知傳裏鬱火變為熱也况肺為

華蓋而五臟六腑火自內起薰蒸焚灼作咳嗽者亦

良多矣已上諸方頗合亦須加減可也

○已上數方治火鬱咳嗽之劑

鍾乳補肺湯和劑方 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦

枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳碎如米 桑白皮各三兩 肉桂去皮 白石英如米

五味子棟 欵冬花去梗 紫苑洗去土 人參去芦二兩

麥門冬三兩 去心

右除鍾乳白石英外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每服四錢水一盞半姜五片棗一枚粳米三十粒煎七分用綿濾去滓食後服

人參潤肺丸和劑方 治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸

咳嗽心法附餘卷之九

成虛勞及療風癰瘰癧頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參 欵冬花去梗 細辛去葉 甘草炙各四兩

官桂去皮 桔梗各五兩 杏仁去皮炒 知母六兩

右為末煉蜜丸如雞頭子大每服一九食後細嚼淡姜

湯下

人參養肺丸和劑方 治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳

嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血

並皆治之

人參 黃芪去芦蜜炙各一兩八錢 瓜蒌根

白茯苓去皮各六兩 杏仁去皮炒二兩

皂角子三兩 湯泡十次為末生

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九食後細嚼用紫蘇

湯下如喘急用桑白皮湯下

團參飲子濟生方 治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽

膿血增寒壯熱漸成勞瘵者

人參 紫苑茸洗 阿膠蛤粉炒 百合蒸

細辛洗去葉 欵冬花 杏仁炒去皮 天門冬湯泡

半夏湯泡七次 經霜桑葉 五味子各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎七分食後溫服

氣嗽加木香唾血而熱加生地黃 唾血而寒加鍾乳

粉 痰極咳嗽加黃芪 損肺唾血加沒藥藕節 嘔

吐肢滿不食加白朮 咳而小便多者加益智仁 咳

而面浮氣逆加沉香橘皮煎 大便溏者去杏仁加鍾

乳粉

紫苑茸湯濟生方 治飲食過度或食煎煇邪熱傷肺咳嗽

咽痒痰多唾血喘急脇痛不得安卧

紫苑茸洗 經霜桑葉 欵冬花 百合蒸焙

杏仁去皮尖 阿膠蛤粉炒 貝母去心 蒲黃炒

半夏湯洗各一兩 犀角鎔 甘草炙 人參各半兩

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後溫服



人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱見發熱類

補肺湯 按梓方 治勞嗽

桑白皮

熟地黄 各兩

人參

紫苑

黃芪

五味子 各兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分入蜜少許食後溫服

服

寧肺湯 楊氏家藏方 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

嗽痰唾

人參 去芦

當歸 去芦

白朮

熟地黄

川芎

白芍藥

甘草 炙

五味子

麥門冬

桑白皮

白茯苓 去皮各半兩

阿膠 蛤粉炒

右咬咀每服一兩生姜五片水二盞煎至一盞去滓通

口服食後

五味黃芪散 按梓方

治嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦

脚膝無力

麥門冬 去心

熟地黄

黃芪

桔梗 各半兩

人參 一錢

芍藥

五味子 各二錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分去滓溫服食後

金散 大全良方 治勞嗽

甘草

黃芩

桑白皮

防風 各一兩

杏仁 粒製 一十七

人參 去芦

茯苓 各五錢

麥門冬 去心 二錢

半

右以前五味用米泔水浸一宿曬乾次入人參茯苓麥

門冬三味同為末每服二錢水一盞蠟一豆大煎至八

分食後溫服

人參潤肺丸

人參

山藥

蓮肉

款冬花

蛤粉

杏仁 去皮尖 各一兩

藕節 五兩

紅棗 去核 半斤

大蘿蔔 煮熟

人參 五兩

白朮

白朮

右為末棗肉丸梧子大每服五十九白湯下食後

人參五味子散 聖惠方

治男女老稚諸虛百損氣血勞傷

涎喘欬嗽或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一

切虛損

人參

五味子

桔梗

白朮

白茯苓

甘草 炙

熟地黄

當歸 各半兩

地骨皮

前胡 去苗

桑白皮

枳殼 去穢炒

黃耆 炙

陳皮 去白

柴胡 各二錢

右咬咀每服一錢水一盞半

生姜三片煎至八分去滓

溫服食後日三煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎尤妙

大寧嗽湯 直指方 治勞嗽諸嗽通用如神効

北五味 茯苓 桑白皮 紫蘇

細辛 橘皮 枳殼 杏仁 蘇

甘草 炙 阿膠 炒 粟殼 去穢蜜炒

半夏 湯洗五 勞嗽加川芎

右咬咀每服一兩水二盞棗一枚姜三片烏梅半個煎

至一盞溫服

加味人參紫苑散 直指方 治虛勞咳嗽

咳嗽 心法附餘卷之五 人參 紫苑茸 陳皮

五味子 貝母 紫蘇葉 桑白皮 白茯苓

杏仁 炒去皮 甘草 各七錢 加州芎 半夏 麴

阿膠 五錢 蛤粉 炒

右咬咀每服一兩水二盞姜七片棗二枚烏梅一箇煎

至一盞溫服

人參蛤蚧散 治三年肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生

瘡遍身黃腫

蛤蚧 一對 全者河水浸五宿 杏仁 去皮尖

人參 甘草 炙 各五 知母 桑白皮

茯苓 去皮 貝母 各三兩

右為細末淨磁盒兒內盛每日用茶點服一錢七神効

○廣按治嗽方中多用人參以其肺虛故也然肺受火

邪久嗽喘滿吐血與夫陰虛火動午後發熱兼嗽者

切宜忌之然肺受寒邪喘嗽與夫陽虛火動晝夜發

熱兼嗽者宜用亦須知母貝母天門冬麥門冬瓜蒌

之類擇其一二味監制可也丹溪云予每治病以某

藥為主治以其藥為引經以其藥為監制是也

○已上數方治勞嗽之劑

二母散 治嗽久不愈者常服除根累効

咳嗽 心法附餘卷之五 貝母 等分

知母 右為細末老生薑切片煎藥細嚼白湯下

人參紫苑湯 百 選方 治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子 二錢 杏仁 半兩 人參 紫苑

甘草 各二錢 縮砂 一兩 桂枝 二錢半 款冬花 半兩

罌粟殼 製去穢姜炒 製一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片烏梅二枚煎服

人參理肺散 按料方 治喘嗽不止

麻黃 去節炒 米穀 炒三兩 人參 二兩 去當歸

木香 各一兩 杏仁 三兩 麴

右為粗末每服四錢水煎服

人參欬花膏和劑方治肺受虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳

嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或勞虛冷嗽及  
遠年近日一切嗽病服諸藥不効者皆治

欬冬花去梗人參去芦北五味炒紫苑洗去芦

桑白皮各一兩

右為末煉蜜九雞頭實大每服一九細嚼姜湯下臨卧

食後服

人參欬冬花散拔粹方治喘嗽久不已者

人參去芦欬冬花各五錢知母貝母

半夏各三錢栗殼一兩炒

右咬咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至八分食後

臨卧溫服加生薑五片同煎

補肺湯直指方治肺虛氣乏久嗽

阿膠炒蘇子桔梗半夏

甘草炙各半兩欬冬花砂仁紫苑

細辛杏仁陳皮去白桑白皮炒

青皮去白五味子石菖蒲草果各二錢

右咬咀每服一兩水二盞生薑四片紫蘇三葉煎至八

分溫服

治多年喘嗽

人參麻黃甘草各二兩

右為末每服二錢杏子五個搗碎無根水同煎和滓食  
後服

治遠年近日一切咳嗽

人參五倍子杏仁去皮尖半夏七錢

右用蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明凡五

錢為末二味入蘿蔔內以頂蓋紙裹煨研丸每服十丸

臨卧烏梅湯下

人參湯經驗方治遠年嗽

麻黃去節杏仁去皮尖炒甘草炙四兩

桑白皮五倍子栗殼梨陳皮各五錢

麥門冬三錢紫苑一兩人參去芦四錢阿膠七錢炒

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分去滓溫服食後

治多年嗽百一選方

杏仁去皮尖半夏湯泡七次南星生用甘草生用各

右咬咀每服八錢生薑七片棗一枚水一盞半煎至八

分食後溫服

諸般嗽不已

栗殼梨上烏梅去核中陳皮去白上人參去芦上

木香下 五味子中 桔梗炒上 杏仁去皮尖

石膏中 甘草下

右咳咀每服八錢薑水二盞煎至八分去滓溫服食後九仙散 治一切咳嗽

久參 欬冬花 桔梗 五味子

阿膠 烏梅各一兩 貝母 罌粟殼各半

桑白皮一兩

右為細末每服三錢白沸湯點服

人參清肺湯和劑方 治肺胃虛熱咳嗽喘急坐卧不安并

治久年勞嗽唾血腥臭

咳嗽心法附餘卷之五 主 桑白皮 地骨皮

阿膠炒 杏仁去皮炒 烏梅去核 甘草炙

人參 知母

罌粟殼去蒂蓋蜜

右咳咀每服三錢水盞半生薑棗子各一枚煎至一盞食後溫服

○已上數方治咳嗽喘急久不愈之劑

○廣按肺主皮毛人之無病之時榮衛周流內氣自皮膚腠理普達於外一或風寒外束則內氣不得於外達便從中起所以氣升痰上故咳嗽宜用辛溫辛涼之劑以發散風寒則邪退正復而嗽止也又按肺為

華蓋凡饑飽勞役喜怒憂恐與夫飲醇醪食厚味則火升痰上而傷於肺亦作咳嗽宜用降火豁痰之劑則火降痰消而咳止也又按肺主氣運行血液周流一身今也肺受火邪氣從火化有升無降為嗽為喘久而不治虛極至損則不能運行氣液發為煩熱驚悸咳嗽粘涎膿血宜用補虛潤燥開鬱散火之劑則肺得清正而嗽止也故治咳嗽要知新久之異虛實之殊補瀉之宜也矣

欬嗽治例出明醫雜著

王節齋曰欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾動而生痰欬嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血無鬱則開鬱滋之潤之欬之降之則治虛之法也

主方

杏仁去皮尖 白茯苓各一錢 橘紅七分 五味子

桔梗 甘草各五分

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏各一錢

麥門冬炒 黃芩知母 各五分

春若傷風致欬鼻流涕宜辛涼解散加防風薄荷

蘇炒黃芩麥門冬 各一錢

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒黃

芩麥門冬石膏 各一錢

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮 各一錢 防

風黃芩山梔 各五錢

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生乾姜

防風 各一錢 肺經素有熱者再加酒炒黃芩知母 各五錢

若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎前胡柴胡

各一錢

欬嗽 心法附錄卷之五

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星 姜汁炒 濕痰脾困

少食加白朮蒼朮 有痰而口燥咽乾勿用半夏南

星宜加知母 蜜水拌炒 貝母瓜蒌仁黃芩 炒

若夏月熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母石膏

上半日欬者胃中有火加貝母石膏黃連 五更嗽者

同治

黃昏欬者火浮於肺不宜正用寒涼藥宜加五味子訶

子皮欬而降之

若欬嗽久肺虛滋氣補血加人參黃耆阿膠當歸生薑

天門冬欬冬花馬兜鈴酒芍藥之類肺熱咳喘去人

參用沙參此無補氣血也

若午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加川芎當

歸芍藥熟地黃黃柏知母竹瀝姜汁天門冬瓜蒌仁

貝母此專補陰血也

若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶子皮香

附米瓜蒌仁半夏麴海石青黛黃芩為末蜜調為丸

噉化仍服前補陰降火湯藥夫治則成勞

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒌仁貝母海石青黛

半夏麴石膏山楂子枳實姜炒黃連為末蜜調噉

化

欬嗽 心法附錄卷之五

若勞嗽見血加阿膠當歸為藥天門冬知母貝母桑白

皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血多是

肺受熱邪氣得熱而變為火火盛而陰虛不得安寧

從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參等甘溫補氣

之藥然亦有氣虛而咳血者則宜用人參黃耆欬冬

花之類但此等證不多耳

因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為

重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只

治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治嗽也

○肺痿

丹溪心法

肺痿治法在乎養血養肺養氣清金 曾治一婦人二十餘歲胸膈間一竅口中所咳膿血與竅相應而出以人參黃耆當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈

附脉理

脉訣舉要曰寸數虛瀉肺痿之形

附諸方

人參養肺湯 治肺痿證咳嗽有痰午後熱并聲嘶

人參 去芦 甘草 阿膠珠 錢各一 茯苓 一錢半

柴胡 四錢 五味子 貝母 杏仁 炒

咳嗽 心法附餘卷之五 桑白皮 二錢 枳實 一錢五

桔梗 錢半 桑白皮 二錢 枳實 一錢五

右咬咀每服八錢生姜三片棗一枚水一盞半煎至八

分食後溫服

知母茯苓湯 宣明方 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓 甘草 知母 五味子

人參 去芦 薄荷 半夏 洗十次 柴胡 去苗

白朮 款冬花 桔梗 麥門冬 去心

黃芩 各半兩 川芎 阿膠 錢各三

右咬咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣通

口服食後

人參平肺散 拔粹方 治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘促

涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

桑白皮 兩 知母 七錢 甘草 炙 地骨皮 兩 各半

五味子 兩 茯苓 錢 青皮 人參 各四錢

陳皮 兩 去白半 天門冬 四錢 如熱加黃芩四錢紫蘇葉

半夏 各半兩

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片煎至八分去滓溫

服或為末姜汁丸彈子大噉化亦得食後

紫苑散 拔粹方 治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參 一錢 紫苑 半錢 知母 一錢半 貝母 一錢半

咳嗽 心法附餘卷之五 桔梗 一錢 甘草 半錢 五味 十五粒 茯苓 一錢

阿膠 炒五分

右咬咀水煎服一云各等分水二盞生姜三片煎至一

盞食前服

劫勞散 拔粹方

治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱

熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜

卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽唾中有紅

線名曰肺痿若不治便成羸劣之疾

白芍藥 六兩 黃耆 甘草 人參

半夏 洗 白茯苓 熟地黃 當歸

五味子 阿膠炒各二兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片棗三枚煎至一盞服不拘時

○肺癰

丹溪心法

肺癰已破入風者不治 用醫聖元戎搜風湯吐之 或用太乙膏成丸食後服 收斂瘡口止有合歡樹皮白欬煎飲之合歡即槿樹皮也又名夜合

附論

○廣按書云咳嗽有濁唾涎沫或咳嗽中有紅線膿血名曰肺痿熱在上焦故也如口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛名曰肺癰欬傷肺葉成也

附脉理

脉訣舉要曰寸數而實肺癰已成寸數虛瀆肺痿之形肺癰色白脉宜短濇死者浮大面白而赤

附諸方

桔梗湯 治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤澀

桔梗去芦 貝母去心 當歸去芦酒浸 瓜蒌子

枳殼去核 薏苡仁炒 桑白皮蜜水 防己各二兩

黃芪去芦 甘草節生用 杏仁去皮尖 百合各半

右咬咀每服五錢水盞半生姜五片煎八分不拘時服

如大便秘加大黃小便赤少加木通

消膿飲治肺癰膿腥氣上衝而嘔咳嗽

南星生一兩 知母 貝母 白芷

生地黃 阿膠炒 川芎 桑白皮炒

白芨各半兩 甘草炙 防風 射干

桔梗 紫蘇葉 天門皮去心 薄荷

杏仁不去皮 半夏蜜製各半

右咬咀每服一兩水二盞生姜七片烏梅一個煎至八分食後溫服

分食後溫服

黃芪散 治肺癰 用白紫蜜炙為細末每服一大匙食遠黃芪湯調服

一方 治肺癰吐膿 桔梗炒一兩 甘草炙半兩

右每服一兩水一鍾半煎八分空心服吐盡膿為効

霍亂 十七

丹溪心法

○內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以提其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽不升陰

降乖隔而成切莫與穀食雖米飲一呷入口即死必待曉  
 瀉過二三時直至饑甚方可與稀粥食之脉多伏欲絕  
 見成吐瀉不徹還用吐提其氣起或用樟木煎湯吐之亦  
 可 大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓  
 散有吐者以二陳湯探吐亦有可下者 轉筋不往男子  
 以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也 轉  
 筋皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮南星煎服 乾  
 霍亂者最難治死在須臾升降不通當以吐提其氣極是  
 良法世多用鹽湯此係內有物所傷外有邪氣所遏有用  
 吐者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜二  
 陳湯加解散藥

霍亂 心法附餘卷之五 三

二陳湯加 川芎 蒼朮 防風

白芷 又云白朮

右對姜五片

治霍亂方

蒼朮 厚朴 陳皮 葛根 各一錢  
 滑石 三錢 白朮 二錢 木通 一錢 甘草 炙五分

右對入姜煎湯下保和丸四五十九

戴云霍亂者吐也有聲有物凡有聲無物而躁亂者謂  
 之乾霍亂也

二陳湯 見痰類

理中湯 見中寒

五苓散 見濕熱

四物湯 見補損

附論

○廣按人於夏月多食生冷因脾虛不能運化加以外  
 感風寒則揮霍亂上吐下瀉也人見倉卒躁擾痛悶  
 似有鬼神然實非鬼神乃飲食痞隔上下不通將欲  
 吐瀉故如是也

附脉理

霍亂 心法附餘卷之五 四

脉訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濡數凶斷又  
 曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代勿訝

附諸方

姜附湯 治中寒霍亂轉筋手足厥冷

理中湯 治中寒霍亂吐瀉 並見中寒

通脉四逆湯 治中寒霍亂吐瀉 並見中寒

吳茱萸湯 治中寒霍亂吐瀉 並見中寒

細辛 白芍藥 甘草 附子 炮一兩 桂心 去皮 木通 各一錢

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎七  
 分溫服



七氣湯 三因方 治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不和	和揮霍變亂吐利交作	半夏 湯洗 五兩 厚朴 姜制 桂心 各二兩 白芍藥 各二兩	茯苓 去皮 各四兩 紫蘇葉 橘皮 各二兩 人參 去芦 一兩	每服四錢水一盞酒半盞生薑七片棗一枚煎七分溫服	五苓散 治霍亂吐瀉煩渴引飲 見濕熱	香朴飲子 治伏熱吐瀉虛煩作亂 見中暑	霍香正氣散 治中濕霍亂吐瀉	不換金正氣散 治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼 並見胃寒	二香散 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂	藿香 二兩 半夏 陳皮 桔梗	白朮 大腹皮 茯苓 厚朴	藜蘆 白芷 各一兩 甘草 二兩 黃連 二兩	香薷 一斤 扁豆 半斤	每服用水一鍾半生薑三片葱白二根煎食後熱服此	即霍香正氣散黃連香薷飲相合也	既濟湯 醫方集成 治霍亂後虛煩不得眠	人參 去芦 甘草 炙 淡竹葉 各半兩 麥門冬 去心 一兩	附子 炮半 半夏 湯洗五錢
---------------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------------------	-------------------	----------------	--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------------	------------------------------	---------------

右咬咀每服四錢水二盞姜五片粳米百餘粒煎空心溫服	麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱多渴小便不利	麥門冬 去心 一兩 橘皮 去白 半兩 湯泡 白茯苓 去皮 七兩	白朮 各一兩 人參 去芦 甘草 炙 各半兩 小麥 半合	右咬咀每服四錢水盞半姜五片烏梅少許煎八分溫服	木瓜湯 直指方 治霍亂吐瀉轉筋痠悶	酸木瓜 二兩 茴香 錢半 甘草 炙 二錢 吳茱萸 洗炒 七次	右咬咀每服四錢姜五片紫蘇十葉煎服空心	桂苓甘露散 治中暑霍亂吐瀉發渴引飲 見中暑	加減理中湯	人參 白朮 乾姜 甘草 各等分	若為寒氣濕氣所干者加附子一兩名附子理中湯	若霍亂吐瀉加陳皮青皮各一兩名治中湯	若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥	若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生薑十片同煎	若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯	若瀉泄不已者於補中湯內加附子一兩 不喜
-------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------	-------	-----------------	----------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	------------------	---------------------

飲米穀不化者再加縮砂仁一兩共成八味 若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附名	四順湯 若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心隔高起急痛手不可近者	加枳實茯苓各一兩名枳實理中湯 若渴者再於枳實理中湯內加枯芩根一兩 若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏一兩 若臍上築者腎氣動也去朮加官桂一兩半腎惡燥故去朮恐作奔豚故加官桂	若悸多加茯苓一兩 若渴欲飲水者添加朮半兩 若腹滿者去白朮加附子一兩 若飲酒過多及啖炙	霍亂 心法附錄卷之五 聖 月令	煇熱食發為鼻衄加川芎一兩 若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈只用本方	三因白朮散 治中暑嘔吐暈眩及大病後調理失宜勞復如初及脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水滑泄腹鳴飲食所傷霍亂吐瀉並宜服之	白芷 甘草 青皮 白茯苓	桔梗 山藥 香附子 乾姜	白朮 陳皮 各一兩	每服水一鍾生薑三片棗一枚木瓜一片紫蘇葉三二片煎食前服 若吐瀉加白梅煎 喘加桑白皮杏仁
--------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------------------------------------

霍亂 心法附錄卷之五 聖 月令	右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二兩甚者加姜汁人參湯 經方 止吐逆及治瀉後煩渴常服調中和氣	茯苓 去皮 人參 各半 葛根 一兩 藿香 去土	木香 錢半 藿香 半兩 葛根 一兩	白朮 茯苓 去皮 人參 各半 甘草 一兩五	毒嘔噦 治大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱及酒	厥入臍煎服	暑嘔逆加香薷霍亂加藿香 產後泄瀉加荆芥 氣	寒勞復加薄荷 膈氣加木通入麝香少許 中	止渴湯 經方 治霍亂煩渴	甘草 炙 人參 去芦 麥門冬 去心 茯苓 去皮	桔梗 瓜蒌根 澤瀉 葛根 各半	右為末蜜湯調二錢服	回生散 百一選方 治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回	陳皮 去白 藿香 去土
-----------------	---------------------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	-----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	-----------------	-----------	--------------------------	-------------

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

姜鹽飲 直指方 治霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩 生姜半兩

右同炒令色變以水一碗煎熟溫服甚者加童子小便一盞

治絞腸沙證 經驗方 治手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸

溫水於病者膝腕內拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈又一法用麻弦小竹弓蘸香油或熱水括手足胸背額項即愈

霍亂 心法附餘卷之五 聖

備急大黃丸 療心腹諸痛卒暴百病用此藥吐下即愈 方見傷食

○廣按乾霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣被鬱而不能行所以卒痛而手足厥冷惡心嘔噦也俗名攪腸沙者蓋言痛之甚也除用藥不言外此方刺青筋以出氣血南方括胸背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之為愈也蓋霍亂乃氣病非血病也今刺青筋固能散氣而血因之以傷況人之一身氣常有餘血常不足今不足者又從而傷之是不足之中又不足也少壯之人庸或得免而衰老

之人則不免於死也何以言之氣為血之先導血為氣之依附今陰血既乏則陽氣失其依附必然發越不死何待書曰陽虛必惡寒陰虛必發熱蓋氣有餘便生火火動則發熱熱久而陰血愈消經曰陰虛則病陰竭則死此之謂也

丹溪心法附餘卷之五 終

霍亂 心法附餘卷之五 聖

休寧東山古菴方廣約之類集

# 暑門

## 瘧十八

丹溪心法

○瘧疾有風 暑 食 痰 老瘧 瘧母 大法風暑

當發汗夏月多在風涼處歇遂開其汗而不泄故也 惡

飲食者必自飲食上得之 無汗者要有汗散邪為主帶

瘧疾

心法附餘卷之六

一

瘧疾

補 有汗者要無汗正氣為主帶散 一日一發者受病

一月 間日一發者受病半年 三日一發者受病一年

二日連發住一日者氣血俱病 瘧病感虛者須以人

參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外

邪同發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山

草果煎服 久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮 一

方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截 老瘧病此係

風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎

撫芎

紅花

當歸

炒栝

白朮

蒼朮

甘草

白芷

右剉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之

若在陰分者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬

廣 按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟傳

出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養

升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗

多用川芎蒼朮乾葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之

微旨學者所當知也

截瘧常山飲

瘧疾

心法附餘卷之六

二

瘧疾

穿山甲

分五

草果

八分

知母

一錢

檳榔

七分

烏梅

八分

常山

八分

炙甘草

三分

右咬咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得

為順 一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或

加青皮陳皮 又方

柴胡

草果

常山

知母

貝母

檳榔

各等分

右用酒水同煎一宿臨發前二時服

又治瘧母此藥消導

青皮

桃仁

紅花

神麴

麥芽 驚甲醋炙 三稜 海粉

莪朮 香附並用醋炙

右為末丸如梧桐子大每服五七十丸白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲水外多汗出

人參 蒼白二朮 黃芪 苓連

山梔炒 川芎 半夏 天花粉

右咬咀水三鍾姜三片煎服

又治瘧疾發渴

生苳 麥門冬 天花粉 牛膝

知母 炒栢 葛根 生甘草

瘧疾心法附餘卷之六

右咬咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿半斤 冬瓜葉 官桂 馬鞭草各三兩

右焙乾為末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前

一時服盡 又云青蒿一兩冬青葉二兩馬鞭草二兩

桂二兩未知孰是姑兩存之以俟知者

截瘧

檳榔 陳皮 白朮 常山各三錢

茯苓 烏梅 厚朴各一錢半

右咬咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一服

服臨發日早一服服後少睡片時

又瘧疾後

白朮 半夏一兩 黃連半兩 白芍二錢

陳皮半兩

又為末粥丸梧子大每服六十九丸姜湯下

附諸賢論

心法附錄曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之脾寒此因

名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况

其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥

消之行氣消堅為主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明

瘧疾心法附餘卷之六

風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘧此言是但三

陰經說不明凡作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳

亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

附脉理

脉訣舉要曰瘧脉自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷

心法附錄曰瘧脉多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲

亦有病久而脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛

數之中見弦但不搏手耳細察可見也

附諸方

黃連香薷飲 治伏暑發瘧煩渴者見中畧

桂枝羌活湯 板料方 治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮

惡寒有汗者

桂枝 羌活 防風 甘草 各半兩

右為粗末每服半兩水煎如吐加半夏麴等分

麻黃羌活湯 板料方 治瘧疾頭痛項強脉浮惡風無汗者

麻黃 去節 羌活 防風 甘草 各半兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎服如吐加半夏麴等分

麻黃桂枝湯 板料方 治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

瘧疾 心法附餘卷之六 五 桂枝 二錢

麻黃 去節 炙甘草 三錢 黃芩 五錢

桃仁 二十箇 去皮尖

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用

此湯散血中風寒也

桂枝黃芩湯 板料方 治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明

少陽三陽合病也

甘草 人參 黃芩 各四兩 柴胡 一兩

石膏 知母 各五錢 桂枝 二錢 半夏 四錢

右為粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯 板料方 治瘧疾先寒後熱多寒少

桂枝 五錢 石膏 知母 各一兩 黃芩 一兩

右為末分三服水二盞煎服間日者邪氣所合故也

○已上數方發散之劑

人參養胃湯 治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散

然後用四獸飲之類截之因食倍加草果 見胃寒類

萬安散 濟生方 治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此

藥以取效氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮 皮炒 厚朴 姜製 陳皮 去白 檳榔

常山 酒浸 甘草 炙各一錢半

右以咀水一盞半煎至一盞露一宿當發日作二服忌

瘧疾 心法附餘卷之六 六

熱性物片時

定齋草果飲子 簡易方 快脾治瘧

草果 蒼朮 厚朴 陳皮

半夏麴 甘草 炙 烏梅 去核各等分

右以咀每服半兩水盞半姜五片棗二箇同煎七分不

拘時服寒多者加乾姜附子熱多者只加柴胡瘧瘧加

檳榔

柴胡桂薑湯 活人方 治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱

者并治勞瘧

柴胡 四兩 桂枝 去皮一兩 黃芩 一兩 瓜蒌根 一兩

杜鵑炮碎 甘草炙 乾姜各一兩炮

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服

柴胡加桂湯活人方 治瘧疾寒後熱無治支結

柴胡八兩 人參去芦 甘草炙 半夏泡七次

黃芩肉桂去皮各二兩

右咬咀每服五錢水盞半姜七片棗二箇煎服若渴者去半夏加人參瓜蒌根同煎服之

○已上數方治瘧疾多熱少發散之劑無汗可用

小柴胡湯 治瘧疾熱多寒少但或單熱頭疼口乾胃滿者方見濕熱類

瘧疾心法附餘卷之六 七

柴胡桂枝湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡去苗一兩 天花粉一兩 黃芩去黑心

人參錢半 甘草炙七錢半

右服一兩姜五片棗一枚水二盞煎一盞去渣通口服

白虎加桂枝湯活人方 治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母六兩 甘草炙三兩 桂枝三兩 粳米三兩

石膏一斤

右咬咀每服五錢水盞半煎至一盞去渣溫服

清脾飲濟生方 治瘧瘵來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澀

青皮去白 厚朴姜製 白朮 半夏湯洗七次

黃芩 草果仁 柴胡去苗 茯苓去皮

甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎七分溫服不拘時

參蘇飲 治發瘧熱多寒少無咳嗽者見傷風類

驅瘧飲 治發瘧熱多寒少者

前胡 柴胡各四兩 桂心 桔梗

厚朴 半夏各三兩 黃芪 乾姜炮

甘草炙各二兩

右剉水二盞生姜三片棗四箇煎至一鍾溫服

瘧疾心法附餘卷之六 八

○已上數方治瘧熱多寒少發散之劑有汗可用

大柴胡湯 治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利為度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪方見濕熱

白芷石膏三物湯

白芷一兩 知母七錢 石膏四兩

右為粗末每半兩水一盞煎服

○已上二方治瘧熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲簡易方 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾

聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾

人參去芦 白朮 茯苓去皮 橘紅

草果仁 半夏 湯炮 棗子 生姜

烏梅 去核各半 甘草 炙減

右咬咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服半兩水二盞煎六分未發前併進數服

七寶飲 簡易方 治一切瘡疾無問寒熱多少及山嵐瘴

氣寒熱如瘡

厚朴 姜製 陳皮 甘草 炙 草果仁

常山 雞骨 檳榔 青皮 各等分

右咬咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿

瘡疾 心法附餘卷之六 九

空心向東溫服睡少頃時須忌熱性物寒多加酒服

清肺飲 三因方 治飲食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴 四兩 烏梅 去核 半夏 湯去 青皮

良姜 各二兩 草果 去皮 甘草 炙半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未發前併三服忌生冷油膩之物

○已上三方治瘧寒多熱少止截之劑

常山飲 和劑方 治瘧疾發散不愈漸成勞瘵

知母 川常山 草果 各三兩 良薑 二兩

甘草 烏梅 去核各一兩

右咬咀每服五錢水一盞薑五片棗一枚煎七分溫服

六和湯

人參 知母 草果 貝母

白芷 烏梅 檳榔 柴胡 各一錢

常山 二錢

右剉薑三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

○已上二方治瘧熱多寒少止截之劑

鬼哭丹 治瘧三二日一發者

常山 二兩 醋浸春五夏 檳榔 各四

貝母 各二兩 半夏

瘧疾 心法附餘卷之六 十

右為末用雞子清麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸

隔夜臨睡冷酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸 治瘧三日一發或十日一發

姜黃 三錢 白朮 一兩 人參 檳榔

草果 莪朮 醋炒 厚朴 各半 黃芩

半夏 青皮 各一兩 甘草 三錢

右為末飯丸如梧子大每六十丸食遠白湯下日二服

紅丸子 清生方 專治食瘧

青皮 炒三兩 阿魏 醋化二錢 蓬朮 醋炙 京三稜 醋炙各二兩

胡椒 一兩



右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十丸至百丸淡姜湯下或因食生果成瘡用麝香湯吞下

老瘡飲 三因方 治久瘡結成癥瘕瘰癧在胃腸諸藥不愈者

蒼木 淋浸 草果 去皮 桔梗 青皮

陳皮 良薑 各半 白芷 茯苓

半夏 湯洗 甘草 炙 枳殼 麩炒 桂心

乾姜 炮各 紫蘇葉 川芎 各一

右吹咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心服

瘡疾 心法附餘卷之六 土

山甲湯 久瘡瘰癧不治者宜服四獸飲間服此湯

川山甲 木鱉子 等分

右為末每服二錢空心溫酒調下

鼈甲飲子 濟生方 治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名

曰瘡母

草果仁 鼈甲 醋炙 黃耆 去芦 白朮

白芍藥 厚朴 姜製 檳榔 橘紅

川芎 甘草 炙各

右吹咀每服四錢水一鍾姜七片棗一枚烏梅少許煎

溫服

十將軍丸 久瘡不瘥腹痛有瘡母

三棱 二兩 炮 莪朮 生 青皮 去白 陳皮 去白

川常山 一兩 砂仁 檳榔 烏梅 各一兩

草果 去殼 半夏 湯泡七次

右先將常山草果二味剉用好酒醋各一碗入瓦器內

先浸一宿後入八味藥同浸至晚用瓦鉋內炭火煮乾

取出晒如無日色用火焙乾為末半酒半醋打糊為丸

如梧桐子太每服三四十九丸白湯吞下日進三服忌生

冷魚腥鹹酸油膩麪諸死毒物服四兩至八兩即除根

凡有積聚及行瘴濕地方宜服之

瘡疾 心法附餘卷之六 十一

四將軍飲 良方 治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不

知人此雖一時急救之方用之有驗

附子 一箇 炮 訶子 四箇 陳皮 四箇 全 甘草 炙 四

右吹咀為四服每服水一鍾半生姜七片棗七枚煎取

一半令熱灌病者立可甦省

○廣按瘧疾發作而僵仆不省人事者蓋由頑痰老痰

膠固於中榮衛不行故也所以中風中暑而卒倒不

省人事者亦由痰之所致也附子性大熱走而不守

本是治寒濕之藥今瘧疾發作僵仆而用之以其性

大熱能開散頑痰使榮衛得行故耳乃是劫劑非正治之藥也

露薑飲 詹素方

用生薑四兩和皮搗汁一碗夜露至曉空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱

○廣按生薑自然汁凡中風中暑中氣中毒乾霍亂一應卒暴之證與童便同用立可解散蓋生薑能開痰童便能降火故也

分利順元散 詹素方 治體虛之人患瘧疾寒多不可用截藥者

瘧疾 心法附餘卷之六 附子 各一兩 南星 二兩 木香 五錢另剉

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和咬咀每服四錢棗七枚生薑十片水一鍾煎七分當發前一日及當發日早晨連進三二服半生半熟能分解陰陽也

一方 治久瘧

用青蒿桂枝各為末若寒多用桂多蒿少熱多用蒿多桂少三七分互用各以生薑二兩連皮搗汁和熟酒調服以衣被蓋卧即愈

雄黃散 詹素方 治久瘧不能食胃中兀兀欲吐而不吐此

藥吐之必愈

雄黃 瓜蒂 赤小豆 各等分

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

辰砂九 宣明方 治一切脾胃虛瘧熱毒者

信砒 甘草 各一錢 硃砂 二錢 大豆 九粒

右為末滴水和水丸勻分作四十九服發日日欲出煎桃心湯下一丸忌熱性物

越效餅子 和劑方 治一切瘧疾發作有時先覺伸欠乃作

寒慄肢振頭顫中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已或內外皆熱頭痛如破渴飲冷水或痰聚胸中煩滿欲吐或先

寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或但熱不寒但寒不

熱或一日或隔日或發後六七日再發皆治之

龍腦 麝香 定粉 研各五錢 荷葉

菜豆 甘草 各五兩 硃砂 一兩 信 醋煮二

金箔 二十五張為末

右為末煉蜜搜和勻每兩作二十九捏匾金箔為衣每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日發者頭夜服隔數日發者前一日夜服連日發凌晨服

不二散

人言 一兩 飛麝 四兩與人言水和軟 白扁豆 末二

細茶末二

右同和勻每服小半錢已前半日用溫茶調下再用茶盪淨忌食酒麪魚等物

雄殊丹

用雄黑豆四十九粒五月五日以冷水浸從早至巳時去皮晒乾研為末入信末一錢再研勻細為丸雄黃為衣晒乾收貯少壯人如梧桐子大衰老人如小黄豆大小兒如菉豆大臨發時五更面東井水下一丸不止再服黑豆圓者是

一方 治久瘡

瘡疾 心法附餘卷之六

天南星 二枚 好信 二錢

右先將南星開孔用信二錢研為末裝入孔內兩星相對用泥固濟炭火煨存性取出研為細末用菉豆粉打糊為丸如豆大每服一二丸臨發日五更溫茶清下白湯亦可

一方

人言 二錢 雄黃 菉豆 各五錢

右為細末麪糊為丸如筋頭大硃砂為衣每服一丸用桃柳條各七寸煎湯露一宿臨發日空心服面向東忌食熱物魚腥油膩十日

瘡疾良方 百一選方 今人治瘡疾多用常山砒霜之類發

吐取涎縱使得安脾胃不能不損不若此藥最為穩當 辰砂 光明 阿魏 真者各一兩

右研勻和稀糊為丸如皂角子大每服一丸空心人參湯下

○已上數方劫奪之劑

灸法 濟生方 治瘡疾久不愈

不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立効或灸第三骨節亦可

對金飲子 和劑方 治寒熱瘡疾愈後理調脾胃

瘡疾

心法附餘卷之六

十六

厚朴 去皮薑汁炒 蒼朮 泔浸去粗皮 甘草 炙各二兩 陳皮 去白

右咬咀每服四錢水一鍾薑三片棗一箇煎服一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

正氣散 徐同知方 退寒瘧止胃寒進食

霍香 四兩 草果 四兩 半夏 陳皮

厚朴 砂仁 甘草 各一兩

右剉為散生薑棗子煎溫服如瘧未至俟發日早服

草果飲 和濟方 治寒熱瘧疾 此進食理脾

紫蘇 草果仁 川芎

青皮 甘草 白芷 各等分

右吹咀每服四錢水一鍾煎七分熱服

○已上數方治瘧初愈理脾進食之劑

○廣按瘧疾之源蓋由暑月中表氣虛而致中氣虛則水穀停聚而為痰飲於胃腸矣表氣虛則風暑入內而使血液稽留於經絡矣久則痰飲血液拂鬱稠粘膠固痞塞不通人之榮衛晝行陽分二十五度脊與背也夜行陰分二十五度胃與腹也榮衛行到病所不通乃作寒戰股振頭顙中外皆寒腰脊俱痛此正氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲水煩滿欲吐自汗此邪火發於外也或獨寒而無熱或寒多而熱少或無汗者宜開鬱豁痰為主用人參養胃湯草果飲子之類以發散之或熱多而寒少或獨熱而無寒或有汗者宜清熱補虛為主用白虎加桂枝湯小柴胡湯之類以發散之用發散之藥三五服後則用四獸飲六和湯之類以截之或瘧久在陰分亦須用血藥微起陽分然後截之可也

瘧疾治痢 出明醫雜著

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪

從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡 去苗 白朮 各一錢 蒼朮 一錢 已上三味瘧疾必用之

陳皮 七分 甘草 五分 乾葛 二分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半

夏 各一錢 熱甚頭痛再加川芎軟石膏 各一錢 口渴加石

膏知母麥門冬 各一錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當

歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母 各一錢 酒洗紅花酒炒

黃蘗 各四分 提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參

黃芪白茯苓 各一錢 以補氣川芎當歸白芍藥熟地黃

錢 各一以補血

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮

白朮黃芩乾葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黃黃耆黃蘗以斂之

無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰有汗

者要無汗扶正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加

人參一錢 酒炒芍藥大麥芽錢各一

若傷食痞悶或有食積者加神曲麥芽枳實炒各二錢

炒黃連五分

若痰盛加姜製半夏南星枳實炒各一錢 黃芩黃連各六分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山錢各一 烏梅淨肉三錢

若日久虛癯寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無

只用四君子合四物湯加柴胡黃芩黃耆陳皮以滋

補氣血

瘧疾 心法附餘卷之六

十九

李天

# 痢

丹溪心法

○痢赤屬血 白屬氣 有身熱 後重 腹痛 下血

身熱挾外感小柴胡湯去人參 後重積與氣墜下之

故兼升無消宜木香檳榔丸之類不愈者用秦艽皂角子

煨大黃當歸桃仁黃連枳殼若大腸風盛可作丸服 保

和丸亦治因積作後重者五日後不可下蓋脾胃虛故也

後重窘迫者當和氣木香檳榔 腹痛者肺金之氣鬱

在大腸之間如實者以劉氏之法下之虛則以苦梗開

然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥姜桂之屬 下血四物為主 下

血多主食積與熱或用朴硝者 青六九治血痢效 痢

疾初得一二日間以利為法切不可使用止瀉之劑若實

者調胃承氣大小承氣三一承氣下之有熱先退熱然後

看其氣病血病加減用藥不可使用參朮然氣虛者可用

胃虛者亦用之 血痢久不愈者屬陰虛四物湯為主涼

血和血當歸桃仁之屬 下痢久不止發熱者屬陰虛用

寒涼藥必兼升散藥併熱藥 下痢大孔痛者因熱流於

下也以檳榔木香黃連黃芩炒乾姜 噤口痢者胃口熱

痢疾 心法附餘卷之六

二十

李天

甚故也大虛大熱用香連及蓮肉各一半共為末米湯調

下又方人參二分姜炒黃連一分為末濃煎終日細細呷

之如吐則再服但一呷下咽便開人不知此多用溫熱藥

其味此以火濟火以滯益滯 封臍引熱下行用田螺肉

搗碎入麝香少許蠶脂內 下痢不治之証下如魚腦者

半死半生下如麝腐色者死下純血者死下如屋漏水者

死下如竹筒注者不治 赤痢乃自小腸來白痢乃自大

腸來皆濕熱為本赤白帶濁同法 下痢有風邪下陷宜

升提之蓋風傷肝肝王木故也有濕傷血宜行濕清熱

內經所謂身熱則死寒則生此是大槩言必無証詳之方

可令豈無身熱而生寒而死者 脉沉少留連或微者易治洪大數者難治也脉宜滑大不宜弦急 仲景治痢疾溫者五法可下者十法或解表或利小便或待其自己還分易治難治不治之證至為詳密但與瀉同立論不分學者當辨之 大孔痛 曰溫之一曰清之按久病身冷脉沉小者宜溫宜補暴病身熱脉浮洪者宜清有可吐者亦有可汗可下者 初得之時元氣未虛必推蕩之此通因通用之法稍久氣虛則不可下壯實初病宜下虛弱衰老久病宜升之 先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此腎傳脾微邪易愈 下痢如豆汁者濕也蓋脾胃為水穀之海無物不受常無四臟故五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之因熱而作不可用巴豆如傷冷物者或可用宜謹 又有時疫作痢一方一家之內上下傳染相似却宜明運氣之勝復以治之戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治但分新久更量元氣用藥與赤白帶同

又方

黃連	滑石	甘草	白芍
蒼朮	白朮	當歸	青皮
條芩			

右剉水煎裏急後重炒黃連滑石加桃仁檳榔甚者黃嘔者用姜汁半夏

又方

乾姜一錢 當歸二錢半 烏梅三箇 栝一錢半 黃連一錢

右剉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳殼又方 治熱與血

大黃 黃連 黃芩 黃柏

枳殼 當歸 芍藥 滑石

桃仁 甘草 白朮 等分

右為末或湯調或作丸用麩糊或神麩糊丸服一本云誤服熱藥滋藥毒犯胃者當明審以祛其毒

治白痢

蒼朮 白朮 神麩 茯苓

地榆 甘草 等分

右剉水煎

治赤痢

地黃 芍藥 栝 地榆

白朮 等分

右剉水煎 腹痛加枳殼厚朴後重加滑石木香檳榔

有熱加黃芩山梔

又治痢方

滑石 一兩

蒼朮 半兩

川芎 三錢

桃仁

芍藥

半兩 炒甘草 一錢

右為粗末姜一片搗細煎滾服

又方 孫郎中飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮

白朮

厚朴

茯苓

滑石 各一錢

右咬咀水煎下保和丸 又云加炒麴甘草

又方

痢疾

心法附餘卷之六

三

痢疾

蒼朮

龜板

白芍 各二兩半

酒柏 炒半兩

右為末粥丸以四物湯加陳皮甘草水煎湯下

又方 痢後腰痛兩脚無力

陳皮

半夏

白芍 各一錢

茯苓

蒼朮

當歸

酒苓 各半錢

白朮

甘草 各二錢

右咬咀作一服姜煎食前服

又方 治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮

白朮

黃芩

滑石

白芍

茯苓

甘草

陳皮

神麴 各等分

右咬咀水煎下保和丸

一老年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下血淡膿水腹痛小便不利裏急後重參朮為君甘草滑石檳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日前證俱減獨小便不利以益元散與之安

治痢十法

其或惡寒發熱身首俱痛此為表証宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生薑三片煎 其或腹痛後重小水短下積此為裏証宜和中疏氣用炒枳殼製厚朴芍藥陳

痢疾

心法附餘卷之六

高

痢疾

皮滑石甘草煎 其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血証法當用搗末桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱加黃芩或口不渴身不熱喜熱手熨盪是名挾寒加乾姜 其或下墜在血活之後此氣滯証宜於前藥加檳榔一枚 其或在下則纏住在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平証當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之毒解積下食自進 其或力倦自覺氣少惡食此為挾虛証宜加白朮當歸身尾甚者加人參又十分重者止用此一條加陳皮補之虛回而利自止 其或氣行血和積少但虛坐努責此為無血証倍用當歸身

處却以生芍藥生芋生桃仁佐之復以陳皮和之血生自  
 安 其或纏墜退減十之七八穢積已盡糟粕未實當炒  
 芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然  
 固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸  
 丸未宜遽用蓋固腸丸有去濕實腸之功 其或利後糟  
 粕未實或食粥稍多或饑甚方食腹中作痛切不可驚恐  
 當以陳皮白朮各半煎湯和之自安 其或久痢後體虛  
 氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子皮肉豆蔻白凡  
 半夏甚者添牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐大澁亦  
 能作痛又甚者灸天樞氣海 右前方用厚朴專瀉滯疑  
 痢疾 心法附餘卷之六 主  
 之氣然厚朴性大溫而散氣久服大能虛人滯氣稍行即  
 去之餘滯未盡則用炒枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之  
 厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退當去之只用陳皮以和  
 藥然陳皮去白有補瀉之兼若為參朮之佐亦純作補  
 藥用 凡痢疾腸痛必以白芍藥甘草為君當歸白朮為  
 佐惡寒者加桂惡熱痛者加黃柏達者更能參以歲氣時  
 今用藥則萬舉萬全豈在乎執方而已哉  
 附脉理  
 脉訣舉要曰瀉則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又  
 曰無積不痢脉宜滑大浮弦急死沉細無害

附諸方  
 五苓散 治伏熱下痢分利陰陽  
 黃連香薷飲 治感暑下痢鮮血  
 清暑益氣湯 治暑病內傷下痢不思飲食發熱  
 六合湯 治伏熱煩悶或成痢疾 俱見中暑  
 ○已上數方治因暑下痢之劑  
 敗毒散加石連肉 治下痢熱毒不進飲食  
 倉廩方 仁存方 治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑致發  
 熱者敗毒散加陳米姜棗同煎 俱見傷風  
 防風芍藥湯 破粹方 治滯痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及  
 痢疾 心法附餘卷之六 主  
 頭痛微汗  
 防風 芍藥 黃芩 各一兩  
 右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服  
 ○已上數方治痢疾身熱者之劑  
 香連丸 和劑方 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後  
 重  
 黃連 去芦二十四兩用吳茱萸十兩 木香 四兩八錢  
 同浸炒令赤色去茱萸不用 右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九粒空心米  
 飲下  
 氣湯 破粹方 治下痢膿血裏急後重日夜無度



芍藥 一兩	當歸 半兩	大黃 二錢半	黃連 一錢
黃芩 二錢半	木香	檳榔 各一錢	
右咬咀每一兩水二鍾煎至七分溫服食前			
木香枳殼丸 聖惠方	治痢疾裏急後重無開胸膈進飲食		
破滯氣散內熱			
木香	檳榔	陳皮 去白	黃連 去鬚
蓬朮 煨	當歸 去芦	枳殼 去穢炒	青皮 各五錢
香附子 去毛	黃栢 各一兩	黑牽牛 一兩	
右為末水丸如梧桐子大每服五十九或七十九姜湯下			
如腫毒加服至二百丸利五十行立消			
痢疾 心法附餘卷之六			
戴人木香檳榔丸 治証同前			
木香	檳榔	青皮	陳皮
廣木	枳殼	黃連	黃栢
大黃 各半兩	丹末	香附 各二兩	
右為末水丸梧子大每五六十丸煎水下量虛實與之			
紺珠多三稜黃芩當歸分兩不同			
保和丸 治脾虛因積作後重者不可下用此消導	方見		
和中丸 同前	方見調補脾胃		
○已上數方治痢疾後重者之劑			
黃連阿膠丸 和劑方	治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍		

腹疼痛口燥煩渴小便不利			
阿膠 炒二兩	黃連 兩	茯苓 三錢	去皮三兩
右黃連茯苓為末水熬阿膠膏搜和丸如梧子大每三			
十九米飲下			
當歸丸 濟生方	治冷留腸胃下痢純白腹痛不止		
當歸	芍藥	附子	白朮
乾姜	厚朴	阿膠 蛤粉炒	烏梅肉 二兩
右為末醋糊丸梧子大每服五十九空心米飲下			
蒼朮芍藥湯 振粹方	治痢疾痛甚者		
蒼朮 二兩	芍藥 一兩	黃芩	官桂 各五錢
痢疾 心法附餘卷之六			
右咬咀每一兩水二鍾煎至一鍾溫服			
四味阿膠丸 仁存方	治挾熱下痢色黃煩燥多渴臍腹疼		
痛小便不利			
黃連 淨四兩	茯苓 去皮二兩	赤芍藥 三兩	阿膠 蛤粉炒
右為末醋糊丸梧子大每服五十九米飲下			
當歸導氣湯 振粹方	治膿血痢無度腹中痛		
當歸	芍藥 各一錢	甘草 一錢半	青皮 七錢
槐花 十分	生地黃 酒洗陰乾二錢		
右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前如後重加木			
香檳榔末各三分澤瀉半錢如小便利去澤瀉			

○已上數方治痢疾腹痛者之劑

烏梅丸 治熱留腸胃臍腹痛下痢純血或服熱藥過

多毒蘊于內滲成血痢 濟生方

烏梅肉 二兩 黃連 三兩 當歸 枳殼 去穢各三兩

右為末醋糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下

茵根丸 濟生方 治一切毒痢及蠱注下血如雞肝心煩腹

痛

茵根 洗 川升麻 犀角 鎔 地榆 洗

當歸 去芦洗 黃連 去蘖 枳殼 去穢 白芍藥 各等分

右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米

飲下 痢疾 心法附餘卷之六 三九

槐花散 振粹方 治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮 槐花 荊芥穗 各等分

右為末水煎空心熱服

地榆散 百一選方 治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢

暑痢

地榆 赤芍藥 黃連 青皮 去白

右等分為末每服三錢漿水調如無只以新水亦得若

血痢水煎

地榆散 治下血遠年不瘥及血痢

地榆 卷栢等分

右咬咀用水沙瓶煮數十沸通口服

藥皮湯 經驗方 治傷寒下痢亦治久血熱痢

藥皮 二兩 黃芩 二兩 黃連 一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服腹痛

加山梔子小便不利加赤茯苓阿膠煎服

椿皮丸 經驗方 治下痢清血腹中刺痛

用椿根白皮不拘多少為末米醋糊丸如梧桐子大空

心米飲下三四十丸

四物湯 保命集 治下痢純血

川芎 當歸 白芍 生薑

槐花 黃連 御米殼 等分

右剉水煎服

苦參丸 治血痢

用苦參不以多少炒焦為末滴水丸如梧子大每服五

十丸米飲下

治痢血方

昔曹曾公痢血百餘日國醫無能療者陳應之取鹽水

梅除核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞

相往肅梁公亦痢血應之曰此挾水穀當用三物散亦

數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉竈心土等分為末  
臘茶清調下食前服

治下痢純血 經鑿方

黃栢 蜜炙今香黃色一兩

右為末每服三錢空心溫漿水調下

一方 治血痢

用地錦草不以多少晒乾碾為細末每服二錢空心未

飲調下

一方 治腸風血痢

用鯽魚一箇破開去腸膽醃白礬二錢燒灰存性為末

痢疾

心法附餘卷之六

三

三

米飲調服

○已止數方治痢疾下血者之劑

地榆散 和濟方

治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿

血赤多白少或下鮮血裏急後重小便不利

地榆 炒

乾葛 各半斤 乾姜 炮二兩 當歸 去苗三兩

茯苓 去皮

赤芍藥 各六兩 甘草 炙四兩 罌粟殼 蜜炒二兩

右為末每服一錢用溫熱水調下不拘時服若下痢純

白及紫黑血并腸滑不禁者不可服之

地榆芍藥湯 按粹方

治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮 八兩

地榆 二兩

卷栢

芍藥 各三兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前通口服

膠湯 按粹方 治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黃連 炒二兩

梔子 五錢

阿膠 蛤粉炒 黃蘗 去皮炙

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服食前

大黃湯 按粹方 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜

無度久不愈者用此微利

大黃 一兩

右用好酒二鍾浸半日煎至一鍾去大黃將酒分二服

如未止再服以利為度復服芍藥湯和之痢止再服芍

藥黃芩湯以徹其毒也

痢疾

心法附餘卷之六

三

三

芍藥湯 按粹方

下血調氣洩而使膿血知氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

芍藥 一兩

當歸

黃連

黃芩 各半兩

肉桂 二錢半

檳榔

大黃 各三錢

甘草 炙

木香 各二錢

右咬咀每服半兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服如痢不

減漸加大黃如汗後膿毒加黃栢半兩

芍藥黃芩湯 按粹方

治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉

洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥 各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣通口服食前  
芍藥皮丸 核料方治便膿血

芍藥 黃蘗皮 等分

右為末醋糊丸如梧桐子大米飲送下五十九

專治赤痢 秘方

黃連 二兩 木香 甘草 各二錢

右咬咀水二鍾煎至一鍾去渣溫服食前一日服五

苓散三貼次日早服此藥即止如神

又方

用連白青韭一大握多要取汁和煮酒一盞溫飲之極

痢疾 心法附餘卷之六

驗又治婦人心痛有效散氣行血故也

解毒金花散 經驗方治下痢膿血熱毒

黃芩 白朮 赤茯苓 赤芍藥 各半

黃連 黃蘗 各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服食前知

腹痛加梔子仁二枚同煎

一方 治熱痢不止

用車前葉搗爛取汁一鍾入蜜一合煎服

黃連烏梅丸 聖惠方治濕熱痢不瘥

烏梅 炒 黃連 各四兩

右為末煉蜜丸梧子大每服二十九米飲下食前  
芍藥皮丸 子和方治一切濕熱惡痢頻併窘痛無問膿

血

芍藥 黃蘗 各一兩 當歸 黃連 各半兩

右為末水丸小豆大溫水下三四十九等服忌油膩生

冷一切熱物

○已上數方治濕熱傷血赤痢之劑

戊巳丸 和劑方治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹刺

痛

黃連 去鬚 吳茱萸 去梗 白芍藥 各二兩

痢疾 心法附餘卷之六

右為末麴糊丸梧子大每服三十九米飲空心下日三

服

升陽除濕防風湯 按粹方如大便閉或裏急後重數至圓

而不能便或少有白膿或少有血慎勿利之升舉其陽

則陰氣自降矣

蒼朮 四兩米泔水製 防風 三錢 白朮 二錢 茯苓 一錢

白芍藥 一錢

右咬咀每服一兩除蒼朮另作片子水一碗半煮至二

盞納諸藥同煎至一盞去渣稍熱空心食前服

升陽益胃湯 治脾虛濕勝陽氣下陷作痢 見內傷

胃風湯 治風入腸胃作痢或白或赤或豆汁見胃風  
錢氏白朮散 治氣血俱虛神弱之人或瀉或痢或吐

人參

白茯苓

白朮

木香

甘草

藿香 各一兩 乾姜 半兩

右為粗末每服五錢水一鍾煎七分食前溫服

一方 治白痢

酸石榴皮

半草果 一箇

陳皮 三片

烏梅 一箇

甘草 一寸

乾姜 一塊

右咬咀都作一服水二鍾煎至一鍾去渣食前溫服

一方 山藥剉如豆大一半瓦器內炒熟一半生用為細

痢疾

心法附錄卷之六

三五

新刊

末米飲調下

○已上數方治濕熱傷氣白痢之劑

噤口痢

石蓮肉

日乾

右為末每服二錢陳倉米調下便覺思食仍以日照東

方壁土炒真橘皮為末姜棗略煎佐之

一方 治噤口痢

用黃連半斤咬咀生薑四兩切作片與黃連同炒待姜  
焦黃色去姜只取黃連為細末同陳米飯一處搗爛丸  
如梧桐子大每服七八十九赤者陳米飲下白者陳皮

湯下赤白相參者陳米橘皮湯下

一方 用獨子肥皂一枚去核用鹽實其內火燒存性為  
細末先煮白米粥用少許入在粥內食之立効

一方 梨一枚去心入好蜜一匙煨過食之

○已上數方治噤口痢之劑

麴窮丸

治食積作痢

川芎

神麴

白朮

附子 各等分

右為細末麴糊丸梧子大每服三五十丸溫米飲下此  
藥亦治飧泄○廣按此治冷飲食作痢熱則開散之理

木香丸

治痢疾

痢疾

心法附錄卷之六

三六

新刊

木香 三錢

豆豉 一兩

洗淨

巴豆 四十九粒

去殼另研

右為末豆豉為丸棗豆大每服三丸紅痢甘草湯下白

痢乾姜湯下

木香不二丸

治痢疾或赤或白或赤白交雜

木香

不見火

肉豆蔻

煨過取

柯子

肉各二錢

巴豆 一兩去殼

淡豆豉末

藥一錢半

打糊

右為末淡豆豉末同麴打糊為丸如黃豆大小兒如棗  
豆大量大小虛實每服許只一丸切忌服二丸食前或  
臨卧冷湯下赤痢地榆湯下白痢乾姜湯下赤白交雜  
甘草湯下服此藥後多行三二次即住

○廣按此二方用已豆即通因通用之理然於傷冷食暴痢用之庶乎可也殊不知痢本因水穀停積濕而生孰濕熱為病但有傷氣傷血為白為赤之分終無寒冷之義經曰苦寒除濕熱用大黃以推蕩乃是正治也

聖餅子 治積滯作痢

黃丹 二錢 定粉 三錢 蜜佗僧 二錢 舶上硫黃 二錢 輕粉 少許

右為細末入白麪四錢滴水和高丸指尖大檢作餅子陰乾食前漿水磨化服之大便黑色為妙

蘇感丸 治冷積作痢

以蘇合香丸與感應丸二藥合勻如粟大每五丸淡姜湯空心下

蘇合香丸 見中風 感應丸 見傷食

○已上數方治積滯作痢之劑

治赤白痢

吳茱萸 揀淨 黃連 去鬚各等分

右為一處以好酒浸透取出各自揀焙或晒乾為末糊丸如梧桐子大赤痢用黃連丸三十粒甘草湯下白痢用茱萸丸三十粒乾姜湯下赤白痢各用十五粒相合

併甘草乾姜湯下

駐車丸 和劑方 治一切下痢無問冷熱

阿膠 搗碎 蛤粉 炒如珠子為末 黃連 去鬚 兩半 當歸 兩半 乾姜 炮一兩

右為末以阿膠膏丸如梧桐子每服三十丸食前米飲下

阿膠梅連丸 宣明方 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸証

金井阿膠 淨草灰炒透 赤茯苓 烏梅肉 炒 赤芍藥 黃柏 剉炒 黃連 去鬚 乾薑 炮

當歸 等分 右為細末入阿膠研勻水丸梧子大溫米飲下十丸食前連夜五六服小兒丸如菉豆大忌油膩脂肥諸物

三味黃丸 經方 止諸痢

黃連 八兩 枳殼 四兩 黃柏 四兩

右為細末麪糊為丸梧子大空心飲湯下二十丸如裏急後重加枳殼湯下

香連丸 治一切痢

黃連 五兩 粉草 一兩 木香 二兩 不見火

右先將黃連用蜜水略拌濕安在銚中重湯蒸之良久

取出晒乾再依上法蒸之得九蒸九曝九炒再晒十分乾與木香一處為末水糊丸梧子大每服五十九食前酒下或米飲下

又方 治一切痢

黃連 一兩 枳殼 甘草 炙 烏梅 各半兩

右咬咀每半兩水煎空心服忌魚猪肉油生冷菓子

遇仙立效散 治諸惡痢或赤或白或膿血相雜裏急後

重臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜無度或口噤不

食不問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

罌粟殼 去蒂蓋蜜炙 當歸 二兩 甘草

痢疾 心法附餘卷之六 三九 地榆 各一兩

赤芍藥 酸石榴皮 地榆 各一兩

右咬咀每服水一鍾半煎空心溫服忌生冷油膩之物

神效參香散 和劑方 治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積

而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下

紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻無問新久並能

治之 白扁豆 炒 人參 去芦 木香 各一兩 茯苓 去皮

肉豆蔻 煨各四兩 陳皮 去白 罌粟殼 去蒂各十二兩

右為末每服三大錢用溫米飲下不拘時服

水煮木香丸 和劑方 治一切下痢赤白膿血相雜裏急後

重

罌粟殼 去穢二兩八錢 青皮 去白二兩四錢 甘草 炙三兩

當歸 去芦 訶子 炮去核 木香 各六兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一鍾煎化至六

分空心或食前服

真人養臟湯 和劑方 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或

如膿血魚腦髓裏急後重臍腹疼痛如脫肛墜下酒毒

便血並治之

罌粟殼 去蒂蓋蜜炙 人參 去芦 當歸 去芦酒洗

肉桂 去皮 訶子 去核 木香 不見火 肉豆蔻 煨各二兩

痢疾 心法附餘卷之六 白芍藥 一兩 甘草 一兩八錢

右咬咀每服四錢水一鍾煎服臍寒者加附子

一方 治一切痢

罌粟殼 蜜製 黃蘗 炙 乾姜 當歸

枳殼 去白 甘草 炙各一錢

右開韭菜十數根水二鍾煎不拘時服

國腸湯 三因方 治冷熱不調下痢赤白

罌粟殼 去蒂蓋蜜三 白芍藥 各二兩 當歸

甘草 各一兩 陳皮 訶子 白姜 炮各二兩

人參 木香 各三錢

右吹咀每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

豆蔻固腸丸

御藥方

治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白

木香

厚朴姜製

赤石脂

乾姜

縮沙

肉豆蔻

各三兩

右為末麵糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

勝金丹

秘方

乾姜

黃蠟等分

右銀石器化蠟入姜末勻丸如芥子太每服七丸或二

七丸白痢酒下赤并花水下

又方

痢疾

心法附餘卷之六

聖

郭氏

烏梅

白梅陳久者

聖

郭氏

右件去梅核搗梅肉爛同乳香末少許丸梧子大以茶

末為衣每服二十九茶湯下食前

石榴皮散

經驗方

治暴瀉不止及痢赤白

用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下二錢

一方 治白膿痢

用白石脂為末醋糊丸如小豆大每服十丸空心米飲

送下日三服

秘方痢疾方

粟殼

去穢蜜陳皮去白

甘草

錢久五

乳香

沒藥各二錢

右吹咀水二鍾煎至一鍾去渣入乳沒食前服如白痢

熱服紅痢冷服如痢不止加青皮四錢煎

白朮安胃散

按粹方

治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘

痛日夜無度又治男子小腸氣痛婦人臍下虛冷并產

後見枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止

茯苓

去皮

白朮

車前子

各一兩

五味子

烏梅

各半兩

罌粟殼

蜜製

二兩

右吹咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

朴連湯

經驗方

治下痢久不瘥

痢疾

心法附餘卷之六

聖

郭氏

厚朴

姜製

黃連

各二錢

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

神効丸

一名當歸丸

治休息痢膿血不止疼痛困弱

當歸

烏梅肉

黃連

等分

右為細末以生蒜汁和衆手丸如梧子大焙乾每服三

十丸空心煎厚朴湯下加至五十丸一方加阿膠一方

煉蜜丸甚者鑠蠟丸

一方 止休息痢

縮砂為末空心米飲下一錢

木香散

本事方

治隔年痢不止并治血痢尤佳



木香	黃連	甘草
各半兩	各半兩	各一兩
生薑	同炒	
右為末入麝香少許每服二錢米飲下		
固腸丸	見婦人帶下類	即椿皮丸
白木黃芩湯	拔粹方	服前藥痢疾雖除更宜調和
白木	一兩	黃芩 七錢 甘草 三錢
右咬咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前		
機要白木芍藥湯	服藥痢疾雖除宜用此補脾胃又治	
老人奉養太過飲食傷脾時或瀉痢		
白芍藥	各一兩	其芍藥補脾炒用治後
新疾	心法附餘卷之六	聖
甘草	多半兩	
右剉每一兩水煎服		
白木黃耆湯	拔粹方	服前藥痢疾雖除更宜服此補養
白木	一兩	黃耆 七錢 甘草 三錢
右咬咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前		
○已上數方治赤白諸痢虛痢久痢之劑		
牛黃神金丸	宣明方	治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤
白諸色或渴否或小便澀否并小兒驚疳積熱瘰癧堅		
積腹滿硬痛作發往來亦能寬隔消食		
輕粉	粉霜	硃砂以上
		雄黃 研

硃砂	信砒	巴豆
三錢		去皮各錢
黃蠟		
右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃硃砂信砒再研		
下丹粉研勻別研巴豆爛去油與前藥研勻近火上炙		
控熟別炙蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新水下一		
丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調桂苓甘露散或		
益元散亦得	俱見中暑類	
調胃承氣湯		
小承氣湯		
大承氣湯	俱見傷寒	
三一承氣湯	心法附餘卷之六	聖
玄青丸	宣明方	治下痢熱惡頻併窘痛或久不愈諸藥不
能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行		
宜以此逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹脹		
療小兒驚疳積熱乳癖諸証泄瀉勿服		
黃連	黃蘗	大黃
黃蘗		甘草
芫花	醋拌炒	大戟 各五錢 牽牛 四兩 取青黛 一兩
輕粉	一錢	
右為末水丸小豆大初服十丸每服加十丸空心日午		
各一服以利為度後常服十五二十丸數日後得		

食以病未全除者再加取利後却常服以意消息病除為度隨証止之小兒丸如黍米大

○已上數方通因通用之劑

○廣按痢疾所因有二或因暑月煩渴縱食瓜果生冷內傷腸胃或因夜卧失被早起入水寒濕外襲肚腹二者皆令水穀不化鬱而生熱則為濕熱濕熱傷氣則成白痢濕熱傷血則成赤痢氣血俱傷則成赤白痢其証臍腹疼痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或赤白相雜或如豆汁或如魚腦或如屋溜水裏急後重頻欲登廁日夜無度不可遽用罌粟痢疾

心法附餘卷之六 聖 溫病四時

穀龍骨肉豆蔻訶子赤石脂單收滋病邪則淹纏而不已也其法痢疾初得一二日間元氣未虛以推逐為美失之於初五日以後脾胃已虛以消導升散為佳所用之藥不過辛苦寒涼之劑以開除濕熱鬱積行氣和血使氣血宣行而已病久挾虛又當以滋補氣血收澀滑脫甘溫辛熱之藥無之則萬舉萬全而無一失也矣 又嘗論之濕熱傷氣成白痢者宜調氣理濕為主而無清熱濕熱傷血成赤痢者宜涼血清熱為主而無理濕至於氣血俱傷成赤白痢者則相兼而治觀丹溪節齋之用藥可見矣

痢疾治例 出明醫雜著

王節齋曰痢是濕熱食積三者別赤白青黃黑五色以屬五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是下之下後未愈隨証調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃芩錢二 黃連錢一 白芍藥錢二 ○已上三味痢疾必用之藥

本香 枳殼錢半 檳榔錢半 炙甘草錢二分

痢疾 心法附餘卷之六 四六 溫病五運

若腹痛加當歸錢半 縮砂錢一 再加木香芍藥各五分

若後重加滑石錢半 再加枳殼檳榔各五分 芍藥生用再加五分

加黃芩條實者亦加五分

若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各一 初欲下之再加大黃錢五 無食積如山查子枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎桃仁錢半 初欲下之再加大黃錢五 若紅白相雜加當歸川芎桃仁錢半 以理血滑石陳皮

蒼朮錢半 以理氣有食積亦如山查子枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減芍連芍藥各一 加白朮一錢 黃耆茯苓陳皮各一 縮砂五分 去檳榔枳殼

再加炙乾姜分五

若紅痢久胃弱血虛或下後未愈減芩連各五分加當歸

川芎熟地黃阿膠珠陳皮各一錢白木半一錢

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澁短少加木通澤瀉

茯苓各一錢山梔子分五以分利之

若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花各一錢久不愈

減芩連各七錢去檳榔枳殼再加阿膠珠炒側柏葉各一錢

炒黑乾姜一錢白木半一錢陳皮一錢

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼用條

實黃芩加升麻錢一以升提之

痢疾心法附餘卷之六 胃七 胃五

若嘔吐食不得下加軟石膏一錢陳皮一錢山梔仁分五

入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白朮陳皮黃

連黃芩阿膠之類以補之而痢自止

有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾姜縮砂

厚朴肉桂之類

若得痢而誤服溫熱止澁之藥則雖稍可亦宜用前法

以下之下後方調之

若得痢使用前正法下之而未愈又用前調理法治之

而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補寒溫二條

擇用更加龍骨赤石脂嬰粟殼烏梅肉等收澁之藥

痢疾心法附餘卷之六 胃六

心法附餘卷之六終

濕門

痞二十

丹溪心法

○痞者有食積無濕 東垣有法有方 心下痞須用枳

實炒黃連 如稟受克實面蒼骨露氣實之人而心下痞

者宜枳實黃連青皮陳皮枳殼 如稟受素弱轉運不調

痞悶 心法附餘卷之七

飲食不化而心下痞者宜白朮山查麴藥陳皮 如肥人

心下痞者乃是濕痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石如瘦人

心下痞者乃是鬱熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻 如

食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草荳蔻吳茱萸砂仁

痞挾血成窠囊用桃仁紅花香附大黃之類

入方

吳茱萸

三兩湯浸

黃連

八兩共

粥糊為丸每服五七十丸白朮陳皮湯下

玉液丸

軟石膏

不拘多少

又云火燉紅出火毒

右為末醋糊丸如菴豆大服之專能瀉胃火併治食積

痰火

附脉理 脉訣舉要曰胃痞脉滑為有痰結弦伏亦痞滿則氣劣

附諸方

枳木丸 脾胃論治痞消食強胃

枳實

去穢炒

白朮

去穢

右同為極細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每五十

丸多用白湯下無時白朮者本意不取其食速化但令

人胃氣強不復傷也

痞悶

心法附餘卷之七

橘皮枳木丸 脾胃論治老幼元氣虛弱飲食不消臍腹不

調心下痞悶

枳實

去穢

橘皮

已上各

白朮

二兩

右件為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸

溫水送下食遠夫內傷用藥之大法所貴服之強人胃

氣令胃氣益厚雖猛食多食重食而不傷此能用食藥

者也此藥久入益胃氣令不復致傷也

○廣按上古用一藥治一病至漢張仲景先生用羣藥

治一病雖然用羣藥治一病亦不過三五味而已其

間君臣佐使分兩不同主治引經秩然有序非若後

世之効驗者一方用至二三十味尤未已也丹溪云  
子每效仲景立方效東垣用藥庶乎品味少而藥力  
專精也此枳木丸乃易老張先生之所作觀其用白  
木二兩以補脾用枳實一兩以消痞至東垣李先生  
加陳皮一兩以和胃一補一消簡而又當真得立方  
之指趣也

橘連枳木丸 古方補脾和胃瀉火消痰

白木 三兩 枳實 一兩 去陳皮 一兩 黃連 一兩 酒

右為末荷葉煮湯打米糊為丸如梧桐子大每服五十  
丸食後服

○廣按易老張先生定枳木丸方用白木二兩以補脾

枳實一兩以消痞取其補多而消少至東垣先生如  
橘皮一兩以和胃名橘皮枳木丸則補消相半也予  
今用白木三兩枳實一兩陳皮一兩黃連一兩名橘  
連枳木丸仍補多消少又無清熱也丹溪云心下痞  
須用枳實炒黃連是矣

平補枳木丸 古方調中補氣血消痞清熱

白木 三兩 白芍藥 一兩 酒浸炒 陳皮 枳實 去穢

黃連 各一兩 人參 木香 各半

右為細末荷葉煮濃湯打米糊為丸如梧桐子大每五

十九漸加至六七十丸食遠米湯下

○廣按此方用白木二兩以補脾氣為君用白芍藥一  
兩五錢以補脾血為臣用陳皮一兩以和胃枳實一兩以  
消痞炒黃連一兩以清熱為佐用人參半兩以補元氣  
木香半兩以調諸氣為使如此平補氣血均去痰火  
無通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣  
枳實消痞丸 治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶倦開胃  
進食

枳實 黃連 乾生薑 二錢 半夏 三錢

厚朴 四錢 人參 三錢 甘草 二錢 白木 三錢

茯苓 麥牙 各二錢

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大三十五丸溫水下

消痞丸 後粹方 治一切心下痞悶及積年久不愈

黃連 六錢 神麴 五錢 黃芩 六錢 姜黃 六錢

白木 各一兩 人參 四錢 甘草 一錢 縮砂仁 二錢

橘皮 四錢 乾生薑 二錢 枳實 五錢 猪苓 二錢

一方加澤瀉厚朴 各三錢 半夏 五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十丸

至百丸白湯下

黃連消痞丸 後粹方 同前

黃連兩半

黃芩兩半

枳實一錢

乾生薑一錢

茯苓五錢

白朮錢五

甘草錢五

片姜黃一錢

陳皮七錢

澤瀉一錢

半夏錢三

猪苓五錢

砂仁三錢

厚朴錢五

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服一百丸溫白湯送下

瓜蒌實九

清生方

治胃痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蒌實別研

枳殼錢五

半夏錢七

桔梗一兩

右為末姜汁打糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後

淡姜湯下

○廣按此方瓜蒌仁潤肺降痰枳殼破滯氣半夏豁痰

痞悶

心法附餘卷之七

五

新天附

燥濕桔梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因

火動加黃連尤妙丹溪云胃中痞須用枳實炒黃連

是也

## 泄瀉 二十一

丹溪心法

○泄瀉有濕 火 氣虛 痰積 食積 濕用四苓散

加蒼朮甚者蒼白二朮同加炒用燥濕并滲泄 火用四

苓散加木通黃芩伐火利小水 痰積宜豁之用海粉

儼黃芩神麴糊丸服之 在上者用吐提 在下陷者

升提之用升麻防風 氣虛用人參白朮炒芍藥升麻

食積二陳湯加澤瀉蒼朮白朮山查神麴川芎或吞保和

丸 瀉水多者仍用五苓散 久病大腸氣泄用熟地黃

半兩炒白芍知母各三錢升麻乾姜各二錢炙甘草一錢

為末粥丸服之仍用艾炷如麥粒於百會灸三壯 脾

瀉當補脾氣健運復常用炒白朮四兩炒神麴三兩炒芍

藥三兩半冬月及春初用肉蔻代之或散或湯作餅子充

佳 食積作瀉宜再下之神麴大黃作丸子服 脾泄已

久大腸不禁此脾已脫宜急澀之以赤石脂肉豆蔻乾姜

之類

泄瀉

心法附餘卷之七

六

新天附

戴云凡瀉水腹不痛者是濕飲食入胃不住或完谷不

化者是氣虛腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣是火或瀉

時或不瀉時或多或少是痰積腹痛甚而瀉瀉後痛減

者是食積

又方

一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄

黃芩炒半兩

白朮炒二兩

白芍酒拌炒半兩

半夏泡各半兩

神麴炒

山查炒各一兩半

右為末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白湯下

治洞泄

炒白木 三兩 炒芍藥 二兩 炒陳皮 一兩 防風 一兩  
久瀉加升麻 六錢

右剉分八貼水煎或丸服

止瀉方薑麴丸

隔年陳麥麴作麴 二兩 炒又 云六兩

茴香 五錢

生薑 二兩 又 云一兩

右為末或丸每服五七錢白湯下

又方

肉豆蔻 五兩 滑石 夏二兩 半秋二兩 春冬一兩 二錢半

右為末飯丸或水調服

泄瀉

心法附餘卷之七

七

東垣

青六丸 去三焦濕熱泄瀉多與清化丸他丸同行并不

單用無治產後腹痛并自利者以補脾補血藥送之

亦治血痢甚効

六一散 一料 紅麴 炒半兩

右為末陳倉米飯丸梧子大每五七十丸白湯下 又

加五靈脂一兩名靈脂丸能行血

又方 治泄瀉或吐嘔

右以六一散生姜汁湯調服

五苓散

六一散

俱見濕熱

附脉理

脉訣要曰夏月泄瀉脉應暑濕洪而數澀脉必虛極治  
暑濕瀉分利小便虛脫固腸固有不痊

附諸方

六和湯 治脾胃不調氣不升降嘔吐或致泄瀉寒熱交

作小便赤澀

加味五苓散 治伏暑發熱及胃濕泄瀉或煩渴小便不

利 並見中暑

清苓湯 治感暑夾食泄瀉煩渴即平胃散五苓散相合

蒼朮 八分 陳皮 八分 厚朴 姜製 七分 甘草 三分

白朮 一錢 茯苓 八分 猪苓 八分 澤瀉 十分

泄瀉

心法附餘卷之七

八

桂 五分

右剉水煎入鹽少許 如作末藥湯服亦可

來復丹 治伏暑泄瀉 見中暑

軟紅丸 聖惠方 治大人小兒冷熱不調吐逆不定霍亂煩

燥吐瀉不止其効如神

明礬 硃砂 研各 乾胭脂 錢二 巴豆 去油

右研勻溶蠟二錢入油七點旋丸大人菴豆大小兒麻

子大每服一丸濃煎槐花甘草湯冷下食前一服定

○已上數方治傷暑泄瀉之劑

藿香正氣散

治感濕泄瀉

見冒寒

戊己丸 治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀不化宜升陽除濕易送下

白朮芍藥湯 治太陰脾經受濕水泄注下體重腹滿困

弱無力不欲飲食暴洩無數水穀不化 俱見痢類

升陽除濕湯 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃色四肢困弱

升麻 柴胡 防風 神麴

澤瀉 猪苓 各半兩 蒼朮 一兩 陳皮

甘草 大麥芽 各三錢

右作十服水煎飯後熱服脾胃寒腸鳴加益智仁半夏

各半兩姜棗煎非腸鳴不用

○已上數方治感濕脾濕泄瀉之劑

升麻湯 治一日大便三四次澹而不多有時瀉腹

中鳴小便黃

黃芪 三錢 甘草 二錢 升麻 六分 柴胡 三分

橘皮 三分 益智 當歸身 各三分 紅花 少許

右咬咀分作二服每服水二盞煎至一盞去渣食前溫

服

錢氏白朮散 治脾胃氣虛或吐或瀉 見痢類

蒼朮白朮散 治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉

和平散 和脾胃止泄瀉 並見調補脾胃

益胃湯 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰

燥熱短氣口不知味腸鳴大便微澹黃色身體昏悶口

乾不喜飲冷

黃芪 甘草 半夏 各二分 黃芩

柴胡 人參 白朮 益智 各三分

當歸稍 升麻 各半錢 陳皮 半錢 蒼朮 一錢半

右作一服水盞半煎八分食前通口服

○已上數方治脾胃氣虛泄瀉之劑

理中湯 治臟腑停寒泄瀉不止 見中寒

八味湯 治內寒泄瀉惡食

吳茱萸 炮七次 乾姜 二兩 陳皮 木香

肉桂 丁香 人參 當歸 洗焙各

右剉每四錢水一盞煎七分溫服

大藿香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮

痛如泄瀉不已最能取効

藿香葉 洗去土 陳皮 去白 厚朴 姜汁

良姜 炒 大麥蘖 神麴 炒 訶子 煨去

青皮 炒 木香 人參 去芦 肉豆蔻 炒

白茯苓 去皮 甘草 炒各 白乾姜 炮半



為末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水用水一大盞煨生姜半塊鹽一捻煎服 水泄滑泄腸風臟毒陳米飲入鹽熱調下 赤白痢甘草黑豆湯下 脾胃虛冷宿滯酒食痰風作暈入鹽少許嚼姜棗湯熱服胃氣欬逆生姜自然汁一呷入鹽點服此藥大能消食順氣利膈開胃

養胃湯 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脹痛腸鳴泄瀉見脾胃

調中散 治虛寒停食嘔吐腸鳴泄瀉

藿香葉 砂仁 蓬朮 乾姜炮

泄瀉 心法附餘卷之七 肉桂 去粗皮 茴香炒 草果 麥芽炒

益智仁 橘紅各一分 蒼朮 神麴炒

桔梗 各一錢半 甘草 炙三分

右用水二盞生姜三片棗一箇煎至一盞去渣入鹽少許溫服

海藏神應丸 治因一切冷物冷水及童乳酪水所傷腹痛腸鳴泄瀉米穀不化 見宿食類

○已上數方治脾胃虛寒食積泄瀉之劑

香連丸 治熱瀉糞色赤黃肛門焦痛糞出穀道猶如湯澆頻渴小便不利宜五苓散吞此丸 見痢類

酒蒸黃連丸 治傷於酒每晨起必瀉宜生姜理中湯加乾葛吞此丸

黃連 十斤 好酒二升 浸以瓦器

右為末滴水丸梧子大每五十九食前白湯下

神聖香姜散 治晨泄

宣黃連 四兩 生薑 四兩 切

右同一處淹一宿銀石器內同炒姜赤黃色為度去姜不用將黃連為末每服三錢茶清調下

○已上數方治脾胃實熱酒積泄瀉之劑

五味子散 有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無效此名

脾腎泄宜服此藥或四苓散送下二神丸或椒附丸

五味子 二兩 吳茱萸 半兩 細粒綠色者

右二味炒香熟為細末每服二錢陳米飲下

○廣按腎司閉藏今縱慾致虛而腎失職故有此病也

四苓散 五苓散去桂是 方見濕熱

二神丸

破故紙 炒 肉豆蔻 二兩 生

右為末以大肥棗四十九箇生姜四兩切同煮棗爛去姜取棗肉研膏入藥和丸梧子大每五十九鹽湯下

椒附丸 泄瀉久重其人甚虛

<p>金鎖正元丹 治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛</p>	<p>為末和麵作滑拙服亦妙</p>	<p>末作一服空心陳米飲調下或單用豆蔻紙裹煨去油</p>	<p>用肉豆蔻一箇剉碎入乳香少許麵裹煨熟去麵研為</p>	<p>一方 治泄瀉不止</p>	<p>右為細末陳米飯丸每服五十丸空心米飲下</p>	<p>鹿茸<small>五錢酒浸炙</small> 乳香<small>一錢</small> 肉豆蔻<small>一兩每箇作兩片入乳香在內麩裹煨</small></p>	<p>香茸丸 治日久冷瀉</p>	<p>以實肝而止瀉也</p>	<p>經正虛邪盛未能尅土亦作泄瀉此當歸厚朴湯所</p>	<p>肝腎氣虛則閉束失職故泄瀉也又肝者脾之賊肝</p>	<p>為門戶約束之具肝腎氣實則能閉能束故不泄瀉</p>	<p>何也蓋腎者所處在下大小二便之門戶而肝者又</p>	<p>○廣按經曰腎司閉藏肝司疎泄肝腎氣虛為病泄瀉</p>	<p>右對每三錢水煎食前服</p>	<p>當歸<small>炒</small> 厚朴<small>製各二兩</small> 官桂<small>三兩</small> 良姜<small>五兩</small></p>	<p>當歸厚朴湯 治肝經受寒面色青慘厥而泄利</p>	<p>右為末酒糊丸每六十丸空心米飲下</p>	<p>附子<small>炒五錢</small> 鹿茸<small>酒蒸焙三錢</small></p>	<p>椒紅<small>炒五錢</small> 桑螵蛸<small>炙三錢</small> 龍骨<small>三錢</small> 山茱萸<small>肉兩</small></p>
-------------------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

<p>白茯苓<small>去皮</small> 附子<small>炮去皮臍</small> 人參 木香<small>紙裹</small></p>	<p>四柱散<small>和劑方</small> 治元臟氣虛真陽耗散臍腹冷痛泄瀉不止</p>	<p>右為末醋糊丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下</p>	<p>麥蘗<small>炒</small> 附子<small>炮去皮臍各半兩</small></p>	<p>革撥<small>半兩</small> 川厚朴<small>姜製</small> 川白姜<small>炮各一兩神麩炒</small></p>	<p>白木 赤石脂 肉豆蔻<small>麩裹煨各一兩</small></p>	<p>補脾丸 百一選方 治滑泄不禁</p>	<p>右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣通口服</p>	<p>肉豆蔻<small>麩裹煨各等分</small></p>	<p>茯苓<small>去皮</small> 木香 藿香<small>去土</small> 訶子<small>去核</small></p>	<p>人參<small>去芦</small> 白木 乾姜<small>炮</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p>止瀉方</p>	<p>右咬咀每服三錢姜棗煎服手足冷者加乾姜</p>	<p>川厚朴<small>製兩</small> 蒼朮<small>炮</small> 茯苓<small>各一兩</small> 木香<small>半兩</small> 甘草<small>四錢</small></p>	<p>肉豆蔻 訶子<small>炮</small> 縮砂 陳皮</p>	<p>實腸散<small>直指方</small> 治泄瀉不止</p>	<p>○已上數方治脾腎肝虛泄瀉之劑</p>	<p>冷之證並治之 凡要遺類</p>
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------

一方加肉豆蔻訶子名六柱散

右等分咬咀每服四錢水一盞姜五片鹽少許煎七分  
空心溫服

麴蘗丸 治臟腑受風濕泄瀉不止 見痢類

肉豆蔻散 和劑方 治脾胃虛弱腹脹滿水穀不消臟腑

滑泄

蒼朮 米泔水浸

乾姜 炮

肉豆蔻 麴蘗

厚朴 去皮

甘草 炙

陳皮 去白

茴香 炒

肉桂 去皮

川烏 皮去

訶子 各二

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎八分溫服

泄瀉

九法附錄卷之七

主

厚腸丸 百一選方 治泄瀉不止

白龍骨

乾姜 炮

附子 炮去

厚朴 姜製

訶子 炮去核

肉豆蔻 麴蘗

陳皮 各等分

右為末酒糊丸如梧子每服五十丸米飲下

下

肉豆蔻 麴蘗

木香 不見火

白茯苓 片皮

乾姜 炮

肉桂 各二

附子 炮去

丁香 不見火

右為末姜汁麵糊丸如梧子大每服五十丸米飲下

訶梨勒丸 濟生方

治大腸虛冷泄瀉不止脇腹引痛飲食

不化

訶梨勒丸 附子 炮

肉豆蔻 麴蘗

吳茱萸 去梗

龍骨 生用

草撥

白茯苓 去皮

木香 各半兩

右為末姜汁煮糊丸如梧

禹餘糧丸 濟生方

治腸胃虛寒骨泄不禁

禹餘糧石 煨赤石脂 煨

龍骨

草撥

訶子 麴蘗

乾姜 炮

肉豆蔻 麴蘗

附子 炮去

右為細末醋糊丸如梧

飲下

○廣按已上諸方皆是止瀉之劑蓋因久瀉腸胃虛脫

泄瀉

心法附錄卷之七

十六

不得已而用之若夫新泄瀉不可使用止瀉邪得補

而愈盛惟當以分利小便導去濕氣為上又論治泄

瀉用藥不可太苦太甘蓋太苦則傷脾太甘則生濕

惟當以淡劑利數為最

○已上數方治腸胃虛脫滑泄不禁之劑

廣按泄瀉之証雖分濕火寒虛痰食六者之殊必以

滲濕燥脾為主而隨証加藥焉濕則導之火則清之

寒則溫之虛則補之痰則豁之食則消之是其治也

雖然六証既明而三虛不可不察三虛者何脾虛腎

虛肝虛也脾虛者飲食所傷也腎虛色慾所傷也肝

虛者忿怒所傷也飲食傷脾不能運化色慾傷腎不能閉藏忿怒傷肝木邪尅土皆令泄瀉然腎泄肝泄間必有之而脾泄恒多爾蓋人終日飲食一或有傷脾胃便致泄瀉也必矣又嘗論之泄瀉痢瘡同乎一源多由暑月脾胃氣虛飲食傷積所致飲食傷積便作則為泄瀉為輕飲食停積既久則為瘡痢為重而瘡與痢又有分別飲食為痰充乎胸脇則為瘡疾飲食為積膠乎腸胃則為痢疾古人有言曰無痰不是瘡無積不是痢良有以也今之醫者不能究病之源而徒執古人之方以偏試之欲其病愈也胡可得哉

泄瀉治例

心法附餘卷之七  
出明醫雜著

王節齋曰泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收澀之

主方

白朮二錢

白茯苓

白芍藥

炒各一錢半  
以上三味泄瀉必用之藥

陳皮一錢

炙甘草

五分

若傷食泄黃或食積加神曲大麥芽山查子各一錢  
炒黃連七分消之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實木香各五分

若小便赤澀短少加澤瀉猪苓木通各一錢以分利之夏

月加茵陳七分炒山梔子四分

若口渴引飲加乾葛一錢人參麥門冬各一錢升麻滑石各四分烏梅肉二箇

若夏秋之間濕熱大行暴注水泄加炒黃連蒼朮澤瀉各一錢升麻木通各五分發熱燥渴加乾葛石膏各一錢

疸小便黃赤加茵陳一錢山梔木通各五分

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連茵陳乾葛各一錢

木香五分神麴麥芽各八分

若寒月瀉瀉清冷腹痛或傷生冷飲食加神麴麥芽炙乾姜各一錢宿砂益智木香各七分

乾姜各一錢宿砂益智木香各七分

若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不效宜加人參黃耆各一錢以補中氣升麻柴胡各四分以升提之再加羌活防風藁本白芷等風藥各四分助風以平之更加炙乾姜五分以固之

乾姜五分以固之

若久泄脾胃虛弱食少難化加炙黃耆人參各一錢神麴麥芽各一錢木香煨過乾姜各五分

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻一錢訶子皮赤石脂各一錢煨木香炙乾姜各五分

丹溪心法附餘卷之七終

休寧東山古庵方

廣約之類

# 濕熱門

廣按濕熱痰熱風熱所因不同為病亦異濕熱者因濕而生熱也痰熱者因痰而生熱也風熱者因火而生風風則兼乎熱也火性炎上凡頭目腫痛眩暈眼昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣齒腫之類皆風熱之所為也水性潤下凡泄瀉下痢水腫鼓脹遺精白濁疝痛腰痛脚氣之類皆濕熱之所為也痰生於脾土居中央凡咽痛喉閉膈噎胸痞痞癰顛狂驚悸怔忡健忘恍惚之類皆痰熱之所為也經曰治病必求其本此風熱痰熱濕熱遇病之根本也

## 吞酸

二十二 附噯氣

### 丹溪心法

○吞酸者濕熱鬱積於肝而出伏於脾胃之間必用糯食蔬菜自養宜用炒吳茱萸順其性而折之此反佐之法必以炒黃連為君二陳湯加茱萸黃連各炒隨時令送

其佐使蒼朮茯苓為輔佐冬月倍茱萸夏月倍黃連湯浸炊餅丸如小丸吞之仍教以糯食蔬菜自養并戒忿怒即安

戴云濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易為酸也

### 入方

茱萸一兩去枝梗煎少時浸半日曬乾 陳皮一兩 蒼朮一兩米泔浸

黃連炒去上秤 黃芩一兩炒

或加桔梗一兩茯苓一兩

右為末神麴糊丸菜豆大每服二三十丸時時津液下

### 食後服

吞酸

心法附餘卷之八

### 黃連清化丸

黃連一兩 吳茱萸浸炒 桃仁二十四箇研 陳皮半兩

半夏一兩半

右為末神麴糊丸菜豆大每服百丸姜湯下

參芩丸 治濕而帶氣者濕熱甚者用之為向導上可治

### 吞酸下可治自利

六一散一料 吳茱萸一兩製

右為末飯丸 六一散 見濕熱

面令丸 瀉肝火行濕為之反佐開痞結治肝邪可助補

脾藥

黃連 六兩 吳茱萸 二兩

右為末粥丸 一方名左金丸治肝火茱萸或半兩水丸白湯下

附諸賢論

或問丹溪曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒何也答曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有積之於久不能自涌而出伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱

永酸 心法附餘卷之八

愈鬱而酸味刺心肌表溫暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也

附諸方

麴木丸 治中脘宿食留飲酸蜇心痛或口吐清水

神麴 炒三兩 蒼朮 一兩半 陳皮 一兩

右為末生薑汁煮神麴為丸每七十丸姜湯下

加味平胃散 治吞酸或宿食不化

蒼朮 一錢 陳皮 八分 厚朴 七分 甘草 二分

神麴 炒七分 麥芽 炒上

右吹咀每服五錢生薑三片水煎服

透隔湯 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噫

氣吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎飲食不下

木香 白豆蔻 縮砂仁 檳榔

枳殼 厚朴 半夏 青皮

陳皮 甘草 大黃 朴硝

右各等分每服一兩水二盞生薑三片棗子一枚煎至一盞去渣通口服食後

丹溪心法

○愛氣 胃中有火有痰

永酸 心法附餘卷之八

入方

南星 五錢 半夏 五錢 軟石膏 六錢 香附 一兩

一本有炒梔子 炒五錢

右作丸或作湯服之蓋胃中有鬱火膈上有稠痰故也

○軟石膏丸亦可服 本方痰條下云噫氣吞酸此係

食鬱有熱火氣衝上黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱

多再加青黛

疸 二十三

丹溪心法

○痘不用分其五同是濕熱如蠶繭相似 輕者小温中丸 重者大温中丸熱多加苓連 濕多者茵陳五苓散 加食積藥 濕熱因倒胃氣服下藥大便利者參芪加 山梔茵陳甘草	
戴云五痘者周身皮膚并眼如梔子水染因食積黃者 量人虛實下其食積其餘但利小便為先小便利白其 黃則自退矣	
入方	
小温中丸 治痘又能去積食	蒼朮 中 川芎 中 香附上 神廻下
針砂 醋炒紅下	黃連 中 心法附餘卷之八 五
春加芩夏加苦參或黃連冬加吳茱萸或乾姜	
大温中丸 治食積與黃腫又可借為制肝燥脾之用脾 虛者以參朮芍藥陳皮甘草作湯使	
陳皮	蒼朮 厚朴 三稜
蓬朮	青皮 各五兩 香附 一斤 甘草 二兩
針砂 二兩 醋炒紅	
右為末醋糊丸空心姜鹽湯下午後飯食可酒下忌犬 肉果菜	
附脉理	

附訣舉要曰五痘實熱脉必洪數其或微瀼証屬虛弱 附諸方	
茵陳五苓散	
右用五苓散五分茵陳蒿末十分和勻先食飯後服方 寸匕日三服○五苓散 見濕熱	
當歸白朮湯 三因方 治酒疸發黃結聚飲癖心胸堅滿不 進飲食小便黃赤其脉弦瀼	
茯苓 三兩 當歸 一兩 白朮 三兩 黃芩 一兩	半夏 二兩 湯 甘草 炙 枳實 炒去白 七次
茵陳 一兩 杏仁 炒 前胡 各二兩	黃連 中 心法附餘卷之八 六
右咬咀每服四錢水一盞煎七分食後温服	
加減五苓散 濟生方 治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小 便不利	
茵陳	赤茯苓 去皮 猪苓 去皮 白朮
澤瀉 各等分	
右咬咀每服四錢水一盞煎八分温服不拘時	
黃耆散 濟生方 治黃汗	
黃耆 去皮 赤芍藥 茵陳 各二兩 石膏 四兩	麥門冬 去心 豆豉 各二兩 甘草 炙
右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分温服不拘時	

茵陳散 濟生方 治黃疸

瓜蒌 一箇 石膏 一兩 甘草 炙半 茵陳

木通 梔子仁 各一兩 大黃 炒半

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服

葛根湯 濟生方 治酒疸

枳實 去白 梔子仁 各一兩 豆豉 各一兩 甘草 炙半

葛根 二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

秦艽飲子 濟生方 治五疸口淡咽乾發熱微寒

秦艽 去芦 當歸 酒浸 芍藥 白朮

黃疸 心法附餘卷之八 七 三百一十一 救

官桂 去皮 陳皮 茯苓 去皮 熟地黃 酒蒸

半夏 湯炮 七次 小草 係速 川芎 各一兩 甘草 炙半

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

茵陳湯 濟生方 治時行瘧熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳 二兩 大黃 一兩 梔子仁 三錢

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

搗藥瓜蒂散 按粹方 治黃疸遍身如金色累效

瓜蒂 二錢 母丁香 一錢 黍米 四十粒 赤小豆 錢半

右先將瓜蒂為末次入三味再碾至夜令病人先含水一口次將藥半字搐入鼻內待下或吐去水便睡至半

夜或次日取下黃水直候利水止即服黃連散或茵陳

五苓散病輕者五日病重者半月見效

黃連散 按粹方 治黃疸大小便秘澀臟腑壅熱

黃連 一兩 川大黃 二兩 炒 黃芩 去黑心

炙甘草 各一兩

右為極細末每服二錢食後溫水調下日三服

必效散 直指方 黃疸通用

葶藶 隔紙炒 龍膽草 山梔子 茵陳

黃芩

右等分每服一兩水一盞煎至一盞溫服不拘時

黃疸 心法附餘卷之八 八 三百一十二 救

一清飲 危氏方 治疸証發熱諸熱通用

柴胡 三兩 赤茯苓 二兩 桑白皮 炒 川芎 各一兩

甘草 炙半兩

每服一兩姜三片棗一枚水二盞煎至一盞食前服

山茵陳散 直指方

梔子 茵陳 各一兩 枳實 七箇 茯苓

每服一兩水二盞姜三片煎至一盞食前通口服

茯苓參濕湯 治黃疸寒熱嘔吐渴飲冷水身體面目俱

黃小便不利



白茯苓五分茵陳六分猪苓澤瀉各三分

黃連黃芩梔子漢防已

白朮蒼朮陳皮青皮

枳實各三分

右每服水二鍾煎至一鍾去粗食前溫服

一方治黃腫及積滯浮腫

皂礬半斤醋膠二斤煮平胃散四兩

右用棗搗爛入礬丸如梧桐子大以平胃散為衣每服

三五十丸臨卧溫酒送下

一方治遍身黃不浮腫手足怠倦

黃疸心法附餘卷之六針砂水漂淨陳皮去白炒蒼朮米泔浸去

青皮去白炒百草霜炒三稜煨莪朮煨各

右為末麵糊丸如梧桐子大每服四十九丸米湯溫酒下

一方

右用絲瓜全者燒灰為末如病因麪傷麪湯下因酒傷

用酒調下數服

## 水腫 一十四

丹溪心法

水腫因脾虛不能製水水漬妄行當以參朮補脾使脾

氣得實則自健運自能升降運動其樞機則水自行非五

苓神佑之行水也宜補中行濕利小便切不可下用二陳

湯加白朮人參蒼朮為主佐以黃芩麥門冬炒梔子制肝

木若腹脹少佐以厚朴氣不運加水香木通氣若陷

下加升麻柴胡提之隨病加減必瀉補中行濕二陳治濕

加升提之藥能使大便潤而小便長產後必須大補血

氣為主少佐蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾若壅

滿用半夏陳皮香附監之有熱當清肺金麥門冬黃芩

之屬一方用山梔子去皮取仁炒槌碎米湯送下一抄

若胃熱病在上者帶皮用治熱水腫山梔子五錢木香

水腫心法附餘卷之八一錢半白朮二錢半咀取急流順水煎服水脹用大

葉香薷濃煎汁成膏丸去暑利小水大戰為末棗肉丸

十丸泄小水劫快實者可用

戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者是也以健脾滲水

利小便進飲食元氣實者可下

附脉理

脉訣舉要曰水腫之證有陰有陽察脉觀色問証須詳陰

脉沉遲其色青白不渴而瀉小便清澁脉或沉數色赤

而黃燥蠱赤溺無渴為陽

附諸方

麻黃甘草湯 濟生方 治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃 去根節 四兩 甘草 二兩

右咬咀每服三錢水一盞煮麻黃再沸後入甘草煎七分溫服慎冒風老人虛人不可輕用

五苓散 方見濕熱 加木香茵陳 治水腫從腰以下俱腫

以此湯利小便仲景曰腰以下腫宜利小便腰以上腫宜發汗也

五皮散 和清方 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛

浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

五加皮 下 地骨皮 中 生薑 下 大腹皮 中

水腫 心法附餘卷之八 土

茯苓皮 上

右咬咀每服二錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷油膩堅硬等物澹寮去五加皮地骨皮用陳皮桑

白皮

葶藶木香散 御藥院方 治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大

便滑

葶藶 二錢半 炒香 木香 五分 茯苓 去皮 二錢半 肉桂 二錢

滑石 三兩 猪苓 去皮 二錢半 澤瀉 木通

甘草 各半兩 白木 一兩

右為末每服二錢白湯下不拘時候

三因當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝心火心火不

能養脾土脾土不能制水水氣盈溢氣脈閉塞滲透經

絡發為浮腫之証心腹堅脹喘滿不安

木香 煨 赤茯苓 當歸洗 桂心

木通 赤芍藥 牡丹皮 檳榔

陳皮 白木 各等分

右咬咀每服三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分

溫服

加味腎氣丸 濟生方 治脾腎虛損腰重脚腫小便不利

白茯苓 去皮 一兩 附子 炮 二兩 澤瀉 官桂 不見火

水腫 心法附餘卷之八 三

川牛膝 去芦 一兩 車前子 酒蒸 山藥炒 山茱萸 取肉

牡丹皮 去木 各一兩 熟地黃 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

實脾散 濟生方 治陰水發腫用此先實脾土

厚朴 去皮 炒 白朮 木瓜 去穢 木香 不見火

乾姜 炮 各一兩 草果仁 大腹子 各半 白茯苓 去皮 一兩

甘草 炙 半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎不拘時服

白朮木香散 宣明方 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧

不能食小便秘者

白木	猪苓 去皮	甘草	澤瀉
赤茯苓 <small>各半</small>	木香	檳榔 <small>各二錢</small>	陳皮 <small>一兩去白</small>
官桂 <small>二錢</small>	滑石 <small>三兩</small>		
右以咀咀每服一兩半生薑三片水二盞煎至一盞去渣			
通口服			
聖靈丹 <small>按粹方</small>	治脾肺有濕喘滿風盛小便赤澀		
苦葶藶 <small>炒四兩</small>	防己 <small>二錢</small>	赤茯苓 <small>錢半</small>	
木香	檳榔	木通	人參 <small>錢半</small>
右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸桑皮湯下			
導氣通經湯 <small>按粹方</small>	治脾氣有餘及氣不宣通面目手足		
浮腫			
陳皮 <small>去白</small>	桑白皮	白木	木香
茯苓 <small>去皮各一兩</small>			
右以咀咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時			
沉香海金沙丸 <small>按粹方</small>	治一切積聚脾濕腫脹肚大青筋		
羸瘦惡証			
沉香 <small>二錢</small>	海金沙 <small>一錢</small>	輕粉 <small>一錢</small>	黑丑末 <small>一兩</small>
右用獨蒜泥丸每服二十九煎灯心通草湯下空心量			
大小虛實			

續隨子丸 <small>按粹方</small>	治通身虛腫喘悶不快
人參	防己
赤茯苓 <small>錢半</small>	木香
檳榔	續隨子
海金沙 <small>五錢</small>	
苦葶藶 <small>四兩</small>	
右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸桑皮湯下	
退腫榻氣散 <small>聖惠方</small>	治積水驚水或飲水過多停積於脾
故四肢而身熱宜用藥內消其腫自退	
赤小豆	陳皮
蘿蔔子	甘草 <small>錢半</small>
木香 <small>錢半</small>	
右以咀咀每服一兩生薑三片棗子一枚水二盞煎至一	
盞服食前	
○已上數方治陰水浮腫之劑	
十棗丸	治水氣浮腫上氣喘急大小便不通
甘遂	大戟
芫花 <small>各等分</small>	
右為末棗者熟去皮核杵爛為丸如梧桐子大每服四	
十九清晨熱湯下以利去黃水為度不利次日再服	
順氣丸又名氣寶丸 <small>聖惠方</small>	治腰脇俱病如抱一甕肌膚
堅硬按之如鼓腹腫不能伸屈自頭至腹中瘦背露骨	
胸膈痞滿四肢無力	
木香 <small>不見火</small>	茴香 <small>炒</small>
菴活	木瓜

川芎

當歸

酒浸各

黑牽牛二兩

地骨皮

檳榔

陳皮

炒各

大黃一兩

皂角四兩

右為細末熬阜角膏丸如梧桐子大每服五六十丸溫

湯下食前一服無木瓜用生薑灯心煎湯下治一切氣

血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫或大便秘脚氣入腹

滿悶寒熱往來狀如傷寒並宜服之

三花神佑丸

宣明方

治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕脹

滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血

壅滯不得宣通或風熱燥鬱支體麻痺走注疼痛風痰

涎嗽頭目旋運瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食

水腫

心法附餘卷之八

主

積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無間赤

白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能

別辨或泛常只為轉動之藥兼瀉久新腰痛并一切下

痢及小兒驚癇積熱乳癖腫滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌炒

牽牛

二兩

大黃

一兩

輕粉一錢

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫

水下每日三服加至快利利後却常服病去為度設病

愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進酒食及

痞悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則初服兩

丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子

大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

一方 治水腫腹脹

大戟

甘遂

芫花

醋浸

巴戟

桑白皮

續隨子

各等分

右為末每服一匙空心菜豆湯下忌生冷油膩酸鹹等

物

一方 治水腫鼓脹

苦葶藶

甘遂

醋浸

商陸根

大戟

各二

大黃

芫花

各一

輕粉

少許

水腫

心法附餘卷之八

主

黑牽牛

頭末

右為細末入輕粉再研每服二錢溫蜜水調下忌生冷

鹽醬之物取下黑黃臭水為驗

○已上數方治陽水浮腫之劑

回鶻五神散

治十腫水氣鼓脹

芫花

獨根

先水

木香

青木香

右各等分晒乾為末每服一錢如人弱服一錢半臨臥

臘酒調下至寅卯時下水氣辰時以白粥補之若病

淺日三服病深隔日限五六日後服金丹

金丹

蒼朮四錢半  
水浸

草烏一錢  
去皮 羌活二兩

山豆一錢半  
去皮

杏仁二十一箇  
去皮

右為末麪糊丸如梧桐子大每服十一丸臨卧生姜湯送下忌鹽醬房事發病之物一百日此藥極驗

一方 用赤小豆商陸白者根各等分以雄猪肚一箇裝藥在內以篾截封其口於瓦罐內煮爛取出去藥乘熱食猪肚宜食五七箇見效

一方 用黑雄猪肚一箇先以茶湯清油洗淨用活蝦蟆三箇每箇口內放銅錢一枚銅錢上安胡黃連末少許

水腫

心法附餘卷之八

七

五

將蝦蟆活裝入肚內兩頭俱割住勿令走氣以文武火煮一日次日五更取出蝦蟆去皮腸肝不用餘肉連猪肚一同撕碎食盡以好酒厭下忌鹽醃雞鵝魚麵羊肉滯氣之物宜食猪肉鴨

一方 於五月五日取螻蛄不拘多少不可見日焙乾凡一病以七箇為度先用七箇頭研為末治上次用腹研為末治中再用足研為末治下每服食前好酒調下

商陸散 治十腫水氣

商陸汁一錢  
甘遂一錢 土狗一箇  
自死者

右為末以商陸汁調空心服日午利下水忌鹽一百日

一方 治水鼓

用商陸根赤者杵爛貼臍心以絹帛縛定水自小便出又方 以商陸白根同生薑二兩煮粥服之忌赤者殺人

分水散 治面水浮腫

土狗一箇 輕粉二分半

右為細末每用少許搐鼻中其黃水從鼻中出

塗臍膏 治水腫小便澀少

猪苓 地龍生研 針砂醋煮 甘遂各等分

右為末用葱搗爛取汁研成膏敷臍中約一寸高以帛縛之水從小便出為度日二次易之

水腫

心法附餘卷之八

七

五

煨腎丸 治脾虛邪水流注經絡腿膝學急四肢腫痛

甘遂生半兩 木香一兩

右為末每服一錢以猪腰一枚剉開去筋膜摻藥在內用薄荷裹定外用紙四五層再裹以水濕於火內煨熟臨卧細嚼溫酒嚥下利去黃水為度

一方 治水腫

黑牽牛頭末 檳榔等分

右為末每服二錢好酒空心調下利去水三五次其腫自消忌鹽醬生冷一百日取虫積沙糖水下

牽牛湯 治腹中濕熱氣足脛微腫中滿氣急咳嗽痰喘

小便不利

牽牛一兩 厚朴五錢

右為末每服二錢姜棗湯調下或以水為丸亦可

一方 治腫脹自去水

用真水銀粉二錢已豆去油四兩生硫黃一錢同研成

膏作餅子先以新綿一片鋪臍上次以藥餅當臍掩之

外用帛縛定約人行五里自然瀉下惡水待三五次除

去藥溫粥補之久患者隔日取

一方 治鼓脹氣滿

用苦丁香為末棗肉為丸如梧桐子大每服三十九空

心棗湯下三服見効

一方 用青木香為末水調一錢服後得吐則効

一方 治水腫

用白商陸細切一升羊肉六兩水十升煮至六升去渣

將肉和葱豉作膾食之

○已上數方治腫脹切奪之劑

○廣按水腫之証蓋由脾虛濕勝凝閉滲道不得通故

邪水隨氣流注經絡之中則一身浮腫皮薄而光手

按成窩舉手即滿也先當補中燥濕使脾得健運次

當開其滲道以決邪水則體用無該標本兩盡病之

不愈者鮮矣今之醫者徒知決水而不知補脾故暫

消而隨腫何益之有哉古人治病之挾虛有先攻而

後補者有先補而後攻者有攻補兼施者何嘗一於

攻也又嘗論之水腫鼓脹之病忌用甘溫之藥蓋腫

脹屬濕甘溫之藥能生濕熱而反助病邪經曰甘能

作中滿是也惟用溫苦溫寒之藥治之則愈蓋苦寒

瀉濕熱苦溫除濕寒也又宜用風藥風能勝濕也

# 鼓脹 二十五

丹溪心法

水腫 心法附餘卷之八

○鼓脹又名單鼓 宜大補中氣行濕此乃脾虛之甚必

須遠音樂斷厚味大劑人參白朮佐以陳皮茯苓蒼朮之

類 有血虛者用四物湯行血藥 有脈實堅人壯盛者

或可攻之便可收拾用參朮為主 凡補氣必帶厚朴寬

滿 厚朴治腹脹因味辛以氣聚於下焦故也須用姜汁

製之 如肥胖之人腹脹者宜平胃五苓共服之 如白

人腹脹者是氣虛宜參朮厚朴陳皮 如瘦人腹脹者是

熱宜黃連厚朴香附白芍 如因有故蓄血而腹脹者宜

抵當丸下死血 如因有食積而腹脹者有熱用木香檳

榔丸有寒用木香厚朴丁香砂仁神曲香附 如因外寒

鬱內熱而腹脹者用霍香麻黃升麻乾薑桂枝 因大怒而腹脹者宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆薈 實者按之不堅不痛治瀕實者下之消之次補之 虛者補之升之補為要 朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急氣血皆虛 腹脹不覺滿者食肉多以黃連一兩阿魏半兩醋浸蒸餅為丸同溫中丸白朮湯下 食肉多腹脹三補丸料內加香附半夏麴蒸餅丸服

心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜

幾張

心法附餘卷之八

五

通經

之德而有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地之交泰是為無病今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否清濁相混墜道壅塞鬱而為熱熱留為濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若虫侵蝕之義理宜補脾又須養肺金以制木使脾無賊邪之患滋腎水以制火使肺得清化却厚味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛實急於作效病者苦於脹急喜行利藥

以求通快不知寬得一日半日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣古方惟禹餘糧丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當

四物湯

見補損

平胃散

見中濕

五苓散

見濕熱

溫中丸

見積聚

三補丸

見補損

附脉理

脉訣舉要曰脹滿脉弦脾制於肝洪數熱脹遲弱陰寒浮

鼓張

心法附餘卷之八

五

通經

為虛滿緊則中實浮則可治虛則危急

附諸方

平肝飲子

濟生方

專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心

腹脹滿頭暈嘔逆脉來浮弦

防風

去芦

桂心 不見火

枳殼

赤芍藥

桔梗

去芦

甘草 炙

木香 不見火

人參

檳榔

當歸 酒浸

川芎

陳皮

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時候

紫蘇子湯

濟生方

治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促

煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而澹

見氣滯

調中順氣丸 治怒氣傷肝二焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛 見脇痛

木香順氣湯 板梓方 治濁氣在上則生腹脹及七情所傷

陳皮 厚朴各四分 當歸 肉豆蔻面裹去灰

蒼朮米泔浸 木香各三分 青皮 益智仁

白茯苓去皮 澤瀉 乾生薑 半夏湯洗七次

吳茱萸 升麻 柴胡各二分 用水煎服

橘皮湯 直指方 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附米炒 半夏 橘皮各二兩 甘草七錢

右吹咀水二盞生薑五片棗二枚煎至一盞通口服

○已上數方治氣脹之劑

大半夏湯 三因方 治肝氣大盛勝剋於脾脾不能運化結

聚涎沫閉塞臟腑胃冷中虛遂成脹滿之疾其脉多弦

遲

半夏湯洗七次 桂心各五兩 附子炮去皮 枳實麩炒

茯苓 甘草炙 厚朴姜炒 當歸各一兩

人參一兩 川椒炒去汗去合口者八百粒

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎空心服

強中湯 齋生方 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成腹

脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾姜炮 白朮各二兩 青皮去白 人參

丁香各三兩 草果仁 附子炮去皮 厚朴姜炒

甘草炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

不拘時嘔者加半夏或食麵脹滿加蘿蔔子各半兩

中滿分消湯 板梓方 治中滿寒脹寒疝大小便不通陰燥

足不收四肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下

焦躁寒沉厥奔豚不收

益智仁 半夏 木香 茯苓

升麻錢各七 川芎 人參 茯苓

當歸 生薑 柴胡 乾姜

革澄茄 黃連各半兩 黃耆 吳茱萸

草豆蔻 厚朴各半兩 一方有麻黃澤瀉各一錢

黃蘗五分

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞溫服大忌房勞濕

麵生冷硬物

木香分氣丸 板梓方 善治脾胃不和心腹脹兩脇膨脹胸

膈注滿痰嗽喘急刺心乾嘔咽喉不利飲食不化晉皆

治之有效



木香	檳榔	青皮	蓬莪木
乾生薑	當歸	姜黃	玄胡
白朮	枳殼	荊三稜	各等分
赤茯苓	陳皮	肉豆蔻	各等分
秋冬加丁香	炒		
右為末白麵糊丸小豆大每服三五十丸生薑湯下忌			
生茄馬齒莧			
禹餘糧丸	治水腫鼓脹上氣喘滿一切水氣脹氣脹		
蛇含石	大者三兩以鐵銚盛入炭火中煨藥與銚子		
鼓脹	心法附餘卷之八		
真針砂	五兩洗以水淘淨控乾更以鐵銚子炒乾入		
禹餘糧	針砂內製		
已上三物為主其次量人虛實入下項藥			
木香	牛膝酒浸	莪朮	白蒺藜
桂心	川芎	白豆蔻	土茴香
三稜炮	羌活	茯苓	乾姜
青皮	附子	陳皮	當歸
右各半兩虛人老人全用半兩實壯之人隨意減之			

右為末拌勻以湯浸蒸餅搗去水和藥再搗極勻丸如			
梧桐子大每服五十丸空心溫酒下最忌食鹽否則發			
疾愈甚			
○廣按此方切劑也然腫脹乃寒濕痞閉積滯非此藥			
之熱燥而能開發流通之乎雖用此藥而能去腫脹			
然腫脹少退即當服補氣補血補脾藥以繼之可以			
免於後患也大抵腫脹之病多用十棗三花以攻決			
惟壯實者可用非虛老人所宜而此劑但取開散寒			
濕痞滯故宜於虛老人也			
○已上數方治寒脹之劑			
鼓脹	心法附餘卷之八		
中滿分消丸	治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹		
不消寒脹			
人參	白朮	姜黃	黃芩
甘草	豬苓	黃連	白茯苓
縮砂仁	乾生薑	枳實	半夏
厚朴	知母	澤瀉	陳皮
右細碾茯苓澤瀉生薑各為末另秤外共為末秤入上			
二味和白水浸蒸餅為丸如梧桐子大每服一百丸熱			
白湯送下寒因熱用故焙熱服之食遠量人虛實加減			
沉香交泰丸	治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不		

伸為臍脹

沉香

白木

陳皮

去白各三錢

枳實

去穢炒

吳茱萸

湯洗

大黃

酒浸一兩

白茯苓

去皮

澤瀉

炒

當歸

酒浸

木香

青皮

去白各二錢

厚朴

姜製五錢

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十丸溫

白湯送下食前微利即止

廣茂潰堅湯

治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐

卧不安大小便澀滯上氣喘促遍身虛腫

厚朴

黃芩

益智

草豆蔻

當歸

各五錢

黃連

六錢

半夏

七錢

廣茂

升麻

心法附餘卷之八

紅花

酒浸

吳茱萸

各二錢

甘草

炒

柴胡

澤瀉

神麴

炒

青皮

陳皮

各三錢

渴者加葛根

四錢

右每服七錢生薑三片煎服

絳珠木香檳榔丸

木香

檳榔

當歸

黃連

枳殼

青皮

黃柏

各一兩

黃芩

陳皮

三棱

香附

已上四味各二兩

莪朮

大黃

各四兩

丑末

二兩

右為末麴糊丸梧子大每服五七十丸臨卧姜湯下尋

常消導開胃只服三十丸

○已上數方治熱脹之劑

抵當丸

水蛭

七箇

石蠅

八箇

桃仁

七箇

大黃

一兩

右為末分作四丸水一盞煎一丸取七分大溫服當下

血未下再服

人參芎歸湯

治血脹煩燥漱水不嚥迷忘小便多大便

異或虛厥逆婦人多有此証

當歸

半夏

七錢

川芎

一兩

蓬朮

木香

砂仁

白芍

甘草

各半兩

人參

桂

五靈脂

各二錢

右以咀生薑三片棗一箇紫蘇四葉水煎服

一方治血鼓腹如盆脹

三棱

義木

乾漆

炒烟盡

牛膝

去芦

蟲蛭

糯米

炒琥珀

肉桂

硃砂

水蛭

石灰

炒赤

大黃

各等分

右為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子

大每服十丸空心溫酒送下重使下亦可

雞屎醴散

宣明方

治日食不能暮食痞滿

大黃

桃仁

去皮尖

雞屎醴

乾者

右等分為末每服一錢生薑三片煎調食後臨卧服

○已上數方治血脹之劑

○廣按水腫鼓脹皆因脾虛所致然水腫輕而鼓脹重不可不知也何則水腫則飲食如常鼓脹則飲食不及常也治水腫則惟補脾導水而已治鼓脹則補脾導水無以銷穀庶乎可也雖然鼓脹有氣血寒熱四者之殊多由怒氣傷肝木邪剋土所以脾病而不能運化水穀故爾又要養肺金以制肝木使脾土得其平則運化行而水穀消矣以此觀之治鼓脹之法必以補脾制肝導水消穀為主看所挾而兼用藥焉挾氣則散氣挾血則破血挾寒則溫寒挾熱則清熱其施治一一清切如此則藥無不投而病無不愈也又按鼓脹之病多不治者何哉此脾虛之極真臟病也如翻胃勞瘵亦然皆真臟病也凡人之病真臟不病則五行相生相制以適於平雖不服藥而自愈者如火極傷金則有水以制之有土以生之如木極剋土則有金以制之有火以生之所謂亢則害承迺制也雖然亦有惡藥忌醫而誤之者蓋正氣與病邪不相兩立一勝則一負久則病劇正脫而不免於死矣夫藥所以助正去邪而使邪退正復也有病不服藥可

乎不用醫可乎

赤白濁 一十六

丹溪心法

○濁主濕熱 有痰 有虛 赤屬血 白屬氣 痢帶

同治 寒則堅凝熱則流通 大率皆是濕痰流注宜燥

中官之濕用二陳加蒼朮白朮燥去其濕 赤者乃是濕

傷血也加白芍藥仍用珍珠粉丸加臭椿根白皮滑石青

儼作丸藥 虛勞用補陰藥大槩不宜熱 一作宜藥 肥

白人必多痰以二陳湯去其濕熱 胃弱者兼用人參以

祇胡升麻升其胃中之氣 丸藥用黃柏炒褐色乾姜炒

微黑滑石蛤粉青黛糊丸服 胃中濁氣下流為赤白濁

用二陳加柴胡升麻蒼朮白朮 丸藥用樗皮末蛤粉炒

乾姜炒黃柏 胃中濁氣下流滲入膀胱青黛蛤粉 肝

脉弦者用青黛以瀉肝 又方炒黃柏一兩生栝一兩滑

石三兩神曲半兩為末滴水丸 燥濕痰南星半夏蛤粉

青黛為末神麴糊丸青黛為衣 有熱者青黛滑石黃柏

之類水丸 張子元血氣兩虛有痰痛風時作陰火間起

小便白濁方在痛風類 一人便濁經年或時夢遺形瘦

作心虛主治用珍珠粉丸和定志丸服 一婦人年近六

十形肥奉養膏梁飲食肥美中焦不清濁氣流入膀胱下注白濁白濁即濕痰也用二陳去痰加升麻柴胡升胃中清氣加蒼朮去濕白朮補胃全在活法服四貼後濁減大半却覺胸滿因柴胡升麻升動胃氣痰阻滿悶又用本湯加炒麴白朮香附素無痰者雖升動不滿也

青黛下

蛤粉中

椿根末上

滑石中

乾姜下

黃柏色下

右為末神麴糊丸仍用前燥濕痰丸子亦治帶下

法曰黃柏治濕熱青黛解鬱熱蛤粉鹹寒入腎滑石利

又方

竅乾姜味苦欬肺氣下降使陰血生乾姜監制

又方

黃柏一兩

生栢二兩一蛤粉二兩

神麴十兩

右為末水丸服五七十九白湯下

附脉理

脉訣舉要曰遺精白濁當驗於尺結扎動緊二證之的

附諸方

定志丸

遠志去心

石菖蒲各二兩

人參

白茯苓各五兩

右為末蜜丸梧子大硃砂為衣每服七丸加至一十九

空心米湯下

半夏丸 治白濁神効

半夏

猪苓

肝脉弦加青黛下

○二陳湯治濁能使大便潤而小便長濁氣只是濕

痰有白濁人服玄兔丹不愈服附子八味丸即愈

者不可不知 有小便如常停久纔方漩濁

茯苓丸 治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小便白濁夢

寐頻泄

兔絲子五兩

白茯苓三兩 石蓮肉二兩

右為末酒糊丸如梧子大每服三十九空心鹽湯下

珍珠粉丸

治白濁夢遺遺精及滑出而不收

真蛤粉一斤

黃柏一斤新瓦

右為細末滴水丸梧子大每服一百丸空心溫酒下

法曰陽盛陰虛故精泄也黃柏降心火蛤粉鹹而補腎

陰也

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀遂成赤濁 見淋類

藥氏定心湯 理心氣不足榮血衰少遇事多驚心神不

守夢中遺精白濁不已

藥氏鎮心爽神湯 理心氣不足夜夢多驚小便白濁遺

精 並見補損

清心蓮子飲 治心虛有熱小便赤濁有沙膜 見淋類

瑞蓮丸 治思慮傷心小便赤濁

白茯苓 去皮石蓮肉 炒去龍骨 生用 天門冬 洗去

麥門冬 洗去 柏子仁 炒別當歸 酒浸 酸棗仁 洗去

紫石英 火煨遠志 甘草湯煮去心乳香 龍齒 各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服七十九空心

溫酒棗湯任下

草解分清飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無

度凝白如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊

益智仁 川草薢 石菖蒲 烏藥 各等分

右剉每服五錢水煎入鹽一捻食前服

一方加茯苓甘草

桑螵蛸散 經方 專治男子小便日數十次稠如米泔或

赤或白心神恍惚瘦悴減食此說多因房勞過度耗傷

真氣得之

桑螵蛸 鹽水遠志 甘草湯煮 菖蒲 鹽炒

龍骨 煨研 人參 去芦 茯神 去木 當歸 酒洗

龜甲 醋炙各

右為末每服二錢臨睡時人參湯下

猪苓丸 即前半夏丸 治年壯氣盛慾動所願不得意淫於

外遺白濁右用半夏一兩破如豆大用猪苓末四兩

先將一半炒半夏黃色不令焦地上空出火毒半日取

半夏為末糊丸如梧子大候乾更用前猪苓末二兩炒

藥微裂同於沙甌內藏之空心溫酒鹽湯下四五十丸

一方 治心經伏暑小便赤濁

人參 白木 赤茯苓 去皮香薷

澤瀉 木猪苓 去皮蓮肉 麥門冬 各等分

右以咀每服四錢水一盞煎服

一方 治小便白濁出髓條

酸棗仁 炒白木 人參 白茯苓

破故紙 益智 洗淨 大茴香

左顧牡蠣 煨各

右為末加青鹽酒糊丸如梧桐子大每服三十丸溫酒

米飲任下

秘精丸 治下虛胞寒小便白濁或如米泔如凝脂

牡蠣 煨 兔絲子 酒蒸焙 龍骨 生用

五味子 韭子 炒 白茯苓 去皮 白石脂 煨

桑螵蛸 酒炙各

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒下

韭子丸 治膀胱腎冷小便白濁滑數無度

赤石脂煨 韭子炒 川牛膝去芦 牡蠣煨

覆盆子酒浸 附子炮去 桑螵蛸酒炙 鹿茸酒蒸

肉苁蓉酒浸 龍骨生各 雞胫燒灰 沉香鑊不見火

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心溫酒鹽湯

任下

附子八味丸 治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛脚膝緩

弱夜多遺溺淋瀝白濁 見補損類

○廣按赤白濁雖多屬濕熱然亦有老人因虛寒而致

之者已上二方乃治虛寒濕寒之劑也

遠志清生方 治因事有驚心神不定夜夢驚墮小便白

濁 心法附餘卷之八 三五

遠志去心 石菖蒲各二兩 茯神去木 白茯苓去皮

人參 龍齒各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大以辰砂為衣每服七十丸

熱湯下

葉氏育神散簡易方 理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小

便白濁 見驚悸類

妙應丸 治赤白濁

真龍骨 辰砂 石菖蒲各二兩 川練子取肉

白茯苓 益智仁 石連肉 縮砂仁各一兩

桑螵蛸焙上 兔絲子酒浸一宿

牡蠣脚草鞋包火 牡蠣假細研三錢

右為末用山藥糊為丸梧子大每服五十丸日間煎人

參酸棗湯下臨卧粳米飲下

濁 心法附餘卷之八 三五

將藥心法附餘卷之八終

休寧東山古庵方廣約之類集

# 痰門

## 痰

一十七 附痰熱

丹溪心法

○脉浮當吐 久得脉濡卒難開也必費調理 大凡治

痰用利藥過多致脾氣虛則痰易生而多 濕痰用蒼朮

白朮 熱痰用青黛黃連芩 食積痰用神麴麥芽山查

痰飲

心法附餘卷之九

一

單如白朮

風痰用南星 老痰用海石半夏瓜蒌香附五倍子作

丸服 痰在膈上必用吐法瀉亦不能去 風痰多見奇

証 濕痰多見倦怠軟弱 氣實痰熱結在上者吐難得

出 痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠濁者必用吐 熱

痰挾風外証為多熱者清之 食積者必用攻之無氣虛

者用補氣藥送 痰因火盛通上者以治火為先白朮黃

芩軟石膏之類 內傷挾痰必用麥蘖白朮之屬多用姜

汁傳送或加半夏虛甚加竹瀝 中氣不足加麥朮 痰

之為物隨氣升降無處不到 脾虛者宜補中氣以運痰

降下二陳湯加白朮之類無用升麻提起 中焦有痰則

食積胃氣亦類所養卒不便虛若攻之盡則虛矣 痰成

塊或吐咯不出無氣鬱者難治 氣實痰熱者難治 痰

在腸胃間者可下而愈在經絡中非吐不可吐法中就

發散之義焉假如癰病因驚而得驚則神出舍空則痰

生也血氣入在舍而拒其神不能歸焉 血傷必用姜汁

傳送 黃芩治熱痰假其下火也 竹瀝滑痰非姜汁不

能行經絡 五倍子能治老痰佐他藥大治頑痰 二陳

湯一身之痰都治管如要下行加引下藥在上加引上藥

凡用吐藥宜升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗

芽茶生薑薑汁之類或用瓜蒂散 凡風痰病必用風痰

痰飲

心法附餘卷之九

二

單如白朮

藥如白附子天麻雄黃牛黃片芩姜蚕猪牙皂之類

諸吐法另具于後

○凡人身上中下有塊者多是痰問其平日好食何物吐

下後方用藥 許學士用蒼朮治痰成窠囊遠行極妙痰

挾瘀血遂成窠囊 眩運嘈雜乃火動其痰用二陳湯加

山梔子黃連黃芩之類 噫氣吞酸此食鬱有熱火氣上

動以黃芩為君南星半夏為臣橘紅為使熱多加青黛

痰在脇下非白芥子不能達 痰在皮裏膜外非姜汁竹

瀝不能導達 痰在四肢非竹瀝不開 痰結核在咽喉

中燥不能出入用化痰藥加鹹藥軟堅之味瓜蒌仁杏仁

海石桔梗連翹少佐朴硝以姜汁蜜和丸噲服之 海粉  
即海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸  
子末子不可入煎藥 枳實瀉痰能衝牆壁 小胃丹治  
膈上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用  
之不宜多

○喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者用  
瓜萋葶氣實必用荆瀝 天花粉大能降膈上熱痰 痰  
在膈間使人顛狂或健忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與  
荆瀝同功治稍重能食者用此二味效速穩當二瀝治痰  
結在皮裏膜外及經絡中痰必佐以姜汁 薑汁治血滯  
痰飲 心法附餘卷之九 三  
不行中焦有飲自然汗冷喫兩三銀蓋必胸中煩燥不寧  
而後愈 參更丸能消痰 見吞酸類

入方  
青礞石丸 解食積去濕痰重在風化硝

南星 二兩切作片用白礞末五錢水浸  
片黃芩 二兩切作片用白礞末五錢水浸

茯苓 二兩切作片用白礞末五錢水浸

法製硝用蘿蔔水煮化去蘿蔔渣今細入臘月牛胆  
礞石 二兩切作片用白礞末五錢水浸  
鐵線縛定益泥固濟晒乾火服紅候令取出  
右為末神曲糊丸梧子大每服三五十九白湯下

一方加蒼朮半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使  
一本礞石南星各二兩無枳實

又方

半夏 二兩 白朮 一兩 茯苓 七錢 黃芩

礞石 一兩 風化硝 二錢

右為末同煎

潤下丸 降痰甚妙

南星 一兩 半夏 二兩各依橘紅製 黃芩

黃連 各一兩 橘紅 半斤以水化薑五錢甘草 炙一兩

右為末蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下

痰飲 心法附餘卷之九 四

一方單用陳皮半斤鹽半兩水拌煮陳皮候乾焙燥為

末入甘草末一兩炊餅丸同上亦好治胸膈有痰兼殺

上熱加青金有濕加蒼朮或加參更看虛實作湯使

又方 治濕痰喘急止心痛

半夏 一味不拘多

右為末粥丸梧子大每服五十丸姜湯下

又方

黃芩 中 香附 上 半夏 姜製 貝母 中

已上治濕痰加瓜萋仁青黛俾丸子治熱痰

又方 燥濕痰亦治白濁因痰者



<p>南星 半夏各一 蛤粉二兩</p>	<p>右為末神曲糊丸如梧子大青黛為衣每服五十丸姜湯下 濕痰加蒼朮 食積痰加神曲麥芽山查 熱痰加青黛</p>	<p>中和丸 治濕痰氣熱</p>	<p>蒼朮 黃芩 半夏 香附等分</p>	<p>右為末粥丸如梧子大每服五七十丸姜湯下</p>	<p>又方 治痰嗽</p>	<p>黃芩酒洗一貝母 南星各一 滑石</p>	<p>白芥子兩各半 風化硝二錢半取其輕浮速降</p>	<p>右為末湯泡蒸餅丸如梧子大每服五十丸白湯下</p>	<p>導痰湯</p>	<p>南星炮一 橘紅去白 赤茯苓去皮 枳殼炒去穢</p>	<p>甘草炙半兩又 半夏四兩又</p>	<p>右咬咀每服五錢生姜五片水一鍾煎七分服</p>	<p>千縉湯 治喘</p>	<p>半夏七箇泡製每 皂角去皮炙 甘草炙一寸</p>	<p>右咀作一服生姜如指大煎服</p>	<p>小胃丹</p>	<p>芫花好醋浸勻過一宿瓦器不住手攪炒令黑不要焦</p>
---------------------	-------------------------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------	---------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------	------------	------------------------------

<p>甘遂濕面長流水浸半日再水洗晒乾又</p>	<p>大戟長流水煮一時再</p>	<p>大黃酒洗炒熟焙乾一兩半 黃柏三兩炒</p>	<p>右為末粥丸麻子大每服二三十丸臨卧津液吞下或白湯一口送下取其鬲上之濕痰熱積以意消息之欲利則空心服</p>	<p>及方甘遂大戟減三分之一硃砂為衣名辰砂化痰丸一方加木香檳榔各半兩蒸餅丸每服七八丸至十丸止</p>	<p>治酒痰 青黛 瓜蒌</p>	<p>痰飲 心法附餘卷之九</p>	<p>右為末姜蜜丸噙化救肺</p>	<p>治鬱痰</p>	<p>白殭蚕下 杏仁去皮 瓜蒌仁中 訶子去核</p>	<p>貝母中 五倍子上</p>	<p>右為末糊丸梧子大每服五十丸白湯下</p>	<p>導痰丸</p>	<p>吳茱萸二錢 茯苓一兩 黃連半兩 滑石七錢半</p>	<p>蒼朮一兩</p>	<p>右為末糊丸梧子大每服八九十丸姜湯下</p>	<p>茯苓丸 出千金方百一選方同</p>
-------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	------------	------------------------------	-------------	--------------------------	----------------------

半夏 <small>四兩</small>	茯苓 <small>二兩</small>	枳殼 <small>一兩</small>	風化硝 <small>半兩</small>
右為末蒸餅或神麴姜汁糊丸梧子大每服三十九丸姜湯下	此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有効	又方 治食積痰火并瀉胃火	軟石膏不拘多少研細
右用醋糊丸如菜豆大每服二十丸白湯下	又方 治陰虛內多食積痰	川芎 <small>七錢</small>	黃連
神麴	麥芽	瓜蒌仁	白木
右為末姜汁蒸餅丸如梧子大每服五十九丸白湯下	痰飲	心法附餘卷之九	七
久吐痰喘	杏仁 <small>去皮尖生用</small>	來復丹 <small>炒</small>	
右等分為末粥丸麻子大每服十五丸白湯下	黃連化痰丸	即黃連清化丸	
半夏 <small>一兩</small>	黃連 <small>一兩</small>	吳茱萸 <small>湯洗一錢半</small>	
桃仁 <small>二十四箇研</small>	陳皮 <small>一兩</small>		
右為末麴糊丸菜豆大每服一百丸姜湯送下	白玉丸		
巴豆 <small>三十箇去油</small>	南星	半夏	滑石
輕粉 <small>各三錢</small>			

右為末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸姜湯下	黃瓜蒌丸	治食積痰癰滯喘急	
瓜蒌仁	半夏	山查	神麴 <small>炒各</small>
右為末瓜蒌水丸姜湯竹瀝送下二三十九丸	又方		
瓜蒌仁	半夏 <small>一兩</small>	蒼朮	香附 <small>二兩</small>
黃芩 <small>半兩</small>	黃連 <small>半兩下</small>		
又方	瓜蒌仁 <small>半兩</small>	黃連 <small>半兩</small>	半夏 <small>一兩</small>
右為末糊丸梧子大每服五十九丸白湯下	痰飲	心法附餘卷之九	八
柳痰丸	瓜蒌仁 <small>一兩</small>	半夏 <small>二錢</small>	貝母 <small>三錢</small>
右為末蒸餅丸如麻子大每服一百丸姜湯下	清膈化痰丸		
黃連 <small>一兩</small>	黃芩 <small>一兩</small>	黃栢 <small>半兩</small>	山梔 <small>半兩</small>
香附 <small>一兩半</small>	蒼朮 <small>二兩</small>		
右為末蒸丸白湯下	搜風化痰丸		
人參	槐角子	蠶蚕	白礬
陳皮 <small>去白</small>	天麻	荊芥 <small>各一兩</small>	半夏 <small>四兩姜</small>

辰砂半兩

右為末姜汁浸蒸餅為丸辰砂為衣服四十九姜湯下

除痰丸 治痰飲

黑丑頭末二兩

枳實炒一兩半

白礬三錢枯

朴硝二錢風化

枳殼半兩

猪牙皂角二錢

右為末用蘿蔔汁丸每服五十九雞鳴時服初則有糞

次則有痰

一方治濕痰

蒼朮三錢

白朮六錢

香附四錢半

白芍酒浸炒二錢半

右為末蒸餅丸如梧子大每服五十九白水下

痰飲

心法附餘卷之九

九

東垣

治肥人濕痰

苦參

半夏錢各一

白朮三錢半

陳皮一錢

右咀作一服姜三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十

五丸

祛風痰行濁氣

明礬一兩

防風一兩

川芎

猪牙皂角

鬱金各一兩

蜈蚣二條用赤脚黃脚各一條

右為末蒸餅丸梧子大每二十九食前茶湯下春以芭

蕉湯探吐

上焦風痰

瓜蒌紅中

黃連上

半夏姜製中

牙皂炮下

姜汁浸煨餅丸梧子大每五七十九白水下

痰氣方

片苓錢炒五

半夏半兩

白朮一兩

白芍一兩

茯苓三錢

陳皮三錢

右為末姜汁泡蒸餅丸如梧子大白水下五十九

利膈化痰

南星

蛤粉研細一兩

半夏

瓜蒌仁

貝母去心治胃

香附各半兩

重便浸

右為末用猪牙皂角十四挺獻碎水一碗半煮杏仁去

痰飲

心法附餘卷之九

十

東垣

皮尖一兩煮水將乾去皂角櫞杏仁如泥入前藥搜和

再入姜汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛為末每服五十九

姜湯下

清膈丸

黃芩半斤酒

南星四兩生用

半夏湯泡七次

右為末姜汁打糊丸如梧子大每服三五十九白水下

清痰丸 專清中脘熱痰積

烏梅

枯礬

黃芩

蒼朮

陳皮

滑石炒

青皮

枳實各半兩

南星

半夏

神曲

山查

乾生姜

香附各一兩

右為末湯浸蒸餅丸如梧子大每服五七十丸白水下

○廣按丹溪治病以痰為重諸病多因痰而生故前諸方間有別出者亦其平日常用故不另開於附方觀者詳焉

附諸腎論

劉宗厚曰痰之為病仲景論四飲六証無擇叙內外三因俱為切當蓋四飲則叙因痰而顯諸証者三因則論其因有所傷而生痰者也唯王隱君論人之諸疾悉出於痰此發前人所未論可謂深識痰之情況而得其真者

痰飲

心法附餘卷之九

上

矣製滾痰丸一方總治斯疾固為簡便較之仲景三因有表裏內外而分汗下溫利之法則踈濶矣况又有虛實寒熱之不同者哉夫痰病之原有因熱而生痰者亦有因痰而生熱者有因風寒暑濕而得者有因驚而得者有因氣而得者有因酒飲而得者有因食積而得者有脾虛不能運化而生者有腎虛不能降火而生者若執痰則多煩熱風痰多成癰疽奇証冷痰多成骨痺濕痰多倦怠軟弱驚痰多成心痛癰疾飲痰多成脇痛臂痛食積痰多成癖塊痞滿其為病狀種種難名王隱君論中頗為詳盡學者但察其病形脉証則知所挾之邪

隨其表裏上下虛實以治也若夫子和謂飲無補法必

當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論執藥治痰

之誤固為詳切亦有挾寒挾虛之証不可不論夫久痰

疑結膠固不通狀若寒凝不用溫藥引導必有拒格之

患况有風寒外束痰氣內鬱者不用溫散亦何以開鬱

行滯又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致四

肢百骸發為諸病理宜導去痰滯必當補接無行又難

拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因

食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰積所養飲食

雖少胃氣卒不便虛故也亦有治痰用峻利過多則脾

痰飲

心法附餘卷之九

上

氣愈虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中氣

則痰自然運下此乃治本之法也謂醫中之王道者正

此類也

附脉理

脉訣舉要曰偏弦為飲或沉弦滑或結或伏痰飲中節

脉理提綱曰痰脉弦滑

附諸方

金沸草散和濟方治外感風寒痰氣內鬱咳嗽稠粘

參蘇飲和濟方亦治外感風寒痰飲停積胸膈咳嗽氣促

言語不能相續者並見傷風類

小青龍湯和濟方治外感風寒內生溢飲支飲倚息喘滿

不得安卧者 見咳嗽類

法製半夏 御藥院方消飲化痰健脾順氣

右用大半夏以湯泡洗一遍去臍再泡洗如此七遍焙

乾用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬

一兩半研細溫水化浸半夏止留水兩指許頻放浸冬

月於暖處頻放浸五日夜取出焙乾再用鉛白霜一錢

溫水化又浸一日夜通前七日盡取出再用醬水放慢

火內煮勿令滾候醬水極熱取出焙乾於銀石器或磁

器內收貯每服一二粒食後細嚼生薑湯下 又一法

痰飲 心法附餘卷之九 主 依前製成半夏每一兩用龍腦半錢研極細同飛過硃

硃於半夏上再為衣却鋪上燈草一層約厚一指單排

半夏於上再用燈草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取

出於器內收貯每服一二粒細嚼食後溫水下或冷水

送下

橘皮半夏湯 宣明方痰嗽久不已者

橘皮 去白 半兩 半夏 二錢半湯洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生姜十片同煎六

分溫服

茯苓半夏湯 治停痰留飲胸膈滿悶嘔逆惡心吐痰水

茯苓 去皮 三兩 半夏 湯泡七次五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎六分空心服

大半夏湯 御藥院方治痰飲及脾胃不和

半夏 陳皮 茯苓 各二錢半

右咬咀水二盞生姜二錢半煎至八分去渣食後溫服

二陳湯和濟方治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或

因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏 湯洗七次 橘紅 陳皮 去白者 各五兩

白茯苓 去皮 三兩 甘草 炙一兩半

右咬咀每服四錢水一盞生姜七片烏梅一箇同煎至

六分熱服

廣按此方半夏豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯苓降氣

滲濕甘草補脾和中蓋補脾則不生濕燥濕滲濕則

不生痰利氣降氣則痰消解可謂體用兼該標本兩

盡之藥也今人但見半夏性燥便以他藥代之殊失

立方之旨若果血虛燥症用姜汁製用何妨抑嘗論

之二陳湯治痰之主藥也如寒痰加附子姜桂濕痰

加蒼白二朮食積痰加麩藥山查熱痰加苓連梔子

風痰加南星皂角燥痰加瓜蒌青黛鬱痰加枳殼香

附老痰加海石朴硝乃食其宜

丁香半夏丸 和劑方 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噎氣心腹痞滿不思飲食

肉豆蔻

木香

丁香

人參

陳皮

去白各半 藿香葉 半兩 半夏 姜製二兩

右為末以生姜汁煮麵糊丸如小豆大每服二三十丸姜湯下

○已上數方治寒痰之劑

平胃散

治有濕痰倦怠軟弱嗜卧沉困無力

方見中濕

五苓散

治臍下有悸停飲顛眩吐涎沫

方見濕熱

化痰丸

本事方 治停痰宿食

痰飲

心法附餘卷之九

五

單和言九十四

半夏湯泡

人參

桔梗

白木

枳實

香附子

白茯苓

前胡

甘草

各半兩

右為末用半夏姜汁煮糊丸如梧桐子大每服四五十

丸姜湯下

檳榔散

濟生方 治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時

或嘔逆

杏仁

旋覆花

半夏

檳榔

甘草

桔梗

白木

人參

乾姜

橘紅

各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半夏五片煎至八分溫服

半夏湯 瑞竹堂方 順陰陽消痞病消酒化痰

半夏

姜製一兩

橘紅

枳實

右咬咀每服四錢水一盞半夏五片煎至七分半饑半飽熱服

飽熱服

海藏五飲湯

按粹方 一留飲心下二癖飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

過多故有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白木

茯苓

厚朴

半夏

痰飲

心法附餘卷之九

六

單和言九十四

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草

各等分

右剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至六分取清

溫服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒多飲加葛

根葛花砂仁

蠲飲枳實丸

按粹方 逐飲消痰導滯清膈

枳實

去穢炒

半夏

陳皮

黑牽牛

半斤取頭末三兩

右為末水煮麴糊為丸如梧桐子大每服五十九生薑

湯下食後

葛花解醒湯 按粹方 治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利 見傷食類

一方 治痰飲流注痠痛

用大半夏二兩湯浸為末風化朴硝二兩生姜自然汁糊丸如梧桐子大每服五丸姜湯下痛在上臨卧服痛在下空心服

○已上數方治濕痰食積痰之劑

清氣化痰丸 古庵方 清頭目涼膈化痰利氣

半夏 湯洗七次 陳皮 去白 茯苓 去皮各半 薄荷葉

荊芥穗 錢各五 黃芩 炒 連翹 梔子仁 炒

痰飲 心法附餘卷之九 七

桔梗 去芦 甘草 炙 各一兩

右為末姜汁煎水打糊為丸如梧子大每服五十丸食後臨卧各一服如腸胃燥實加酒炒大黃芒硝各一兩

○廣按此方即二陳湯與涼膈散相合是也蓋痰因火動故作胸膈痞滿頭目昏眩今因二陳以豁痰利氣

涼膈以降火散風熱何病之不瘳哉

滌痰丸 御藥院方 治三焦氣滯痰飲不利胃膈痞滿咳嗽唾

稠粘面目執赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣清

膈化痰

木香

檳榔 青皮 去白 陳皮 去白

京三稜 煨 枳殼 去穢炒 半夏 洗七次 大黃 一兩

黑牽牛 微炒 二兩

右為末水糊丸梧桐子大每服四五十丸姜湯食後下

利膈丸 按粹方 治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛 炒四兩 半夏 洗 皂角 去皮弦酥 炙各二兩

青皮 去白 槐角子 炒 木香 各一兩 檳榔

大黃 各半兩

右為末生姜糊丸如梧子大每服七十丸食後生姜湯下

開結枳實丸 御藥院方 宣導滯氣消化痰飲升降陰陽通

痰飲 心法附餘卷之九 十二 三百五十五

行三焦滯滌脾胃流暢大小腸開導膀胱專主胃中痞

逆惡心嘔噦飲酒不消宿食停積兩脇膨悶咽嗝不利

上氣喘嗽黃疸等症

枳實 炒 白朮 半夏 雙 南星 炮

白礬 枯 苦葶蘆 炒 大黃 青皮 去白 各

木香 三錢 黑牽牛 頭末 二兩 大皂角 酥炙去

旋覆花 兩 各

右為末生姜汁糊為丸梧子大每服五十丸姜湯下無

時婦人乾血氣膈實腫滿或大便不通小便不利生姜

葱白湯下

王隱君滾痰丸

括曰既裏翻身甲掛金于今頭戴草堂深相逢二八求  
斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸桐子意  
常斟千般恠証如神効水瀉雙身却不任

大黃

酒蒸 黃片 各八兩

沉香 半兩

礞石

一兩 鐵線 碎煨 硝磺 一兩 用入小砂 礞石內及硝磺蓋之  
鐵線 煨定 鹽泥 固濟 曬乾 火煨 紅候 冷取出

一方加硃砂二兩

研為細末為水

右為細末水丸梧子大每服四五十九量虛實加減服

茶清溫水任下臨卧食後服

按此以黃黃芩為君大瀉陽明濕熱之藥礞石以墜

痰飲

心法附錄卷之九

九

三指集

痰沉香則引諸氣上而至天下而至泉為使也

大利膈

拔粹方

主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香 七錢

檳榔 半錢

厚朴 一兩

人參 去芦

藿香葉

當歸

甘草 炙

枳實 炒各半兩

大黃 一兩

酒浸焙

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十九溫水下

食後或臨卧服

○已上數方治熱痰之劑

辰砂化痰丸

和劑方

治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礞 別研

辰砂 半兩

半夏 飛研各半兩

洗七次姜汁搗作曲三兩

南星 一兩 炮

右以白礞半夏曲天南星為末和勻生薑汁煮麩糊丸  
如梧桐子大別用辰砂為衣每服二十九食後姜湯下

半夏利膈丸

御藥院方

治風痰壅盛頭眩目眩咽膈不利

涕唾稠粘并治過酒停飲嘔逆惡心胃膈引痛腹內有

聲

半夏 湯洗

白朮

白茯苓 去皮

白礞 生

入參 去芦

滑石

貝母 各一兩

白附子 生用

天南星 生用

右為末麩糊丸如梧桐子大每服三十九食後姜湯下

痰飲

心法附錄卷之九

二

三指集

葉氏分涎方 簡易方 治風痰留滯膈間喘滿惡心涎唾不

利

陳皮 去白

揀參

枳實

苦梗

半夏 洗七次今軟每箇切

天南星 去皮蒸餅包灰火煨

右吹咀每服二錢水一盞姜十片同煎食後服

靈砂白丸子

治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔

吐不已

靈砂

青州白丸子

各一兩

右為末和勻以生薑自然汁打黍米糊丸如梧桐子大



每服三十九空心人參湯或棗湯下

大人參半夏丸宣明方化痰墜涎止嗽定喘治諸痰不可

盡述

茯苓去皮 人參去芦 天南星 薄荷葉各半兩

乾生薑 半夏 白礬生 寒水石

蛤粉各二兩 藿香葉二兩

右為末糊丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水

亦得一方加黃連半兩黃蘗一兩水丸取効愈速治酒

病調和臟腑尤宜服之

心風痰不下聖惠方

痰飲心法附餘卷之九 荊芥四兩 白礬生一兩 槐角生二兩 陳皮

半夏各二兩半

右為末水糊為丸如梧桐子大每服四十九生薑湯下

辰砂祛痰丸聖惠方治酒食過多酸鹹作成痰飲聚於胃

中疑則嘔逆惡心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則

左癱右瘓淺則蹉然倒地此藥神効

硃砂一兩水飛一半 半夏四兩 槐角炒

陳皮 白礬生 荊芥各一兩

生薑四兩與半夏製作餅陰乾

右為末姜汁打糊丸如梧子大每服五十九生薑湯皂

角子湯任下忌動風動氣物食後溫服

化痰丸瑞竹堂方快脾順氣化痰消食

半夏淨洗 皂角切碎 天南星去皮 生薑

白礬

右件各四兩用砂鍋內同水煮天南星無白點為度煉

去皂角不用將半夏天南星生薑切細晒乾如無日色

慢火焙乾加後藥

青皮去穢 陳皮 乾葛 紫蘇子

神麴 麥蘗炒 蘿蔔子炒別 山查

香附子去毛 杏仁去皮尖

痰飲心法附餘卷之九 一方加枳實茯苓

右十味各一兩合煎藥碾末姜汁蒸餅浸糊丸如梧桐

子大每服五七十丸食後臨卧茶酒任下

利膈化痰丸

白木四兩 皂角去皮炒 生半夏 生白礬

右將皂角搽水半碗浸半夏白礬春五夏三秋七冬十

日不用皂角晒乾為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服

三十九姜湯下

四七湯和清方治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅

核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏五兩 茯苓四兩 紫蘇三兩 厚朴三兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至六分熱服婦人有孕惡阻亦宜服之但半夏用姜汁製過男子因氣而小便白濁用此湯下青州白丸子有効三仙丸百一選方治中脘氣滯胃膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星生去 半夏湯洗七次二味各五兩為末用生

痰飲聚為度難在篩中用諸葉蓋之令氣黃色 香附子去毛五兩 枳殼去白 青皮去白 枳殼去白 檳榔

右為末麵糊丸如梧子大每服四十丸食後姜湯下機

要香附加橘紅名玉粉丸治氣痰

沉香和中丸秘方治証同前

陳皮去白 青皮去白 枳殼去白 檳榔

木香 黃芩 青礞石煅 滑石二兩 黑牽牛頭末二

大黃一分 沉香一錢 右為末滴水為丸如梧子大每服五十丸臨臥茶清下

節齋化痰丸

論曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何

痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清薰蒸成聚而變為痰為痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾古人用

二陳湯為治痰通用者所以實脾燥濕治其標也然以

之而治濕痰寒痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上

肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間

吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被

鬱故其津液之隨氣而升者為火薰蒸凝濁鬱結而成

歲月積久根深蒂固故名老名鬱而其源則火邪也病

在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃濕痰冷痰痰

飲痰涎之比也故湯藥難治亦非半夏茯苓蒼朮枳殼

南星等藥所能治也惟在開其鬱降其火清潤肺金而

消化凝結之痰緩以治之庶可取効今製一方于後

天門冬去心 黃芩酒炒 海粉另研 瓜蒌仁另研

橘紅去白 桔梗去芦 香附子鹽炒 芒硝另研

連翹五錢 青黛二錢 右為極細末煉蜜入生薑汁少許和藥末杵極勻丸如

小龍眼大噙化一丸或嚼爛清湯細嚥之或丸為細丸

如黍米大淡湯送下五六十丸

此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺

與胃脘皆受火邪故鬱滯而成此方用天門冬黃芩

泄肺火也海粉芒硝鹹以軟堅也瓜蒌仁潤肺降痰  
香附米開鬱降氣連翹開結降火青黛解鬱火故皆  
不用辛燥之藥

○已上數方治鬱痰老痰之劑

蘇子降氣湯和劑方治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰  
涎壅盛

川當歸去芦甘草炙前胡去芦肉桂去皮

厚朴去皮姜製半夏麴紫蘇子各五兩半

陳皮去白二兩半

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

痰飲心法附餘卷之九治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿

俞山入降氣湯和劑方治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿

咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡去芦五加皮姜製黃芪肉桂

當歸去芦半夏麴紫蘇子陳皮去白

厚朴去皮姜製桔梗各一兩羌活去芦各

甘草一兩乾姜炮附子炮去人參去芦各

右咬咀每服五錢水一盞半紫蘇三葉姜三片棗一枚

煎服

黑錫丹和劑方治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯

竭及婦人血海久冷無子或赤白帶下並皆服之

肉桂去皮沉香附子炮去葫蘆巴酒浸

破故紙苗香肉豆蔻麴陽起石研細

金鈴子去木香各一兩硫黃黑錫去渣各

右用燈盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上

出火毒研令極細餘藥並杵羅為末一處和勻自朝至

暮必研令黑光色為度酒糊為丸如梧桐子大陰乾入

布袋內擦令光瑩每服四十粒空心鹽姜湯下女人艾

棗湯下

靈砂丹和劑方治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升

降陰陽安和五臟扶助元氣

痰飲心法附餘卷之九水銀一兩硫黃四兩

右用新鐵銚炒成砂有煙即以醋酒候研細入水火鼎

醋調赤石脂封口鐵線笮縛晒乾鹽泥固濟用炭二十

斤煨如鼎裂筆蘸赤石脂頻扶火盡為度經宿取出研

為末糯米糊為丸如麻子大每服二寸粒空心棗湯米

飲人參湯任下

○廣按已上四方並係類聚溫熱之藥而出證皆云治

上盛下虛氣不升降蓋謂盛者即心火之炎虛者即

腎水之弱火炎水弱則有升無降故津液湧而為痰

稠粘膠固凝滯於胃膈之間非金石丹藥溫熱香燥

之劑而能流通開散之乎書云重可以去怯正所謂  
劫劑也用此劫劑之後又當用無補無消之藥繼之  
如六味地黃丸之類是也

金匱腎氣丸 即六味地黃丸 治腎氣有飲故用此藥補腎

逐水 見補損

○廣按腎水虛弱則心火上炎以致津液敗濁而為痰  
涎用此劑補腎逐水乃標本之藥也前黑錫丹等劑  
溫脾劫痰乃治標之藥也

六君子湯 治脾虛不進飲食嘔吐痰水 方見調補脾胃

白朮湯 援粹方 治胃中虛損及痰吐者 方見調補脾胃

痰飲 心法附餘卷之九 三  
半夏 錢二 白朮 一錢 檳榔 二錢 木香

甘草 錢二 茯苓 二錢

右為末每服二錢生薑調下食前服

八味丸 治脾腎兩虛嗽唾而不咳者 方見補損

○已上數方治虛痰之劑

○廣按痰本津液因熱而成熱則津液薰蒸而稠濁故  
名為痰也痰之為物隨氣升降無處不到或在臟腑  
或在經絡所以為病之多也若夫寒痰濕痰熱痰則  
易治至於風痰燥痰老痰則難治也分而治焉寒則  
溫之濕則燥之熱則清之風則散之燥則潤之老則

軟之總而治焉用人參甘草以補脾半夏白朮以燥  
濕陳皮青皮以利氣茯苓澤瀉以滲水是舉其綱也  
如寒痰加以附子姜桂濕痰加以蒼朮厚朴食積痰  
加以麴蘗山查熱痰加以芩連梔子風痰加以南星  
皂角燥痰加以瓜蒌杏仁鬱痰加以枳殼香附老痰  
加以海石芒硝是張其目也雖然痰證又有挾虛者  
不可不加補藥焉如挾氣虛加以四君血虛加以四  
物脾虛治以六君腎虛治以六味分其表裏上下審  
寒熱虛實而施治之未有不中其情者

痰飲治例 出明醫雜著

痰飲 心法附餘卷之九 三

王節齋曰痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七  
情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或  
凝滯胃脘或留聚腸胃或流注經絡四肢隨氣升降遍  
身上下無處不到其為病也為喘為欬為惡心嘔吐為  
痞隔壅塞關格異病為泄為眩暈為憎雜怔忡驚悸為  
癲狂為寒熱為痛腫或骨間輻輳有聲或背心一點常  
如水冷或四肢麻痺不仁皆痰所致百病中多有兼痰  
者世所不知也痰有新久輕重之殊新而輕者形色清  
白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結欬之難出  
漸成惡味酸辣腥臊鹹苦甚至帶血而出治法痰生於

脾胃宜實脾燥濕又隨氣而升宜順氣為先分導次之  
又氣升屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之  
風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食積痰則消之  
在上者吐之在中者下之又中氣虛者宜固中氣以運  
痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈盛矣

主方二陳湯

橘紅中

半夏湯泡

白茯苓上

甘草下

生姜中

右方摠治一身之痰如要下行加引下藥上行加引上藥

痰飲

心法附餘卷之九

三

三

濕痰多軟如身體倦怠之類加蒼朮白朮

寒痰痞塞胃中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之

類痰厥頭痛亦加半夏

風痰加南星枳殼白附子天麻姜蚕猪牙皂角之類

氣虛者更加竹瀝氣實加荊瀝俱用姜汁

執痰加黃芩黃連痰因火盛逆上降火為先加白朮

黃芩軟石膏黃連之類眩暈嘈雜者火動其痰也

亦加山梔黃連黃芩

血虛有痰者加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝姜

汁滯血者更加黃芩白芍藥桑白皮血滯不

行中焦有飲者取竹瀝加生薑韭菜自然汁吃三  
五銀盞必胃中燥煩不寧後愈

氣虛有痰者加人參白朮脾虛者宜補中虛以運

痰降下加白朮白芍藥神曲麥芽兼用升麻提起

內傷挾痰加人參黃耆白朮之類姜汁傳送或加

竹瀝尤妙

食積痰加神曲麥芽山查炒黃連枳實以消之甚者

必用攻之宜丸藥兼血虛者用補血藥送下中焦

有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之

盡則虛矣

痰飲

心法附餘卷之九

三

三

老痰用海石半夏瓜蒌仁香附米連翹之類五倍子

佐他藥大治頑痰宜丸藥喉中有物咯不出嚥

不下此痰結也用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜

蒌仁杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝姜汁煉

蜜和丸噙化服之脉濇者卒難開必費調理氣實

痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滯者難

治

痰在膈上必用吐法瀉之不去膠固稠濁者必用吐

脉浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就發

散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐如防風川芎

桔梗芽茶生姜韭汁之類或瓜蒂散凡吐用布緊

勒肚於不通風處行之

痰在腸胃間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之

類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰易生而多

痰在脇下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝

不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生姜韭汁隔間

有痰或癲狂或健忘或風痰俱用竹瀝與荆瀝同

功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐

痰飲 心法附餘卷之九

三

希

下後方用藥

凡人頭面頸身中有結核不痛不紅不作膿者皆

痰注也宜隨處用藥消之

滾痰丸攻瀉腸胃痰積及小兒食積痰急驚風痰盛

者最為要藥常宜合備但須量人虛實而用之

○痰熱 新增

附諸賢論

劉宗厚曰夫痰熱之原有因熱而生痰者有因痰而生熱

者廣按因熱而生痰者熱則薰蒸津液而成痰因痰而

生熱者痰則阻礙氣道而生熱夫熱生痰而痰生熱始

終新久之謂也

附諸方

四神丸 經驗良方 治痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急手足

頑麻

天麻 大者 南星 熱湯洗 防風 去芦各 薄荷葉 半兩

右為末酒糊為丸如菉豆大每服一十九食後荊芥生

姜湯下

龍星丹 治諸風熱壅痰盛

解毒雄黃丸 治上膈壅熱痰涎不利 並見中風

鵬砂散 和劑方 治大人小兒風痰熱毒喉閉生瘡鼻衄出

痰飲

心法附餘卷之九

三

希

血

山藥 生六斤 腦子 七兩 另研 牙硝 十四兩 甘草 二十兩

射香 研四兩 鵬砂 生二十兩 另研

右為末每服半錢好茶點服

上清丸 治膈間痰熱口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽喘悶煩

燥不寧 見風熱

哮喘 二十八

丹溪心法

○哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用



療藥須當帶表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者  
用二陳湯加蒼朮黃芩作湯下小胃丹看虛實用

又方 治寒包熱而喘

半夏

枳殼

桔梗

片苓

紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

右水煎服

天寒加桂枝

治哮喘積方

用雞子一箇畧敲損膜不損浸尿缸內三四日夜取

出煮熟喫之効蓋雞子能去風痰

紫金丹 治哮喘三年後可用

痰喘

心法附餘卷之九

三三

古言

用精豬肉二十兩一作三切作骰子塊用信一兩明者

研極細末拌在肉上令勻分作六分用紙筋黃泥包之

用火烘令泥乾却用白炭火於無人處煨青烟出盡為

度取放地上一宿出火毒研細以湯浸蒸餅丸如菉豆

大食前茶湯下大人二十九小兒七八丸量大小虛實

與之

喘

二十九

丹溪心法

喘病 氣虛 陰虛 有痰 凡久喘之証未發宜扶

正氣為主已發用攻邪為主 氣虛短氣而喘甚不可用

苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加千緡湯有痰亦短氣

而喘 陰虛自小腹下火起衝於上喘者宜降心火補陰

有火炎者宜降心火清肺金 有痰者用降痰下氣為

主 上氣喘而躁者為肺脹欲作風水證宜發汗則愈

有喘急風痰上逆者大千方千緡湯佳或導痰湯加千緡

湯 有陰虛痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火

諸喘不止者用劫藥一二服則止劫之後因痰治痰因火

治火切藥以椒目研極細末一二錢生薑湯調下止之氣

虛不用 又法蘿蔔子蒸熟為君皂角燒灰為臣研末生

喘痰

心法附餘卷之九

三三

古言

姜汁煉蜜丸如小豆大服五七十丸喻化止之 氣虛者

用人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類 氣實人因服黃

耆過多而喘者用三拗湯以瀉氣 若喘者須用阿膠若

久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子以補之 若新病

氣實而發喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者

凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣

虛喘者擡肩頓項喘而不休火炎上喘者乍進乍退得

食則減食已則喘大槩胃中有實火膈上有稠痰得食

入咽墜下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再

升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水凡利五六次而安

入方

痰喘方

南星製中

半夏製中

杏仁去皮尖中

瓜蒌仁中

香附上

陳皮去白中

皂角炭下

蘿蔔子下

右為末神麴糊丸每服六七十丸姜湯下

又方

蘿蔔子蒸半兩

皂角半兩

海粉一兩

南星一兩

喘疾

心法附餘卷之九

三

三

白礬

一錢半姜汁浸

石用瓜蒌仁姜蜜丸噙化

切喘藥

好銅青

研細號丹少許炒赤色

右為末每服半錢醋調空心服

附諸賢論

王節齋曰喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹脹則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之

官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之

降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故小

便漸短以致水溢皮膚而生腫滿焉此則喘為本而腫

為標治當清金降氣為主而行水次之脾土惡濕外主

肌肉土能剋水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸

漬肌肉水既上溢則邪反浸肺氣不得降而生喘矣此

則腫為本而喘為標治當實脾行水為主而清金次之

苟肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用

清金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治喘脹者但知

實脾行水而不知分別肺脾二症予故為發明之

附脉理

心法附餘卷之九

三

袖珍方論曰凡此證脉滑而手足溫者生脉瀋而四肢寒

者死

附諸方

三拗湯

和劑方

治感冒風寒鼻塞聲重語音不出咳嗽喘

急

生甘草

麻黃

不去節

杏仁

不去皮火

各等分

右咬咀每服五錢水一盞姜五片煎服以得汗為度

華蓋散

和劑方

治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不

得睡卧或聲音不出者



小青龍湯 和劑方 治感寒咳嗽喘急不得睡卧

蘇沉九寶湯 簡易方 治老人小兒素有喘急遇寒暄不常

發則連綿不已咳嗽吼哮夜不得睡 並見咳嗽

分氣紫蘇散 和劑方 治脾胃不和氣逆喘促

五味子 去梗 桑白皮 茯苓 去皮 甘草

草果仁 大腹皮 陳皮 去白 桔梗 各二兩

右咬咀每用二兩入紫蘇一兩五錢搗碎同一處拌勻

每服四錢水一盞姜三片入鹽少許同煎空服

紫蘇子湯 濟生方 治因憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹及

喘促煩悶腸鳴氣走澆瀉有聲大小便不利脉虛數而

澁 見氣滯類 心法附餘卷九

杏仁半夏湯 宣明方 治肺氣不足喘咳嗽不已并傷寒往

來寒熱

杏仁 去皮 桔梗 陳皮 去白 茯苓 去皮

漢防己 桑白皮 白礬 各二錢 猪牙皂角

薄荷 各一錢 甘草 二錢

右為末作二服水一盞生姜三片煎至六分食後溫服

寧蘆散 濟生方 治過食煎燂或飲酒過多致肺壅喘不得

安卧吸肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甘草 炙 桔梗 瓜蒌仁 升麻

慧以仁 桑白皮 炙 葛根 各一兩 甘草 炙 五錢

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去渣

食後溫服

定肺湯 直指方 治上氣喘嗽

紫苑 五味子 橘皮 去白 甘草 炙

紫蘇子 炒 杏仁 去皮 炒 桑白皮 炒 半夏 製

枳殼 炒 等分

右咬咀每服一兩生薑五片紫蘇五葉水二錢煎至一

盞食後溫服

○已上數方攻邪之劑

喘疾 心法附餘卷九 人參潤肺湯 宣明方 治肺氣不足喘急咳嗽不已往來寒

熱自汗 見咳嗽 蘇子降氣湯 和劑方 治虛陽上攻喘促咳嗽 見痰類

杏蘇飲 直指方 治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉 二兩 五味子 大腹皮 烏梅 去核

杏仁 去皮 炙 桑白皮 炒 陳皮 去白 桔梗

麻黃 去節 阿膠 炒 各七錢半 紫苑

甘草 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分去渣

食後溫服

玉華散 直指方治咳嗽上喘調順肺金清利咽膈安和神氣

甜葶壁 焙 桑白皮 炒 天門冬 去心 馬兜鈴

半夏 製 紫苑 杏仁 去皮 貝母 炮

百合 人參 錢各五 百部 甘草 各二錢

右咬咀每服一兩水二盞生薑四片棗子三枚煎至一盞去渣食後溫服一方無生薑

杏參散 秘方治胃膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡卧不得見咳嗽

○已上數方半攻半補之劑

喘疾 心法附餘卷之九

神秘湯 三因方治上氣喘急不得卧者

橘皮 去白 桔梗 紫蘇 五味子

人參 各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分食後服

知母茯苓湯 宣明方治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

見肺痿類

五味子湯 活人方治喘促脉伏而數者

五味子 半兩 人參 麥門冬 去心 杏仁 去皮

生薑 陳皮 錢各一 棗子 三枚

右咬咀作二服每服水二盞煎至一盞食後溫服

寧肺湯 楊氏家藏方治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾稠黏 見咳嗽

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接 見發熱

○已上數方補虛之劑

人參理肺散 拔粹方治喘不止

麻黃 去節 炒 木香 各一兩 罌粟殼 炒 三兩 人參 三兩

杏仁 三兩 當歸 一兩

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣食後溫服

紫參散 拔粹方治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

麻黃 桔梗 五味子 甘草 炙

紫參 兩 罌粟殼 炒 三兩 蜜 三兩

右咬咀每服一兩水一盞半煎至八分食後溫服

○已上二方止澁之劑

惡心 三十

丹溪心法

○惡心有痰 有熱 有虛 皆用生薑隨證佐藥

戴云惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上宜用生薑蓋能開胃豁痰也

附諸方

大半夏湯

半夏

陳皮

茯苓 各二錢半

右以咀水二盞生姜二錢半煎至八分食後服

小半夏茯苓湯

半夏

五兩

茯苓 三兩

右以咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生姜自然

汁投藥中更煎一二沸執服無時 或用生姜半兩同

煎

加味二陳湯

半夏

橘紅

茯苓

甘草

炙

黃連

姜汁

黃芩

姜汁炒各一錢半

右作一服水二鍾姜五片煎八分溫服

加味生薑理中湯

人參

白朮

陳皮

各等分

生薑

甘草

右水煎服

嘔吐

三十一

丹溪心法

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦 胃中有熱

膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生薑 有久病嘔者

胃虛不納穀也用人參生薑黃芪白朮香附之類 嘔吐

朱奉議以半夏橘皮生薑為主 劉河間謂嘔者火氣炎

上此特一端耳 有痰膈中焦食不得下者 有氣逆者

有寒氣鬱於胃口者 有食滯心肺之分而新食不得

下而反出者 有胃中有火與痰而嘔者 嘔吐藥忌瓜

附脈理

嘔吐

心法附餘卷之九

三

脈訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濡數凶斷

附諸方

香薷飲

和劑方治伏暑而嘔

見中暑

四君子湯

援粹方治久病胃虛而嘔

茯苓

白朮

人參

黃芪 各一兩

右以咀每服一兩水二盞姜五片煎一盞去渣溫服

錢氏白朮散

治症同前

見痢類

加味理中湯

和劑方治胃感寒嘔吐不止

人參

白朮

乾姜

炮 甘草 各一錢

丁香

十粒

右以咀生薑十片水煎服

大藿香散 衛生方 治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作

寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉 洗去土 半夏 白朮 人參 去芦

木香 不見火 茯苓 去皮 桔梗 去芦 枇杷葉 製去毛

橘皮 甘草 炙各半兩

右為末每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎六分溫服

養胃湯 徐氏方 治脾胃虛冷不思飲食嘔吐翻胃

白豆蔻仁 人參 丁香 縮砂仁

肉豆蔻 附子 炮 甘草 沉香

橘紅 麥芽 神麴 各三錢

右為細末每服二錢姜鹽湯下

旋覆花湯 衛生方 治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花 去梗 半夏 湯泡七次 橘紅 乾姜 炮各一兩

檳榔 人參 去芦 甘草 白朮 各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

加味二陳湯

半夏 橘紅 各五兩 白茯苓 二兩 甘草 炙一兩半

砂仁 丁香 各五錢 生薑 二兩

右水煎服

藿香養胃湯 御藥院方 治嘔吐不已

藿香葉 一兩 半夏 二兩湯洗焙 陳皮 一兩 甘草 二兩

厚朴 二兩姜製 蒼朮 三兩米泔浸

右為粗末每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎

去渣溫服

生薑橘皮湯 活人方 治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮 四兩 生薑 半斤

右以咀水七盞煮至三盞去渣逐旋溫服

濟生竹茹湯 治熱嘔或因飲酒過度而嘔者

葛根 半夏 湯泡七次 甘草 二兩炙

右以咀每四錢水一盞入竹茹一小塊姜五片煎服

小柴胡加竹茹湯 治發熱而嘔

柴胡 二錢 半夏 湯洗一錢 黃芩 人參

甘草 炙各七錢 竹茹 一塊 橘皮 錢

右以咀水一盞生薑七片煎六分溫服

二一承氣湯 宣明方 治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或

利而不鬆快時覺腹痛滿者或下利赤白而嘔吐食不

下者或大小腸膀胱結而不上為嘔吐隔食煎熟入

硝細細服

○廣按三因方言嘔吐証忌用利藥此言其常然大小

腸膀胱熱結而不通上作嘔吐隔食若不用利藥開

通發泄則嘔吐何由而止或只嘔吐而大小便不秘

澀者此利藥又當所忌也三承氣湯見濕熱類

吐虫而嘔方

黑鉛炒成灰檳榔末等分米飲調下

## 欬逆 三十二

丹溪心法

○欬逆有痰 氣虛 陰火 視其有餘不足治之其詳

在格致餘論不足者人參白朮湯下大補丸 有餘并有

痰者吐之人參蘆之類痰碍氣而吃逆者用蜜水吐此乃

燥痰不出 痰者陳皮半夏 氣虛人參白朮 陰火黃

連黃栢滑石 欬逆自利者滑石甘草炒黃栢白芍人參

白朮陳皮加竹瀝服

戴云吃逆者因痰與熱胃火者極多

附諸方

半夏生薑湯 治欬逆欲死

半夏一兩二錢半 生薑一兩

右以水二盞煎八分去滓分作二服

柿蒂湯清生方 治胃膈痞滿咳逆不止

柿蒂 丁香各一兩

右咬咀每服二錢水一盞姜五片煎服

羌活附子散清生方 治吐利後胃寒咳逆

羌活 附子炮去 茴香炒各五錢 乾姜炮

木香各一兩

右咬咀每服二錢水一盞鹽少許煎至半盞溫服不拘

時一方去木香用丁香三因方二香並用

橘皮湯清生方 治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮去白二兩 人參 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞竹茹一小塊生薑五片棗二

枚煎七分溫服不拘時

○廣按欬逆之症乃胃火蒸薰津液成痰凝滯於胃膈

之間阻碍氣道所以咳逆也已上二方治吐利後胃

寒胃熱咳逆然吐利後胃熱咳逆者常多而胃寒咳

逆者千百中而一二也

人參白朮湯

人參 黃芩 柴胡 乾姜

梔子仁 甘草炙各半兩 白朮 防風

半夏泡九次 五味子各四錢

右咬咀每服四錢姜三片水一鍾半煎至七分溫服

桂苓白朮散 宣明方 消痰止咳逆散痞塞開堅結痛悶進

飲食調和臟腑

揀桂

乾生薑

錢各二 茯苓 去皮

半夏 各一

白朮

陳皮 去白

澤瀉 各半

右為末麵糊丸如小豆生薑湯下二三十丸日三服病

在上食後病在下食前在中不拘時一方加黃連半兩

黃栢二兩水丸取効愈妙

灸法 見濕熱

大補丸 見補損

欬逆

心法附餘卷之九

四

# 翻胃

三十三

丹溪心法

○翻胃大約有四 血虛 氣虛 有熱 有痰無病

必用童便韭汁竹瀝牛羊乳生薑汁 氣虛入四君子湯

右手脉無力 血虛入四物湯加童便左手脉無力 切

不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味 治反胃用黃

連三錢生薑汁浸炒山查肉二錢保和丸二錢同為末糊

丸如麻子大胭脂為衣人參湯入竹瀝再煎一沸下六十

九有痰二陳湯為主寸關脉沉或伏而大 有氣結宜

開滯導氣之藥寸關脉沉而澹 有內虛陰火上炎而反

胃者作陰火治之 年少者四物湯清胃腕血燥不潤便

故滋格致餘論其詳 年老雖不治亦用參朮關防氣虛

胃虛 氣虛者四君子湯加蘆根童便或參苓白朮散或

韭汁牛羊乳或入駁驢尿 又有積血停於內而致當消

息逐之大使澀者難治常令食兔肉則便利 翻胃即膈

噎 膈噎乃翻胃之漸 發揮備言 年高者不治 糞

如羊屎者斷不可治大腸無血故也

戴云翻胃血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無

力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有

翻胃

心法附餘卷之九

四

三十三

熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛者四

物為主氣虛者四君子為主熱以解毒為主痰以二陳

為主

入方 用馬剝兒燒灰存性一錢好棗肉平胃散二錢

右和勻溫酒調服食即可下然後隨病源調理

又方

茱萸中

黃連

貝母上

瓜蒌仁下

牛轉草中

治翻胃

韭菜汁二兩 牛乳一盞

右用生薑汁半兩和勻溫服効

治翻胃積飲通用

益元散生薑自然汁澄白脚九小九子時時服

溫清丸 治翻胃

乾姜一兩 滑石 甘草各二兩

右為末丸如桐子大每服三五十丸白湯下

附諸方

撞氣阿魏丸 和劑方 治五種噎疾九般心痛痞癖氣塊腹

痛腹鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並治之

木香通氣飲子 御藥院方 治一切氣噎塞痰飲不下

青皮 去穢 木香 蓬莪術 檳榔

陳皮 去白 蘿蔔子 炒各五錢 藿香葉一兩 甘草炙

人參 去芦 枳殼 錢各五 香白芷 二錢

右為末每服五錢水二盞煎八分溫服

瓜蒌實丸 濟生方 治胃痞痛徹背脇喘急妨悶膈噎翻胃

方見痞類

人參利膈丸 按粹方 治胃中不利痰咳喘滿和脾胃壅滯

推陳致新治膈氣聖藥

木香 檳榔 半錢 人參 當歸

薑香 甘草 枳實 各一 大黃 酒浸

厚朴 姜製 一兩

右為末滴水為丸梧桐子大每服五十九丸溫水送下

棗肉平胃散 開胃進食

厚朴 姜製 陳皮 去白各三兩 甘草炙

紅棗 生薑 各二兩 蒼朮 酒浸一宿 炒五斤

一方加茯苓人參

右剉拌勻以水浸過面上半寸許煮乾焙燥為末每服

二錢鹽湯空心點服

保和丸 消食開胃 見積類

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

導寧純陽丹 治痰涎聚於中脘不能傳導 垂見調補脾胃

○已上數方消導之劑

白朮和胃丸 治脾胃虛弱不能運化

和中散 同前

八珍湯 同前

參苓白朮散 同前 俱見調補脾胃

已上數方補虛之劑

燒針丸 此藥清鎮專主吐逆

黃丹 多不以

右研細用去皮小囊肉丸如雞頭子大每用一丸針簽於燈上燒灰為末乳汁下

神仙奪命丹 專治噎食

烏梅十三箇水浸去核

硃砂二錢

雄黃二錢

乳香一錢 百草霜錢五

菉豆

黑豆各四十粒

右將烏梅杵爛前藥并豆為末入梅再搗和勻丸如彈子大以乳香少加硃砂為衣陰乾每服一丸空心嚥化待藥盡烙熟餅一箇擘碎入熱茶泡食之無碍為驗過三五日依法再服一丸即愈極有神効

治膈氣經驗方

翻胃 心法附餘卷之九

至一

三箇

用大鯽魚自死者活者不効剖去腸留鱗用大蒜去皮薄切片填滿魚腹內仍合魚用濕紙包定次用麻縛之又用熟黃泥厚厚固日微乾炭火慢慢煨熟取出去鱗刺骨用平胃散杵丸如梧桐子大日晒乾瓶收勿令泄氣每服空米飲下三十九

槿花散 治翻胃

以千葉白槿花陰乾為末陳米湯調下三五口不轉再服

一方 治轉食

用翻翅雞一隻煮熟去骨入人參當歸鹽各五錢為細

末再煮取與食之勿令人共食

一方 治翻胃不問新久冷熱二症

用虎脂半斤切如豆大用清油一斤入瓦瓶內浸虎脂一月厚綿紙封口勿令氣泄每用清油一兩入無灰好酒一大鍾調勻不拘時溫服服盡病減其虎脂再添油再浸再可活二人若一時無虎脂只用珠子硃黃細研半兩水銀二錢半入硃黃末研至無水銀星再研如黑煤色每服三錢生姜四兩取自然汁入好濃酒一鍾溫熱調空心服厚衾蓋之當自足趾間汗出遍身皆汗透吐當立止不止再服此藥輕浮難調須先滴酒少許以

脂緩緩研之旋添酒調

一方 治噎食

用碓薺上細糠蜜丸如彈子大每服一丸嚥化津液嚥下

一方

用白麵二斤半蒸作大饅頭一箇項上開口取空將皂礬裝滿用新瓦四圍遮護饅頭鹽泥封固却挖土窰安放以文武火燒一晝夜候紅色取出研為細末棗肉丸如梧桐子大每服二十九空心酒湯任下忌酒色

○已上數方專治之劑



西君子湯

四物湯 俱見補損

二陳湯 見痰類

○廣按膈噎翻胃之證因火而成其來有漸病源不一有因思慮過度而動脾火者有因忿怒過度而動肝火者有因久食煎炒而生胃火者有因淫慾忘返而起腎火者蓋火氣炎上薰蒸津液成痰初則痰火未結咽膈乾燥飲食不得流利為膈為噎久則痰火已結胃之上脘不開飲食雖進停滯腸間須臾便出謂之嘔吐至於胃之下脘不開飲食雖進停滯胃中良翻胃 心法附錄卷之九 五十五

久方出謂之翻胃丹溪云年高者不治蓋少年氣血未虛用藥劫去痰火病不復生年老氣血已虛用藥劫去痰火雖得暫愈其病復作所以然者氣虛則不能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火故也丹溪又云此証者切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味其局方在用香燥之藥宜合手夫証屬熱燥固不宜用香燥之藥又香散氣燥耗血而滋味助火而生痰也予嘗用霞天膏加於補虛藥中以治此証者一人則吐瀉以去積血一人則吐瀉以去積痰俱獲病安思食而彼二人俱不能節戒隨啖肥甘終不

能免殊不知此証挾虛雖云病去而脾胃尚弱肥甘

難化故病復也噫嘻得此証者可不知所謹哉知所

懼哉耶若用霞天膏吐瀉後宜用人參煉膏補之

霞天膏 見倒倉法 人參膏 見駐顏

嘈雜 三十四

丹溪心法

○嘈雜是痰因火動治痰為先姜炒黃連入痰藥用炒山

梔子黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛 嘈雜

此乃食鬱有熱炒梔子姜炒黃連不可無 肥人嘈雜二

陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒山梔子 嘈雜若濕痰氣鬱

不喜食三補丸加蒼朮倍香附子 醫按將氏子條云心

嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而止

又云眩運嘈雜是火動其痰二陳湯加梔子芩連之類

戴云此則俗謂之心嘈也

二補丸 見補損

二陳湯 見痰類

關格 三十五

丹溪心法

○關格必用吐提其氣之橫格不必在出痰也 有痰宜吐者二陳湯吐之吐中便有降 有中氣虛不運者補氣藥中升降 寒在上熱在下脉兩手寸俱盛四倍以上戴云關格者謂膈中覺有所碍欲升不升欲降不降欲食不食此為氣之橫格也

## 癭氣 三十六

丹溪心法

癭氣先須斷厚味

入方

海藻

一兩

黃連 二兩 一云黃蘗

五五

三白

右為末以少許置掌中時時舐之津嚥下如消三分之

二止後服

附諸方

海帶丸 治癭氣久不治者

海帶

貝母

青皮

陳皮

右各等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後嚥化

一方

海藻

海帶

昆布 各一兩

廣茂

青鹽

各半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後嚥化

破結散 治石癭氣癭筋癭血癭肉癭等證

海藻 洗

龍膽草

海蛤

通草

昆布 洗

礬石

松蘿 各七錢

麥麴 一兩

右為末每服二錢酒服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菓等物

丹溪心法

○結核或在項在膈在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核不散

癭氣

心法附餘卷之九

五五

三白

入方

治耳後項各一塊

姜蚕 炒

酒大黃

青黛

牛膽南星

右為末蜜丸嚥化

又方 治項頸下生痰核

二陳湯 四錢

大黃 七分

連翹 七分

桔梗 八分

柴胡 七分

生薑 三片

右以水煎食後服

又方 治臂核作痛

四錢二陳湯加連翹七分

防風 五分

川芎 五分

皂角刺 五分

蒼朮 七分

酒黃芩 七分

右以水煎服

瘰癧

心法附餘卷之九

五十七

瘰癧

瘰癧心法附餘卷之九終

丹溪心法附餘卷之十

休寧東山古菴方廣約之類集

# 痰熱門

瘰癧

五十七

丹溪心法

○瘰癧不可作風治無用風藥 大率與瘰癧病相似此瘰癧為甚為虛宜帶補 多是氣虛有火兼痰宜用人參竹瀝之類

瘰癧

心法附餘卷之十

一

瘰癧

附論

○廣按瘰癧發作則通身而戰棹皆因氣虛挾痰火所致正猶火炎而旋轉也火能燥物而使氣液之不足世人不諳誤認為風而用風藥風能勝濕是不足之中而又見損也玉匱金鑰曰休治風休治燥治了火時風燥了夫火為風燥之本能治其火則是散風而潤燥何風燥之有哉此瘰癧症所以宜補氣液而兼散痰火也

瘰癧

三十八

丹溪心法

○驚與痰宜吐 大率行痰為主用黃連南星瓜蒌半夏  
尋火尋痰分多分少治之無不愈者 分痰與熱 有熱  
者以涼藥清其心 有痰者必用吐藥吐後用東垣安神  
九 大法宜吐吐後用平肝之劑青黛胡川芎之類龍  
會九正宜服之 且如癇因驚而得驚則神不守舍舍空  
而痰聚也

戴云癇者俗曰猪癲風者是也

附脉理

脉訣舉要曰癲癇之脉浮洪大長滑大堅痰蓄心狂

附諸方

通泄散

治風涎暴作氣塞倒仆

苦丁香 為末三錢

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎自出如未出

含砂糖一塊下咽涎出

墜痰丸 治風癇

天南星 九蒸九晒

右為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服二十九人參湯

菖蒲麥門冬湯任下

一方 治遠年近日風癇心痺風狂中風涎潮牙關不開

破傷風搐者用皂角不蛀肥者一斤去皮弦切碎以  
漿水一碗浸春秋三四日夏一二日冬七日搽去滓將  
汁入銀器或砂鍋慢火熬以槐柳枝攪成膏取出攤厚  
紙上陰乾收貯用時取手掌大一片以溫漿水化在盞  
內用竹筒灌入病人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止服  
溫鹽湯一二口便止忌雞魚生硬濕麪等物

五癇丸 楊氏方 治癲癇發作不問新久竝宜服之

全蝎 二錢 去毒炒 皂角 四兩 提碎水半升浸

南星 二錢 烏蛇 一兩 酒浸一兩 白附子 二兩 湯泡

雄黃 一錢 白礬 一兩 吳蚣 半條 硃砂 二錢 半

麝香 三錢 白姜 一兩 白附子 二兩 湯泡

右為末姜汁煮麪糊丸如梧桐子大每三十九姜湯下

控涎丹 治諸癇久不愈者頑涎結聚變生諸症並

宜治之一

全蝎 二錢 去毒 鈇粉 二錢 甘遂 二錢 半夏

生川烏 二錢 姜蚕 三味 不炒 碎生薑

右為末姜汁打糊丸如菉豆大硃砂為衣每服十五丸

食後姜湯下忌甘草

遂心丹 治風疾癲癇婦人心風血邪

甘遂 錢 不蛀者

右為末用猪心取管血三條和甘遂末將心批作兩塊  
甘遂末入在內令線縛定外用皮紙裹慢火煨熟不可  
焦取末細研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸  
將煨猪心煎湯化下大便下惡物為効

鬱金丹 治痢疾

川芎 二兩 防風 鬱金 猪牙皂角

明礬 各一兩 蜈蚣 黃脚赤脚 各一條

右為細末蒸餅丸如梧桐子大空心茶清下十五丸

追風丹 治風癰及破傷風暗風

川芎 二兩 細辛 六錢 半夏 湯泡 桔梗

附子 泡去 薄荷葉 川烏 白附子 兩各二

魚鱉 人參 去芦 硃砂 另研各

白花蛇 酒浸去皮骨 麝香 另研 南星 三錢

蜈蚣 四條 金頭赤 全蝎尾 去針 一錢 生用

右為末生姜汁和劑為錠每服一錠溫酒化下以汗出

為度

引神歸舍丹 百一選方 治心氣不足并治心風

附子 一箇 重七錢 以上者泡去皮臍 硃砂 一兩

大天南星 厚土皮取 兩生用

右為末用猪心血并麝香為丸如梧桐子大煎甘草根

湯子午之分各一服止五十丸

驚氣丸 和劑方 治心受風邪涎潮昏塞牙關緊閉醒則精

神若痴及驚憂積氣竝皆治之

紫蘇子 二兩 附子 去皮臍 天麻 去苗 橘紅 二兩

白姜蚕 兩 炒半 麻黃 去根節 南木香 一兩 硃砂 研一錢

南星 浸洗薄切姜汁 白花蛇 酒浸炙熟去 皮骨半兩

乾蝎 去針尾毒 微炒一錢

右為末入腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每

服一丸用金錢薄荷湯化下或溫酒化下亦可

○廣按痼症病本痰熱宜用辛寒之劑治之已上三方

皆用附子何也蓋痼乃痰痰結於心胸之間每遇火

動則發非附子熱性走而不守而能流通結滯開散

頑痰可乎此從治之法乃剏劑也不得已而用之亦

猶中風之證本風火陽邪而用烏附類也丹溪前條

云痼症尋火尋痰分多分少則此三方只宜施之於

肥白多痰之人用諸藥而不効者若夫黑瘦多火之

人不宜用也

追風祛痰丸 治諸風癰暗風

防風 天麻 僵蚕 炒去 白附子 一兩

全蝎 去毒炒 木香 各半兩 硃砂 另為末

右為末用猪心血并麝香為丸如梧桐子大煎甘草根

猪牙皂角

炒一兩

白礬

枯半兩

半夏

湯泡七次礬為末秤六兩分作二分  
用主姜汁作餅一分用皂角浸漿作餅一分

南星

三兩到一半化白礬水  
浸一半皂角漿各一宿

右為細末姜糊為丸如梧桐子大每服七八十九食遠

臨卧用淡姜湯或薄荷湯下

○廣按此方用藥之當製藥之精無過不及用之豈有

不効者

○已上數方溫脾化痰之劑

鎮心丹

治諸癇

好辰砂

不拘多少

癲疾

心法附餘卷之十

六

二百九十三

右為細末猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟取出丸如梧

桐子大每服一丸食後臨卧人參湯下

參砂丸

治風癇

人參

蛤粉

硃砂各等分

右三味為細末猪心血為丸如梧桐子大每服三十九

食遠金錢薄荷湯下

歸神丹

治癲癇諸疾驚悸神不守舍

顆塊硃砂

二兩猪心酒浸

金箔二十片

白茯苓

酸棗仁

羅參

當歸各二兩

銀箔二十片

琥珀

遠志姜製

龍齒各一兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二三十丸麥

門冬湯下炒酸棗仁湯亦可

寧神丹

清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荊芥

僵蚕炒

獨活

遠志去心

犀角

麥門冬去心

酸棗仁

炒

辰砂各五錢

另研

半夏

南星

石膏

各一兩

甘草炙

白附子

川芎

鬱金

牛黃各三錢

珍珠三錢

生芩

黃連

各五錢

金箔三十片

癲疾

心法附餘卷之十

七

三百八十六

右為末酒糊丸每服五十九白湯下

牛黃清心丸

和劑方

治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛

煩少睡常發狂癲言語錯亂

六珍丹

三因方

治風癇卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊

叫猪呼犬吠腑臟相引氣爭掣繼吐沫涎久而方醒

通明雄黃

葉子雄黃

未鑽真珠各一兩

丹砂半兩

水銀一兩半

黑鉛一兩

熬成膏

右為末研令極細蜜和杵二三萬下如梧桐子大每服

五九姜棗湯下

龍腦安神丸

按粹方

治男子婦人五種癲癇無問遠年近

日發作無時

茯苓 三兩

大參

地骨皮

甘草 各四兩

麥門冬 二兩

龍腦 別研

射香 各五錢

牛黃 五錢

硃砂

牙硝 各三錢

桑白皮

明犀末 一兩

金箔 十五片

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月溫水化下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強日進

三服

朱砂安神丸

按粹方 治心煩懊懷心亂怔忡胸中氣亂心

下痞悶食入及吐出

癰疾

心法附餘卷之十

生甘草 一錢半

朱砂 四錢

黃連 五錢

生甘草 一錢半

右為末蒸餅丸如黃米大每服十丸唾津送下

虎睛丸

楊氏藏方

治癰疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作

譫語

犀角屑 一兩

虎睛 一對

大黃 一兩

梔子仁 半兩

遠志 一兩

右為末煉蜜丸如菉豆大每服二十丸溫酒食後送下

滾痰丸

治膈熱太甚作癰

見痰類

龍會丸

治肝火太甚作癰

見協痛

○已上數方清心降火之劑

古方三癰丸 治小兒百二十種驚癰

荊芥穗 三兩 白礬 一兩半 生半枯

右為末麴糊為丸黍米大硃砂為衣姜湯下二十九丸如慢驚用朱復丹急驚三癰丸食癰醒脾丸可也

本事人參散 治小兒慢脾風神昏痰盛

人參 半兩

員白大南星

一兩切片以生薑汁并漿水各半陰滿煮帶性晒

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞作兩三次灌下

朱復丹

見中暑

醒脾丸

見

癰疾

心法附餘卷之十

九

顛狂

三十九

丹溪心法

○顛屬陰狂屬陽癰多喜而狂多怒脈虛者可治實則死

大率多因痰結於心胃間治當鎮心神開痰結亦有中邪

而成此疾者則以治邪法治之原病式所論尤精蓋為世

所謂重陰者癰重陽者狂是也大槩是熱 癰者神不守

舍狂言如有所見經年不愈心經有損是為真病如心經

蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若癰哭呻吟

為邪所憑非狂也燒蛋紙酒水下方寸匕 卒狂言鬼語

金大母指甲下即止 風癲引脇痛發則耳鳴用天門冬  
去心日乾作末酒服方寸匕 癲疾春治之入夏自安宜  
助心氣之藥 陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂病宜大吐  
下則除之

入方 治癲風

麻仁 四升

右以水六升猛火煮人牙澄去滓煎取十合旦空心服  
或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進  
三劑愈

又方 治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

苦參 不以  
多少

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸煎薄荷湯下

附脉理

脉訣舉要曰癲癰之脉浮洪大長滑大堅痰蓄心狂又  
曰乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂

附諸方

控涎丹 治痰迷心竅時作癲狂狂言如有所見

甘遂 去心

紫大戟 去皮

白芥子 真者各

等分

右為末煮麴糊丸如梧桐子大晒乾臨卧淡姜湯或熟  
水下三十丸以下利去痰飲為愈

通風祛痰丸 治痰迷心竅顛狂妄語 見癲類

集氏清心圓 簡易方

治心受邪熱精神恍惚狂言呼呌睡

卧不寧

人參

蝎梢

鬱金

生地黄

天麻

天南星

為末入黃牛胆內令滿掛當風  
處吹乾臘月遠要用旋取各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十九丸人參  
湯下

龍星丹

治胸膈停痰蓄熱顛狂號呌 見中風類

滾痰丸

治痰熱攻心顛狂唱哭 方見痰類

○已上數方下痰軍志之劑

類狂

心法附餘卷之十

十一

癲癰

牛黃清心丸

治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少  
睡常發狂癲言語錯亂 見中風

牛黃瀉心湯

治心經邪熱狂語精神不爽

腦子研

牛黃研

硃砂研各

一錢 大黃兩

右研為末每服三錢涼生薑蜜水調下

集氏雄朱丸 簡易方

治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過  
多氣結不散積成痰涎留在心包痰塞心竅狂言妄語

叫呼奔走

類塊硃砂 一錢半

白附子 一錢

雄黃 明淨者

一錢半

右為細末和勻以猪心血和丸如梧桐子大別用硃砂



為衣每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安魂定魄補心益氣

殊砂安神丸 治症同前

龍腦安神丸 治症同前 並見癰類

牛黃膏 聖惠方 治婦人熱入血室發狂不認人者

牛黃 二錢 硃砂 鬱金 各三 腦子

甘草 錢各一 牡丹皮 三錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一丸新水化下

寧志膏 大全良方 治婦人因失血過多心神不安言語不

常不得睡卧

心法附錄卷之十

辰砂 研 酸棗仁 炒 人參

白茯苓 去木

琥珀 錢各七 滴乳香 一錢

右為末和勻每服一錢濃煎燈心棗子湯空心調下

一方無茯神琥珀蜜丸如彈子大薄荷湯化下一丸

茯神散 大全良方 治婦人心虛與鬼交通妄有所見聞言

語雜亂

茯神 一兩 茯苓 人參

石菖蒲 各二

赤小豆 半兩

右以咀每服八錢水一盞半煎至八分通口食前服

○已上數方清心除熱之劑

# 驚悸怔忡 四十

丹溪心法

○驚悸者血虛驚悸有時以朱砂安神丸 痰迷心膈者痰藥皆可定志丸加琥珀鬱金 怔忡者血虛怔忡無時血少者多有思慮便動屬虛 時作時止者痰因火動瘦人多血少 肥人屬痰 尋常者多是痰 真覺心跳者是血少四物朱砂安神之類 假如病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

附諸賢論

心法附錄卷之十

十三

音正

心法附錄曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸怔忡之所肇端也曰驚悸曰怔忡豈可無辨乎心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物過險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚悸心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有快快之狀是則為怔忡治之之法驚悸者與之豁痰定驚之劑怔忡者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已

附脉理



朱砂安神丸 治血虛心煩懊惱驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂過五錢水飛 黃連酒洗六錢 甘草炙二錢

生地黃半一錢 當歸半二錢

右四味為細末蒸餅丸如黍米大朱砂為衣每服三五

十九津下

牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少

睡夢寐紛紜

歸神丹 治驚悸怔忡神不守舍 並見癰類

真珠丹 治肝經因虛內發風邪則魂散不守時或驚

悸怔忡

心法附餘卷之十

柏子仁 人參 酸棗仁各一兩 熟地黃

當歸各一兩 犀角 茯神 沉香

龍齒各半兩 真珠母三錢

右為末煉蜜丸如梧子大辰砂為衣每服四五十丸金

錢薄荷湯下

益榮湯 治思慮過度耗傷心血致心不寧怔忡恍

惚夜多夢寐小便赤白濁

當歸酒浸 黃芪去蘆 小蘗 酸棗仁炒去殼

柏子仁炒 麥門冬去心 茯神去木 白芍藥

紫石英各一兩 木香不見火 人參 甘草炙各半兩

石咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分服

○已上數方補血安神之劑

### 健忘

四十一

丹溪心法

○健忘精神短少者多亦有痰者

戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非比生成之愚頑不知人事者

附諸方

寧志膏 和制方 治心神恍惚一時健忘 見補損

健忘 心法附餘卷之十

定志丸 治心氣不定恍惚多忘

遠志 菖蒲各二兩 人參一兩 白茯苓三兩

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣服二十九丸米湯下

壽星丸 利制方 治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚

健忘妄言如有所見

天南星 一斤先用炭火三十斤燒地坑通紅去炭以

盆覆坑周圍用炭排定勿令走氣次日取出為末 朱砂二兩

琥珀另研

右用生薑汁麴糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至

五十丸煎石菖蒲人參湯下

脾湯清生方 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白木 茯神 去木 黃耆 去芦 龍骨 肉

酸棗仁 去殼 人參 各一兩 木香 半兩 甘草 炙二錢

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分溫服

朱雀丸 百一選方 治心神不定事多健忘

茯神 一兩 沉香 半兩

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十丸人參湯下食

後服

二丹丸 治健忘養神定志和血內以安神外華腠理

方見中風

健忘 心法附餘卷之十

人參 遠志 九聖惠方 治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬 去心 白茯苓 菖蒲 錢各七 人參

遠志 去心 酸棗仁 黃芪 兩各半 桔梗

丹砂 官桂 錢各半

右為末蜜丸如豆大每服二十九至三十九米湯下

### 纏喉風喉痺 四十二附咽痛咽瘡

丹溪心法

喉痺大槩多是痰熱 重者用桐油探吐 一方射干

逆流水吐之 又方李實根皮一片嚙口內更用李實根

研水敷項上一週用新藥 纏喉風屬痰熱戴云謂其

咽喉裏外皆腫者是也用桐油以鴉翎探吐 又法用灯

油脚探吐 又用遠志去心為末水調傳項上一遭立効

亦可吐 咽喉生瘡痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制

客於咽喉也用人參荊芥蜜炙黃柏 虛火用人參竹瀝

血虛四物加竹瀝 實熱者黃連荊芥薄荷硝蜜姜汁

調嚙化 治喉痛用倒滴刺根淨洗入些少好酒同研滴

入喉中痛立止 喉痺風熱痰先以千緡湯後以四物加

黃柏知母養陰則火降 又方猪牙皂角為末和霜梅噙

又方木鱉子用鹽酒水浸久噙一丸 又方茜草一兩

作一服降血中之火 又方煇硝半錢枯礬半錢棚砂一

錢為末杜牛膝搗汁調點喉閉或有中垂一絲結成小血

珠垂在咽喉中用杜牛膝根即鼓槌草直而獨條者搗碎

用好米醋共小和研取汁三五滴滴在鼻中即破 喉痛

必用荊芥陰虛火炎上必用玄參 又喉痺陳久白梅入

青鹽令化噙梅於口中

入方

雄黃解毒丸 治纏喉急喉風雙鵝腫痛湯藥不下

雄黃 二兩 巴豆 去油十 鬱金 一錢

右為末醋糊丸如菉豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即

魁大効如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者

潤喉散 治氣鬱夜熱咽乾哽塞

桔梗 二錢 粉草 一錢 紫河車 四錢 香附 三錢

百藥煎 一錢

右為末傳口內

又方 喉痛

鵬砂

膽礬

白僵蚕

陳霜梅

右為末和鶩

附諸方

奪命散 秘方 治急喉風

喉痺

心法附餘卷之十

二十

全編

白礬 枯

姜蚕 直者 鶩砂

皂角末

右等分為末少許吹入喉中痰出瘥

如聖散 三因方

治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊

急不省人事或時氣纏喉風竝用

雄黃 細研

白礬 枯

藜蘆 厚者去皮心不可生用按秘方言生用

猪牙皂角

去皮炙

右為末用一守指入鼻內吐痰為愈

治咽喉牙關緊閉 經驗方

右用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在

紙上却以此紙作個撚子點灯吹滅以煙薰入鼻中一

霎時口鼻涎流牙關開矣

治走馬咽痺 張子和方

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如

右左俱有者用二枚塞左右鼻中

○愚按已上二方皆用巴豆蓋巴豆乃斬關奪門之將

熱則流通之理雖是以熱攻熱不妨碍也

吹喉散 治咽喉腫痛急慢喉閉懸癰乳蛾嚙物不下

訶子

一兩醋浸一宿去核晒乾

黃芩

酒浸一宿晒乾 膽礬 一錢

明礬

半錢 牛旁子

甘草

生 薄荷 各五

一方有百藥煎

喉痺

心法附餘卷之十

主

三百五十二號

右為末先用老生姜擦舌上每用藥一錢芦管吹入喉

中吐出涎痰便用熱茶喫下再吹第二次便用熱粥三

次再吹用熱茶或熱粥乘熱食之加朴硝末少許如口

舌生瘡用藥吹之口中立去痰涎為妙

奪命丹 秘方 治咽喉一切腫毒木舌雙乳鵝喉痺等証

紫荷車

蜜陀僧 各半

砂仁

管仲

姜蚕 直者

烏魚骨

茯苓 各一

射香 少許

右為細末麪糊為丸如彈子大陰乾用一九無根水浸

一時頻食一九作二服神効

奪命筋頭散 聖惠方 治急喉痺咽喉腫痛堵塞氣不得通

欲死之狀

膽礬 四錢

草烏 四錢

礞礬 六錢

雄黃 一錢

右為末用一筋頭點上咽喉內急吐涎沫立應次以大

黃甘草等分俱為麤末每服三錢水一鍾半煎至一鍾

去滓化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白

礬二錢

治咽喉腫痛 秘方

山豆根

射干花根

右同陰乾為末吹入喉中如神

治喉痺 秘方

喉痺

心法附餘卷之十

三

喉痺為急病

須臾命不通

急研新艾水

入口便和同

臘內無新艾

蛇床瓶內燒

其烟纔入口

此病一時消

一方 治喉痺

青黛 五分

猪牙皂角

去皮弦

膽礬 熟者一錢半

右為細末醋薄糊為丸如櫻桃大每用一丸以熟絹裹

在筋頭上用好醋潤透將藥點在口內喉瘡上咬着筋

其涎如水即解後服防風通聖散

七寶散

僵蚕 白者一錢 牙皂角 一挺 去

全蝎 十箇 頭角 去毒

硼砂

雄黃

明礬 各一錢

膽礬 五分

右為細末每用一字入喉中即愈

碧雪散 治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

燈心灰 二錢 硼砂 一錢

右研為細末用搗翎管吹入喉中立刻

嚕化三黃丸 秘方 治咽喉痛大効

山豆根 一兩 硼砂 二錢

龍腦 少許

射香 少許

右為末用青魚膽為丸如菉豆大每服三五丸嚕化津

嚕下

碧玉丸 御藥院方 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿

喉痺

心法附餘卷之十

三

不下或生瘡癰重舌木舌並宜服之

青黛

盆硝

蒲黃

甘草 末各一兩

右同研勻用沙糖為丸每兩作五十九丸每服一丸嚕化

或用乾藥末糝咽喉隔內亦好

龍腦散 御藥院方 治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺邪毒

蘊滯胸膈不利故發疼痛急喉痺閉塞腫痛粥飲難嚕

硼砂

腦子

硃砂 各一分 滑石 細末三錢

石膏 二兩

甘草 半錢 末抄小

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾糝嚕津亦得

龍腦破毒散 御藥院方 治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

益硝	白殭蚕	甘草
四錢	為末炒去嘴	八錢
青黛	馬勃	腦子
一錢	米三錢	一錢
麝香	蒲黃	
一錢	半兩	
右同研為細末用瓷盒子收如有病証每服用藥一錢		
用新汲水小半鍾調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血		
便愈如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥半		
錢以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作四五		
服亦如前法用並不計時候		
甘桔湯	治少陰咽痛	
桔梗	甘草	
	各等分	
右吹咀每服五錢水一鍾半煎至八分通口服		
桔梗湯	治咽喉疼痛如有物妨悶	
桔梗	甘草	
炒五錢	湯浸七遍切	
半夏	焙乾二錢半	
甘草	錢半	
人參	去芦頭	
右吹咀每服一兩水一鍾煎七分去滓溫服食後		
利膈湯	治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡	
雞蘇葉	荊芥穗	
防風	桔梗	
人參	牛旁子	
甘草	各一兩	
右為末每服三錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加姜蜜		
一兩		

通氣湯	治喉痺疼痛閉塞不通水漿不下痰涎壅	
牽牛	鼠粘子	
半生半熟	二錢	
枳殼	甘草	
一分半炒	一錢二分	
右為細末每服三錢沸湯點服		
甘露內消丸	治咽喉腫痛不利咽乾痛上焦壅滯	
口舌生瘡		
薄荷葉	川芎	
一兩	三錢	
人參	柯子	
	各五分	
右為細末煉蜜為丸如皂角子大硃砂為衣每服一丸		
噙化下無時		
上清連翹散	治諸瘡腫毒咽喉疼痛煩渴大便自利	
虛熱不寧		
連翹	山梔子	
	甘草	
右用水二鍾煎至八分去滓溫服食後		
玉鑰匙	治風熱喉閉及纏喉風	
焰硝	鴨砂	
一錢	五分	
腦子	少許	
白殭蚕	一厘	
右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈		
鵬砂散	治咽喉瘡腫閉塞不通	
鵬砂		
白殭蚕	百藥煎	
各三錢	山豆根	

盆硝	薄荷	紫河車 <small>各半</small>	青黛一錢
川芎三錢			
右為細末大人每服半錢小兒一字次擦咽中或水調服			
三黃丸 <small>大成</small>	治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫悶心膈燥煩		
小便赤澀大便秘結並宜服之	見火類		
加味三黃丸 <small>秘方</small>			
大黃	黃芩	黃連 <small>各二兩</small>	礬砂二兩
黃藥子	白藥子 <small>各一兩半</small>	山豆根	黃栢
苦參 <small>各一兩</small>	京墨三錢	麝香 <small>少許</small>	片腦 <small>一錢</small>
冬加知母	心法附餘卷之十	主六	解毒
右為末猪膽調攤碗內蒸二次後入片麝礬為丸豆大			
噙化			
荊黃湯 <small>大成</small>	治臟腑實熱咽喉腫痛大便秘結咽喉之證		
多是風熱上壅然後成之非實熱不可服	見風熱		
佛手散 <small>應驗方</small>	治咽喉腫痛生瘡風熱喉痺腫塞		
薄荷二兩	盆硝一兩	甘草七錢	桔梗五錢
蒲黃 <small>五錢</small>	青黛二錢		
右為細末每用少許乾糝又用竹管吹咽喉內噙化下			
時時服之			

綠雪散 <small>大成</small>	治咽喉腫痛嚙物悶及口舌生瘡		
龍腦 <small>半錢</small>	礬砂一錢	硃砂三錢	馬牙硝 <small>半錢</small>
寒水石 <small>二錢</small>			
右研勻每用一字擦於舌上津嚙之			
人參清肺散 <small>御藥院方</small>	治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫痛		
嚙物妨悶宜服此藥			
連翹三錢	黃芩	川大黃	薄荷 <small>各一錢半</small>
人參	甘草	梔子	盆硝 <small>各一錢</small>
泊附子 <small>七分</small>	黃連 <small>五分</small>		
右用水一鍾半煎至一鍾去滓溫服食後			
牛旁子湯 <small>大成</small>	治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡有如肉腐		
牛旁子二錢	玄參	升麻	桔梗 <small>去苦</small>
犀角	黃芩	木通 <small>去皮</small>	甘草 <small>各一錢</small>
右用水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓溫服食後			
涼膈散 <small>大成</small>	治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利		
咽喉煩燥多渴腸胃秘澀小便不利一切風熱並皆治之	方見濕類		
大青湯 <small>端效</small>	治咽喉唇腫口舌糜爛疳惡口瘡		
大青葉	升麻	大黃 <small>各二錢</small>	生地黄 <small>切焙</small>



右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食後微利止

嗽口地黃散 御藥 治脾肺風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉塞

不通或生舌脹

黃芩 四錢 甘草 一錢二分 荊芥穗 一錢 薄荷葉 五分

右咬咀用水一鍾半煎至一鍾去滓熱嗽冷吐不拘時

一方 治喉痺

用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少搗爛取汁吞

下或動大便解或用醃醋同研取汁嚥引出涎更妙又

名野萱花

灸累年喉痺舉發 秘方

男左女右以手大指甲第一節灸二三小柱

針喉閉

針少商出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲角韭

葉許三稜針針之 針合谷二穴在虎口針五分

針尺澤二穴在臂中橫紋出血妙

四物湯 見補損

千縉湯 見痰類

○廣按纏喉風喉痺之證其人隔間素有痰涎或因飲酒過度或因忿怒失常或因房室不節而發作也何則飲酒過度是胃火動也忿怒失常是肝火動也房

室不節是腎火動也火動痰上而為痰熱燔灼癰塞

於咽嗑之間所以內外腫痛而水漿不入也其症可

謂危且急矣治療之法急則治標緩則治本治標用

九散以吐痰散熱治本用湯藥以降火補虛已上方

劑其於治標已詳悉矣其於治本尤缺畧也諸方出

証但云治風熱而未云治痰熱但云治脾肺火而未

云降肝腎火予雖不敏贅以管見如挾痰加以瓜蒌

半夏或千縉湯之類如挾肝火加以柴胡黃連或小

柴胡湯左金丸之類如挾腎火加以生地黃黃柏或

四物湯加知母黃柏之類未知賢哲以為何如 又

喉痺 心法附餘卷之十

常論之胃肝腎三經之火各有所因而生富貴之家

醇酒厚味多生胃火婦人隱憂不發多生肝火男子

房勞致虛多生腎火人之五臟六腑皆有火不如此

三經之火常變現而為病之多也

丹溪心法附餘卷之十終



# 火門

## 火 四十三 附風熱

丹溪心法

○夫陰虛火動難治 火鬱當發者何經 輕者可降

重者則從其性而升之 實火可瀉黃連解毒湯之類

虛火可補 小便降火最速 凡氣有餘便是火不足者

火証

心法附錄卷之十一

是氣虛 火急甚重者必緩之以生甘草兼瀉兼緩參朮

亦可 人壯氣實火盛顛狂者可用正治或硝黃冰水之

類 人虛火盛狂者以生薑湯與之若投冰水正治立死

有補陰即火自降炒黃柏生地黃之類 凡火盛者不可

驟用涼藥必兼溫散 有可發者 風寒外來者可發鬱

火可發 氣從左邊起者乃肝火也 氣從臍下起者乃

陰火也 氣從腳下起入腹如火者乃虛之極也蓋火起

於九泉之下多死一法用附子末津調敷湧泉穴以四物

湯加降火藥服之妙 陰虛証本難治用四物湯加炒黃

柏降火補陰 龜板補陰乃陰中之至陰也 四物加白

馬脰骨降陰中火可代黃連黃芩 黃連黃芩梔子大黃

黃柏降火非陰中之火不可用 生甘草緩火耶木通下

行瀉小腸火 人中白瀉肝火須風露中二三年者 人

中黃大涼治疫病須多年者惟中氣不足者味用甘寒

山梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下降人所

不知亦能治痞塊中火邪

入方

左金丸 治肝火 一名回令丸

黃連 六兩 吳茱萸 半兩 或

右為末水丸或蒸餅丸白湯下五十丸

附諸賢論

心法附錄卷之十一

劉宗厚曰火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死

甚暴何者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消鑠於物莫能禦

之遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相

火也猶龍火也火性不妄動能不遽於道常以稟位聽

命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜

欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一妄行元

氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之

極也病則死矣經所謂一水不勝二火之火出於天造

君相之外又有厥陽臟腑之火根於五志之內六欲七

情激之其火隨起蓋大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心為君主自焚則死矣丹溪又曰火出五臟主病曰諸風掉眩屬肝火動之類經所謂一水不勝五火之火出自人為又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱皆瘕皆屬於火之類而河間又廣其說火之致病者甚多深契內經之旨曰諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有聲如鼓癰疽瘍疹癰氣結核吐下霍亂脅蠱腫脹鼻塞衄血溢血泄淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄血汚此皆少陰君火之熱乃真心小腸之氣所為也若腎瘕暴瘕胃脉操擾狂越罵詈驕駭肘腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守嘔嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔滿溢食不下目昧不明暴注瞷瘕暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所為也是皆火之變見為諸病也為脉虛則浮大實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水濕折之從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎

火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熟為血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實為陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰失守無根之火為陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾姜之屬若胃虛過食冷物遏陽氣於脾土為火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此之類而求火之為病施治何所依據故於諸經集畧其說備處方之用庶免實實虛虛之禍也

附脉理  
脉理提綱曰火脉洪數虛則浮

附諸方  
九味羌活湯 治春夏秋非時感冒風寒發熱惡寒頭疼項強或無汗或有汗以代桂枝麻黃青龍各半湯治太陽經表熱之神藥也此湯非獨治四時風寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜証亦有神也

六神通解散 治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒

脉洪數先用九味羌活湯不愈後服此湯 並見傷寒

○已上二方發散風寒表熱之劑

東垣瀉陰大升陽湯 治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛

羌活 甘草 黃芪 蒼朮 各一

升麻 八錢 柴胡 一兩 人參 黃芪 各七

黃連 酒炒 石膏 半兩 秋

右咬咀每服一兩或半兩水煎 此藥發脾胃火邪又

心膽肝肺膀胱藥也瀉陰大升陽氣榮養氣血者也

升陽散火湯 治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨隨

中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或

大証 心法附錄卷之十一

胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻 葛根 獨活 羌活 各半

防風 二錢 柴胡 八錢 甘草 錢三 人參

白芍 各半 甘草 生二錢

右咬咀每服半兩或一兩水煎稍熱服

地骨皮散 治渾身壯熱脉長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮 茯苓 各半 柴胡 黃芪

生苳 知母 各一 石膏 二兩 羌活

麻黃 各七錢 半有

右咬咀每服一兩入姜煎

○已上三方升散鬱火表熱之劑

小羌胡湯見傷寒

羌胡飲子 治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來

則發寒裏熱來和則發熱邪熱半在表半在裏

裏出入進退無時即寒熱往來陰陽相勝也蓄熱寒戰

表之陽和正氣與邪熱并高於裏脉道及傷寒發汗不

解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗後勞復

或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芪 甘草

大黃 當歸 芍藥 各半兩

右為末每服抄三錢水一盞生薑三片煎至七分溫服

大証 心法附錄卷之十一

日三服病熱甚者加服之

防風當歸飲子 宜明方 治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱甚

陽勝陰衰邪氣上逆上實下虛怯弱不耐或表熱而身

熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進

退出入不已而為寒熱往來或表多則惡寒或裏多則

發熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏高熱

極深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩

渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩

渴而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱而痛者或熱結極

甚陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏

熱者或熱極閉塞不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或一切風熱癰滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭痛口乾鼻塞耳鳴及聾咽嗑不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥澀小便溺淋悶或是皮膚瘙癢手足麻痺又或筋脉拘急支體倦怠或渾身肌肉跳動心忪驚悸或口眼喎斜語言蹇澀或狂妄昏惑健忘失志及或腸胃燥熱悌鬱而饑不欲食或濕熱內餘而消穀善飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功驗自可知矣

防風

當歸

白芍

柴胡

黃芩

人參

甘草

大黃各一兩

滑石六兩

右停每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同煎至七分去渣溫服

○廣按此方用大黃瀉陽明之濕熱從大便出用滑石降三焦之妄火從小便出用黃芩以涼膈柴胡以解

肌防風以清頭目用人參甘草以補氣當歸芍藥以補血瀉心肝之陽補脾腎之陰而無辛味辛香燥熱之謬藥真治風熱燥熱濕熱挾虛之良劑非聖於醫者其能如是也耶

濕熱病汗下後餘熱未退用此尤妙

○已上三方和解半表半裏熱之劑

大柴胡湯

方見傷寒

防風通聖散

方見中風

○已上二方發攻表裏熱之劑

調胃承氣湯

大証

心法附餘卷之十一

小承氣湯

並見傷寒

大承氣湯

並見濕熱

○已上四方攻下裏熱之劑

清心湯

即涼膈散料內加黃連五錢用蜜與竹葉同煎

連翹

山梔子

大黃

薄荷葉

黃芩各五錢

甘草一兩

朴硝二錢

加黃連半兩

右為細末每服五錢水一盞蜜少許竹葉十片同煎七分溫服

洗心散

和劑方

治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥眼澀多

淚大便秘結小便赤澀

白木一兩

麻黃和等

當歸去土

荊芥穗

芍藥

甘草

大黃切焙

各八錢

右為末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許同煎溫服

人參瀉肺湯秘方治肺經積熱上喘咳嗽胸脇脹滿痰多

大便秘滯

黃芩

梔子

枳殼

甘草

薄荷

連翹

杏仁炒去

桑白皮炒

大黃

桔梗等分

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

三黃湯和劑治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃連去土

黃芩去土

大黃煨各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分空心服

三黃丸和劑治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀大便秘結並宜服之

黃連去土

黃芩去土

大黃煨各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九粒熱水吞下

一方用腦射為丸如大豆大夜間噙化一二丸亦好

化三黃丸治症同前

見喉痺

人參乙宜明方治中外諸熱發汗咬牙時語驚悸弱血

淋閉咳嗽血瘦弱頭痛并骨蒸肺癆喘嗽去大黃加梔

子名曰梔子金花丸又曰既濟解毒丸

黃連

黃柏

黃芩

大黃各等分

自利去大黃加梔子

右為末滴水丸如小豆大每服二三十丸新汲水下

四生丸宜明方治一切熱痰常服潤肌膚諸熱證皆可服

大黃

牽牛

皂角各二

朴硝半兩

右為末滴水丸如梧子大每服三十九粒食後白湯下

黃連解毒湯宜明方治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘

滿腸厥極深蓄熱內甚方見濕熱

黃連湯聖惠方治一切積熱血熱腹熱酒熱註用

黃連淨不拘多少井水浸之良久碗盛於鍋內煮取清

汁服之

○廣按書云寒因熱用熱因寒用何也蓋積熱用寒藥

以治之痼冷用熱藥以治之恐相違逆如黃連用姜

汁制酒制如附子用蜜制童便制是也此方既用一

味黃連又用井水浸之不無太過乎以酒代之庶乎

妙矣

神效丸宜明方治三焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或生瘡

癰咽隔不利或腸胃結燥小便赤澀大便閉塞一切熱

證並宜服之

大黃

黃芩

牽牛

滑石

黃連

薄荷

川芎

右為末滴小丸如梧桐子大每服五十九溫水食後下  
解毒丸通玄方治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬

牙痛一切熱毒並宜治之

大黃

黃連

黃芩

山梔子

牽牛

滑石

右為末滴水丸如梧桐子大每服二十四溫水送下

此即黃連解毒湯神方九合方也

火証

心法附餘卷之十一

三白生散

全真丹

聖惠方

治臟腑積熱洗滌腸垢潤利燥澀解風毒

攻疰手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘胸膈

痞塞臍腹脹滿飲食減少困倦無力

川大黃

三兩用米泔水浸過三日每日

黑牽牛

四兩同研取頭末四兩

右以皂角一兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿入蘿蔔

一兩切作片子同皂角一處熬至半碗去滓再煎至二

鍾離和上件藥末乾濕調勻丸如梧子大每服二三十

丸至五六十丸諸飲下隨證加減以利為度

平胃散

三因方

治胃經實熱口乾舌裂大小便秘澀及熱

病後餘熱不除蓄於胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴

去皮射干

升麻

茯苓

芍藥

二兩枳殼

大黃

甘草

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓空心熱服

八正散治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛痛臟

腑秘結小便赤澀

方見淋閉

○已上諸方治三焦鬱火實熱之劑

黃芩湯

治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋瀝不利

澤瀉

施子仁

黃芩

麥門冬

木通

生地黃

黃連

甘草

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞食前溫

服

清心丸

治經絡中火邪夢漏心忪恍惚口瘡咽燥

黃柏

生三兩龍腦

二錢

右為末蜜丸梧子大每服十九臨臥煎麥門冬湯下

碧璽

和劑方

治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝

青黛

石膏

寒水石

朴硝

滑石

甘草

馬牙硝

右將甘草湯入諸藥末再煎用柳木棍不住手攪令消

溶入青黛和勻傾沙盆內候冷凝結成霜研為末每用

<p>少許含化津嚙如喉閉不能嚙用竹筒吹藥入喉中  <small>玄明粉 御藥院方</small> 此藥大治邪熱所干膈上氣滯臟腑秘          澀並宜服之以朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下          露至天明自然結作青白塊子用磁罐子按實於炭火          內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨          便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研          為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨睡          斟量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下</p>	<p>白虎湯 治氣熱 見濕熱          四順清涼飲 治血熱 見風熱          薄荷煎 御藥院方 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛          薄荷 一兩取頭川芎 半兩取腦子 三錢砂仁 半兩取          右為末入腦子和勻煉蜜成劑任意嚙嚼和劑方無腦          子有桔梗</p>	<p>天竺散 經方 治臟腑積熱煩噪多渴口舌生瘡咽喉腫          痛          山梔子 去殼 連翹 各三錢 甘草 三兩 雞冠雄黃 五          瓜蒌 六錢 鬱金 用皂角水煎切          右為末每服一錢食後臨睡新汲水調下          清氣散 本事方 治氣壅痰涎上膈煩熱</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>枳殼 川芎 柴胡 前胡          茯苓 甘草 獨活 羌活          青皮 白朮 人參 各等分</p>	<p>右為末每服二錢水一鍾荆芥一穗煎七分服          龍腦飲 和劑方 治蘊積邪熱咽喉腫痛心煩鼻衄及痰熱          咳嗽中暑煩躁傷寒餘毒發熱並宜用之          縮砂仁 瓜蒌根 各三兩 石膏 四兩 藿香葉 二兩          甘草 六兩 梔子仁 十二兩          右為末每服二錢用新汲水入蜜調下          傷寒餘毒潮熱虛汗除蜜入竹青煎服</p>	<p>龍腦雞蘇丸 和劑方 消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治          咳嗽唾血吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾熱口          甜膈熱口苦並宜服之          黃耆 一兩 麥門冬 四兩 阿膠 炒          人參 一兩 生乾地黃 六兩 甘草 二兩          木通 二兩 柴胡 二兩 升麻 二兩 宿取汁後為膏          雞蘇淨葉 一斤 即</p>	<p>右除別研藥外並搗為末將好蜜二斤先煉一二沸然          後下生乾地黃末不住手攪令勻取木通柴胡汁慢火          熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為丸如黃豆大</p>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------



每服二十九嚙破熱水下虛煩消渴驚悸人參湯下嗽唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟淋用車前子煎湯下

甘露飲和劑方治胃中客熱牙宣齲腫咽膈乾燥吐氣腥

臭或胃經受濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼去白 麩炒 石斛去片 枇杷葉淨去毛 甘草

乾熱地黃 黃芩 天門冬去心 山茵陳

生乾地黃 麥門冬去心

右改咀每服三錢水一鍾煎至七分食後溫服

滋腎丸按粹方治不渴小便閉邪熱在血分也

知母二兩酒浸除乾 肉桂一錢 黃蘗一兩細剉酒炒除乾

右知母黃栢氣味俱陰以同腎氣故能補而瀉下焦火也桂與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熱水為丸百沸湯下

○已上諸方治三焦鬱火虛熱之劑

○風熱新增

附諸方

定風餅子簡易方治風客陽經邪傷腰理背脊強直言語

蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒

過多嘔吐涎沫頭目眩暈常服消風去邪見傷風

追風散和劑方治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚癢

白僵蚕去絲 炒 荆芥二兩 石膏四兩 川烏泡去皮 兩

防風去片 兩 全蝎炒 一兩 川芎三兩 射香一兩

甘草一兩

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

荊芥丸楊氏方治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風

發熱頭疼鼻塞聲重並皆治之

養氣丹和劑方治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升

降或咳嗽或喘促一切體虛氣弱之人婦人血海冷憊

諸証並宜服之

禹餘糧火煨醋淬 各七次 紫石英火煨 七次 磁石火煨醋淬 七次

赤石脂火煨醋淬 各七次 代赭石火煨醋淬 七次

已上五石各水飛再研挹其清者置之紙上用竹篩盛之滴盡水候乾各用瓦瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固濟

陰乾以硬炭五十斤分作五處煨此五藥以紙灰蓋之

火盡再煨如此三次埋地穴內兩日出火毒再研細入

後藥

肉苁蓉酒洗浸一宿 焙乾一兩半 破故紙炒 附子泡一兩

茴香炒 丁香一兩 肉桂去皮

山藥

巴戟湯去心

鹿茸酥炙

當歸酒浸

肉豆蔻麩炒

鍾乳粉另研

沉香

白茯苓去皮

遠志去心

沒藥別研

陽起石煨別研

五靈脂別研

乳香別研

硃砂別研

研各

右入前藥同研極勻用糯米糊為丸每兩作五十九陰

乾入布袋內擦令光瑩每服二十九空心溫酒姜鹽湯

任下婦人用艾醋湯下

養正丹和劑方治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身

羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血

海火冷竝治之

水銀

心法附餘卷之十一

硃砂研各

黑錫

硃黃

硃砂研各

硃砂研各

右用鐵蓋一隻火上溶黑鉛成汁次下水銀以柳條攪

次下硃砂攪令不見星子放下少時方入硃黃末急攪

成砂和勻如有酸以醋酒之候冷取出研極細者糯米

糊為丸如菉豆大每服三十粒鹽湯棗湯任下

○廣昔年初見養氣丹養正丹出證曰治諸虛百損真

陽不足上實下虛氣不升降一切體弱氣虛之人並

宜服之云者予以為補虛益損之劑無出於此後觀

本草集要曰熱中酒中不得服芳草石藥夫芳草之

味美石藥之氣云云子則於此二丹所用石藥不

能不致疑焉及觀七方十劑之目石藥乃為重劑重

可以去怯其疑方纔釋也何以言之夫體弱氣虛之

人稠痰鬱火膠固於胸臆之間非石藥之氣悍而能

開散之乎蓋石藥所以去病邪病邪退而正氣自復

正猶石灰所以殺稂莠稂莠死而禾苗自茂也石藥

非補人之藥亦猶石灰非肥田之物養氣丹內有從

菴鹿茸當歸等藥庶乎有補而養正丹全是金石之

藥何補之有哉觀者詳焉

○已上諸方辛溫發散之劑

清風散和劑方治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲

重耳作蟬鳴及皮膚頑麻癢痒癰疹婦人血氣風頭皮

腫痒竝治之

見傷風

八風散和劑方治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚癢

痒癰疹成瘡及治寒熱不調鼻塞聲重

藿香半斤

白芷

前胡去芦

黃耆去芦

甘草

人參去芦

羌活去芦

防風去芦

右為末每服二錢水一盞入薄荷少許煎湯調下食後

服茶清下亦可

清神散和劑方消風化痰治頭目眩暈耳聾鼻塞咽隘不

利

檀香 <small>兩十</small>	人參 <small>去土兩</small>	羌活 <small>去土兩</small>	石膏 <small>研五兩</small>
薄荷 <small>去土兩</small>	荊芥 <small>二十兩</small>	甘草 <small>炙二兩</small>	防風 <small>去土兩</small>
細辛 <small>焙五兩</small>			
右為細末每服二錢食後沸湯點服或入茶末尤妙			
四生散 <small>和劑方</small>	治男子婦人肝腎風毒上攻赤眼痒痛羞明多淚及下注脚膝生瘡遍身風癬兩耳內痒服之尤効		
黃耆	川獨活	蒺藜 <small>沙苑</small>	白附子
右等分為細末每服二錢薄荷酒調下如腎藏風下症生瘡以猪腰子批開入藥末二錢在內合定裹煨熟空火 <small>証心法附錄卷之十一</small>			
心細嚼用鹽酒下			
川芎茶調散 <small>和劑方</small>	治諸風上攻頭目昏眩偏正頭疼及腦疼鼻塞聲重 <small>見傷風</small>		
大辰砂丸 <small>御藥院方</small>	清頭目化痰涎及感冒風寒鼻塞聲重頭目昏眩項背拘急皮膚癢痒並皆治之 <small>見傷風</small>		
防風散 <small>楊氏方</small>	治頭目不清去風明目		
防風	川芎	白芷	甘菊花
甘草			
右等分為末每服二錢食後荊芥湯調下			
追風散 <small>瑞竹堂方</small>	治白癧風		

何首烏	荊芥穗	苦參
蒼朮 <small>米泔水浸二宿</small>		
右件為細末好肥皂角三斤去皮弦入磁器內熬為膏和為丸如梧桐子大每服三五十丸空心酒茶任下忌一切動風之物		
胡麻散 <small>和劑方</small>	治脾肺風毒攻衝遍身皮膚癢痒或生瘡疥或生癰疹用手搔時浸淫成瘡久而不差愈而復作面上遊風或如虫行紫白癧頑麻或腎臟風攻生瘡並宜服之 <small>見癰疹</small>	
四神丸 <small>經驗方</small>	治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急 <small>証心法附錄卷之十一</small>	
芎朮湯 <small>御藥院方</small>	清神爽志祛風消蘊治頭目昏痛鼻塞聲重	
川芎 <small>二兩</small>	白朮 <small>錢五分</small>	
右咬咀每服八錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服食後或為細末白湯點服亦得		
天麻散 <small>宣明方</small>	治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發躁熱	
川芎	苦參	地骨皮
威靈仙	何首烏	薄荷葉
苴蒲	杜蒺藜	牛蒡子
		蛇蛻草
		細辛
		蔓荊子

荆芥穗	防風 <small>已上各</small>	天麻	甘草 <small>炙二</small>
右為末每服三錢用蜜水調下茶酒任下不拘時			
防風天麻散	宣明方	治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯	
或暴瘡不語內外風熱癰滯并解昏眩	見中風		
消毒犀角飲	治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮項		
結核遍身瘡節並宜用之	見斑疹		
一方	治風熱結滯或生瘡癰及金石發熱小腸等熱		
用桑椹不拘多少微研以布絞去粗以瓦器熬稀膏量			
多少入蜜再熬成稀膏盛于磁器中每服一匙食後			
臨臥以沸湯點服			
火註	心法附餘卷之十一		
○已上諸方辛平發散之劑			
上清散	治上焦熱耳鼻壅塞頭目不清		
川芎	荊芥穗	薄荷葉 <small>各五</small>	朴硝
石膏	桔梗 <small>各一兩</small>		
右為細末每服一字口噙水鼻內搐之加龍腦三分妙			
上清丸	治口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱能清聲潤肺		
寬膈化痰爽氣寧神			
百藥煎	薄荷 <small>淨米各</small>	縮砂 <small>一兩</small>	片腦 <small>一錢</small>
玄明粉	甘松	桔梗	柯子
硼砂 <small>各五</small>	寒水石 <small>一兩</small>		

右為細末甘草熬膏為丸如梧桐子大每服一丸噙化			
或嚼三五丸茶湯下			
龍腦丸	宣明方	治大人小兒一切蘊熱毒氣不散口舌生	
瘡咽喉腫痛及失音癰疹			
龍腦	硃砂	硼砂	牛黃 <small>各等</small>
右為末鎔黃蠟為丸如米粒大每服三五丸浸甘草人			
參湯送下			
龍腦川芎丸	御藥院方	消風化滯除熱消痰通利七竅爽	
氣清神			
桔梗 <small>半一兩</small>	片腦 <small>六錢</small>	縮砂仁 <small>二錢</small>	白豆蔻 <small>五錢</small>
火註	心法附餘卷之十一		
薄荷 <small>去土五</small>	川芎	防風 <small>去芦</small>	甘草 <small>各一</small>
右為末煉蜜為丸每兩作一十九丸每服一丸細嚼茶清			
送下			
當歸龍膽丸	宣明方	治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋	
惕搐弱神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉腫脹胸膈			
痞塞咽嗑不利腸胃燥澀小便溺悶筋脉拘急肢體痿			
弱暗風癰疾小兒急慢驚風常服宣通血氣調順陰陽			
病無再作			
當歸 <small>焙</small>	草龍膽	山梔子	黃連
黃藥	黃芩 <small>各一</small>	大黃	蘆薈

青黛 <small>各五錢</small> 木香 <small>二錢</small> 麝香 <small>五分</small>	右為末煉蜜和丸如小豆大 <small>小兒如大</small> 每服二十丸生薑湯送下忌發熱諸物 <small>無服防風</small>	羌活散 <small>和劑方</small> 治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及風邪塞壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩痛天陰風雨預覺不安 <small>見傷風</small>	羌活丸治症同前 <small>見傷風</small>	旋覆花湯 <small>御藥院方</small> 治風熱則面生赤瘰子腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風狀如虫行忌猪肉麴	旋覆花 <small>去土</small> 人參 <small>去芦</small> 柴胡 <small>去芦</small> 赤茯苓 <small>去皮</small>	赤芍藥 <small>去皮</small> 黃芩 <small>去芦</small> 枳實 <small>炒</small> 甘草 <small>各二兩</small>	右咬咀每服一兩水一盞半生薑五片煎至八分六滓食後溫服	通關散 <small>御藥院方</small> 治風熱上攻頭目筋脉拘急痰涎壅盛肢節煩疼	羌活 <small>去芦</small> 獨活 <small>去芦</small> 防風 <small>去芦</small> 天麻 <small>去芦</small>	山梔子 大黃 <small>各一兩</small> 滑石 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	右咬咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至八分食後溫服	仙術 <small>各散</small> 宣明方治風熱壅塞頭目昏眩及明耳目消痰
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------

飲清神	川芎 連翹 黃芩 山梔子	菊花 防風 大黃 當歸	芍藥 桔梗 藿香葉 <small>各五錢</small> 蒼朮	石膏 <small>各兩</small> 甘草 滑石 <small>各三兩</small> 荊芥穗	薄荷葉 縮砂仁 <small>各二錢</small>	右咬咀每服三錢水一盞煎至七分食後通口服	川芎石膏湯治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴	防風通聖散治風熱諸証總劑 <small>並見中風</small>	○廣按此方治熱風燥三者之總劑也凡熱風燥之為病必於此而取則焉何以言之風本於熱熱極則風生燥生於風風動則燥至是熱風燥三者其實一源流也故此一方而能兼治之觀其用防風麻黃薄荷荊芥使熱邪從玄府出也用梔子滑石使熱邪從小便出也用大黃朴硝使熱邪從大便出也其餘黃芩散肺火連翹散心火石膏散胃火芍藥散脾火川芎當歸和血潤燥白木甘草補脾和中桔梗開膈其間並無一味辛香燥熱之藥可謂善於處方矣故於熱風燥三者之証百發百中無施而不可非聖於醫者其能是歟
-----	--------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

愈風丹 <small>瑞竹堂方</small> 治諸般風証偏正頭痛	防風通聖方 四物湯 黃連解毒湯 <small>各二料</small>	加羌活 何首烏 細辛 菊花	天麻 獨活 薄荷 <small>各一兩</small>	右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶清下不拘時	荊黃湯 <small>和劑方</small> 治風熱結滯或生瘡癰	荊芥 <small>四兩</small> 大黃 <small>二兩</small>	右吹咀每服五錢水一鍾煎至六分空心服	涼膈散 <small>和劑方</small> 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不	大証 <small>心法附餘卷之十一</small> 五 治風熱	利煩燥多渴腸胃秘澀便溺不利 見濕熱	連翹 <small>四分</small> 甘草 川大黃 朴硝 <small>各二錢</small>	薄荷 黃芩 山梔子 <small>各一錢</small>	右水一鍾竹葉七片蜜少許同煎一鍾食後服	既解毒湯 治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安	大便微秘	大黃 <small>酒炒</small> 黃連 <small>酒炒</small> 黃芩 <small>酒炒</small> 甘草 <small>炙</small>	桔梗 <small>各一錢</small> 柴胡 升麻 連翹	當歸身 <small>各一錢</small>	右每服水二鍾煎一鍾食後溫服
-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------	----------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------

洗心散 治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便赤澀 <small>見火類</small>	犀角地黃湯 治風熱大甚眼赤目痛喉閉口瘡丹毒 <small>見血</small>	四順清涼飲 治一切積熱丹毒并喉龍熱痛	當歸 <small>去芦</small> 甘草 <small>炙</small> 赤芍藥 大黃 <small>各等分</small>	右每服五錢水一鍾煎至六分食後溫服	牛黃清心丸 <small>和劑方</small> 治諸風緩縱不隨語言寒澁心怔健忘恍惚去來頭目眩暈胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤	又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘感虛煩少	大証 <small>心法附餘卷之十一</small> 五 治風熱	睡喜怒無時或發狂顛神思昏亂 見中風	○已上諸方辛涼外散內消之劑	○廣按宣明論云夫熱風之體也曲直動搖風之用也風生於熱以熱為本而風為標凡為風者即風熱病也又按錢氏小兒論云肝有風目連劓不搖得心熱則搖以此論之凡病掉眩強直之謂風風則不離乎熱也觀火燄之上搖則熾風之象矣 又按古方不分風之從外入由內起一舉曰風今予分之外入則曰中風傷風冒風內起則曰風熱外入治以辛溫外散內起則治之以辛涼內消庶得其病機治法也
--------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 吐血

四十四

丹溪心法

○吐血陽盛陰虛故血不得下行因火炎上之勢而上出  
脉必大而孔大者發熱孔者血滯與失血也 大法補陰  
抑火使復其位用交趾桂五錢為末冷水調服 山梔子  
最清胃脘之血 吐血覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承  
氣湯下之 先吐紅後見痰嗽多是陰虛火動痰不下降  
四物湯為主加痰藥大藥 先痰嗽後見紅多是痰積熱  
降痰火為急 痰嗽涎帶血出此是胃口清血熱蒸而出  
吐血 心法附餘卷之十一 主  
重者梔子輕者藍實或暴吐紫血一碗者無事吐出為好  
此熱傷血死于中用四物湯解毒湯之類 吐血挾痰積  
吐一二碗者亦只補陰降火四物湯加大劑之類 挾痰  
若用血藥則泥而不行只治火則止吐血火病也 大吐  
紅不止以乾姜 末重便調從治 喉脫痰血荊芥散妙  
舌上無故出血如線不止以槐花炒末乾摻之 若吐  
血一方重便一分酒半分搗栢葉溫飲非酒不行 嘔吐  
血出於胃也實者犀角地黃湯主之虛者小建中湯加黃  
連主之  
入方

三黃補血湯 治初見血及血多宜服

熟芋 一錢 生芋 伍分 當歸 七分 柴胡 五分

升麻 芍藥 二錢 牡丹皮 五分 川芎 七分

黃耆 五分

右以水煎服 血不止可加桃仁半錢酒大黃斟酌虛  
實用之內却去柴胡升麻

又方 治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參 一錢 黃耆 二錢 五味 十三 芍藥

甘草 五分 當歸 五分 麥門冬 五分

右以水煎服 加鬱金研入亦可

吐血 心法附餘卷之十一 主

又方

人參 白朮 茯苓 陳皮 各一

甘草 半夏 麴 川芎 各五 青皮

神麴 各三

右以水煎服 如胃不和加藿香 如渴者加葛根

半錢 若痰結塊者加貝母一錢黃芩半錢去白陳皮

半錢 若小便赤色加炒黃柏五分 若大便結燥加

當歸七分 心煩加黃連酒拌晒乾五分 若小便滑

加煨牡蠣 若見血多去半夏恐燥加生芋一錢牡丹

五分桃仁三分 若胃中不足飲食少進加炒山梔仁

八分 若血溢入濁道留聚膈間滿則吐血蘇子降氣湯加人參阿膠各五分 上膈壅熱吐血者以四物湯加荊芥阿膠各五分更不止於本方中大黃滑石各五分 胃傷吐血宜理中湯加川芎乾薑各五分此是飲酒傷胃也吐血不止用生薑根為末二錢水煎放冷食後服良 白芨末調服治吐血

已上諸方雖非丹溪所出以其藥同故錄於前

### 附諸賢論

劉宗厚曰經云榮者水穀之精也和調五臟洒陳於六腑乃能入於脉也源源而來生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脉少則瀆充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汗變化而赤為血也生化旺則諸經恃此而長養衰耗竭則百脉由此而空虛不可知謹養哉故曰血者神氣也持之則存失之則亡是知血盛則形盛血弱則形衰神靜則陰生形役則陽充陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行于內苟無陰以羈束則氣何以樹

立故其致病也易調治也難以其比陽常虧而又損之則陽易亢陰易乏之論可以見矣諸經有云陽道實陰道虛陰道常乏陽常有餘陰常不足以人之生也年至十四而經行至四十九而經斷可見陰血之難成易虧如此陰氣一傷所變之証妄行於上則吐血衄衄洩於外則虛勞忘反於下則便紅稍熱膀胱則癰閉溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏則為崩中濕蒸熱瘀則為帶下熱極腐化則為膿血火極似水血色紫黑熱勝於陰發為瘡瘍濕滯於血則為痛痒癰疹皮膚則為冷痺畜之在上則人喜忘畜之於下則人喜狂墮悲跌仆則瘵惡內凝若分部位身半已上同天之陽身半已下同地之陰此特舉其所顯之證者治血必血屬之藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證輔佐謂之六合湯者詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能涼血治血虛腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則為脾胃論有云若善治者隨經損益摘其一二味之所宜為主治可



以此特論血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又  
從長沙血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物者  
獨能主血分受傷為氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花  
蘇木血竭牡丹皮者血滯而宜蒲黃阿膠地榆百草霜  
棕櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛  
所宜茯苓瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者  
血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾姜桂者血寒所  
宜生地黃苦參血熱所宜特取其正治大畧耳若能觸  
類而長可謂應無窮之變矣

附脉理

吐血

心法附餘卷之十一

主

附諸方

脉訣舉要曰諸証失血皆見花脉隨其上下以驗所出大  
凡失血脉宜沉細設見浮大後必難治

附諸方

犀角地黃湯 治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣湧泄為

衄血或溝道閉塞流入胃腹吐出血如鼻衄吐血不  
盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角

鎔

生牛

白芍

牡丹皮

各等

右咬咀每服五錢水煎溫服實者可服

桃仁承氣湯

芒硝

桂各二錢

甘草二錢五分

大黃一兩

桃仁五錢去

右咬咀每服一兩入姜同煎

黃連解毒湯

見濕熱

三黃丸

治積熱吐血咽膈不利

見火類

犀角地黃湯

按粹方

主脉浮客脉芤浮芤相合血積胸中

熱之甚也血在上焦此藥主之

生地黃

二兩

黃芩

黃連各一兩

大黃半兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食後通口服

四生湯

良方

治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生栢葉

生地黃各等

右研爛九如鷄子大每服一丸水三鍾煎至一鍾濾過

溫服

藕汁散

濟生方

治吐血不止

生藕汁

生地黃汁

大煎汁

各三

生蜜半匙

右件藥汁調和令勻每服一小鍾不拘時服

雙荷散

聖惠方

治卒暴吐血

藕節

七個

荷葉頂

七個

右同蜜搗細水三鍾煎八分去滓溫服或研末蜜調下

枇杷葉散

治暑毒攻心嘔吐鮮血

已上數方治內實吐血之劑

小建中湯

桂枝

甘草 炙三錢

大棗 三個

白芍 六錢

生薑 一錢

阿膠 合炒一

右咬咀水煎

荊芥散

荊芥穗 半兩 甘草 一兩

桔梗 二兩

右咬咀姜煎食後服

大阿膠丸

和劑方

治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有

鮮血勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

麥門冬

半兩 茯神

栢子仁

百部根

吐血

心法附餘卷之十一

杜仲 炒

丹參

貝母 炒

遠志

人參 各二錢

茯苓

乾山藥

熟地黃

阿膠

五味子 各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸水煎六分

必勝散 和劑方 治男子婦人血妄流溢或吐或衄血

小薊

并根

人參

蒲黃

當歸 去芦

熟地黃

川芎

烏梅 去核各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分溫服不拘時

龍腦雞蘇丸

治膈熱咳嗽或吐血衄見火類

茯苓補心湯

治心虛為邪氣所傷吐血見咳血

是齋白朮散

簡易方

治積熱吐血咳血若因飲食過度

重有傷脾胃而吐血者最宜服之惟忌食熱麪煎燂一切發風之物

切發風之物

白朮 二兩

人參 去芦

白茯苓 去皮

黃芩 蜜浸各一兩

山藥

百合 去心各七錢半

甘草 炙半兩

柴胡

前胡 各二錢半

右咬咀每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎六分溫服

歸脾湯

治思慮傷脾不能統攝心血以致久行或吐血

下血

見健忘

天門冬湯

清生方

治思慮傷心吐血衄血

吐血

心法附餘卷之十一

遠志 去心甘

白芍藥

黃芪 去芦

藕節

阿膠 蛤粉炒

沒藥

當歸

生地黃 各一兩

人參

甘草 炙各五錢

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎六分不拘時溫服

加味理中湯

乾姜 泡

人參

白朮 各二兩

甘草

葛根 各半兩

右咬咀每服二錢水一鍾煎七分溫服不拘時

麥門冬飲子

按粹方

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少

血吐血

人參 五味 <small>各五錢</small> 熟地 <small>半錢</small> 黃芪	芍藥 甘草 <small>各一錢</small> 當歸身 麥門冬 <small>各一錢</small>	右以咀作一服水煎食後服之	團參丸 治吐血咳嗽服涼藥不得者	人參 黃耆 飛羅麴 <small>各一兩</small> 百合 <small>五錢</small>	右為末滴水為丸如梧子大每服三十丸茅根湯下	震膠散 經方 治大人小兒吐血	阿膠 <small>炒</small> 蛤粉 <small>各一兩</small> 辰砂 <small>少許</small>	右為末藕節橘汁和蜜調下食後服	側柏散 治內損吐血下血因酒太過勞傷於內血氣妄	行其出如湧泉口鼻皆流須臾不救服此即安又治男	子婦人九竅出血	側柏葉 <small>一兩五錢</small> 人參 <small>去芦一兩</small> 荊芥穗 <small>燒灰一兩</small>	右為末每服三錢入飛羅麴二錢拌和汲水調粘相似	一方 治吐血	用生地黃五斤搗汁生蜜二斤半以瓦錫器盛貯於鍋	內重湯桑柴火煮三日三夜取出入人參末四兩茯苓	末六兩令勻不拘時候以熱湯點服 一名雙玉膏	方
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------	-----------------	---------------------------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	---------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---

用柏葉一握乾姜三片阿膠二挺炙水二鍾煎至一鍾	去粗煩服	芍藥湯 <small>清生方</small> 治一切失血過多眩暈不甦	芍藥 當歸 <small>各等分</small> 酒浸	右以咀每服四錢水二鍾半煎至七分溫服不拘時	四物湯 <small>見補損</small> 治失血過多加柏葉煎服	理中湯 <small>見中傷</small>	蘇子降氣湯 <small>見痰類</small>	○已上諸方治內虛吐血之劑	一方 治酒色傷心肺口鼻俱出血	用荊芥燒灰置地上出火毒為末每服三錢陳米湯下	一方 治大人吐血及傷酒食醉飽低頭擱重損傷吐血	至多汗血妄行口鼻血出但聲未失者投之無不効	百草霜 <small>即鍋底上黑灰用外人家者妙</small>	右為末每服三錢米飲調下或井花水調下二服即愈	若鼻衄用一捻吹入鼻中立効	○皮肉破處及炙瘡出血百般用藥不止搽半錢或一	字立止	一方 治吐血	用好墨為末每服二錢以白湯化阿膠清調服
-----------------------	------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------	----------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----	--------	--------------------

一方

用血餘燒灰為末每服三錢冷水調下

○如鼻衄以竹管吹入鼻中即止

一方 治吐血咯血

用藕節搗汁飲之

一方

用栢葉瓦上焙乾為末每服三錢食後米飲調下

一方

用大黃末每服一錢以生地黃汁一合水半鐘煎四五

沸溫服即愈

吐血

心法附錄卷之十一

卷之十一

一方 治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衄血

葛花 二兩 黃連 四兩

右為末以大黃末熬膏子丸如梧子大每服一百丸溫

湯下或煎服亦可 吐衄證若脉滑數難治

○已上諸方止血涼血之劑

○廣按氣屬陽喜動血屬陰喜靜動靜有常則氣血調

均陰陽和順何病之有哉今也六淫侵于外七情戕

于中動過于靜陽勝乎陰則氣有餘而血不足也丹

溪曰氣有餘便是大火性急暴熾灼經絡則血沸騰

而錯經妄行為咳血嘔血咯血衄血溺血下血之所

由也况血為氣之依附若是血敗散枯涸則氣失其

附而發越矣不死何待可不畏哉治療大法以苦甘

寒藥散火涼血為君以辛味藥開鬱利氣為臣以升

提藥俾復其位為佐使或以酸澀藥止塞其源或以

甘溫藥收補其後如此病之不愈者未之有也 又

按丹溪正法吐血條已兼咳嘔咯衄四者附方嘔血

衄血通用

# 咳血 四十五

丹溪心法

咳血

心法附錄卷之十一

卷之十一

○咳血 火升 痰盛 身熱多是血虛四物湯加減用

戴云欬血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是

咯血者每欬出血皆是血疔瘡衄血者鼻中出血也溺血

者小便出血也下血者大便出血也雖有名色分六俱

是熱証但有虛實新舊之不同或妄言為寒者誤也

八方

青黛

瓜蒌仁

訶子

海粉

山梔

右為末以蜜同姜汁丸嚥化欬甚者加杏仁去皮尖後

以八物湯加減調理

附諸方

黃芪散 治欬成勞

甘草 四錢 黃芪 麥門冬 熟芩

桔梗 白芍 各五錢

右咬咀每服五錢水煎

茯苓補心湯 三因方 治心氣虛耗不能藏血以致面色黃

瘁五心煩熱咳嗽唾血 及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜

治之

半夏 湯泡 七次 前胡 白茯苓 人參 各七錢

紫蘇 枳殼 麩炒 桔梗 甘草 炙

乾葛 陳皮 各五錢 當歸 二錢 熟地黃 一兩 五錢

白芍藥 二兩 川芎 七錢 五分

右咬咀每服四錢水一鍾姜三片棗一枚煎七分食後

溫服

雞蘇丸 按粹方 治虛熱昏冒倦怠下虛上癢嗽血衄血

雞蘇葉 八兩 即金 黃耆 防風

荊芥 各一兩 桔梗 川芎 甘草

菊花 生芩 各半 片腦 五分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去心煎

湯化下 又治肺損吐血日漸乏力衰弱行步不得促

嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢

用桑枝剉炒香煎湯嚼下

經效阿膠丸 濟生方 治嗽血唾血

當歸地黃湯 宣明方 治嗽血衄血大小便血或婦人經候

不調月水過多喘嗽 並見癆瘵

人參芩歸湯 直指方 治虛勞少血津液內耗心火炎燥熱

乘肺金咳嗽咯血及血不榮肌肉動輒毛寒咳嗽

當歸 川芎 白芍藥 各五錢 人參

半夏 梨 橘紅 赤茯苓 阿膠 炒

細辛 北五味 甘草 炙 各二錢 五分

右咬咀每服八錢水二鍾姜三片煎一鍾食後溫服

一方 治咳嗽 用新綿燒灰半錢食後好酒調服

一方

用栢葉瓦上焙乾為末每服三錢食後米飲調下

嘔血 四十六

丹溪心法

○嘔血火載血上錯經妄行 脉大發熱喉中痛者是氣

虛用參芪蜜炙黃栢荊芥當歸生地黃用之 嘔血用韭

汁童便姜汁磨鬱金同飲之其血自清 火載血上錯經  
妄行用四物湯加炒山梔童便姜汁服 又方山茶花童  
便姜汁酒服 又鬱金末治吐血入姜汁童便良 又一  
方用韭汁童便二物合用鬱金細研和服 又方治吐血  
或衄血上行用鬱金如無用山茶花代姜汁童便和好酒  
調服即止後以犀角地黃湯加鬱金 怒氣逆甚則嘔血  
暴痺內逆肝肺相搏血溢鼻口但怒氣致血証者則暴甚  
故經曰抑怒以全陰者是也否則五志之火動其火載血  
上錯經妄行也用柴胡黃連黃芩黃芪地骨生熟苧白芍  
以水煎服虛者以保命生地黃散再加天門枸杞甘草等

分水煎服

附諸方

一方 治嘔血

黃栢 蜜炙

右搗為末煎麥門冬湯調二錢七立瘥

聖惠方 治嘔血

側栢葉 或晒乾或陰乾或手焙乾

右為末不拘時以米飲調下一錢七

保命生地黃散 治諸見血無寒吐血衄血下血溺血

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮

天門冬 去心 黃耆 白芍藥 甘草 炙

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

脈微身涼加減每一兩加官桂半錢  
大薊散 治飲啖辛熱傷於肺經嘔血出血名曰肺

大薊根 洗 犀角 鑊 升麻 桑白皮 炙  
蒲黃 炒 杏仁 去皮尖 甘草 炙 五 桔梗 炒 一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎至八分溫服不拘

咯血 四十七 附痰涎血

丹溪心法

○咯血痰帶血絲出者用姜汁青黛童便竹瀝入血藥中

用如四物湯加地黃膏牛膝膏之類 咯唾血出於腎以

天門冬麥門冬貝母知母桔梗百部黃栢遠志熟苧牡蠣

姜桂之類 痰涎血出於脾以葛根黃芪黃連芍藥當歸

甘草沉香之類主之

又方 治痰中見血

白朮 一錢 當歸 一錢 芍藥 一錢 牡丹皮 一錢 五分

<p>桃仁<small>一錢</small> 山梔<small>八分</small> 桔梗<small>七分</small> 貝母<small>一錢</small></p>	<p>黃芩<small>八分</small> 甘草<small>三分</small> 青皮<small>五分</small></p>	<p>右以水煎服</p>	<p>又方 治痰中血</p>	<p>白朮<small>一錢</small> 牡丹皮<small>一錢</small> 貝母<small>一錢</small> 芍藥<small>一錢</small></p>	<p>桑白皮<small>一錢</small> 山梔<small>八分</small> 桃仁<small>一錢</small> 甘草<small>二分</small></p>	<p>右以水煎服</p>	<p>又方 治痰中血</p>	<p>橘紅<small>二錢</small> 半夏<small>一錢</small> 茯苓<small>一錢</small> 甘草<small>三分</small></p>	<p>白朮<small>一錢</small> 枳殼<small>一錢</small> 人參<small>五分</small> 五味<small>十五分</small></p>	<p>桑白皮<small>一錢</small> 黃芩<small>一錢</small></p>	<p>右以水一鍾姜三片煎服 或加青黛半錢</p>	<p>又方</p>	<p>橘紅<small>一錢</small> 半夏<small>一錢</small> 茯苓<small>一錢</small> 牡丹皮<small>一錢</small></p>	<p>貝母<small>一錢</small> 桃仁<small>一錢</small> 黃連<small>七分</small> 甘草<small>一錢</small></p>	<p>大青<small>五分</small></p>	<p>右以水煎生薑三片如法煎服</p>	<p>附諸方</p>	<p>治咯血</p>	<p>荷葉<small>不拘多</small></p>
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------	------------	------------	-----------------------------

<p>右為末米湯調二錢七</p>	<p>又方 治咯血及衄血</p>	<p>白芍藥<small>一兩</small> 犀角末<small>二錢</small></p>	<p>右為末新汲水服一錢七血止為限</p>	<p>又方 治咯血</p>	<p>桑白皮<small>一錢</small> 半夏<small>一錢</small> 知母<small>一錢</small> 貝母<small>一錢</small></p>	<p>茯苓<small>一錢</small> 阿膠<small>五分</small> 桔梗<small>七分</small> 陳皮<small>一錢</small></p>	<p>甘草<small>一錢</small> 杏仁<small>五分</small> 生薑<small>一錢</small> 山梔<small>七分</small></p>	<p>柳桂<small>二分</small> 宜入治上焦</p>	<p>右以水煎生薑三片如法煎服</p>	<p>咯血 天門冬<small>九</small> 本方 治吐血咯血大能潤肺止咳</p>	<p>天門冬<small>一兩</small> 甘草<small>一錢</small> 白茯苓<small>一錢</small> 阿膠<small>一錢</small></p>	<p>杏仁<small>炒</small> 貝母<small>各五</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸熱津含化日夜可十九</p>	<p>雞蘇散<small>清生方</small> 治勞傷肺經腫內有血咽喉不利</p>	<p>雞蘇葉 黃耆 生地黃<small>洗淨</small> 阿膠</p>	<p>貝母<small>去心</small> 白茅根<small>各一</small> 麥門冬<small>去心</small> 桔梗<small>去芦</small></p>	<p>甘草<small>各九錢</small></p>	<p>右以水咀每服四錢水一鍾姜三片煎七分溫服</p>
------------------	------------------	--------------------------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

槐花散 朱氏集驗方 治咯血失血

用槐花炒為末每服二錢糯米飲下仰臥

黃連阿膠丸 濟生方 治勞嗽並嗽血唾血 見痢類

恩抱散 治咯血吐血唾血及煩燥欬嗽

生蒲黃 乾荷葉 茅根 各等分

右為末每服三錢濃煎桑白皮湯食後溫服

### 衄血 四十八

丹溪心法

○衄血涼血行血為主大抵與吐血同 用山茶花為末

童便姜汁酒調下 犀角地黃湯入鬱金同用加黃芩升

麻犀角能解毒 又以鬱金末童便姜汁并酒調服 經

血逆行或血腥或吐血或唾血用韭汁服之立効 治血

汗血衄以人中白新瓦上火逼乾入麝香少許研細酒調

下經驗人中白即溺盆白塗秋石也 衄血出於肺以犀

角升麻梔子黃芩芍藥生地黃紫苑丹麥阿膠之類主之

原病式曰衄者陽熱拂鬱于於足陽明而上熱則血妄

行故鼻衄也

附諸方

河間生地黃散 治鬱熱衄血或咯吐血皆治之

枸杞 柴胡 黃連 地骨

天門冬 白芍 甘草 黃芩

黃芪 生苈 熟苈 各等分

右咬咀水煎服 若下血加地榆

又方 治衄血

伏龍肝 半升即鍋心灶內土

右以新吸一大碗淘取汁和蜜頓服

茜根散 治鼻衄不止

茜根 阿膠 蛤粉炒 黃芩 各一兩 側柏葉

生苈 各一兩 甘草 炙半兩

右以水煎服加姜三片如法煎服

黃芩芍藥湯 治鼻衄不止

黃芩 二錢 芍藥 二錢 甘草 一錢

右以水煎服 或犀角地黃湯如無犀角以升麻代之

○鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出凡鼻衄並以

茅花調止衄散時進折二甘仍令以麻油滴於鼻或以

蘿蔔汁滴入亦可又茅花白芍藥對半尤好 外迎法

以井花水濕紙頂上貼之 左鼻衄以線扎左手中指

右出札右手中指俱出兩手俱札 或炒黑蒲黃吹鼻

中或龍骨末亦可



止衄散

黃芪 六錢

亦茯苓

白芍藥

當歸

生半

阿膠 各三錢

右為末每服二錢食後黃芪湯調下

芍附飲

川芎 二兩

香附 四兩

右為末每服二錢茶湯調下

○廣按血証須要涼血散火此藥既非涼血又非散火

何也蓋血病用血藥而不効者以其血之所藏無以

養也夫心主血肝藏血此方用川芎所以和血通肝

而血歸於肝臟也用香附所以開鬱行氣而使火

散經絡也血歸火散何病之不止哉

黃芩芍藥湯

按料方

治虛

不能飲食衄血吐血

黃芩

芍藥

甘草 各等分

一法加生薑黃耆

右水煎服 此藥治傷寒衄血吐血嘔血

茜梅丸

本事方

治衄血無時

茜草根

艾葉 各一兩

烏梅肉 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸烏梅湯下

生地黃湯

按料方

治上熱衄血

生地黃

阿膠 炒各一兩

川芎

桔梗

蒲黃

甘草 生各五錢

右咬咀每服八錢水一鍾半入生薑汁一匙煎至八分

去滓溫服

麥門冬飲

直指方

治鼻衄

白芍藥

蒲黃 各二錢

生薑 一錢

生地黃 三錢

麥門冬

去心

右咬咀蜜一合水一鍾半煎至八分分作二服

川芎二黃散

直指方

治實熱衄血

大黃

濕紙

川芎

黃連

黃芩 各等分

衄血

心法附錄卷之十一

黃連

黃芩

各等分

右為末每服二錢井水調下食後

生地黃湯

按料方

治榮中有熱及肺癰鼻衄生瘡一切丹毒等疾

生地黃

赤芍藥

當歸

川芎 各等分

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服 若鼻衄加

蒲黃生瘡加黃芩丹毒加防風

清肺飲

按料方

治衄血吐血久不愈者

五味子

十個

麥門冬

當歸身

人參

生地黃

各五錢

黃耆 二錢

右咬咀作一服水一鍾煎至一鍾去滓食後溫服 用

三稜針針氣街出血立愈

地黃飲按粹方治衄血往來久不愈甚効

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮各等分

右為末每服二錢蜜湯調下日三服

麥門冬飲子濟生方治衄血不止

麥門冬 生地黄各等分

右剉每服一兩水三鍾煎至一鍾溫服

黃連散經方治大人小兒盛熱乘於血血隨熱氣散溢

於鼻者謂之鼻衄凡血得寒則凝凝結聚得熱則流散

妄行

衄血

心法附錄卷之十一

聖九

二百八十五

黃連

黃芩

栢葉

甘草各等分

豆豉三十粒

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣食後通口服

生地黄湯 治鼻衄昏迷不省

用生地黄三五斤取汁服之以粗塞鼻中須臾即止

白芨散 治鼻衄不止

用白芨不以多少為末冷水調貼鼻竅下

丹金散 治鼻衄不止

土馬鬃即鹽上

甘草各二錢

黃藥子半兩

右為末每服二錢新汲水調下不止再服

射香散御藥院方治鼻衄不止

白礬枯過

白龍骨枯者另研

射香各五錢

射香五分

右三味拌和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然

後吹藥於鼻中或以濕紙撚蘸藥鼻內尤妙

龍骨散三因方治鼻衄過多

用白龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡九竅

出血皆可用此藥吹之

山梔散

朱氏集驗方

治鼻衄不止

用山梔子不以多少燒為末少許吹入鼻中

黑神散

衄血

心法附錄卷之十一

辛

二百八十五

用百草霜為末用少許吹入鼻中立効

一方 治鼻血不止

用頭髮燒灰以竹管吹入鼻中即止或以酒調亦可

一方

用新採栢葉榴水服之即止

一方 治鼻衄及酒疸黃沙淋

用萱草根搗汁一鍾生姜汁半鍾相和時時細呷

一方

用生姜汁磨好墨滴鼻中

一方

用茆花塞鼻中外用茆花濃煎湯服

# 溺血

四十九

升溪心法

○溺血屬熱 用炒山梔子水煎服或用小蘗琥珀 有

血虛四物加牛膝膏 實者用當歸承氣湯下之後以四

物加山梔

入方

小蘗飲子 治下焦結熱血淋

生芋

小蘗

滑石

通草

淡竹葉

七片

蒲黃

炒七

藕節

二錢

當歸

酒浸

一兩

甘草

炙三

分

梔子

炒八

甘草

炙三

分

右用水煎空心服

附諸方

許令公方 治尿血

生地黃汁一合

生薑汁一合

右以二物相合頓服瘥

當歸承氣湯

當歸一錢

厚朴八分

枳實八分

大黃八分

芒硝七分

右剉水煎如法溫服

當歸散 大 全 良 方 治婦人小便出血或時尿血

當歸

刺蘗葉

七錢

羚羊角屑

赤芍藥

各半

生地黃

一兩

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓通口服食

前

一方

治小便出血

用當歸四兩酒三升煮一升頓服

一方

用琥珀為末每服二錢灯心薄荷湯調下

鹿角膠丸

清生力

治房屋勞傷小便尿血

鹿角膠

五錢

沒藥

另研

油頭髮灰

各三錢

右為末用茅根汁打糊丸如梧子大每服五十九鹽湯

送下

六味地黃丸

治老人尿血

見補攝

瑞竹堂蒲黃散

故紙

炒

蒲黃

炒

千年石灰

炒

右等分為細末每服三錢空心熱酒調下 此刮劑也

下血

五十

# 下血

五十



丹溪心法

○下血其法不可純用寒涼藥必於寒涼藥中加辛味為佐久不愈者後用溫劑必兼升舉藥中加酒浸炒涼藥如酒煮黃連九之類寒因熱用故也 有熱四物加炒山梔子升麻秦艽阿膠珠去大腸濕熱 屬虛者當溫散四物加泡乾姜升麻 凡用血藥不可單行單止也 入方

白芷 五味子 各等分

右為末粥丸如梧子大每服五十九米湯下

附脉理

下血 心法附餘卷之十一

脉訣舉要曰便血則花數則赤黃實脉癰閉熱在膀胱

附諸方

黃連香薷飲 治伏暑純下鮮血 見中暑

敗毒散 治風熱流入大腸經下血不止 見傷風

胃風湯 治風濕乘虛入於腸胃或下瘀血 見痢類

槐花散 治腸胃有濕脹滿下血

蒼朮 厚朴 陳皮 當歸

枳殼 各二兩 槐花 二兩 甘草 烏梅 各半

右以水煎五錢空心服

當歸和血散 按粹方 治腸癖下血濕毒下血

槐花 青皮 各六錢 當歸身 升麻 各二錢

荆芥穗 熟地黃 白朮 各六錢 川芎 四分

右為末每服二三錢清米飲調下食前

升麻去濕和血散 按粹方 治腸癖下血作派其血呬出有力而遠射四散如篩春二月中下二行腹中大作痛乃

陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈

生地黃 牡丹皮 生甘草 各五錢 熟甘草

黃耆 各一錢 當歸身 熟地黃 蒼朮

秦艽 肉桂 各二錢 橘皮 升麻 各七錢

白芍藥 一錢 五分 心法附餘卷之十一

右以咀作一服水四鍾煎至一鍾稍熱空心服

黃連湯 按粹方 治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連 當歸 各五錢 甘草 各一錢

右以咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前通口腹

○已上諸方治濕毒下血之劑

香連丸 冷熱不調下血如痢 見痢類

聚金丸 楊氏方 治腸胃積熱或酒毒大便下血腹中熱痛

煩渴脉弦數

黃連 四兩 酒炒一兩 姜汁炒一兩 黃芩

黃連 四兩 酒炒一兩 姜汁炒一兩 黃芩

黃連 四兩 酒炒一兩 姜汁炒一兩 黃芩

黃連 四兩 酒炒一兩 姜汁炒一兩 黃芩

防風 各一兩

右為末煮麵糊丸如梧子大每服五十丸米泔浸枳殼水下不拘時

芍藥黃連湯 保命集 治大便後下血腹中痛謂之熱毒下血

芍藥

黃連

當歸 各五錢

淡桂 五分

甘草 各二錢

大黃

右每服一兩水二鍾煎至一鍾服如痛甚調木香煨榔末一錢服

阿膠湯

按粹方

治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黃連丸

治飲酒過多下血不止

心法附錄卷之十一

黃連丸

黃連 二兩

赤茯苓

阿膠 炒各一兩

右用黃連茯苓為末調阿膠象手丸每三十九丸食後米飲下

芍藥湯

按粹方

行血調氣澀而便膿血知氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

見痢類

涼血地黃湯

按粹方

如飲食不節起居不時者陰受之陰

受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下為食泄久為腸

癖者水穀與血另作一派唧出也時令值夏濕熱大盛

正當客氣勝而主氣弱也故腸癖之証甚以此藥主之

熟地黃

當歸

青皮

槐花 各五分

知母 炒

黃柏 各一錢

右咬咀作一服水一鍾煎至七分溫服如小便澀臍下悶或大便後重調木香煨榔末各五分稍熱空心服或食前服如裏急後重又不去者當下之如有傳變隨証加減

○已上諸方治熱毒下血之劑

伏龍肝散

三因方

治先糞後血謂之遠血無止吐衄

伏龍肝

半斤

甘草 炙

白朮

阿膠

黃芩

乾地黃 各三兩千金

心法附錄卷之十一

黃芩

右咬咀每服四錢水一鍾煎空心服虛者加附子

竹茹湯

大全良方

治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹

熟地黃 各二兩

人參

白芍藥

桔梗

川芎

當歸

甘草 炙

桂心 各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食後通口服

煎紅丸

濟生方

治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日久羸瘦

側柏葉

炒黃

鹿茸 去毛

附子 炮去

川續斷 酒浸

黃耆

阿膠 炒粉

白礬 枯半

當歸 去苗酒

右為米醋煮米糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲下

○廣按本方出證云治臟腑虛寒下血不止夫血証乃火使之然言虛則可言寒則不可也丹溪云下血久不愈者後用溫劑此方正合其義東垣云勞者溫之損而溫之損而溫之損而不溫何能愈哉此方乃溫補之義非溫寒之說也

○已上諸方治久虛下血之劑

醫師固榮散 治吐血便血

白芷 半兩

真蒲黃 炒一錢 甘草 半錢

地榆 去蘆一兩

下血 心法附餘卷之十一

卷

卷

右吹咀每服二錢溫酒調服如氣壯人加石膏一兩

槐花

荆芥穗 各等分

右為末酒調下一錢七仍空心食猪血妙

一方 治卒下血

用赤小豆一升搗碎水二升絞汁飲之

烏梅丸 治便血下血

烏梅 三兩 燒灰存性

右為末醋糊丸如梧子大每服七十丸空心米湯下

一方 治中毒下血

用蜆皮燒灰存性研細每服二錢水調下日進三服

一方 治下血刮劑

百藥煎

一兩 取一兩 燒為灰

右為末糊丸如梧子大服六十丸空心米湯下

一方

血餘灰

鞋底灰

猪牙皂角灰 各等分

右為末酒調二錢七

一方 治下鮮血

山梔子仁 燒灰

右為末水和一錢七服

下血 心法附餘卷之十一

卷

卷

一方 治糞前有血面色黃

石榴皮

右為末煎茄子湯調一錢七

一方 治糞後下血不止

艾葉

不以多少

右以生姜汁三合和服一錢七

一方 治臟毒下血

苦棟

炒令黃

右為末蜜丸米飲下二十丸尤妙

一方

百草霜 研細

右用酒調下三錢七

○已上諸方涼血止血之劑

酒煮黃連九 見泄瀉

四物湯 見補損

## 腸風臟毒

丹溪心法

○腸風獨在胃與大腸出 若兼風者蒼朮秦艽芍藥香

附

腸風 心法附餘卷之十一

堯

又方

黃芩

秦艽

槐角

升麻

各一錢五分

青黛 一錢

右以水一鍾半煎十分服

治腸風下血

滑石

當歸

生苳

黃芩

蒼朮 各等分

右以水煎服 或以蒼朮生苳不犯鐵器為末丸服

又方

茄葉 燒存性 梔子 炒

右為末蒸飯丸如梧子大每服一百丸空心米湯下

又方 便血久遠傷血致虛并麻風癰瘡見回者

龜板 二兩

升麻

香附 各五錢

芍藥 一兩半

側柏葉 一兩 椿根皮 七錢

右為末粥丸以四物湯加白朮黃連甘草陳皮作末湯

下丸藥

又方 脉緩大口渴月經紫色勞傷挾濕

白朮 半兩

黃柏 炒

生苳

白芍 各三錢

地榆 二錢

黃芩

香附 各二錢

右為末蒸餅丸每服五十九丸滾水下

腸風 心法附餘卷之十一

卒

又方 治積熱便血

蒼朮

陳皮 半兩

黃連

黃柏

條芩 各七錢五分 連翹 半兩

右為末生苳膏六兩合丸如梧子大每服五十七丸白

湯下

又方

腸風晚露以車荷鳴五七個焙乾燒灰醋調搽仍忌濕

麝酒辛熱物

附諸方

腸風黑散 和劑方 治腸風下血或在糞前後並皆治之

荆芥二兩	亂髮	槐花	槐角 <small>各一兩</small>
甘草 <small>炙</small>	蠟皮 <small>炒各一兩</small>	枳殼 <small>炒去白二兩</small>	
右將所燒藥同入瓦瓶內鹽泥固濟燒存三分性出火毒同甘草枳殼搗羅為末每服三錢水一鍾煎七分空心服			
香梅丸 <small>濟生方</small>	治腸風臟毒下血		
烏梅 <small>同核燒存性</small>	香白芷 <small>不見火</small>	百藥煎 <small>燒存性各等分</small>	
右為末米糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲下			
黑玉丹 <small>和濟方</small>	治腸風積熱下血不止		
刺蝟皮 <small>斤制</small>	猪懸蹄 <small>一百斤</small>	敗棕 <small>剉八兩</small>	苦練根 <small>五兩</small>
陽風 <small>心法附錄卷之二</small>	雷丸 <small>四兩</small>	牛角 <small>剉二兩</small>	槐角 <small>六兩</small>
芝蔴 <small>四兩</small>	亂髮 <small>皂角水洗</small>		
右剉碎用甕罐內燒存性研為細末入乳香二兩射香入錢研和令勻用酒打麵糊為丸如梧子大每服二十丸先細嚼胡桃一枚空心以溫酒吞下多進得効			
槐角丸 <small>和濟方</small>	治五種腸風下血痔瘻脫肛下血並服		
槐角 <small>炒一兩</small>	地榆	黃芩	防風 <small>去芦</small>
當歸 <small>酒浸一宿焙乾去芦</small>	枳殼 <small>去白麩炒各八兩</small>		
右為末酒糊丸如梧子大每服三十丸空心米飲下			
烏荆丸 <small>直指方</small>	治腸風下血諸風抽掣		

川烏頭 <small>一兩炮去皮</small>	荆芥二兩		
右為末醋糊丸如梧子大每服二十九枳殼湯下			
槐花散 <small>本事方</small>	治腸風臟毒下血		
槐花 <small>炒</small>	栢葉 <small>枳殼焙</small>	荆芥穗	枳殼 <small>各等分</small>
右為末每服二錢空心米飲調下			
香附散 <small>本事方</small>	治腸風		
香附 <small>一兩</small>	枳殼 <small>七錢半炒</small>	當歸 <small>半兩</small>	川芎 <small>五錢</small>
槐花 <small>炒</small>	甘草 <small>炙各二錢五分</small>		
右為末每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎七分溫服			
蒜連丸 <small>濟生方</small>	治臟毒下血		
瘡爪黃連 <small>去鬚一兩</small>			
右為末用獨頭蒜一箇煨香熟研和入白杵極爛丸如梧子大每服四十丸空心陳米飲下			
加減四物湯	治腸風下血不止		
側柏葉	生地黃	當歸 <small>酒浸去芦</small>	川芎 <small>各一兩</small>
枳殼 <small>炒去白</small>	荆芥穗	槐花 <small>炒</small>	甘草 <small>炙各半兩</small>
右吹咀每服四錢水一鍾姜三片烏梅少許同煎空心溫服			
黃連散 <small>宣明方</small>	治腸風下血疼痛不止		
黃連	雞冠花	貫衆	川大黃



烏梅各一 甘草錢五

右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不拘時

黃連貫眾散 張子和方 治腸風下血

黃連 雞冠花 貫眾 大黃

烏梅兩各一 甘草五分 枳殼 荊芥兩各一

右為末每服二錢溫米飲下食前

結陰丹 摘粹方 治腸風下血臟毒下血凡大便血疾

枳殼 去穢 威靈仙 黃芪 陳皮 去白

椿根白皮 何首烏 荊芥穗各半

右為末酒糊丸如梧子大每服五七十丸陳米飲入醋

少許煎過要放溫送下

地骨皮散 經驗方 治腸風痔瘻下血不止

地骨皮 鳳眼根皮 並用懸崖中者好去土用

右二味各等分同炒微黃色搗為細末每服三錢空心

溫酒調服忌食油膩等物

止血散 御藥院方 治腸風下血或在糞前或在便後在便

前者其血近腎肝血也在便後者其血遠心肺血也此

藥並主之

皂角刺 燒灰 胡桃仁 去皮 故紙 炒 槐花 三兩

右為末每服二錢米飲調酒亦可

一方 治腸風臟毒

用茄蒂燒灰存性為末米飲調下二錢小兒服半錢

一方 治腸風下血

乾椿根白皮 人參 去芦

右件等分為末每服二錢空心用酒或米飲調下

一方

槐花 枳殼

右等分炒存性為末新井水為丸米飲下

一方 治臟毒下血

用黃連四兩酒浸春秋五日夏三日冬七日曬乾為末

以烏梅肉六兩同搗為膏丸如梧子大每服二三十丸

空心白湯下

一方 治腸風下血

用椿根白皮北引者去粗皮酒浸晒乾為末研膠棗肉

丸如梧子大每服三五十九酒送下

○廣按腸風者邪氣外入隨感隨見所以其色清也臟

毒者蘊積毒久而始見所以其色濁也治腸風以散

風行濕藥治臟毒以清熱涼血藥又要看其虛實新

久之不同新者實者宜降之瀉之虛者久者宜升之

補之故治法有所異也

# 痔瘡 五十二

丹溪心法

○痔瘡專以涼血為主

入方

人參

黃芪

生苴

川芎

當歸 和血

升麻

條芩 腸大

枳殼 寬腸

槐角 涼血

黃連 等分

一方無黃連

右以水煎服 或丸服亦可

重洗

心法附餘卷下

奎

五倍子

朴硝

桑寄生

蓮房

加荆芥

煎湯先重後洗又冬瓜藤亦好 又大腸熱腫者用木

鱉子五倍子研細末調傳 痔頭向上是大腸熱甚收

縮而上用四物湯解毒湯加枳殼白木槐角秦艽

附諸方

清心丸 素問云諸痛痒瘡瘍皆屬心火此藥王

黃連 一兩

茯神

微赤茯苓 各半

右為末煉蜜為丸如梧子大每服一百丸食前米湯下

清涼飲 治諸痔熱甚大便秘結

當歸

赤芍藥

甘草

大黃 飯上蒸

右等分為末每服二錢新水調下

黃耆葛花丸 宣明方 治腸中久積熱毒痔瘻下血疼痛

黃芪

葛花

生地黃 焙

黃赤豆花 各二

大黃

赤芍藥

黃芩

當歸 各三

蟬皮 一錢

檳榔

白茯苓

皂角子仁 各五

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九至三十九煎藥

白皮湯及茴香槐子煎湯下亦可

槐角丸 治痔瘻有効

槐角

當歸

地骨皮

蟬皮 各

右為末滴水丸如梧子每服五十九空心服

蟬皮丸 治諸痔瘡出血裏急疼痛

槐花 炒

艾葉 炒

枳殼

地榆

當歸

川芎

黃芪

白芍

白礬 枯

貫衆

蟬皮 各

頭髮 燒三

猪後蹄重甲 十枚

皂角 一錢 炙

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九食前米湯下

猪甲散 治諸痔

猪懸蹄甲 不以

右為末陳米湯調二錢空心服	芍歸丸	治痔下血不止	川芎	當歸	黃芪	神麴
地榆	槐花	炒各半兩	阿膠	炒	頭髮	燒灰
荊芥	木賊	各一錢五分				
右為末煉蜜丸如梧子大每五十九食前米湯服	乾葛湯	治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血				
乾葛	枳殼	炒	半夏	茯苓		
生芩	杏仁	各半兩	黃芩	甘草	炙各二錢半	
右剉每服三錢黑豆一百粒姜三片白梅一箇水煎服						
橘皮丸	治因憂思恐怒適臨于前痔瘡發作腫痛大便難強努則肛出亦皆治之					
橘皮	枳殼	炒	川芎	槐花	炒各半兩	
檳榔	木香	桃仁	炒去皮	紫蘇葉		
甘草	炙各二錢半	香附	二錢半			
右剉每服三錢姜棗煎服						
一方	治腸痔每大便常有血					
蒲黃末方寸七米飲調下日三頓瘥						
地黃丸	治五痔滋陰必用之					
地黃	酒蒸熟一兩六錢	槐花	炒	黃柏	炒	

<p>杜仲<small>炒</small></p> <p>獨活<small>各一兩</small></p> <p>黃芪<small>一兩</small></p> <p>右為末煉蜜丸如梧子大每五十九空心米湯服下</p> <p>一方</p>	<p>白芷<small>各一兩</small></p> <p>澤瀉</p> <p>白附子<small>二錢</small></p>	<p>山藥</p> <p>牡丹皮</p> <p>茯苓<small>各六錢</small></p>	<p>大黃<small>煨三錢</small></p> <p>牡蠣<small>煨一兩</small></p> <p>右為末作十服空心白水調服</p> <p>五灰散<small>三因方</small></p> <p>鱉甲<small>治壯</small></p> <p>猪左足懸蹄甲<small>治腸痔</small></p> <p>痔瘡</p> <p>心法附餘卷上</p> <p>右燒存性隨証倍用一分為末井花水調二錢空心臨</p> <p>時服</p> <p>香殼丸<small>宣明方</small></p> <p>而成瘻</p>	<p>木香</p> <p>黃蘗<small>各三錢</small></p> <p>枳殼<small>去穢</small></p> <p>厚朴<small>各半兩</small></p> <p>黃連<small>一兩</small></p> <p>蟬皮<small>燒灰一箇</small></p> <p>當歸<small>四錢</small></p> <p>荆芥穗<small>三錢</small></p> <p>右為末麵糊丸如梧子大每服二三十丸溫水下食前</p> <p>日三服</p> <p>一方</p> <p>治諸痔瘡</p>	<p>槐花<small>四兩</small></p> <p>皂角刺<small>槌碎一兩</small></p> <p>胡椒<small>十粒</small></p> <p>川椒<small>一兩</small></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

右用獐猪肚一箇入藥在內扎定口煮熟去藥空心食

又方

○已上諸方內治之劑

薰洗方

槐花

荆芥

枳殼

艾葉

右以水煎入白礬先薰後洗

又方

用五倍子如燒香法置桶中薰妙

又方

木鱉子

七箇取

白礬末 二錢

痔瘡

心法附餘卷五

李

右以水煎薰洗二三次

淋之良

如肛門腫熱以朴硝末水調

又方

又方

搗桃葉一斛蒸之內小口器中以下部榻上坐虫自出

又方

用無花果葉煮水薰少時再洗

又方

用好醋沃燒新磚如法坐薰良

又方

翻花痔

用荆芥防風朴硝煎湯洗之次用木鱉子礬金研末入

龍腦些少水調傳之或用熊膽片腦和勻胎之尤妙

又方

用全蝎不以多少或二三箇初發痔瘡用此燒薰

又方

用韭菜不以多少燒熱湯以盆盛湯在內盆上用器具

蓋之留一竅却以韭菜於湯內泡之以殺道坐竅上令

氣蒸薰候溫用韭菜湯輕輕洗瘡數次自然脫體

又秘方

先用乾馬齒莧煎湯洗次用螺螄活搗敷瘡紙封口空

心食煎鹽湯調下枳殼末一二錢

又方

痔瘡 心法附餘卷五

李

又方

用枳殼不拘多少每用末二錢水一大碗沙瓶內煎百

沸先薰蒸而後洗之

外敷蝸牛膏

用蝸牛一枚射香少許用小砂合子盛蝸牛以射香糝

之次早取汁塗瘡瘡有効

槐白皮膏

和清方

治內外諸痔年久不愈者

槐白皮

枳實 各五錢

赤小豆 二合 桃仁 六十枚

當歸 各三兩

甘草

白芷 各二兩

右咬咀以煎成猪膏一斤微火煎至黃色藥可成膏以

貼瘡

五灰膏

危氏方

治臟腑一切蘊毒發為痔瘡不問遠年近

日形似雞冠蓮花核桃牛乳或內或外並皆治之此方

親傳之瘡科劉叔茂累試皆驗不敢自秘

蕎麥

灰半

荊柴

老杉枝

薊柴

山白竹

右以上四般柴竹截作二尺許長以斧劈破成片各取

一束曬乾放火上燒過置壩內為灰防為風所化俟盡

燒却以水於鍋內煮用炭汁又用酒漏以布帛實其竅

置蕎麥灰於酒漏內以所煮四般炭汁淋之然後取汁

痔瘡

心法附錄卷上

主

於鍋內慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰同丹調和

成膏以瓦瓶貯之止用石灰傳之面上不令走氣臨用

時却去石灰以冷水調開冷病若以水洗洗淨痔瘡仰

卧搭起一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹篦挑藥

塗痔上須臾痛息用紙楷去藥再塗如此三四遍要痔

瘡如墨樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以葱

湯和之日洗三五遍六七日後膿穢出盡其瘡自消

寬腸丸

方大成

五灰塗痔瘡之後或臟腑秘結不通者

用此藥寬腸

黃連

枳殼各等

右為末麵糊丸如梧子大每服五十九空心米湯下

一方 治久痔

用熊膽塗神効

一方 治痔瘡有頭

用芫花入土根洗淨木臼搗以少水絞汁於銀銅器內

慢火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔瘡頭繫時微痛

候心躁痔落時以紙擦離膏於竅內永除其根

一方

治用藥枯痔後大便堅硬難下以大黃濕紙裹煨枳殼

去穢當歸酒洗各等分為末煉蜜丸如梧子大每服三

痔瘡

心法附錄卷上

主

三

十九白湯下

灸法

用大蒜一片頭垢捻成餅子先安頭垢鑷於痔上外安

蒜艾灸之

○已上數方外治之法

四物湯

見補損

解毒湯

見濕熱

漏瘡

五十三

丹溪心法

○漏瘡先須服補藥生氣血用參朮芎歸為主大劑服之外以附子末津唾和作餅子如錢厚以艾灸之漏大炷大漏小炷小但灸令微熱不可使痛乾則易之則再研如末作餅再灸如困則止來日又灸直至肉平為効亦有用附片灸仍用前補劑作膏貼之尤妙 痔漏涼大腸寬大腸用枳殼去穢入巴豆鐵線纏煮透去巴豆入藥用丸藥則爛搗用前藥乾用寬腸 澀竅用赤石脂白石脂枯礬黃丹腦子 漏竅外塞用童便煨爐甘石牡蠣粉入方

黃連散 元有痔漏又於肛門邊生一塊皮厚腫痛作膿就在痔孔出作食積注下治

黃連 阿魏 神麴 山查

桃仁 連翹 槐角 犀角等分

右為末以少許置掌心時時舐之津液嚥下如消三分之二止後服

附諸方

加味槐角丸 古庵方 治痔漏通用及治腸風下血

槐角二兩 生半二兩 當歸身 黃芪各二兩

川芎 阿膠各半 黃連 條芩

枳殼 秦艽 防風 連翹

地榆 升麻各一 白芷半兩

右為末煉蜜丸或酒糊丸如梧子大每服五十九丸漸加至七八十丸百丸空心溫酒或米湯送下

法曰以槐角生半生血涼血為君當歸川芎黃芪阿膠補虛為臣以諸藥為佐使蓋黃連瀉心火條芩涼大腸枳殼寬大腸秦艽去大腸風防風為血證上使連翹為血證中使地榆為血證下使而連翹又能散經絡中大邪地榆又能涼血升麻升散火邪又與白芷引諸藥入大腸經絡夫痔漏經絡之病也

槿藤子丸 御藥院方 治腸癖下血痔漏結核疼痛

槿藤子一箇重七錢者 皂角刺燒存 茴香炒

枯白礬 枳殼去白 樗白皮 白附子炮

蝟皮炒存性乳香半錢

右為末醋麵糊丸如梧子大每服五十九丸空心溫酒下如痔瘡痛醋研五七丸塗患處

蝟皮丸 齋生方 治五種痔漏

猪左懸蹄甲 黃牛角腮 蝟皮一箇同上二

防風去芦 貫眾 槐角子炒 鱉甲醋煮

枳殼去白 雞冠花 槐花 黃耆去芦

雷丸 黃連去須 當歸 香白芷

油髮灰

玄參各半

麝香五分

右為末米糊丸如梧子大每服一百丸空心米飲送下  
年高并虛弱者不宜服也

枳殼散

御藥院方

治腸風痔漏便血無數疼痛不可忍

枳殼去穢

槐子微炒

荊芥穗各半

右為末每服三錢薄粟米粥調下如人行一二里地再

以粥壓下日進二三服

一方 治痔漏下血疼痛

用槐花炒枳殼去穢各一兩為末醋糊丸如梧子大每

服二十丸空心米飲湯下十服見効

一方

用枳殼水浸去穢每二片用巴豆一粒在內線縛於銀

石器內以醋浸一宿熬煮乾去豆為末醋糊為丸如梧

子大每服十五丸空心茶清送下

猪腎丸 通行漏瘡中惡水自大腸中出

用黑牽牛碾細末二錢半入猪腎中一線札青竹葉包

慢火煨熟空心溫酒嚙下

○已上諸方治初發痔漏涼解之劑

乳香丸 治冷漏

乳香二錢

杜鰂粉分半

右為末雪糕糊丸麻子大每服三十丸姜湯空心下  
釣腸丸和濟方 治久漏虛漏肛門腫痛或生瘡時有膿血  
及腸風下血虛寒久不愈者

括蔞二枚

蟬皮二箇

雞冠花微炒

綠礬枯一

白礬二

胡桃仁取仁十五兩不去

白附子

天南星生用

枳殼去穢

半夏

訶子二兩

附子去皮臍生

右為末醋糊丸如梧子大每服一十九丸空心臨卧溫酒

送下

黑丸子危氏方 專治年久痔漏下血用之累驗

乾姜

百草霜一兩

木饅頭二兩

烏梅

敗棕

栢葉

油髮各半

白芷五錢

燒灰存性

藥入後

桂心三錢

白芷五錢

燒灰存性

右丸味為末醋糊丸如梧子大空心米飲下三十丸

烏玉丸秘方 治男子婦人下血腸風痔漏者疼痒不可忍

服此三四次是効初得此病或痒或疼或發道周迴多生

硬核是痔破者是漏下血是風皆因酒色過度即成此

疾人多以外醫敷洗不知病在腸中有虫若不去根其

病難除

槐角六兩

雷丸四兩

敗棕八兩

苦練根五兩

芝蔴 四兩

牛角鯁 十一兩 亂髮 半兩 水

右件剉碎用磁器內燒存性碾末入乳香二兩麝香八錢研勻酒糊丸如梧子大每服五十九丸細嚼胡桃一箇溫酒送下空心臨晚二服甚者三服忌別藥房室醋魚雞諸般發風動氣毒物并坐濕地

○已上諸方治年久痔漏溫澁之劑

薰男婦翻花漏瘡

革麻子 去殼 防風

天南星 各半

右件為粗末盆內燒煙上用器具蓋之留一孔坐孔上薰之

又方 薰漏瘡 心法附餘卷五

艾葉

五倍子

白膠香

苦練根 各等

右剉碎如燒香法置長桶內坐薰瘡處

薰洗痔瘻疼痛

枳殼 半兩

朴硝 二錢

薄荷 半兩

荊芥

乾蓮蓬 各一兩

右件為粗末用水三碗煎至二碗半乘熱薰洗

洗漏瘡方 治漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨

漏蜂房白芷煎湯洗 或大腹皮苦參煎湯洗

右洗畢拭乾先用東向石榴皮晒為末乾摻以殺淫虫

少頃傳藥

又方

用冬瓜湯洗即愈

又方

用朴硝井水調洗 或用蜜和硝調搽

又方 治痔漏

用河邊水漂出柳根赤鬚煎湯洗極効

傳久漏方

用九孔蜂房炙黃以臘月猪脂研傳候收又以龍骨降香節末入些乳香傳瘡

又方 傳痔漏 心法附餘卷五

用田螺一箇挑開簷入片腦一分過一宿取螺內水搽

瘡先用冬瓜瓢煎湯洗淨搽

蒲黃散 治下部痔漏

蒲黃 一兩

血竭 半兩

右為末每周少許拈患處

又方

用蛻螂不以多少焙乾為末先用禁水洗淨貼之

辰砂挺子 秘方 治痔漏等瘡

人言 一錢

白礬 二錢

蜜陀僧

辰砂 各五錢



右件先研人言細鋪鍋底次用藥鋪入言上枯煙盡為度次將陀僧辰砂研細白糕和作尖挺子如小麥大每用一粒頑漏納瘡口上去敗肉盡後貼生肌散	生肌散 秘方	寒水石 一錢 龍骨 五錢 乾胭脂 三分 輕粉 一錢	右件研末乾貼瘡嫩寒水石乾胭脂加龍腦瘡老止依方	辰砂膏 秘方	瓜蒂 三錢 密陀僧 二錢 硃砂 半錢 片腦 少許	右件為末如瘡乾津調貼瘡濕乾貼	王紅散 秘方	硃砂 二兩 先燒硃砂在鍋內火用 白礬 兩	硃砂 四錢	右件為末敷痔乾用津唾調貼	代針膏 秘方	巴豆 五錢 枳殼 大者二錢 去皮 枳殼 去穢	右件將豆裝在枳殼內綿縛罐內盛醋煮乾枳豆晒乾研細用絲綿蘸濕敷痔根上去痔不用止用生肌散如頑漏日久不可用津調代針膏敷瘡頭尖敗肉自去
--------------------------------------------------------------	--------	---------------------------	------------------------	--------	--------------------------	----------------	--------	----------------------	-------	--------------	--------	------------------------	----------------------------------------------------------------

口效散 聖惠方 治鼠疥痔漏	蜜陀僧 二錢 射香 片腦 各半 銅綠 一錢	右件為末先用溫水洗拭乾敷	生地黄膏 治漏瘡通用	露蜂房 二錢 五倍子 三錢 木香 三錢 乳香 一錢	輕粉 一字	右為末用生地黄一握搗細和為膏攤生絹貼之	蛇蛻散 治漏瘡血水不止	蛇皮 焙焦 五倍子 龍骨 各二錢 續斷 五錢	右為末入射香少許津唾調傳	漏瘡 秘方	○已上諸方外治之法	○廣按痔漏之源由乎酒色過度濕而生熱充于臟腑溢于經絡墜手穀道之左右衝突為痔久而成漏者也痔輕而漏重痔實而漏虛治痔之法不過涼血清熱而已至於治漏初則宜涼血清熱燥濕久則宜澀竅殺虫而無乎溫散也或曰痔漏火是根源何故而用溫澀殊不知痔止出血始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕寒不用溫藥何以去濕而散寒乎非止痔漏百病中多有始熱而終寒者如瀉痢如嘔吐初作則腸胃氣實為熱久作則腸胃氣虛而為寒矣丹
---------------	-----------------------	--------------	------------	---------------------------	-------	---------------------	-------------	------------------------	--------------	-------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

溪下血條云下血久不愈者後用溫劑正此義也

# 脫肛 五十四

丹溪心法

○脫肛屬氣熱 氣虛 血虛 血熱 氣虛者補氣參  
芪芎歸升麻 血虛四物湯 血熱者涼血四物湯加炒  
栢 氣熱者條芩六兩升麻一兩麵糊丸 外用五倍子  
為末托而上之一次未收至五七次待收乃止 又東壯  
方壁土泡湯先薰後洗

附諸方

脫肛 心法附餘卷之十一 全  
香荆散 三四方 治肛門脫出大人小兒悉皆治之

香附子

荆芥穗 各等 一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎至十數沸熱淋洗

一方

用五倍子為末每用二錢入白礬一塊水二碗煎洗

一方

用木賊燒灰存性為末搽肛門上按入即愈

一方

用浮萍為末乾貼患處

一方

用蔓陀羅花子連殼一對橡斗十六箇搗碎水煎三五

沸入朴硝熱洗其肛自收

靈散 治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨 煅五 木賊 錢五分 性二

右為末摻托之

又方

用槐花槐角等分炒黃色為末用羊肉蘸藥炙熟食之  
以酒送下或以猪腰去皮蘸藥炙食亦可

# 淋 五十五

淋疾 心法附餘卷之十一 全

丹溪心法

○淋有五皆屬手熱 解熱利小便山梔子之類山梔子

去皮一合白湯下

戴云淋者小便淋瀝欲去不去不去又來皆屬於熱也

入方 治老人氣虛而淋者

人參 白朮 木通 山梔子

右水煎服

地髓湯 治死血作淋痛不可忍此證亦能損胃不食

杜牛膝 根一合一名苦狀

右以水五鍾煎耗其四而留其一去滓入射香少許空

心服之又車以酒煎亦可又名苦杖散 老人虛寒者  
八味丸或六味地黃丸為要藥

又方 治氣虛而淋者

八物湯加黃芪虎杖甘草煎湯服諸藥中可加牛膝

附諸方

五苓散 治伏暑小便赤澀如淋 見中暑

一方 治諸淋

四苓散 二錢 益元散 一錢 燈草 三十莖 山梔子 一錢

右水煎空心服 或益元散加車前末一錢 或益元

散加阿膠末一錢

淋疾 心法附餘卷之十一

八正散 和劑方 治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便赤

澀癃閉不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆治之

車前子 瞿麥 篇蓄 滑石

甘草 山梔 大黃 木通 各一

右咬咀每服二錢水一鍾入燈心十莖煎至六分食前

溫服

五淋散 和劑方 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不

出或如膏如沙如石或如豆汁並皆治之

赤茯苓 六兩 赤芍藥 山梔子 仁 各十 當歸 去

甘草 五兩 各條 各三兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎八分空心服

石韋散 和劑方 治膀胱有熱淋瀝不去臍腹急痛蓄作有

時勞後即發或尿如豆汁或出沙石並皆治之

芍藥 白朮 滑石 葵子

木通 瞿麥 石韋 去毛 各當歸

甘草 各一 王不留行 一兩

右為末每服二錢空心小麥湯調下

通草湯 濟生方 治諸淋

王不留行 葵子 通草 茺根

蒲黃 當歸 去芦 桃膠 瞿麥

淋疾 心法附餘卷之十一

滑石 各一 甘草 半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎服

地膚子湯 濟生方 治諸病後體虛腸熱結下焦遂成淋

疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿出血

地膚子 一兩 猪苓 知母 黃芩

海藻 洗 通草 瞿麥 去根 枳實 炒

升麻 葵子 各半

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎六分溫服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子 生半 淡竹葉 赤茯苓 灯草 各二

荊芥穗能通竅

右作二服水煎

立效散和劑方治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草炙三兩 瞿麥穗一兩 山梔子去皮炒

右咬咀每服五錢水一鍾姜三片葱白三箇灯心三十莖煎至六分去滓食後溫服

○已上八方清熱之劑

導赤散和劑方治心虛蘊小便赤澀或成淋痛

生乾地黄 甘草 木通

右咬咀每服三錢水一鍾竹葉十片煎六分溫服

淋疾心法附餘卷之十一

大府丹本事方治心經蘊熱小便赤少及五淋澀痛

木通 黃芩各一兩 生熟地黄二兩

右為末煉蜜杵為丸如梧子大每服五十九丸木通湯送下

下

○已上二方寧心之劑

六味地黄丸 治血虛腎虛消渴淋濁 見補損

鹿角霜丸三因方治膏淋多因憂思失志濁氣不清小便

淋閉黯如膏脂疲劇筋力或傷寒濕多有此証

鹿角霜 秋石 白茯苓各等分

右為末麵糊丸如梧子大每服五十九丸空心米湯下

○已上二方滋腎之劑

一方 治氣虛脾虛消渴淋濁

人參 滑石錢各一 白朮半一錢 赤茯苓

澤瀉各七分 麥門冬 甘草各五分 竹葉三十片

右剉作一服水一鍾灯心二十莖煎六分溫服食前

清心蓮子飲和劑方治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩

渴微熱小便赤澀或欲成淋並皆治之

黃芪蜜炙 石蓮肉去心 赤茯苓 人參各七錢半

車前子 麥門冬去心 甘草 地骨皮

黃芩各半兩

淋疾心法附餘卷之十一

右咬咀每服五錢水一鍾煎六分溫服發熱加柴胡薄

荷

○已上二方扶脾之劑

髮灰散 治血淋 若單小便出血為莖衄皆主之

亂髮不拘多少燒灰入射香少許每服用米醋泡湯

調下 治淋以葵子末等分米飲空心調下最治婦

人胞轉不尿

葉氏治血淋方簡易方

阿膠麩炒 木猪苓 赤茯苓 滑石

澤瀉各一兩 車前子半兩

右咬咀每服三錢水一鍾煎六分五更時服	一方 治小腸有熱血淋急痛	車前草連根帶穗洗淨白內搗井花水調濾清汁空心涼服一碗若是淋沙石則以煨寒水石為末調服	一方 治血淋熱淋効	赤小豆 <small>不以多少炒微熱</small>	右為末每服二錢煨葱一根溫酒調服	通秘散 治血淋痛不可忍	陳皮 香附 赤茯苓 <small>各等分</small>	右剉每服二錢水煎空心服	淋疾 <small>心注附餘卷之主</small>	白薇散 治熱淋血淋	白薇 赤芍藥 <small>各等分</small>	右為末每服二錢溫酒調下立効或加檳榔	一方 治熱淋血淋	麻根 <small>十箇</small>	右以水四碗煎至一碗空心服甚効	一方 治血淋諸熱淋	山茵陳 淡竹葉 木通 山梔子	滑石 甘草 猪苓 瞿麥	右剉每服五錢水一鍾半灯心少許煎至八分空心溫
-------------------	--------------	------------------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------	-------------	------------------------------	-------------	---------------------------	-----------	---------------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------	-----------	----------------	-------------	-----------------------

服如大便秘澀加大黃同煎	○已上八方理血之劑	沉香散 治氣淋疼此多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便溺不通	沉香 石韋 滑石 王不留行	當歸 <small>各半兩</small> 葵子 芍藥 <small>各七錢五分</small> 甘草	陳皮 木香 青皮 <small>各三錢五分</small>	右為末每服三錢煎大麥湯下	傳濟方 治五淋	赤芍藥 <small>二兩</small> 檳榔 <small>二箇麵煨</small>	淋疾 <small>心注附餘卷之主</small>	右為末每服二錢水煎空心服	一方 治卒淋急痛	益元散 二錢 茵春 <small>一錢微炒黃</small> 木香 檳榔 <small>各二錢半</small>	右為末水調服	○已上三方理氣之劑	一方 治小便淋痛赤澀下沙石	萱草根一握搗取汁服 或嫩苗煮食之亦可	一方 治沙石淋	琥珀二錢研為末空心葱白湯調下	琥珀散 <small>宣明方</small> 治五淋沙石淋
-------------	-----------	-------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	--------------	---------	----------------------------------------------	---------------------------	--------------	----------	----------------------------------------------------------	--------	-----------	---------------	--------------------	---------	----------------	-------------------------------

滑石	琥珀各一	木通	當歸
木香	鬱金	篇竹各半	
右為末每服五錢以蘆葦葉煎湯空心調服如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下			
○已上三方開鬱之劑			
二神散	治諸淋急痛		
海金沙	七錢	滑石	半兩
右為末每服二錢煎木通麥門冬車前草湯入蜜少許送下			
一方	淋疾	心淋附餘參士	金
石燕子	七箇	大	新桑白皮
右將二物分作七貼用水一鍾煎七分去粗空心午前至夜各一服			
琥珀散	聖惠方	治五淋澀痛小便有膿出血	
琥珀	海金沙	沒藥	蒲黃各一
右為末每服三錢濃煎通草湯送下日二服			
一方	用蜆蚶七枚鹽二兩同與新瓦上焙乾研細溫酒調服		
一錢即愈			

用芋根二莖剉碎水一碗煎至半碗頓服即通	一方	用車前子一兩以絹囊盛水二鍾煎溫服立瘥	一方	用地膚子或莖葉一兩水一鍾煎溫服即此方掃帚
○已上數方專攻之劑	一方	治淋莖中痛此是肝經氣滯有熱	甘草稍	半兩
青皮	黃柏	澤瀉	各一	
右作一服水二鍾煎至一鍾空心溫服	一方	治苦病淋而莖中痛不可忍		
淋疾	心淋附餘參士	金		
六君子湯	加黃柏知母滑石石葦琥珀煎服	見調		
麥冬琥珀湯	治淋莖中痛不可忍相引脇下痛			
人參	五分	茯苓	四分	川練
生甘草	一錢	玄胡索	七分	澤瀉
當歸稍	加青皮	黃柏	各三	
右作一服水一鍾半煎至七分空心溫服	○已上諸方治莖中痛之劑			
治婦人諸淋方				
用苦楸根俗名杜牛膝洗淨槌碎一握水五碗煎至一碗去渣入射香乳香末各少許調服小便內當下沙				

石剝剥有聲是其似也

石韋散 治婦人小便卒淋澀

石韋

黃芩

木通

榆栢皮

葵子

瞿麥穗

甘草 各等分

石咬咀每服八錢水一鍾半姜三片煎至八分去渣食前溫服

○已上治婦人淋証之劑

八味丸

八物湯

並見補損

廣按林證其感不一或因房勞或因忿怒或因醇酒

或因厚味所致夫房勞者陰虛大動也忿怒者氣動

生火也醇酒厚味者釀成濕熱也積熱既久熱結下

焦所以小便淋瀝欲去不去又來而痛不可忍

者初則熱淋血淋久則煎熬水液稠濁如膏如沙如

石也諸方中類多散執利小便而於開鬱行氣破血

滋陰益少焉若夫散執利小便只能治熱淋血淋而

已其膏淋沙淋石淋三者必須開鬱行氣破血滋陰

方可也古方用鬱金琥珀開鬱藥也用青皮木香行

氣藥也用蒲黃牛膝破血藥也用黃栢生地黃滋陰

藥也東垣用藥凡例小腹脹用青皮黃栢夫青皮疎

肝黃栢滋腎蓋小腹小便乃肝腎之部位也學者不

可不知

肝黃栢滋腎蓋小腹小便乃肝腎之部位也學者不

可不知

肝黃栢滋腎蓋小腹小便乃肝腎之部位也學者不

# 小便不通 五十六

丹溪心法

○小便不通有氣虛 血虛 有痰 風閉 實熱 氣

虛用參芪升麻等先服後吐或參芪藥中探吐之 血虛

四物湯先服後吐或芎歸湯中探吐亦可 痰多二陳湯

先服後吐已上皆用探吐 若痰氣閉塞二陳湯加木通

一作香附探吐之以提其氣氣升則水自降下蓋氣承載

溺閉

心法附錄卷之五

生

其水也 有實熱者當利之砂糖湯調牽牛末二三

山梔之類 有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升 有

孕之婦多患小便不通胞被胎壓下故也轉胞論用四物

湯加參朮半夏陳皮甘草姜棗煎湯空心服 一婦人脾

寒後患大小便不通此是痰隔中焦氣滯於下焦以二陳

湯加木通初喫後煎植吐之

附脉理

脉訣舉要曰鼻頭色黃小便必難脉浮弦濇為不小便

附諸方

蒲黃湯 聖惠方 治心腎有熱小便不通

赤茯苓	木通	車前子	桑白皮	炒
荊芥	灯草	赤芍藥	甘草	微炒
蒲黃	生	滑石		
右各等分為末每服二錢葱白煎湯調下食前服				
葵子散	宣明方	治小便不通		
葵子	茯苓	去皮各		
右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓食前服				
葵子湯	濟生方	治膀胱實熱腹脹小便不通		
赤茯苓	去皮	木猪苓	去皮	葵子
瞿麥	滑石	木通	去節	黃芩
車前子	甘草	等分		
右咬咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分去滓溫服				
海金沙散	拔萃方	治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或		
五種淋疾癃閉不通				
海金沙	研	木通	瞿麥穗	滑石
通草	各半	杏仁	去皮尖麩	
右咬咀每服一兩燈心二十莖水二鍾煎至一鍾溫服				
鬱金黃連丸	秘方	治心火炎上腎水不升致使水火不得		
相濟膀胱小腸積熱或癃閉不通或遺溺不禁或白濁				
如淋或膏淋如膿或如梔子水或如沙石米粒或如粉				

糊相似者俱熱證也此藥悉皆治之				
鬱金	黃連	各一	黃芩	琥珀
大黃	酒浸	各四兩	滑石	四兩
白茯苓	四兩		黑牽牛	炒取頭末三兩
右為末水丸如梧子大每服五十丸沸湯下空心服如				
用消導飲食降心火可加沉香五錢				
宣氣散	濟生方	治小便不通腹臍急痛		
甘草	木通	各三	梔子	二錢
葵子				
滑石	錢各一			
右為末每服半錢灯心湯下食前				
木通散	濟生方	治小便不通小腹痛不可忍		
木通	滑石	各一	黑牽牛	頭末半兩
右咬咀每服一錢水半鍾灯心十莖葱白一莖煎三分				
食前				
八珍散	聖惠方	治大人小兒小便不利或不通		
大黃	木通	去皮	滑石	粉草
瞿麥	山梔子	黃芩	荊芥	各等
右為末每服一錢薄荷湯調下小兒減服食前				
草蜜湯 治心腎有熱小便不通				
生車前草搗取自然汁半鍾入蜜一匙調下				



一方 治膀胱不利為癰瘕者小便閉而不通

八正散加木香 方見淋類

一方 治小便不通臍下滿悶

海金沙 一兩 臘茶 半兩

右為末每服三錢生薑甘草湯調下

一方 治膀胱有熱小便不通

用朴硝不拘多少研為末每服二錢空心以茴香湯調

下妙

琥珀散 治老人虛人小便不通

用琥珀為末每服一錢以人參茯苓煎湯調空心服或

煉蜜丸如梧子大每服十九丸赤茯苓湯下

一方 治小便不通

雞子中黃一枚服之不過三

一方

用炒鹽熟熨小腹冷復易之

或以食鹽炒熱熨之

一方 治忍小便人致胞轉

自取爪甲燒灰米飲服之

一方

取陳久筆頭一枚燒灰和水服之

一方

用酸漿草搗汁入蜜同服

一方

用竹雞草一兩洗淨車前草一兩同於砂盆搗爛加蜜

少許無蜜加鹽少許取汁空心服小便自通竹雞草其

葉如竹葉花翠藍色

四物湯 見補損

二陳湯 見痰類

## 小便不禁 五十七

丹溪心法

丹溪心法

○小便不禁者屬熱屬虛 熱者五苓散如解毒虛者五

苓加四物 戴云小便不禁出而不覺赤者有熱白者氣

虛也

附諸賢論

王節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而用溫澁之

藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不

能禁而頻數來也故年老人多頻數是膀胱血少陽火

偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澁

之劑加牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥也病本

屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收之澁之治其標也

附諸方

茯苓丸 三因方 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓

白茯苓 各等分

右為末以新汲水煖先澄去筋膜控乾別取地黃汁與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈子大空心鹽酒嚼下一丸

桑螵蛸散 濟察方

治男子小便頻數如稠米泔色此由勞心焦思得之有服此藥不終劑而愈 方見赤白濁

心焦思得之

有服此藥不終劑而愈

方見赤白濁

治小便遺失 濟察方

阿膠 珠炒成

杜蠟

鹿茸 酒炙

桑螵蛸 酒炙各等分

右為末糯米糊丸如梧子大每五十九空心鹽酒下

六味地黃丸

治內虛熱者小便頻數不禁

本方加牡蠣五味子 見補損

家韭子丸 二因方 治大人小兒下元虛寒小便不禁或成

白濁

家韭子 炒六兩

鹿茸 酥炙四兩

茯苓 酒浸

牛膝 酒浸

熟地黃

當歸 各二兩

杜仲 去皮炒

石斛 去芦

乾姜 炮

桂心 各一兩

兔絲子 酒浸

巴戟 去心各一兩半

右為末酒糊丸如梧子大每服一百丸空心鹽湯溫酒

任下小兒須作小丸服之

五苓散

見中暑

解毒散

見濕熱

四物湯

見補損

夢遺

五十八

附精滑

丹溪心法

○專主乎熱

帶下與脫精同治法青黛海石黃柏 內

夢遺

心法附餘卷之五

文一

三百五十五

傷氣血虛不能固守常服八物湯加減吞檉樹根丸 思

想成病其病在心安神丸帶補藥 熱則流通知母黃柏

蛤粉青黛為丸 精滑專主乎濕熱黃柏知母降火杜蠟

蚬蛤粉燥濕

戴云因夢交而出精者謂之夢遺不因夢而自泄精者

謂之精滑皆相火所動久則有虛而無寒也

入方

良姜 三錢

燒灰

黃柏 二錢

燒灰

芍藥 二錢

燒灰

石為末麵糊丸梧子大每服三十九空心茶湯下

附諸賢論

王節齋曰夢遺精滑世人多作腎虛治而用補腎滋精之藥不効殊不知此證多屬脾胃飲酒厚味痰火濕熱之人多有之蓋腎藏精之所生由脾胃飲食化生而輸歸於腎今脾胃傷於濃厚濕熱內鬱中氣濁而不清則其所化生之精亦得濁氣腎主必藏陰靜則寧今所輸之精既有濁氣則邪火動于腎中而水不得寧靜故遺而滑也此證與白濁同丹溪論白濁為胃中濁氣下流滲入膀胱而云無人知此也其有色心太重妄想過用而致遺滑者自從心腎治但無脾胃者多要當審察附脉理

夢遺 上法附餘卷之十一 先

脉訣舉要曰遺精白濁當驗於尺結孔動緊二證之的附諸方

固精丸 治心神不安腎虛自泄精  
知母 炒 黃柏 酒炒 各三錢 龍骨 二錢

茯苓 蓮蕊 茯苓 遠志 各三錢

一方有茱萸肉三錢

右為末煮山藥糊丸梧子大硃砂為衣服五十丸

小兒絲子丸 和劑方 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

石蓮肉 二兩 兔絲子 酒焙 五兩 白茯苓 焙 一兩 山藥 三兩 內將

右為末用山藥糊搜和丸如梧子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下如脚膝無力木瓜湯下

威喜丸 和濟方 治丈夫元陽虛憊精氣不固小便白濁餘淋常流夢寐多驚頻頻遺泄婦人白濁白帶並皆治之

黃蠟 四兩 白茯苓 去皮切塊用緒茶一分於器內同煮二十餘沸取出日曬不用緒茶四兩

右以茯苓末鎔黃蠟丸如彈子大每一丸空心細嚼津液嚥下以小便清為度忌米醋只喫糠醋

金鎖正元丹 和濟方 治真氣不足呼吸短氣四肢倦怠脚膝酸疼目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損之證並皆服之

五倍子 八錢 紫巴戟 一兩 補骨脂 酒浸 一兩 硃砂 二錢

夢遺 心法附餘卷之十一 古

龍骨 二錢 肉苁蓉 酒焙 一兩 胡蘆巴 炒 一兩 茯苓 去皮 八錢

右為末入研藥勻酒糊丸如梧子大每服二十九空心溫酒鹽湯任下

玉鎖丹 和藥院方 治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨 蓮花蕊 雞頭實 烏梅肉 各等

右為末用熟山藥去皮為膏和丸小豆大每服三十丸空心米飲下

芡實丸 濟生方 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面少顏色驚悸健忘小便赤澁遺精白濁足脛酸疼耳聾目暗

芡實 <small>燕去皮</small>	蓮花鬚 <small>二兩</small>	茯神 <small>去木</small>	山茱萸肉
龍骨 <small>生用</small>	五味子	枸杞子	熟地黃 <small>酒蒸</small>
韭子 <small>炒</small>	肉苁蓉 <small>酒浸</small>	川牛膝 <small>去芦</small>	紫石英 <small>煨各兩</small>
右為末酒煮山藥糊丸如梧子大每服七十九空心鹽湯下			
固精丸 <small>經驗方</small>	治思慮色慾過度損傷心氣遺精盜汗小便頻數		
白茯苓 <small>去皮</small>	秋石 <small>各四兩</small>	石蓮肉 <small>去殼</small>	
水雞頭粉紅花在上結子垂下 <small>各二兩</small>			
右為末以蒸棗肉杵和丸如梧子大鹽湯下三十九溫鹽酒下亦可			
小中金丸 <small>宣明方</small>	治元臟氣虛不足夢寐陰人走失精氣		
陽起石 <small>研</small>	木香	乳香 <small>研</small>	青鹽 <small>各一錢五分</small>
骨碎補 <small>炒</small>	白龍骨 <small>二兩緊者搗碎絹袋盛大</small>		
黃狗腎 <small>一對酒一升煮</small>	杜仲 <small>各半兩去皮</small>		
茴香 <small>炒</small>	白茯苓 <small>二兩與狗腎同為末</small>		
右為末酒麵糊丸如皂角子大每服二丸空心溫酒下			
忌房室			
華氏定心湯 <small>簡易方</small>	理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精		

人參 <small>去芦</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	黃芪 <small>蜜炙</small>	茯神 <small>去木</small>
厚朴 <small>姜制</small>	川芎	赤石脂 <small>研</small>	白朮 <small>各二兩</small>
紫苑茸	防風	甘草 <small>炙各一兩</small>	麥門冬 <small>去心</small>
官桂 <small>半兩</small>			
右咬咀每服三錢水一鍾赤小豆七十粒煎六分食後服			
金櫻丸	治精滑夢遺及小便後遺瀝		
金櫻子	雞頭實 <small>各一兩</small>	白蓮花蕊	龍骨 <small>各半兩</small>
右為末糊丸如梧子大每服七八十九空心鹽酒下			
白羊肝丸	治遺精		
用大半夏八兩剉片猪苓四兩為末拌炒黃色去猪苓却將半夏為末用白羊腎兩對去筋膜無灰好酒煮爛搗為泥和半夏末為丸如梧子大晒乾將猪苓末炒熟拌和藥丸安於磁器內密封養藥每服三十九猪苓煎湯送下			
秘元丹	治精不禁危急者		
龍骨 <small>酒煮</small>	靈砂 <small>水飛各一兩</small>	砂仁 <small>半兩</small>	訶子 <small>小者熟煨</small>
右為末糯米糊丸如菜豆大每服十五丸加至二十丸空心溫酒下臨臥熱水下亦可			
一方			

靈砂二兩 陽起石火煨砂仁

訶子肉各一兩

白茯苓

杜鵑雌雄各半

麥門冬去心二錢半

右為末糯米飯丸空心酒下一十九丸要通飲葱茶半鍾即行如無陽起石以龍骨代之亦妙

鍊鹽散 治漏精白濁

白鹽

不以多少入礬石器內按實黃泥封固火煨一日取出鋪陰地一宿

白茯苓

山藥

煨各一兩

右為末入鹽一兩研勻棗肉和蜜丸如梧子大每服三

十丸空心棗湯送下

桑螵蛸散 治小便白濁夢遺失精

見赤白濁

八物湯

見補損

心法附錄卷三

重

樗樹根丸 即固腸丸 見婦人

○廣按精猶水也靜則位安動則妄行何以言之左腎所藏者精也真水也右腎所藏者氣也相火也夫夢遺精滑之症蓋由人之思想過度以動心火心火君火也若火動則相火翕然而動所以激搏真水而踈泄也其為熱証明矣古方往往以為寒而用熱燥之藥積薪救火難矣哉今但錄其稍可者以為收澁滑脫之用亦所謂切劑也中病則已不可過服况龍骨最能潤津 若過服之晚年發燥熱之所由也慎之

慎之或曰精泄已久則為寒矣古方用熱藥豈以是乎予曰不然夫精屬陰也火屬陽也陰精虛而陽火愈熾矣經云陰虛生內熱才六陰虛生內寒也

心法附錄卷三

心法附錄卷三

重

心法附錄卷之十一終

休寧東山古庵方廣藥之類集

# 風熱門

## 斑疹 五十九

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以微汗散之切不可下 內傷斑者胃氣極虛一身人皆行於外所致宜補以降於陰証畧例中求之 發斑似傷

斑疹 心法附錄卷之十二

寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理 疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者 疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之 癰疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癰疹也發則多痒或不仁者是兼風兼濕之殊色紅者兼火化也 黃瓜水調伏龍肝去紅點

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之

附諸方 玄參升麻湯 三四方 治傷寒失下熱毒在胃發癰或汗下

時後餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參 升麻 甘草 各等分

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分溫服溫毒發斑亦宜服之

陽毒升麻湯 活人方 治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻 犀角 射干 黃芩 各二分

人參 甘草 各二分

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯 活人方 治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁 赤芍藥 大青 知母 各一兩

升麻 黃芩 石膏 各二兩 甘草 各半

杏仁 去皮尖 柴胡 各一兩 五錢

右咬咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化癰湯 治傷寒汗吐下後癰發脈虛

人參 石膏 知母 甘草 各一分

守真加白朮一方加玄參分

右咬咀時時煎服

黃連橘皮湯 治溫毒發斑

黃連 陳橘皮 杏仁 枳實 各一分

麻黃 葛根 厚朴 甘草 各一分

右咬咀水煎服

調中湯 治內傷外感而發陰斑

蒼朮一錢 陳皮一錢 砂仁 藿香

芍藥炒 甘草炙 桔梗 半夏

白芷 羌活 枳殼各二錢 川芎五錢

麻黃 桂枝各五分

右咬咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子

牛旁子六錢 荊芥 防風各三錢 甘草一錢

右咬咀水煎服

通聖散 出丹溪經方

川芎 當歸 麻黃 薄荷

連翹 白芍各半兩 黃芩 石膏

桔梗各一兩 滑石三兩 荊芥 梔子

白朮各二錢半 甘草二兩

右剉水煎服 如身疼加蒼朮羌活 痰嗽加半夏

每服細末三錢生薑三片搗細湯起煎沸服之

# 頭眩

六十

丹溪心法

○頭眩 痰挾氣虛併火 治痰為主挾補氣藥及降火

藥 無痰則不作眩痰因火動又有濕痰者 濕痰者多

宜二陳湯火者加酒苓挾氣虛者相火也治痰為先挾氣

藥降火藥如東垣半夏白朮天麻湯之類 眩暈不可當

者以大黃酒炒為末茶湯調下 火動其痰用二陳加黃

芩蒼朮羌活散風行濕 左手脉數熱多脉滿有死血

右手脉實有痰積脉大是久病久一作虛久病之人氣血

俱虛而脉大痰濁不降也 昔有一老婦患赤白帶一年

半頭眩坐立不得睡之則安專治赤白帶帶愈其眩亦安

附脉理

頭眩 心法附錄卷之十二 眩暈 眩暈要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風

浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當

審諦先理痰氣次隨證治

附諸方

獨活散 楊氏家藏方 消風化痰治頭目眩暈

細辛去土 石膏 甘草炙 防風去

獨活去土 旋覆花 蔓荊子 川芎

獨活去土

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎至六分食後熱服

附方散 本事方 治風眩頭暈

山藥	甘菊花	人參	茯神
小片芎	錢各五	山茱萸肉	兩一
右為末每服二錢酒調不拘時日三服不可悞用野菊			
芎木湯	滿生方	治胃雨中濕眩暈吐逆頭重不食	
川芎	半夏	白木	兩各一
甘草	兩	甘草	兩
右咬咀每服四錢水一鍾姜七片煎七分溫服不拘時			
芎木除眩湯	直指方	治感寒濕頭目眩暈	
甘草	炙	川芎	附子
官桂	分	白木	
右咬咀每服二錢姜七片水煎溫服食前			
頭眩	心法附餘卷之十二	五	
荊黃湯	張子和方	治頭眩	
大黃	荊芥穗	防風	各等分
右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度			
芎辛湯	滿生方	治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈欲倒	
嘔吐不定並皆治之			
川芎	兩一	細辛	兩七
白木	甘草	兩各半	
右咬咀每服一兩姜五片茶芽少許水一鍾半煎八分			
臨臥溫服或食後服亦可			
頭運方	利痰清氣降火		
南星	分五	半夏	錢一
桔梗	分七	枳殼	錢一

陳皮	錢	甘草	分三	茯苓	錢一	黃芩	分一
右作一服姜七片水煎服食後							
香橘飲	治氣虛眩運						
木香	白木	半夏	錢	橘皮			
茯苓	砂仁	兩各半	丁香	甘草	錢二分		
右咬咀水二鍾姜五片煎服加當歸川芎官桂治血虛眩運							
白附子丸	治風痰上厥眩運頭疼						
全蝎	兩半	白附子	兩	南星	兩	半夏	
旋覆花	甘菊	天麻	川芎				
橘紅	僵蚕	乾薑	兩各一				
頭眩	心法附餘卷之十二	六					
右為末生姜半斤取汁打糊丸梧子大煎荊芥湯下五十丸							
人參前胡湯	治風痰頭運目眩						
半夏	麴	木香	枳殼	炒	紫蘆		
赤茯苓	南星	地	甘草	錢各五	人參	錢三	
前胡	橘紅	錢各五					
右剉咀每服五錢姜五片水煎服							
川芎茶調散	治風眩頭痛	見傷風					
半夏白朮天麻湯	見頭痛						
喝起散	大全良方	治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事					
喝起草	即蒼耳草也						



右取嫩心不以多少陰乾為末每服二錢酒調下

黑錫丹 治早起眩暈須臾自定以為常此因老痰鬱痰所作必須此藥劫之 見痰類

○廣按頭眩之症多主於痰無痰則不作眩有因寒痰濕痰者有因熱痰風痰者有因氣虛痰者有因血虛挾痰者其証不一也夫寒痰濕痰作眩或因外感寒濕或因內傷生冷熱痰風痰作眩或因外感風暑或因內動七情氣虛眩暈或因脾虛不進飲食或因胃弱嘔吐泄瀉血虛眩暈男子每因吐血下血女人每因崩中產後而作也已上數方雖各有主未能盡其變在智者擴充之也又嘗論之夫咳嗽頭痛頭眩三者乃病之標必治其病之本而病方已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之本也

## 頭痛

六十一 附眉眶痛

丹溪心法

○頭痛多主於痰痛甚者大多有可吐者可下者 清空  
諸頭痛除血虛頭痛不可治 出東垣試効方 血虛頭  
痛魚尾上攻頭痛用芎歸湯古方有追涎藥

王節齋論

王節齋曰久頭痛病暑感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得效誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉遏而為痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣唯當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從治法治之則病可愈而根可除也

附脈理

脈訣舉要曰頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣

頭痛

心法附錄卷之十二

虛頭痛雖弦必瀉痰厥則滑腎厥堅實

頭痛治例

心法附錄曰頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡 太陰蒼朮

少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是濕痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子白芍酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安

神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如苦頭痛用細辛

如項顛痛宜葉本防風柴胡東垣云項顛痛須用葉本去川芎

且如太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實升麻葛根石膏頭痛  
心法附餘卷之十二 九

白芷為主

太陰頭痛必有痰體重或腹痛脉沉緩以蒼朮半夏南星為主

少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛為主

厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩以吳茱萸湯主之

血虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃芪為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荊子二分細辛二分其効如神

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也知體而不知用者弊體用不失可謂上上矣

附諸方

加減三五七散 和劑方 治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸 去核 細辛 一兩 乾姜 炮 三兩 防風 去蘆 四兩

茯苓 三兩 附子 三兩 半 炮 去皮 附子 三兩 半 炮 去皮

右為細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛 見傷風

都梁丸 和劑方 治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風頭痛

香白芷 揀大者 湯洗 五次 剉 晒 乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼用荊芥湯下

小芎辛湯 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已

川芎 一兩 細辛 洗 去 土 白朮 甘草 炙 各 半 兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片茶芽少許煎服

一方 治傷風感冒一切頭痛

荊芥 兩 細辛 甘草 七錢 白芷

羌活	香附子	薄荷	荆芥
茵陳	蒼朮	川芎	荊芥
右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下			
定風餅子	秘方治偏正頭痛		
草烏頭	微炮	香白芷	川芎
天麻	甘草	細辛	防風
右為末姜汁丸如龍眼大捏作餅子每服一餅食後茶湯下			
川芎丸	聖惠方消風壅化痰涎利咽膈清頭目旋暈心忪		
頭痛	心法附餘卷之十二		
煩熱頭項緊急肩背拘攣肢體煩疼皮膚癢痒腦昏目			
疼鼻塞聲重面上遊風			
川芎	薄荷	甘草	細辛
防風	各二兩	桔梗	各十兩
右為末煉蜜丸每兩半作五十九丸每服一九細嚼茶清			
食後臨臥時下			
二芎餅子	濟生方		
川芎	撫芎	乾姜	甘草
薑本	去	天南星	去
一方有蒼耳無白朮		防風	去
		白朮	各等分

右為末姜汁浸蒸餅為劑如雞頭大捏作餅每服五六餅細嚼茶清下			
微清膏			
蔓荊子	細辛	薄荷	川芎
生甘草	炙甘草	葉本	錢一
右為末茶清調下二錢			
神靈散	治偏正頭疼眼痛不止及破傷風等疾		
煇硝	黃丹	雄黃	沒藥
乳香	各二錢		
右為細末令患人口噙溫水用竹筒吹藥入鼻中少許			
頭痛	心法附餘卷之十二		
一方	治偏頭疼以雄黃細辛等分研末每用一字左邊		
痰吹右鼻內右邊痰吹左鼻內			
○已上諸方辛溫外散風寒之劑			
天麻散	治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發燥熱方見風		
奎朱丹	御藥院方治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯胸膈		
不利			
朱砂	二兩	龍腦	錢一
石膏	燒通紅	白附子	炮去皮
右為末燒粟米飯為丸如小豆大硃砂為衣每服三十			
食後茶酒任下			

太川芎丸 治胃風暈眩外合陽氣風寒相搏胸膈痰飲		偏正頭疼		川芎 一斤 天麻 四兩 兩		右為末煉蜜為丸每兩作十九每服一丸食後細嚼茶酒下		上清散 集成 治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者		川芎 鬱金 芍藥 荊芥穗		薄荷葉 芒硝 錢各二 乳香 沒藥 錢各半		腦子 二分		右為末每服一字鼻內搐之		頭痛 心法附餘卷之十二 廿三		藥花散 和劑方 治風熱上攻頭痛不止		石膏 荊菊花 防風 旋覆花		枳殼 蔓荊子 甘草 羌活 錢各半		右用水二盞生薑五片煎至一盞去粗溫服		芎芷散 直指方 治風壅頭痛		川芎 白芷 荊芥穗 軟石膏 各等分		右為末每服一錢食後沸湯調下		川芎散 校料方 治偏頭痛神効		荊菊花 石膏 川芎 錢各二		右為細末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生	
------------------------	--	------	--	---------------	--	-------------------------	--	------------------------	--	--------------	--	----------------------	--	-------	--	-------------	--	----------------	--	-------------------	--	---------------	--	------------------	--	-------------------	--	---------------	--	-------------------	--	---------------	--	----------------	--	---------------	--	-----------------------	--

石膏散 校料方 治頭痛不可忍		麻黃 去根 石膏 各二 何首烏 兩半 乾姜 七錢		右為細末每二錢臘茶清調服		點頭散 聖惠方 治偏正頭痛		川芎 主二 香附子 去毛 四兩		右為末每服一錢好茶調下常服除根		一方 治頭痛去風痰		南星 一箇大 皂角 十四箇七箇 生七箇煨 白梅 一箇		牙茶 撮 葱頭 四分 姜三片		頭痛 心法附餘卷之十二 十四		右將前藥俱在石器內搗碎水一盞半煎至一盞去滓		溫服不可輕犯鐵器搗		一方 治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷開之		雨前茶 川芎 白芷 防風		藁本 細辛 當歸 等分		右以咀每服五錢水一鍾半煎服		川芎散 聖惠方 治頭風偏正頭痛		羌活 細辛 川芎 香附子		槐花 甘草 荊芥穗		薄荷 菊花 茵陳 防風 各一兩	
----------------	--	--------------------------	--	--------------	--	---------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------	--	----------------------------	--	----------------	--	----------------	--	-----------------------	--	-----------	--	-----------------------	--	--------------	--	-------------	--	---------------	--	-----------------	--	--------------	--	-----------	--	-----------------	--

右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物

○已上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

清膏 治偏正頭痛年深不愈者又治風濕熱頭上癰  
及腦痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎錢五 柴胡錢七 黃連炒酒 防風

羌活各一兩 炙甘草五錢 細梃子黃芩三兩去皮一兩

右為末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口

內少用白湯送下臨臥 如苦頭痛每服加細辛二分

痰厥頭痛脉緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩

五錢 如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半

加柴胡一倍 如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白

虎湯加香白芷白虎湯方見濕熱類

靈砂丹 御藥院方 治風熱鬱結氣血滯滯頭目昏眩鼻塞

聲重鼻流清涕口苦舌乾咽噎不利胸膈痞悶咳嗽痰

實腸胃燥澀小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正

頭疼髮落牙痛遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並皆治

之

天麻 獨活 羌活 細辛

防風 連翹 石膏 薄荷各一兩

川芎 梔子 芍藥 荊芥穗

當歸 黃芩 大黃生 全蝎去毒

菊花 人參 白朮各半兩 硃砂一兩

寒水石生 桔梗各一兩 縮砂仁二錢 生甘草一兩

滑石四兩

右為末煉蜜丸每兩作十丸硃砂為衣每服一丸細嚼

茶清送下

真珠散 聖惠方 治偏正頭痛頭風

盆硝七錢 白滑石半兩 乳香一錢 片腦少

右研細用一字口噙水嚥鼻內

豆粉丸 聖惠方 治風熱頭疼

頭痛 心法附餘卷之十二 十六

川芎 細辛 甘草 白芷

豆粉各二錢 薄荷 石膏各半兩 朴硝二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸

細嚼茶清下

川芎散 聖惠方 治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多

眵齒間緊急作偏頭痛

川芎 柴胡各一兩 半夏麴 甘草炙

甘菊花 細辛 人參 前胡

防風各半兩

右以咀每服八錢水一盞半生薑三片薄荷少許煎至

八分溫服		安神湯 聖惠方		治頭痛頭旋眼黑	
羌活	黃蘗	生甘草	加蔓荊子	升麻	炙甘草
兩	酒浸各一兩	錢三	半	酒浸各半兩	錢三
柴胡	生地黃	知母	升麻	升麻	升麻
兩	錢三	酒浸	酒浸	酒浸	酒浸
右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣食後溫服					
治頭痛		片苓酒浸透晒乾為末茶清調下		治諸般頭痛亦	
治頭痛如破		治血虛頭痛			
頭痛		心法附餘卷之十二		七	
酒炒大黃半兩一半茶煎		○已上諸方辛涼內消風熱之劑			
定風餅子		治風寒客於陽經邪傷膝理背脊強直言語			
寒澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞶筋惕手顫鼻淵					
方見傷風					
如聖餅子		和劑方 治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛			
防風	天麻	南星	乾姜		
兩	各半	洗	半		
川芎	甘草	川烏	半夏		
兩	各一	兩	生半		
右為末用姜汁糊和丸雞頭實大作餅子每五餅細嚼					
茶酒下或荊芥湯下瀉察方加細辛					

三生丸 濟生方		治痰厥頭痛	
半夏	白附子	天南星	各等分
右為末生薑自然汁浸蒸餅為丸如菉豆大每服四丸			
丸食前姜湯米飲任下			
天香散 簡易方	治年久頭風頭痛不得愈者		
天南星	半夏	川烏	白芷
兩	湯洗去	皮去	各等分
右咬咀每服四錢水一盞煎至半盞入姜汁半盞煎八分溫服			
九龍丸 聖惠方	治男女八般頭風一切頭痛		
川芎	石膏	白芷	川烏頭
兩	各半	各半	各半
半夏	南星	加細辛	全蝎
兩	各半	兩	錢半
右為末薑汁為丸如梧桐子大每服五十九茶清送下			
不臥散	治頭痛不可忍者		
玄胡索	青黛	猪牙皂角	肥實者刮去
兩	錢二	皮及子二兩	各半
右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰臥以水化開用竹管送入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病者坐却令咬定銅錢一箇於當門齒上當鼻挺出成盆即愈			
至真丸 濟生方	治腎厥頭痛不可忍其脉舉之則弦按之則堅		

生硫黃 <small>二兩 石膏 不燥者 半夏 湯洗 七次 硝石 別研 兩</small>	右為末研勻用生薑汁煮糊丸如梧子大每服四十丸	食前姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩	芍烏散 治氣厥頭痛因氣所觸心腹脹滿嘔吐酸水頭目昏眩	川芎 天台烏藥 <small>各等分</small>	右為細末每服二錢臘茶清調服	芍米湯 <small>三國方</small> 治着濕頭痛身重眩暈痛極	附子 <small>生去皮 臍半兩</small> 白朮 川芎 桂心 <small>各二錢半</small>	甘草 <small>一錢半</small>	頭痛 <small>心法附餘卷之十二</small> 充	右咬咀每服四錢水一盞姜七片梔子一箇煎食前服	○已上諸方治痰厥腎厥着濕之劑	順氣和中湯 治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈	黃芪 <small>一錢半</small> 人參 <small>一錢</small> 甘草 <small>分七</small> 白朮	陳皮 當歸 芍藥 <small>各五</small> 升麻	柴胡 <small>分三</small> 細辛 蔓荊子 川芎 <small>各二</small>	右作一服水煎食後服 亦治氣血俱虛頭痛	半夏白朮天麻湯 治脾胃証已經服疎風丸下三三三	原證不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不轉開頭	苦痛如裂四肢厥冷不得安臥此氣虛頭痛也
-----------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

黃柏 <small>二錢 酒洗</small> 乾姜 <small>三錢</small> 澤瀉 白茯苓	天麻 黃芪 人參 蒼朮 <small>各五</small>	炒神麴 白朮 <small>各一錢</small> 麥芽 半夏 <small>湯洗</small>	陳皮 <small>錢半</small>	右每服五錢水煎熱服	芍歸湯 治血虛頭痛	川芎 當歸 <small>各等分</small>	右每服五錢水煎服	四神散 <small>大全良方</small> 治婦人血風眩暈頭痛	菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗	頭痛 <small>心法附餘卷之十二</small> 幸	右等分為細末每服二錢葱白二寸茶末二錢水一盞	半煎至八分去滓食後溫服	調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛	內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分 方見脾胃	○已上諸方治氣虛血虛之劑	丹溪心法	○眉眶痛屬風熱與痰 作風痰治類痛風	八方	黃芩 <small>酒洗</small> 白芷 <small>各等分</small>	右為末茶清調二錢
-----------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------	-----------	-----------	--------------------------	----------	-----------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------	-------------	---------------	----------------------	--------------	------	-------------------	----	--------------------------------------------	----------

又方

川烏

草烏二味為君

羌活

黃芩

細辛

甘草等分

右為細末茶清調服 一本加南星

附諸方

選奇方 治眉骨痛不可忍大有効

羌活

防風各二錢

甘草二錢夏月生冬炒

酒黃芩一錢冬月不用有熱者用

右每服三錢水一鍾煎七分食後溫服

上清散 治因風頭痛眉骨眼腫俱痛不可忍者

一方 治頭痛連眼痛 俱見頭痛

# 頭風

六十二

丹溪心法

屬痰者多 有熱有風有血虛 在左屬風薄荷料芥

屬血虛川芎當歸 在右屬痰蒼木半夏屬熱酒芩為

主又屬濕痰川芎南星蒼木 偏頭風在左而屬風者

用荆芥薄荷此二味即是治之主藥有君臣佐使之分

凡主病者為君而多臣次之佐又次之須要察其兼見

何症而佐使之如有痰即以二陳湯治痰而佐之他症

又方

酒片苓一兩

蒼木

羌活

防風各五錢

細辛二錢

蒼耳三錢

右為末每服三錢生薑一大片同搗勻茶湯溫起服之

又方

酒片苓五錢

蒼木二錢

羌活

蒼耳

川芎

生甘草

酒黃連各一兩夏熟錢半

右為末服法同前

瘦人搗藥

頭風

心法附餘卷之三

主

軟石膏

朴硝各五錢

腦子

荆芥

檀香皮

薄荷各一錢

白芷

細辛各二錢

右為末搗鼻內

頭痒風屑髮黃

用大黃酒浸炒為末茶調服

一粒金搗鼻方

治偏頭風

葉本

玄胡索

白芷

川芎

青黛各一兩 搗碎不以多少研細用酒調服

右為末入製單撥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水化開搗鼻以銅錢二三文口咬定出涎



治頭風

烏頭尖七箇

荊芥

防風

甘草

蔓荊子

台芎

桔梗

麻黃各五錢

右為末茶調服

一人頭風鼻塞

南星

蒼朮

酒芩

辛荑

川芎各等分

右為末茶調服

附諸方

川芎散

振粹方

治偏頭痛頭風神効

頭風

心法附餘卷之十二

三

甘菊花

石膏

川芎各三錢

右為末每服一錢茶清調下一方有白薑六錢生用

消風散

和劑方

治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人

頭皮腫痒並皆治之

川芎茶調散

和劑方

治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛頭

風並見傷風

菊花茶調散

治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風鼻塞

菊花

川芎

荊芥穗

羌活

甘草

白芷各二兩

細辛一兩

防風各半

蟬蛻

僵蚕

薄荷各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

芎辛湯

治膈痰風厥頭目昏痰鼻塞聲重肩背拘急

川芎五錢

細辛三錢

甘草錢半

右用水煎食後服

一方治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢為末滴水為丸如梧子大捏作餅子晒乾每用一餅新水化開男左女右仰面以蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出更不再發亦治痰疾妙

一方

頭風

心法附餘卷之十二

三

天麻

防風

川芎等分

右為末每服二錢溫酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即愈

一方治偏頭風

用單撥為末令患者口中含水如左邊痛左鼻吸一字

右邊痛右鼻吸一字甚効

金花一聖散

治頭風

川芎

川烏

白芷各等分

右為末每服二錢生葱三寸薄荷葉三四片同煎食後服

黃連

宜灸頭會百會前頂上星等穴瘥

# 眼目 六十三

丹溪心法

○眼黑睛有翳皆用知母黃柏 眼睛疼知母黃柏瀉腎

火當歸養陰水 眼中風淚出食後吞龍會丸數粒日

三次 冬月眼暴發痛亦當鮮散不宜用涼藥

入方

神効七寶膏 治暴發眼熱壅有翳膜者

麝仁去油心 白礬砂錢二 片腦錢一 硃砂錢一

眼目心法附餘卷之十二 薑

右為細末用蜜調成膏點眼

爛眼

薄荷 荊芥 細辛各等分

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆香

烟上取烟盡之後以小青罐收烟灰之凡眼有風熱致

淚者皆可點此是陽明經有風熱所致

生熱地黃丸 治血虛眼見後

龍會丸 見腦痛

一人病眼至春夏便當作鬱治

黃芩酒浸 南星製 香附童便浸 蒼朮童便浸

槐花酒浸一兩半 山梔炒一兩 龍膽草酒浸 陳皮

連翹 蘿蔔子蒸 青黛各半兩 柴胡三錢

右為末神麴糊丸如梧子大每服五十丸白滾水下

附諸賢論

王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦

寒辛涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥

以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其辛

性甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼

或用乾姜末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪

內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底

眼目心法附餘卷之十一 藥

之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以

阻逆之則鬱火內攻不得散矣故點藥用辛熱而洗眼

用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰

片為劫藥而誤認為寒常用點眼遂致積熱入目而昏

暗瘡翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼

而妄將冷水冷物冷藥挹洗嘗致昏瞎者有之

附諸方

明目派氣飲 和劑方 治肝經不足內生風熱上攻眼目視

物不明常見黑花當風多淚癢澁難開或生障翳婦人

血風時行暴赤一切眼疾並皆治之



右吹咀每服三錢水一鍾煎三沸瀝去滓溫服或洗	十金神麴丸 <small>三因方</small> 明眼目百歲可讀細書常服有效	神麴丸 <small>四</small> 光明硃砂一兩磁石二兩煅	右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九食後茶飲下	黃連丸 <small>本事方</small> 治肝經風熱上攻眼目澀痛不可用藥補者	黃連 決明子各一 沒藥 光明硃砂	甘菊花 防風 羌活 桂心各半	乾熱地黃一兩	右為末煉蜜丸如梧子大每服三十食後熱水下	決明子散 <small>濟生方</small> 治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤澀翳肉或痒或痛羞明多淚	黃芩 甘菊花 木賊 決明子	石膏 赤芍藥 川芎 川羌活各一	甘草 蔓荊子 石決明各一	右為末每服二錢水一鍾姜五片煎至六分食後服	草龍膽散 <small>聖惠方</small> 治風毒熱氣攻衝眼目暴赤癰澀羞明及腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛肉癰痛	龍膽草 洗去 菊花 梗 木賊 洗淨 草決明 炒	甘草 二兩 香附子 炒 川芎 各四兩
----------------------	----------------------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------------------------	------------------	----------------	--------	---------------------	-----------------------------------------------------	---------------	-----------------	--------------	----------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------

右為末每服三錢用麥門冬湯入沙糖少許調服食後或米泔調下亦得	又方 <small>和劑方</small> 治眼目暴赤腫痛風毒熱氣上衝睛疼連眶眼皆赤爛瘀肉侵睛時多熱淚及因忿怒逆損肝氣久勞瞻視風沙塵土入眼澀痛致成內外障翳等疾	龍膽草 各六兩 荊芥 各四兩 菊花 各五錢	赤芍藥 防風 羌活 各一	右用為末溫酒調二錢食後服	散熱飲子 <small>按梓方</small> 治眼暴赤暴腫	防風 羌活 黃芩 黃連	右等分水一鍾半煎八分去滓溫服食後如大便秘加大黃一兩痛甚加當歸地黃各一兩如煩燥不眠加梔子一兩	○已上諸方散風熱之劑	石膏羌活散 <small>宣明方</small> 治久患雙目不親光明遠年近日內外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾	羌活 治風 蜜蒙花 治翳	香白芷 治翳 乾菜子 細辛 二味 起 蘇子 起 拳	川芎 治頭 蒼朮 行氣 甘菊花 治目 荊芥 穗 治目	石膏 黃芩 二味 洗 荊芥 穗 治目
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------	--------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

甘草

右為末每服一錢至二錢食後臨臥用蜜水一盞調服

或茶清亦可日進三服至十日漸明至二十日大驗此

方醫數十餘人矣 後人加當歸枸杞子梔子仁連翹

柴胡薄荷葉防風天麻桔梗各等分

蟬花無比散和刺方 治大人小兒風毒傷肝或為氣攻一

切眼目昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸漸細

小連翹赤爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澁癢痛並治

茯苓 甘草 防風 川芎

羌活 當歸 赤芍藥 蛇蛻

蟬退 去皮蟬蛻 蒼朮 去皮

石決明 用鹽水炙 蒼朮 去皮

右為末每服三錢食後米泔調服茶清亦可忌毒食

翳眼地黃丸和刺方 治男子婦人肝虛熱積上攻眼目翳

膜遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘

並治暴赤熱眼

牛膝 去酒 石斛 去地黃 熟地黃 洗酒

防風 去酒 杏仁 去油研細

枳殼 去白殼炒

右為末煉蜜如膏每服三十丸食前鹽湯溫酒

任下

羊肝丸清生方 治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝生用 黃連去刺

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黃連末杵和丸

如梧子大每服五十丸熟水送下利濟方用白羊子肝

上清丸秘方 治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角 犀角 黃連 厚朴各一

牛黃 黃芩 川芎 羌活

蟬退 白芷 菊花 大黃

防風 草決明 地膚子 滑石各五

生地黄 熟地黃 牽牛半

右為末煉蜜丸如梧子大每服三五十丸食後茶清下

杞苓丸曾氏家傳 專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏

暗遠視不明漸成内障

白茯苓 去皮 真枸杞 酒浸當歸 酒洗 青鹽一兩

兔絲子 浸酒

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十丸食前熱湯下

導赤散曾氏家傳 治心火積熱上攻眼目兩眦浮腫血侵

白睛羞明酒淚一切治之

牛旁子 炒 榆子 槐子 炒 生乾地黃

黃芩 <small>各等分</small>		右為末每服二錢食後麥門冬湯調下	車前散 <small>曾氏家傳</small>	人羞明多淚	密蒙花 <small>去枝</small>	甘草 <small>去枝</small>	粉草	龍膽草 <small>洗各等分</small>	右為末每服二錢食後米湯調下	五味子 <small>九</small> <small>曾氏家傳</small>	眼目昏暗或生翳膜
肝經積熱上攻服目逆順生腎血灌瞳					白蒺藜 <small>炒去刺</small>	車前子 <small>炒各</small>	黃芩		治心肝二經蘊積風邪并腎臟虛耗	心法附餘卷之十二	
黃耆		人參 <small>各一兩</small>	蔓荊子 <small>二錢</small>	甘草 <small>炙八錢</small>	白芍藥 <small>二錢</small>	黃柏 <small>三錢酒浸</small>	右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食後臨臥溫服	助陽和血補氣湯 <small>衛生寶鑑</small>	治眼目發腫熱白睛紅多眼		
蔓荊湯 <small>聖惠方</small>		治勞役飲食不節內障眼疾此方立効									
右為末煉蜜丸如彈子食前姜湯嚥下一丸											
人參		百部	防風 <small>去芦各一兩</small>	遠志 <small>去心</small>	杜仲 <small>去皮姜汁炒</small>	白茯苓	麥門冬 <small>各半兩</small>	五味子	杜仲 <small>去皮姜汁炒</small>	白茯苓	麥門冬 <small>各半兩</small>
貝母 <small>炒</small>		栢子仁	茯神 <small>去木</small>	遠志 <small>去心</small>	杜仲 <small>去皮姜汁炒</small>	白茯苓	麥門冬 <small>各半兩</small>	五味子	杜仲 <small>去皮姜汁炒</small>	白茯苓	麥門冬 <small>各半兩</small>
阿膠 <small>炒粉</small>		熱地黃 <small>各一兩</small>	白茯苓	麥門冬 <small>各半兩</small>	杜仲 <small>去皮姜汁炒</small>	白茯苓	麥門冬 <small>各半兩</small>	五味子	杜仲 <small>去皮姜汁炒</small>	白茯苓	麥門冬 <small>各半兩</small>

淚無疼痛而癰澁難開此服苦寒藥太過而真氣不舒		通九竅故眼昏花不明宜助陽和血補氣	防風 <small>分七</small>	黃耆 <small>二錢</small>	甘草 <small>炙</small>	蔓荊子 <small>一錢</small>	當歸身 <small>半錢</small>	白芷 <small>五分</small>	升麻	柴胡 <small>各五分</small>	右咬咀作一服水一鍾半煎一鍾臨臥通口服忌風寒及食冷物	地黃湯 <small>按秘方</small>	治眼久病昏澁因發而久不愈者	防風	羌活	黃芩	黃連	地黃	當歸	人參	茯苓	石等分為粗末每服五錢水一鍾半煎八分食後臨臥	眼目	心法附餘卷之十二	通口服	四物龍膽湯 <small>按秘方</small>	治目亦暴發作雲翳疼痛不可忍	當歸	川芎	芍藥	地黃 <small>各五錢</small>	羌活 <small>三錢</small>	草龍膽 <small>二錢</small>	防風 <small>三錢</small>	防己 <small>二錢</small>	右咬咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服	○已上諸方散風熱兼補虛之劑	菊睛丸 <small>和劑方</small>	治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚	枸杞子 <small>三兩</small>	茯苓 <small>酒浸炒</small>	甘菊花 <small>四兩</small>	巴戟天 <small>去心</small>	楊氏家藏方加五味子 <small>二兩</small>
-----------------------	--	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------	----	----------	-----	--------------------------	---------------	----	----	----	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

右為末煉蜜丸如葉豆大每服百丸茶清下

點一切惡眼風赤者

龍腦	麝香	硃砂各二錢	沒藥
血竭	乳香	銅青各一錢	鵬砂二錢
右為末滴水和在如梧子大每服一丸新汲水化開點之立効			
撥雲膏	礞甘石	黃丹各一兩	川烏七錢
乳香	沒藥	硃砂	輕粉各一錢
青鹽	血竭	片腦各半錢	麝香
牡蠣各七	當歸半錢	黃連一兩	蜂蜜一
銅綠	鷹條各一錢	五錢	蜂蜜一
眼目 心法附錄卷之十一			
右件脩合各如法研細用白湯蜜十五兩慢火初沸下黃丹二沸下礞甘石三沸下諸藥不粘手為度用磁蓋內熱水泡開熱點不拘時			
捲簾散 楊氏家藏方 治久新痛眼昏澁難開翳膜遮睛或成胬肉或暴發赤腫疼痛並皆治之			
礞甘石	黃連	六錢	地骨水一
已上先將礞甘石末入沙鍋內開口煨令外有霞色為度次將入黃連朴硝水中浸飛過候乾文入黃連半錢水飛過再候乾次入	賦粉一		
白礬	二錢	一錢	黃連末

青鹽	膽礬各七錢	丁香另研	乳香另研
鉛白霜	各一錢	銅綠七錢	硃砂一
右為末同前藥和合令勻每用少許點眼			
○已上諸方點攀睛赤肉之劑			
黃連散	楊氏家藏方	治肝受風熱眼眩赤爛	
乳香	一錢	半	黃連
右吹咀每服二錢水二鍾煎一鍾濾去粗熱洗光明湯	秘方	治一切暴眼	
白礬	一錢	銅綠一錢	杏仁
乾姜	三分	俱	甘草各一
眼目 心法附錄卷之十二			
右件用生絹袋盛貯頓放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋定待冷臨臥洗之			
洗眼湯	治暴赤眼		
當歸尾	黃連各一錢	赤芍藥	防風各半
杏仁	四箇	去	
右用水半鍾將小孩乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時			
消毒散	御藥院方	治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消	
大黃	生五錢	黃芩	黃柏各一
右為末每用生蜜水調藥如糊攤在緋絹花子上隨目赤左右貼於太陽穴如乾用溫水頻潤			



五黃膏 衛藥院方治目赤

黃栢兩一 黃連 黃芩 黃丹

大黃各半

右為細末每一錢蜜水調成膏攤排絹上隨左右眼赤

貼於太陽穴

赤眼方秘方

雞爪黃連三錢 銅綠半錢 大艾葉

右將黃連銅綠研末用淨水調膏攤於磁器蓋內却將

艾揉軟為丸燒艾炮黑蓋內藥乾用沸湯泡澄清以銀

簪蘸藥點之

眼目心法附錄卷之十二 治一切目疾不問得病之因悉治之

爐甘石散海上方 治一切目疾不問得病之因悉治之

爐甘石真者半斤黃連四兩對如豆大於銀石器中

片腦二錢半

右二味同研勻每用半字白湯泡時時洗之點亦可

又方海上方

爐甘石半兩 硃砂各一 鵬砂各一

白礬錢各半 麝香少許

石為極細末用沸湯泡點洗俱可

乳香散 治眼赤腫疼痛不可忍

鬱金二錢 盆硝 黃連各一 雄黃

乳香 沒藥 片腦各半

右為末鼻內搐少許點亦可

復明膏秘方 點遠年近日雜患眼目昏花

黃連一斤洗淨 當歸半斤洗淨

柯子三兩洗淨 黃栢三兩去粗皮

右四味用臘水一大桶磁器內浸十五日用銅鍋內熬

至數十沸濾去滓爐甘石半斤桑柴火煨七次用煎藥

四味汁煎七次如雞子黃色為用研極細末水飛過雞

梨二十五箇搗爛用生絹袋濾去滓黃丹半斤水飛過

去為用蜜二斤半水二升半葱一把熬水盡去滓猪膜

子十五箇擇淨脂油用擇草袴一大把同搗爛泥生絹

袋濾去滓再過一次同煎藥汁下入銅鍋內煎熬欲成

稀膏下後六味

青鹽 盆硝各一 銅綠研極細末 鵬砂

熊膽 硃砂各五

右為極細末入鍋再熬一時欲成稠膏子下後四味

麝香三錢水 龍腦 輕粉 粉霜各二錢

再熬從緊至慢漸漸微火熬成膏出鍋入磁器內盛放

土中埋一箇月去火毒可用已後若乾時却用乳汁化

開點每日可點三五十筋若腫時歇一二日再點以効

為度二月九月修合為妙

珊瑚膏

秘方

治遠年近日不親光明一切雜患病眼五輪

不損者並皆治之新患眼翳日見効每用阜角子大一

塊冷水半鍾雞子殼少許於小盞內浸化研開點眼或

洗眼亦得臨臥點用奇効不可具陳除內障氣眼不治

紫金膏

秘方

同珊瑚膏治證每遇病眼用藥如菴豆許點

眼大角內點五七遍看病大小用此膏與珊瑚膏

膏

龍膽膏

秘方

治暴赤眼腫痛癢難開怕日羞明迎風淚

出視物昏花每用豆許點眼大角內少時連點數次

眼目

心法附錄卷之十二

聖

有功效今具藥品于后

玄精石

一斤

桂府滑石

一斤

俱

黃連

秦皮

細切

龍膽草

苦練根

五味子

各用

十兩

當歸

赤芍藥

大梔子

桂仁

各用

十兩

杏仁

各五

槐枝

二斤

柳枝

二斤

切

玄精石至五味子七味用大鍋盛水二大桶煎至一半

去滓將細生絹濾過磁器盛放又當歸至柳枝亦七味

亦用水二桶煎至一半去滓再將細生絹濾過亦用磁

器盛放白沙蜜五斤先用少油搽鍋內慢火煉蜜紫色

為度將前二欠煎成藥水同煎數沸再用生絹濾過再

熬至一半八銅鍋內下鵬砂五兩猪膽大者五箇慢火

煎用鐵鏟不住手攪熱成稀膏除二斤於磁器內盛放

一宿將上等片腦六錢研細入藥內攪勻用油紙封固

一宿名為片腦膏下爐甘石六兩黃丹六兩用水飛

過硃砂九錢攪鹽九錢盆硝九錢銅綠九錢輕粉三錢

粉霜二錢俱研細用水一碗用細生絹濾過盡入煎熟

成二斤藥內將鐵鏟不住手攪慢火再熬成稀膏又除

二斤半用磁器內盛放經一宿再用上等片腦一錢磨

香二錢研細入藥內攪勻將油紙封固一宿名為紫金

膏又以珊瑚半兩為粗末用水一大碗煎數沸去滓

眼目

心法附錄卷之十二

聖

不用入煎熬成稀膏半斤於內又下爐甘石二兩黃丹

二兩用水飛過將鐵鏟不住手攪煎成稠膏再下上等

片腦一錢研細入藥內攪勻於磁器內盛放名為珊瑚

膏

脩煉爐甘石黃丹之法

爐甘石不拘多少砂器盛頓木炭火煉通赤用黃連水

蘸七次水飛淘澄為泥用之

黃丹不拘多少以砂鈔炒候紫色用水飛過淘澄為塵

用之

光明撥雲錠子

治遠年近日一切眼疾

<p>右研極細以後黃連膏子和劑掇成錠子淨水磨化點</p>		<p>珍珠一錢</p>	<p>血竭三錢</p>	<p>乳香</p>	<p>沒藥各一錢</p>	<p>麝香二分</p>	<p>海螵蛸二錢</p>	<p>片腦一錢</p>	<p>礞砂一兩</p>	<p>礞砂石一斤<small>煨過用黃連半斤水二碗煎</small></p>
<p>劑藥黃連膏子</p>		<p>黃連半斤</p>	<p>龍膽草</p>	<p>當歸</p>	<p>芍藥</p>	<p>川芎</p>	<p>木賊</p>	<p>菊花各等分</p>	<p>紅花</p>	<p>羌活</p>
<p>生地黄</p>		<p>白芷</p>	<p>防風</p>	<p>黃芩</p>	<p>黃柏</p>	<p>龍膽草</p>	<p>當歸</p>	<p>芍藥</p>	<p>川芎</p>	<p>木賊</p>
<p>薄荷葉</p>		<p>羌活</p>	<p>紅花</p>	<p>菊花各等分</p>	<p>右用水七八碗浸藥三日煎成膏子和劑前藥成錠子</p>	<p>開光錠子</p>	<p>煨黃連水半</p>	<p>礞砂五錢</p>	<p>珍珠</p>	<p>片腦各三錢</p>
<p>牛黃</p>		<p>雄黃各一錢</p>	<p>右為細末熬黃連膏為錠子磨點</p>	<p>春雪膏</p>	<p>於春天雪冷凍之時取明淨朴硝三四斤為末或不拘</p>	<p>多少用黃連防風赤芍藥當歸尾各五錢牙皂三箇各</p>	<p>剉片與硝拌和入雪與硝一般多同拌勻為水過一宿</p>	<p>瀝去黃連等藥却將硝雪水用瓦盆或銅盆盛之於露</p>	<p>天淨處受霜露之氣其盆弦上自然結成砂却用烏盆</p>	<p>天淨處受霜露之氣其盆弦上自然結成砂却用烏盆</p>

一箇以紙劬墊盆底內用厚皮紙盛砂於盆內紙劬上使砂中水氣盡滲於紙內候砂乾莖以磁器收貯封固如用每硝砂一錢加礞砂半錢片腦三分研細點眼

○已上諸方點洗之劑

○廣按眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎經真水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也苟實焉則散其風熱苟虛焉則滋其真陰苟虛實相仍則散風熱滋真陰兼之夫何眼疾之不瘳哉此內治之法也至於久而失調熱壅血凝而為瞖睛察肉翳膜赤爛之類不假點洗外治之法則何由而全愈乎蓋病情有標本治法有內外故也又嘗論之氣有餘便是火而散火在於破氣血不足則陰虛而滋陰在於補血也常使血能配氣水能制火則眼疾胡為而作也歟

### 耳聾

六十四

丹溪心法

○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱通聖散滾痰丸之類 大病後耳聾須用四物湯降火虛火動耳聾者亦用四物湯因鬱而聾者通聖散內

大酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒 耳鳴

通者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星枯梗皮荊芥不愈用四物湯炒 耳鳴必用龍會丸食

後服 氣實入檳榔丸或神芎丸下之 聾病必用龍會丸四物湯養陰 濕痰者神芎丸檳榔丸 耳濕腫

痛涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荊芥羌活服腦多射少濕加枯礬吹耳內開關然亦是陰虛

戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

草麻子四十棗肉十

耳聾心法附餘卷之十二

右入人乳汁搗成膏石上晷曬乾便丸如指大綿裹塞

於耳中

又方

鼠膽汁滴入耳中尤妙

又方

將龜放在漆棹上尿出用綿漬之掬入青葱管中滴入

耳中

附諸賢論

王節齋曰耳鳴證或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不効殊不知此是痰火上升鬱於耳中而

甚則癰閉矣遇此疾但審其平昔飲酒厚味上

焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多因先有痰火在上又感腦怒而得怒則氣上少陽之火客於耳

也若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升故也其鳴不甚其人必多慾當見勞怯之證

附諸方

犀角飲子清生方治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水

流出

犀角銹

葛蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆炒

甘菊花去枝梗

耳聾心法附餘卷之十二

甘草炙半

右吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分溫服

清神散 治風氣壅上頭目不清耳常重聽

礬石煅去

乾菊花各一兩

荊芥穗

羌活

木通

川芎

防風錢各五

木香錢

石菖蒲

甘草各三錢

右為末每服三錢食後臨臥茶清調下

復聰湯姚方伯傳治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏製

陳皮去

白茯苓去

甘草炙

篇蓄

木通

瞿麥

黃精去粗皮切

右用水二茶鍾生姜三片煎至一茶鍾空心臨臥各一

服

涼膈散 治風熱上攻耳聾見濕熱

通聖散 治風熱上攻耳聾見斑疹

瘰癧丸 治熱痰濕痰耳聾見痰類

神芎散 治濕熱濕痰耳聾見痰類

檳榔丸 治濕熱濕痰耳聾見痰類

龍會丸 治肝火上升耳聾見腦痛

和劑流氣飲 治氣閉耳聾見氣滯

耳聾心法附錄卷之十二

內加菖蒲生薑葱白同煎凡治聾清開鬱行氣

六味地黃丸 治陰虛火動耳聾見補損

內加知母黃柏菖蒲遠志

地黃丸 治勞損耳聾

熟地黃 當歸 川芎 辣桂

兔絲子 川椒炒 故紙炒 白蒺藜炒

胡蘆巴炒 杜仲炒 白芷 石菖蒲各二錢半

磁石火燒醋淬七次研

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九粒白溫酒下

磁石羊腎丸 治諸般耳聾補虛開鬱行氣散風去濕

磁石三兩火煨醋淬七次用葱子一合水通三兩厚

川芎 白木 川椒去目 肉棗去核

防風 茯苓 北細辛 山藥

遠志去心 大川烏炮 木香 當歸

鹿茸酒浸一宿 兔絲子酒浸 黃芪各一兩 肉桂六錢

熟地黃兩 石菖蒲一兩

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛研細好酒糊丸

如梧子大每服五十九粒空心溫酒下鹽湯亦可

○廣按丹溪云耳聾皆屬於熱而巳上二方又用辛熱之

藥不無使人疑議殊不知耳聾多屬痰火鬱結非磁石

之鎮墜川烏之流通與夫川椒細辛肉桂菖蒲之辛散

則老痰鬱火何由而開耳聾何由而愈哉雖然耳聾由

此而愈亦為劫劑後當以通聖散和之可也

○巳上諸方內治之劑

一方 治耳聾久不聞者

緊磁石一塊如豆大 川山甲燒存性為末一字

右用新綿子裹塞於患耳內口中含茶生鐵覺耳內如

風聲即愈

一方 用其遂末吹入左耳耳草末吹入右耳立効

一方 治耳痛及聾

用巴豆十四粒研爛以鵝脂半兩鎔化和巴豆末為丸如小豆大以綿裹塞耳中

耳鳴方

草烏燒

石菖蒲

右等分為末用綿裹塞耳中一日三度

耳鳴暴聾方

川椒

石菖蒲

松脂各二錢半

山豆肉錢半

右為末鎔蠟丸如棗核大塞入耳

貯耳方 治風熱搏之津液結輒成核塞耳

生肉脂

地龍

釜下墨各等分

耳聾

心法附餘卷之十二

耳聾

耳聾

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿裹入耳令潤即挑出

出

紅綿散 治貯耳有膿及黃水

海鱧鮓

枯礬各一錢

麝香一字

乾胭脂分五

右為末用管吹入耳中

一方

用五倍子焙乾一兩全蝎三錢燒存性為細末吹入耳

中

一方

用枯白礬一錢胭脂一字麝香少許研細以綿校子先

輾去耳中膿水即用別纏校子送藥入耳中 一方

龍骨亦佳 一方 治耳內膿出或黃汁

石膏新瓦上煨

明礬枯

黃丹炒

真蛤粉

龍骨各等分

麝香少許

右為末綿纏竹箇杖耳換綿蘸藥入耳

一方 治耳作膿者

用耳遂一塊如棗核大以綿裹塞耳中以甘草口中徐徐嚙下

徐嚙下

耳爛 用貝母研末乾摻

耳聾

心法附餘卷之十二

耳聾

治百虫入耳

一方用香油灌入耳即出

一方用鷄冠血滴入耳即出

一方驢牛乳最良灌入耳即出

治一切虫物入耳

用竹管入耳門以口氣盡力吸出最妙

一方 治凍耳

用橄欖核燒灰清油調敷雀腦亦可

○已上諸方外治之法

○廣按丹溪云耳聾皆屬於熱誠哉斯言然有左耳聾

者有右耳聾者有左右耳俱聾者不可不分經而治也夫左耳聾者少陽火也龍會九主之右耳聾者太陽之火也六味地黃丸主之左右耳俱聾者陽明之火也通聖散滾痰丸主之何以言之有所忿怒過度則動少陽膽火從左起故使左耳聾也有所色慾過度則動太陽膀胱相火從右起故使右耳聾也有所醇酒厚味過度則動陽明胃火從中起故使左右耳俱聾也蓋左耳聾者婦人多有之以其多忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右耳俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而論之忿怒致耳聾者為多丹溪云厥陰少陽火多當用開痰散風熱其此之謂乎

## 鼻病 六十五

丹溪心法

○酒瘡鼻是血熱入肺 治法用四物湯加陳皮又云紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服格致論中於上藥有茯苓生薑氣弱者加黃芪

又方

用桐油入黃連末以天吊藤燒灰熱傳之一云用桐

油入天吊藤燒油熱調黃連末拌傳之

又方

用山梔末蜜臘丸彈子大空心嚼一九白湯下

治鼻中瘻肉 胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶簪錢二 細辛錢一 白芷錢半

右為末內鼻中

治鼻淵

南星 半夏 蒼朮 白芷

神麝 酒苓 辛夷 荊芥各等分

右末水調食後服

鼻病 心法附餘卷之十二

附諸賢論

王節齋曰鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或暑感風寒便塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用鮮味通利辛溫之藥不効殊不知此是肺經素有邪火鬱甚則鼻得熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發也治法清肺降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥喻化或末藥輕調緩服久服無不効矣此予所親見而治驗者其平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而致室塞聲重或流清涕者自作風寒治

附諸方		葛蒲散	藥院方	治鼻內室塞不通不得喘息			
葛蒲		阜角	等分				
右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時							
增損防風通聖散		治鼻塞不利肺氣不清					
鼠粘子	桔梗	桑白皮	紫苑				
荊芥穗	甘草	生一兩					
右咬咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後溫服							
羌活散	治腦有鬱熱遇寒鼻塞		見傷風				
仙術芍散	治腦有鬱熱遇寒鼻塞		見風熱				
鼻病	心法附餘卷之十二		重				
川芎石膏湯	治腦有鬱熱遇寒鼻塞		見中風				
○已上數方治鼻塞之劑							
倉耳散	三四方	治鼻流濁涕不止名曰鼻淵					
辛夷仁	兩半	蒼耳子	炒二錢半	香白芷	兩一	薄荷葉	半錢
右為末每服二錢葱茶清食後調下							
辛夷散	治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已						
或氣息不通或不聞香臭							
川芎	木通	節去	防風	片去	甘草		
辛夷仁	細辛	洗去土	藁本	升麻			
香白芷	各等分						

右為末每服三錢茶清調下			
防風湯	治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必動血		
防風 <small>二兩</small>	黃芩	人參	甘草 <small>炙</small>
川芎	麥門冬 <small>去心各一兩</small>		
右為末每服二錢沸湯調食後服			
○已上數方治鼻淵之劑			
鉛紅散	治風熱上攻面鼻生熱赤刺癢疹俗呼肺風		
舶艸硫黃	白礬 <small>枯各半兩</small>		
右為末黃丹少許染與病人面色同每上半錢津調夜塗之臨臥再塗兼服升麻湯下瀉青丸以除病根也			
鼻病	心法附餘卷之十二	重	
局方升麻湯			
熟半夏	茯苓	白芷	當歸 <small>各二錢</small>
蒼朮	乾葛	桔梗	升麻 <small>各一兩</small>
熟枳殼	乾姜 <small>各半錢</small>	大黃 <small>蒸半兩</small>	芍藥 <small>七錢半</small>
陳皮	甘草 <small>各一兩半</small>		
右咬咀每服五錢生薑燈心水煎食前服			
瀉青丸	見中風		
白龍丸	治酒瘡鼻并滿面紫赤酒刺		
川芎	藁本	細辛	白芷
甘草 <small>等分</small>			



右為末每四兩入煨石膏末一斤水九逐日用此丸末洗面如濕豆法更卷少時方用湯洗去

又方

用黃柏苦參檳榔等分為末傳以猪脂調尤妙

又方

用青黛槐花杏仁研傳之

又方

用杏仁研乳汁傳之

○已上數方治酒瘡鼻之劑

白黃散

關易方治鼻膿瘻肉鼻痔等症

鼻痔

心法附餘卷之十二

鼻痔

雄黃

白礬

細辛

瓜子

右為末搗入鼻中

辛荑膏

即藥院方

治鼻生瘻肉室塞不通有時疼痛

辛荑華

兩

細辛

木香

木通

白芷

杏仁

湯泡去皮尖研各五錢用

右用羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤

黃色放冷入龍腦麝香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉

脫即愈

鬱金散

治鼻中生瘻肉

用鬱金猪牙皂角各一兩二味水浸一宿火煮透鬱金

為末去皂角不用以鬱金焙乾再用北細辛半兩麝香細研各一錢同為末煉蜜丸如茶子大每服一九食後細嚼茶湯嚥下

輕黃散 治鼻中瘻肉

雄黃

兩半

麝香

少許

杏仁

湯泡去皮尖雙仁者各一錢

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁盒蓋定

每有患者不問深淺夜臥用筋頭點糝米大紐鼻中隔

夜一次半月効

又方

鼻痔

心法附餘卷之十一

鼻痔

用狗骨燒灰加硃砂少許每用搗鼻中瘻肉自化

又方

以胡荽搗爛塞鼻中一夕自然落出

又方

用白礬燒為末面脂和綿裹塞鼻中數日瘻肉隨藥落

又方

用雄黃一塊如棗塞鼻中過十餘日瘻肉自落

○已上數方治瘻肉之劑

口舌

六十六

丹溪心法

○口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛且不能食相火衝上無制用理中湯人參白朮甘草補土之虛乾姜散火之標甚則加附子或禽官桂亦妙 一方生白礬為末傳之極効或禽良久以水漱之再禽 一方治口瘡甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月無此用西瓜皮燒灰傳之 又方黃連好酒煮呷下立愈 又方遠志醋研鵝毛掃患處出涎入方

細辛

黃栢分

一云黃連

右為末貼之或擦舌上吐涎水如再傳須旋合之若合下既久無効

治滿口白爛

草撥為末

厚黃栢一兩

右用栢火炙為末醋煎數沸後調上藥漱涎再用白濁漱口則愈

附諸方

立効散

端効方治唇緊瘡疼痛

訶子肉

五倍子

右為末乾貼唇上立効分等

赴庭散

端効方治赤白口瘡

黃栢

青黛

蜜陀僧等

右為末乾貼瘡

換柳散應驗方治口瘡疼痛大有神効

五倍子錢三

寒水石半兩

蒲黃

黃丹二錢

右為末每服少許乾貼瘡上

龍石散和劑方治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽噎腫

寒疼痛妨悶每用少許搽貼患處嚙津小兒瘡疹毒氣

攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥搽貼立効

硃砂一錢半

寒水石錢二分半

生腦子二錢

右為末每日三五次用夜臥搽貼妙

中香

心法附餘卷之十一

辛大

三百十五友

清金散端効方治大人小兒白口瘡急惡狀似木耳

五倍子去土

青黛錢四

右為末好油調貼瘡上咽喉中瘡爛用竹管吹入喉中

有津吐出

無金散三因方治熱毒生瘡於舌

細辛

黃連各等

右為末先以布帛蘸水揩淨患處搽藥於上涎出即愈

赴庭散

應驗方治口瘡疼痛

五味子一兩

滑石半兩

黃栢蜜炒

右為末每服半錢乾搽瘡上良久便可飲食

治口瘡 張子和方

白礬

二兩枯黃丹一兩微紅放下

右為末摻於瘡上即愈

一方 治蠱唇

用黃栢一兩去粗皮以五倍子二錢蜜陀僧甘草各少許三味為末水調敷在黃栢上灸三五次藥末盡為度後將黃栢切作片子臨時貼於患處天明則愈

一方 治爛疔瘡

用橄欖燒灰存性為末先用米泔水洗淨後摻上藥

一方 治舌腫

口舌

心法附錄卷之十二

五九

二便法

用百草霜為末以好醋調敷立効

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索一兩

黃蓮

黃栢各半

蜜陀僧三錢

青黛二錢

右為末傳貼口內有津即吐

○已上諸方治標之劑

升麻散 濟生方

治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

甘草九錢

升麻

赤芍藥

人參

桔梗

乾葛各一兩

右以咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分溫服

為黃飲子 濟生方 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼炒去白

黃芩

防風去

半夏洗湯

石斛各一兩

甘草炙半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑參

天門冬

麥門冬去心各炒一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚥化嚥津

增損如聖散 治上焦熱壅口舌生瘡

桔梗二兩

甘草多一兩半

防風半兩

枳殼製二兩

黃芩二兩

口舌

心法附錄卷之十二

李

二便法

右為末每服三錢水煎食後服

○已上諸方治本之劑

○廣按口舌証中治標之劑毛靜而治本之劑稍畧宜於火類風熱之中選而用之

牙齒 六十七

丹溪心法

○牙痛梧桐淚為末少加麝香擦之 牙大痛必用胡椒末搗能散其中浮熱間以升麻寒水石佐以辛涼藥薄荷細辛之類 又方用清涼藥便使痛不聞

治華撥川芎薄荷荊芥細辛樟腦青鹽

治牙痛甚者

防風

羌活

青鹽合同

細辛

草撥

川椒谷減半

右為末擦噤

又方

南星為末霜梅五箇取其引涎以荊芥薄荷散風熱青鹽入腎入骨擦噤

又方

蒲公英燒灰

香附米

白芷

青鹽各等

牙齒

心法附餘卷之十一

空

夏千餘

右為末擦噤

治陰虛牙出鮮血氣鬱

用四物湯加牛膝香附生甘草側柏

蛀牙

蘆薈白膠香塞蛀孔中

陽明熱而牙痛

大黃香附各燒灰存性為末入青鹽少許不時擦牙

上

固齒

用羊脰骨燒存性二錢當歸白芷猪牙皂角青鹽各

一錢為末擦牙上

刷牙藥

燒白羊骨灰一兩升麻一兩黃連半錢擦用

附諸賢論

王節齋曰牙床腫痛齒動搖或黑爛脫落世人皆作腎

虛治殊不知此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床

上下床屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美

酒厚味膏粱甘滑之物以致濕熱上攻則牙床不清而

為腫為痛或出血或生蟲由是齒不得安而動搖黑爛

脫落也治宜瀉陽明之濕熱則牙床清寧而齒自然安

牙齒

心法附餘卷之十二

空

固矣

附諸方

血竭散應驗方牢牙定痛治齒根注復連膈骨疼痛久而

不愈者

血竭

石膽

乳香

五靈脂

蜜陀僧各等分

右研令勻每用一字以指蘸貼牙病處候少時荊芥湯

漱

立効散

御藥院方

治牙疼不可忍

百草霜細研

滄鹽研各錢

麝香研

乳香研細各錢

右件一處再研勻每用少許口噙溫水隨牙疼一邊裏  
內搗之用無時尤妙

一方

用蒼耳草細辛芫花小麥川椒各等分剉碎水煎時時  
噙漱吐去藥不可嚥下 又細辛芫花二味擦漱尤妙

青龍散

御藥院方

治陽明經風熱齒斷腫痛

香白芷

川芎

盆硝

細辛 各半兩

青黛

錢三

薄荷葉

錢二

右為末以指蘸藥擦牙腫處吐津誤嚥不妨

宣牙膏

御藥院方

治齒牙動搖不牢疼痛不止斷肉出血

麝香

字一

龍骨

定粉

別研各二錢半

右二味為細末後入麝香勻用黃臘一兩磁蓋內熔開

入藥於內攪勻放冷取出熨斗燒鋪紙內藥攤之勻薄

每用剪作紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼一宿至

次日早晨取出藥每夜用之此半月消牙齒腫忽生斷

肉治疳蝕去風邪牢牙齒大有神効

梧桐淚散

御藥院方

治牙齒斷腫悶宣露血出

梧桐淚

川芎

細辛

白芷 各半錢

生地黃

錢一

青鹽

分二

寒水石

燒熟二錢

右件同為細末每用塗貼患處吐涎候嚥不妨無時日

五七次

露蜂房散

御藥院方

治牙齒疼痛經驗神効

露蜂房

炒

細辛

各二錢半

大戟

七錢

防風

分一錢二

右咬咀每服五錢水一鍾煎七分去滓熱漱冷吐無時

消毒散

御藥院方

治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚蚕蛾

五倍子

蜜陀僧

各一錢

右為細末每用少許乾傳瘡上有津吐也

開關散

應驗方

治牙關緊急不開因風熱攻注牙齒

川芎

薄荷

盆硝

白芷

全蝎

各一錢

礞石

天麻

各半錢

細辛

錢一

右為末每用少許以指蘸藥滿口擦牙斷上嚥半時用

溫水漱吐

太和散

御藥院方

治牙齒動搖斷肉浮腫虫鍾發痛

梧桐淚

白茯苓

生地黃

各半錢

川芎

香白芷

升麻

各三錢

華陰細辛

分一錢

青鹽

分一

麝香

分半

牙皂

燒存性二分

右為末青鹽麝香另研拌勻每用藥少許指蘸藥擦牙

病處常用去疳牢牙定疼止痛

消風定痛散

應驗方

治牙齒疼痛風熱攻注斷肉腫悶

荊芥

錢四

白芷

防風

細辛

金錫		升麻	川芎各二	膽礬三
朴硝		青黛各八		
右為末每用一指蘸藥擦於牙上噙半時有津吐出				
赴庭散		治風牙疳牙攻痺疼痛不可忍		
良姜		草烏皮	細辛去土	荊芥去梗各
右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良				
久用鹽湯灌漱其痛即止用腐炭末一半根常使擦牙				
細辛散		治風牙疳或牙齦宣爛腮頰浮腫皆治		
荊芥		縮砂半	細辛二	川椒去目
白芷		鶴虱	牙皂	萆撥各半
草烏				
右為末每用少許於痛處頻頻擦之有涎吐出仍用鹽				
湯漱				
丁香散		治牙齒疼痛		
丁香		萆撥	蝎稍	大椒各等分
擦法同前				
定痛散		治牙風疼痛立効		
細辛		草烏	全蝎	乳香
右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽湯灌				
漱即止				

雄黃定痛膏		楊氏家藏方	治牙齒疼痛
盆硝		雄黃	細辛
牙皂		大蒜	
右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧子每用一丸將綿			
子裹藥左邊牙痛放在左耳右邊牙疼放在右耳內裏			
久痛止取出藥丸可治數人亦皆治之			
一方		治一切牙痛	
川升麻		當歸	川鬱金
萆撥		白芷	荊芥
右為末用瓦合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許			
揩在牙痛處以溫荊芥湯灌漱立効			
一方		治牙疼	
鶴虱		細辛	白芷
右為末拭牙上或煎湯噙漱立効			
一方		治風牙疼	
防風		麻黃	生地黃
蜂窩		花椒	浮麥
右為粗末入葱白三根同水煎熱漱不可嚥下			
一方		治牙疼不可忍	
用蠟為末以巴豆一粒研成膏飯丸如蛀孔大綿裹			

安松蛀孔內立効

單檢散 治風腫牙痛

單檢散 治風腫牙痛 良姜各一 草烏去皮尖

右為末以指蘸藥擦於患處

一方 取疼牙落不犯手

草烏 單檢散 川椒 細辛各一

右為末每用少許擦於患牙處其牙自落

○已上諸方外散治標之劑

攝活散 御藥院方清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒

攻注牙齒斷肉虛浮宣露腿下動搖發痛又治偏頭痛

漸漸攻注眼目或發疼痛視物不明其藥攻効不可具

述

川芎 獨活 羌活 防風各一錢

細辛分七 薄荷 生地黃 荊芥各一錢

右為粗末作一服水二鍾煎一鍾去滓溫服食後日進

三兩服愈

上清防風散 御藥院方治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯

牙齒悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭目昏眩並皆治之

防風 細辛去苗 薄荷葉各二錢 川芎一錢

獨活去苗 荊芥穗 天麻 甘草炙

白楓 白芷各一錢 片腦一分

右同為細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清調勻

稍熱漱冷吐不拘時如覺頭昏目痛牙齒腫悶用熱茶

清調三錢食後服

甘露飲子 御藥院方治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫

悶宣露心中多煩飢不欲食嗜臥及咽喉中有瘡並皆

治之

黃芩 天門冬 枇杷葉 甘草

枳殼 麥門冬 生乾地黃 山茵陳

石斛 熟地黃各等

右為粗末每服五錢水一大鍾煎至七分去滓溫服食

後若齒斷宣露腫悶前藥熱漱之極驗

敗毒散 御藥院方治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

細辛分五 薄荷葉一錢 地骨皮五錢 荊芥穗三錢

右為粗末每服七錢水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐

煎服尤妙

地骨皮散 應驗方治牙齒虛熱氣毒攻衝斷肉腫痛口舌

生瘡此藥如神

柴胡錢四 地骨皮三錢 薄荷二錢

右咬咀作一服水一鍾半煎至一鍾去滓熱漱冷吐煎

<p>牙齦散 御藥院方 治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風寒</p>		<p>防風 苗去 當歸 升麻 各二 葉本 去苗</p>	<p>甘草 炙 白芷 細辛 芎藭 各一</p>	<p>木香 分半</p>	<p>右件搗羅為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水二</p>	<p>鍾藥五錢煎至七沸去滓熱漱冷吐秋冬牙痛用此煎</p>	<p>脈解散最妙</p>	<p>地黃散 御藥院方 治風熱攻注陽明牙痛斷腫或血出宣</p>	<p>露</p>	<p>牙齒 心法附餘卷之二 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百</p>	<p>生地黃 一錢 防風 細辛 薄荷葉</p>	<p>地骨皮 葉本 各一 茵草葉 荊芥穗</p>	<p>當歸 各半</p>	<p>右同為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓微熱漱</p>	<p>口冷吐之前服尤妙</p>	<p>玉池散 御藥院方 治牙痛或動搖不牢</p>	<p>地骨皮 白芷 升麻 防風</p>	<p>細辛 川芎 槐花 當歸 去芦</p>	<p>葉本 去 甘草 生俱各</p>	<p>右為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓溫熱漱口</p>
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------	--------------	------------------------------	------------------------------	--------------	---------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------

<p>冷則吐之前服尤妙 張龍圖去地骨皮加獨活治牙</p>		<p>流膿血變骨脂風者及骨已出者俱効</p>	<p>○已上諸方內消治本之劑宜於火類風</p>	<p>血竭散 應驗方 治牙疳并惡瘡不差如神</p>	<p>龍骨 兩一 蒲黃 兩二 血竭 錢五 枯白礬 兩一</p>	<p>寒水石 兩二 細研</p>	<p>右為末每用少許貼在瘡口上紙封貼</p>	<p>續連散 應驗方 治牙齒疳口生瘡立効</p>	<p>寒水石 兩二 細研 蒲黃 錢五 黃丹 錢五</p>	<p>右為末每用少許乾貼瘡上噙多時吐出</p>	<p>牙齒 心法附餘卷之二 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百</p>	<p>一方 治走馬牙疳</p>	<p>黃柏 藜蘆 石膏 銅青</p>	<p>膽礬 麝香 許少 龍骨 病急多用 病輕少用</p>	<p>右以火焙存性為末每用五分擦於患處</p>	<p>一方 治牙疳</p>	<p>青黛 錢三 銅綠 晉礬 黃柏</p>	<p>藜蘆 枯白礬 人言 用紅藥十枚去核各 分八內以火燭作灰用</p>	<p>芒硝 錢二 麝香 錢半 輕粉 錢四 黃連 錢二</p>	<p>右為末後入輕粉麝香研勻少許擦患處</p>	<p>一方</p>
------------------------------	--	------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------



五倍子

一兩 焦銅青

明礬

各一 麝香

右研末先以鹽醋湯洗患處拭乾摻藥於上

○已上諸方治疳之劑

固齒茯苓散 應驗方 牢牙齒固密不生疳疾

龍骨

寒水石

升麻

香白芷

茯苓

細辛

青鹽

石膏

麝香

石燕

大者半對火燒醋淬七次

右為末每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

白牙藥

御藥院方 治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香

白芷

青鹽

升麻

牙痛

心法附錄卷之十二

升麻各二錢半

石膏

細辛

麝香

砂鍋

右除砂鍋膏香三味外五味同為細末加上前三味共

八味調勻再研每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱

口吐出

立蘇黎散

御藥院方

治牙齒疼痛斷腫搖動常用擦漱固

齒

土蘇黎

去角生用 不以多少

右為粗末每服五錢淡漿水半碗煎至七八沸去滓入

鹽末一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋

單方之藥取效急速無神仙秘旨云若人脈差黎一年

已後冬不寒夏不熱服之二年老若復少髮白復黑齒

落重生服之二年輕身長生今雖不作湯散服餌久而

漱之其驗亦同

沉香白牙散

御藥院方

楷齒瑩淨令白及治口臭

沉香

麝香

細辛

升麻

藁本

藿香葉

甘松

白芷

石膏

寒水石

右為末每日早晚揩牙

齒藥方

三國方

西嶽蓮花峯神傳

諸牙卑角及生髮

西國升麻熟地黃

木律旱蓮槐角子

細辛荷帶要相當

青鹽等分同燒毀

研細將來使最良

楷齒牢牙髭髮黑

誰知世上有仙方

右用新瓦罐盛藥合口以麻縛定鹽泥固濟日乾穿一

地穴先放新磚後放藥以錐口向下用炭火燒令青煙

出稍存性去火經宿取為末每用擦牙溫水漱去一方

皁蓮作黃連

一方 固齒烏髭髮

母丁香

沉香

石燕

一雙火煨

龍骨

海馬

茴香

生地黄

麝香二錢

青鹽兩半

右為末每用一撮空心擦牙縫噙片時溫水漱去

是活散應驗方

漱牙藥去風止痛

薄荷

是活錢一

大黃錢一

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐之嚙亦無妨

○已上諸方固齒之劑

○廣按牙痛之証其人傷胃素有濕熱上出於牙齦之間適被風寒或冷飲所鬱則濕熱不得外達故作痛也其病情有標本之分所用藥有溫涼之異何則牙痛之証寒是標故外擦漱之藥宜辛溫以散寒開鬱牙齒

牙齒

心法附餘卷之十三

主

齒牙痛

熱是本故內服餌之藥宜辛涼以散熱清中如此則內外交攻標本兩治其病豈有不愈者乎

丹溪心法附餘卷之十三

鮑集

休寧東山古庵方廣約之類集

# 燥門

## 消渴 六十八

丹溪心法

○消渴養肺降火生血為主 分上中下治 三消皆禁

用半夏血虛亦忌用口乾咽痛腸燥大便難者亦不宜用

汗多者不可用不已必須姜監制 消渴若泄瀉先用白

消渴

心法附餘卷之十三

十

消渴

末白芍藥炒為末調服後却服後藥汁即諸內傷病退後

燥渴不解此有餘熱在肺經可用參苓甘草少許生薑汁

調冷服或以茶匙挑姜汁與之虛者可用人參湯 天花

粉消渴神藥也 上消者肺也多飲水而少食大小便如

常 中消者胃也多飲水而小便赤黃 下消者腎也小

便濁淋如膏之狀面黑而瘦

入方

黃連末

天花粉末

人乳汁

又云藕汁

生芩汁

右後三味汁為膏入前二味搜和佐以姜汁和蜜為膏

徐醫舌上以白湯少許送下 能食者加軟石膏八

附諸賢論

劉河間宣明論曰燥乾者金肺之本燥金受熱化而成燥  
澀也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能  
勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也  
又燥濕小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反  
同於風熱火也又加大便乾澀乃大腸受熱化成燥澀  
經云諸澀枯涸又如癰瘕中風皆因火熱耗損血液玄  
府閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲主聲肺結云肺肢痛經  
消渴心法附餘卷之十三 二  
戾者風熱濕相致而遂以偏枯語音澀手足不隨也然  
中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛  
不能開發貫注多成偏枯經曰諸澀枯涸乾勁皺揭屬  
於燥也 又如胃膈痺熱煩滿飢不欲食或痺或消中  
善食而瘦或燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便狂陽  
心火燥其三焦腸胃燥澀拂鬱而水液不能宣行則周  
身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消渴然雖多飲亦  
其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止而便注為小  
便多出俗未明妄為下焦虛冷誤人多矣 及夫周身  
熱燥鬱故變為雀目或內障癰疽瘡瘍上為咳嗽喘下

為痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化者變為水腫腹  
脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便有脂液者為消腎  
也此為三消病也 消渴 消中 消腎 經意皆云  
熱之所致也

附諸方

東垣曰膈消者以白虎加人參湯治之 中消者以調胃  
承氣湯二黃丸治之 下消以六味地黃丸治之  
人參石膏湯即白虎加人參湯 治膈消上焦燥渴不欲飲食  
人參兩半 石膏二兩 甘草四錢 知母七錢  
東垣加黃芩杏仁  
消渴心法附餘卷之十三 三  
右吹咀每服一兩水二盞粳米一撮煎至一盞去滓通  
口服無時  
清心蓮子飲 治心經蘊熱作渴小便或赤澀或濁淋  
黃芩 麥門冬 地骨皮 車前子  
甘草各三錢 蓮子 茯苓 黃芪  
柴胡 人參各三錢半  
右吹咀水煎服  
六神湯三因方 治三消渴疾  
枇杷葉 瓜蒌根 乾葛 蓮房  
甘草 黃耆各等分

<p>右咬咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓</p> <p>地黃飲子 簡易方 治消渴咽乾而亦煩燥</p> <p>人參 生乾地黃 熟乾地黃 黃耆 蜜炙</p> <p>天門冬 心去 麥門冬 心去 澤瀉 石斛 炒去根</p> <p>枇杷葉 炒去毛 枳殼 炒去穢 甘草 炙各等分</p> <p>右咬咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服</p> <p>硃砂黃連丸 秘方 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴</p> <p>硃砂 別研 宣連 兩三 生地黃 兩二</p> <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九燈心棗子湯送下</p>	<p>消渴 心法附餘卷之十三 四</p> <p>烏梅五味子湯 大咸方 專治消渴生津液</p> <p>五味子 巴戟 酒浸 百藥煎 烏梅</p> <p>甘草 各等分</p> <p>右咬咀每服四錢水一盞空心煎服</p> <p>補腎地黃丸 秘方 降心火益腎水治消渴除骨蒸壯筋骨</p> <p>明眼目</p> <p>生地黃 半斤酒浸二日蒸爛 研膏與相拌晒乾 鼠苓 一兩酒炒</p> <p>白茯苓 兩四 黃柏 地黃 酒乾 當歸 酒洗</p> <p>枳殼 兩 麥門冬 一兩熟地黃 酒浸 天門冬 心去</p> <p>揀參 兩 甘菊花 兩二 生苓 兩一</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

右為末滴水丸如梧子大每服七十九空口鹽酒下		麥門冬飲子 宣明方 治膈消胸滿心煩津液短少消渴		五昧子 知母 甘草 炙 瓜蒌仁		人參 乾葛 生地黃 茯神 各一兩		麥門冬 二兩 去心		右咬咀每服一兩水二盞竹葉十四片煎一盞溫服		川黃連丸 治消渴		川黃連 兩五 天花粉 麥門冬 去心各二		右為末生地黃汁并牛乳夾和搗丸梧子大服三十丸		粳米湯送下		消渴 心法附餘卷之十三 五		玉泉丸 治煩渴口乾		麥門冬 心去 人參 茯苓 黃芪 半生半炙		烏梅 焙 甘草 各一 瓜蒌根 乾葛 兩各一		右為末蜜丸彈子大每一丸溫湯嚥下		甘露湯 經方 治煩渴口乾		百藥煎 白乾葛 錢各三 烏梅 五味子		天花粉 錢各二 甘草 錢半		右咬咀水煎服		又方 經方 經驗止渴及除瀉後煩渴常服調中和氣		茯苓 人參 各五 乾葛 兩一 藿香	
----------------------	--	-------------------------	--	-----------------	--	------------------	--	-----------	--	----------------------	--	----------	--	---------------------	--	-----------------------	--	-------	--	---------------	--	-----------	--	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--------------------	--	---------------	--	--------	--	------------------------	--	-------------------	--

木香

甘草各一錢半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣通口服加滑石亦可

栝蒌湯 經方 治消渴小便多

用栝蒌根薄切炙五兩水五升煮取四升隨意飲

栝蒌丸

用栝蒌根薄切用人乳汁拌蒸竹瀝拌晒為末煉蜜為丸如彈子大噉化或丸如菉豆大每服一百丸米飲下

忍冬丸 治消渴既愈之後須預防發癰疽之患

消渴

心法附餘卷之十三

六

用忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置瓶罐內用無

灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許碾為細末以所浸酒打麵糊為丸如梧子大每服一百丸不拘時溫酒米飲任下

一方 用忍冬草水浸煎服

黃耆六一湯 治諸虛不足胸中煩悸常消渴或先渴而欲發癰疽或病癰疽而作渴並宜服之 見益汗

大黃甘草飲子 宣明方 治男子婦人一切消渴不能止者

甘草 大篇者四兩長四指打碎

大豆 五升煮三沸另淘苦水再煮

大黃 一兩半錦紋者

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少

更添豆軟於盆中放冷令病人食豆湯飲湯汁無時候食盡如渴燥止罷不止再煮煎藥不三次病即去矣

○已上諸方治上消之劑

調胃承氣湯

三黃丸 俱見火類

順氣散 援粹方 消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤以此

下之不可多利微微利至不飲食而愈

厚朴 姜製

大黃 四錢

枳實 一錢

右咬咀水二盞煎至一盞去滓通口服無時

人參白朮湯 宣明方 治胃膈痺熱煩滿飢不欲食瘰癧成爲

消渴

心法附餘卷之十三

二

消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼

療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過積毒一切腸胃燥澀倦悶壅塞瘡疥麻痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

荊芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉 各半

茯苓 去皮

連翹

瓜蒌根

乾葛 各一兩

甘草 三兩

藿香葉

青木香

官桂 各一分即二錢半是也

石膏 四兩

寒水石 二兩

滑石 半斤

右為細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生姜三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢得臟腑流利取効如常服以意加減燕服消痞丸散以散腸胃結滯濕熱內甚自利者去了大黃芒硝

消痞丸 宣明方 治積濕熱毒甚者身體面目黃心脇脹滿嘔吐不能飲食痿弱難以運動咽嗝不利肢體焦眩眩

為大小便血腸風痔瘡三焦壅滯悶痺熱中消渴傳化失常小兒疳積熱

黃連 乾葛 各一兩

消渴

心法附餘卷之十二

黃芩

大黃

黃栢

梔子

薄荷

藿香

厚朴

茴香 各半兩

木香

辣桂 各半兩

青黛 一兩

研

牽牛 二兩

右為細末滴水丸如小豆大每服十丸新水下溫水亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚本自利者去大黃

牽牛忌發熱諸物

黃連猪肚丸

三因方

治強中消渴

黃連 去

梁米

瓜蒌根

茯苓 各四兩

知母

麥門冬 去心各二兩

右為末用大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合

口置籠中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入蜜棧和前藥杵數千下丸如梧桐子大每服五十丸人參湯下

一方 加人參熟苳濟生除知母梁米用小麥

加味錢氏白木湯 直指方 治消中消穀善飢

人參

白木

白茯苓

甘草 炙

藿香葉 一兩

枳殼 去穢炒 各半兩

乾葛 二兩

木香

北五味

柴胡 各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服

五豆湯 瑞竹方

能解酒毒止消渴能發小兒豆疹不出并消渴

消渴

心法附餘卷之十三

九

鮮發渴之証後成瘡癰者

黑豆

黃豆

藜豆

青豆

赤小豆 各五錢

乾葛 一兩

甘草 一兩

貫眾 半斤

右前藥俱不剉用水五斗五升騰八日用大鍋熬至熟

濾出豆汁令以磁甕盛之簪葉紙重封春夏月開用酒

後渴隨意飲大人渴後或成瘡瘍小兒豆瘡不出皆可

飲最妙

灸法 秘方

近世醫者不審病症從何而得不明虛實每以

補藥投之遂致不救可惜也殊不知瘰癧者乃積熱也復

以熱藥與之是乃失之若服補藥即寸口脉其其人下

熱即不可治也甚者吐血而死有灸法甚妙令病人暨其兩手剪去中指甲於兩手中指頭上各灸一炷如大豆令兩人發火仍令兩人吹去各指尖上艾焙其火必爆再用艾焙兩箇兩脚二處太衝脉上亦依前法兩人發火吹之亦爆高五六寸四箇艾焙有四箇小孔處此其驗也其人立飲食黃色遂退更先灸百會穴一焙如前法吹之萬不失一也

○已上諸方治消中之劑

六味地黃丸 見補損

八味丸加減 治心腎不足消渴引飲

消渴

心法附餘卷之十一

本方減附子加五味子 方見補損

玄兔丹 和劑方 治腎水枯竭津液不生消渴諸証

兔絲子 酒浸研焙 乾末十兩

白茯苓 二兩 去皮淨

乾蓮肉 三兩 五味子 半兩 酒浸焙

右為末別研山藥末六兩將浸藥餘酒更添煮糊搜和

搗數千杵丸如梧桐子大每服五十丸米湯空心下

夢遺白濁服之亦好

鹿茸丸 三因方 治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸 七錢 半 炙 麥門冬 二兩 熟地黃 黃耆

五味子 雞胫胫 炒 肉從蓉 酒 山茱萸

破故紙 牛膝酒

玄參 錢各五

人參 錢各七

茯苓

地骨皮

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸米湯下

加減腎氣丸 濟生方 治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肌體損瘦並宜服之

山茱萸肉 白茯苓 皮去 牡丹皮 心去 熟地黃 酒

五味子 澤瀉

官桂 不見火 沉香 各半兩

鹿角 鎔

山藥 炒各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸鹽湯米飲任下

弱甚者加附子半兩無進黃芪湯

消渴 心法附餘卷之十一

人參散 宣明方 治消腎善飲而食後小便數弱者

人參 砂仁 各三

白木 澤瀉

瓜蒌 桔梗

梔子 連翹 各半

葛根 黃芩

大黃 薄荷

白茯苓 各一兩

甘草 半兩

石膏 半兩

滑石

寒水石 各三

右為末每服五錢水一盞煎至七分八蜜少許再煎三

二沸去滓食前服食後服消痞丸

○已上諸方治下消之劑

燥結 六十九

丹溪心法

○燥結血少不能潤澤理宜養陰

入方 治大腸虛秘而熱

白芍藥一兩 陳皮 生芋 歸身一兩

條苓 甘草二錢

右為末粥丸白湯下七八十九空心服

附脉理

脉訣舉要曰熱厥脉伏時或而數便秘必難治不可錯

燥結 心法附餘卷之十三 三

附諸方

潤麻丸 丹溪秘方 能潤血燥大便不通

麻子仁 當歸 桃仁 生芋

枳殼各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心白湯下

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞

不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身 升麻 桃仁泥各一錢 生芋

熟芋各五錢 甘草各三錢 紅花各三錢

右作一服水煎食前調換柳末五錢或加麻仁泥一錢

加大黃名當歸潤燥湯

潤燥湯

升麻 生芋各二錢 歸稍 生甘草

大黃煨 熟芋 龜仁泥 麻仁各三錢

紅花五分

右除桃仁麻仁另研作一服水煎次下桃仁麻仁煎空

心熱服

活血潤燥丸 治大便風秘血秘每常燥結

當歸稍一錢 防風三錢 大黃煨 羌活各一兩

桃仁二兩 研 麻仁二兩 研

燥結 心法附餘卷之十三 三

皁角煨 存性一兩 三錢 其性得

右除二仁另研外餘為末後和勻蜜丸梧子大空心服

五十丸白湯送下三兩服後以蘓子麻仁粥每日早晚

食之大便秘不致結燥以磁器盛之紙封母令見風

脾約麻仁丸 和劑方 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴去皮 芍藥 枳實各八分 杏仁去皮炒

麻仁另研 各五錢 大黃煨 各一兩

右為末蜜和丸如梧子大每服二十九臨臥溫水下太

便通利即止

滋腸五仁丸 楊氏方 治津液枯竭大腸秘澀傳導艱難



<p>右為末煉蜜丸如梧子大每服七丸空心米飲下此</p> <p>治脉浮晝便難者如脉沉夜便難用苑仁橘紅</p> <p>紫蘓麻仁粥 老人服之能順氣滑大便</p> <p>紫蘓子 麻子仁</p> <p>右二味不拘多少研爛水濾取汁煮粥食之</p> <p>潤腸丸 濟生方 治發汗過多耗散津液大腑秘結</p> <p>肉從蓉 酒浸焙 沉香 另研</p> <p>右為末用麻子仁汁打糊為丸如梧子大每服七十</p> <p>况空心米飲下</p> <p>之太固氣丸 治虛老之人大便結燥 方見中風</p>	<p>橘紅 取末 杏仁 湯浸去皮</p> <p>右前藥入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度</p> <p>橘杏丸 濟生方 治老人氣秘大腑不便</p> <p>麻子仁 一匙半細研用水 芝蔴 半匙微炒所用</p> <p>桃仁 湯泡去皮尖 荊芥穗 獨末各</p> <p>右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧子太</p> <p>每服五十丸空心米飲下</p> <p>潤腸湯 楊氏方 治大便秘澀連日不通</p>	<p>栢子仁 半兩 桃仁 杏仁 炒去皮尖</p> <p>陳皮 四兩 另 松子仁 二錢 郁李仁 錢</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<p>右為末與麻仁研勻煉蜜為丸如梧子大每服三十丸食前白湯下</p> <p>枳殼 各一兩</p> <p>火麻子 去殼 研膏 大黃 錢二 枳殼 各一兩</p> <p>右為末每服二錢米飲調下空心加四物湯二錢尤妙</p> <p>決麻仁丸 良方 治婦人腸胃風結大便常秘</p> <p>枳殼 各一兩</p> <p>右為末與麻仁研勻煉蜜為丸如梧子大每服三十丸食前白湯下</p>	<p>二蓋煎至一蓋去滓食前通口服一方用枳實</p> <p>通神散 良方 治婦人大便不通</p> <p>大黃 芒硝 苑仁</p> <p>郁李仁 湯泡去皮微 木香 半兩</p> <p>右為末每服一兩生薑五片豉二十一粒烏梅一個水</p> <p>二蓋煎至一蓋去滓食前通口服一方用枳實</p> <p>枳殼 各五錢 甘草 各二錢</p> <p>黃芩 各五分</p> <p>右咬咀每服一兩生薑五片豉二十一粒烏梅一個水</p> <p>川大黃 湯洗 杏仁 去皮 升麻 梔子仁</p> <p>枳殼 各五錢 生地黃 一兩 人參</p> <p>大黃飲子 聖惠方 治身熱大便不通</p> <p>任下</p> <p>右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸蘓子湯荊芥湯</p> <p>枳殼 炒 麻仁 各半</p> <p>陳皮 半兩 阿膠 炒 防風 錢各一 杏仁 炒去</p> <p>枳殼 炒 麻仁 各半</p> <p>右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸蘓子湯荊芥湯</p> <p>任下</p>	<p>栢子仁 半兩 桃仁 杏仁 炒去皮尖</p> <p>陳皮 半兩 阿膠 炒 防風 錢各一 杏仁 炒去</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

○已上諸方治血液枯涸燥結之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

以此下之

方見火類

一和散

治七情之氣結于五臟不能流通以致脾

胃不和心腹痞悶大便秘澀

薤活

去芦

紫蘊

去梗

木香

白木

枳殼

各七錢半

甘草

陳皮

大腹皮

一錢

枳殼

治腸胃風氣壅盛大便秘實

右咬咀每服五錢水一盞煎六分不拘時服

枳殼

治腸胃風氣壅盛大便秘實

枳殼

去穢

川大黃

薤活

橘紅

桑白皮

香白芷

各二兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十丸空心米飲姜湯

任下

檳榔丸

清生方

治大腸濕熱佛鬱不通心腹脹滿大便秘

結

黃芩

大黃

枳殼

白芷

枳殼

薤活

牽牛

人參

麻仁

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十丸空心熱水下

木香三稜散

治腹中有虫面色瘡黃一切積滯

黑牽牛

半生半

木香

雷丸

錫灰

三稜

莪朮

大黃

右為細末每服二錢空心蜜水調下或砂糖水亦可須

先將燒肉一片口中嚼之吐出口中肉汁後服藥

牛黃丸

治上焦熱臟腑秘結

大黃

白牽牛

蜜調下

右為細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷而手足煩者

蜜調下

皂角丸

治大腸有風大便秘結年高入宜服

皂角

枳殼

右為細末蜜丸如梧子大每服七十丸空心米飲下

南木香丸

治大便秘結

南木香

枳殼

右等分

先將枳殼去穢每個切作四片用不蛀皂角三

寸生薑五片巴豆三粒畧槌碎不去殼用水一盞將枳

殼同煮和滾濾去生薑巴豆皂角不用只將枳殼剉細

為末入前木香枳榔麻仁同為末煉蜜丸如梧子  
大蜜湯下五十丸不拘時

風潤腸丸 聖惠方 治二焦不和胸膈痞悶氣不升降飲  
食遲化腸胃燥澀大便秘結

沉香 枳榔 木香 青皮

蘿蔔子 炒 槐角 炒 陳皮 去穢 枳殼 炒 去穢

三稜 煨 枳實 炒 木通 各五 郁李仁 去皮 一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五六十丸木瓜湯下常

服溫潤腸胃導化風氣一方有大黃無木通米飲下

消毒麻仁丸 和劑方

杏仁 二兩 去皮 大黃 兩 生五 山梔子 十兩

右為末蜜丸梧子大每服五十丸食前白湯送下

○已上諸方治濕熱怫鬱燥結之劑

治大便秘通

用皂角燒烟馬桶內坐薰即通

治大小便不通 秘方

用火燒鹽於臍內切蒜一片蓋鹽上艾灸二三炷即通

治大小便不通

用明礬末一匙安臍中冷水滴之冷透腹內自然通如  
是曾灸無臍孔即於灸盤上用紙糊作圈子籠灸

礬末在內仍作前法用水滴之  
治大小便不通 直指方

用連根葱一二莖帶土生薑一塊淡豆豉二十一粒鹽  
二匙同研爛捏作餅子烘熱掩臍中以帛扎定良久氣  
透自通不然再換一餅

提盆散 拔粹方 即霹靂箭

用草烏一味為末用葱頭帶涎離烏頭末納肛門中

蜜導法

凡諸秘結不通或兼他証又或老弱虛極不可用藥者  
用蜜熬入皂角末少許秉熱攪作丸候冷以導之冷秘

生美兌佳

猪膽汁導法

用大猪膽一枚瀉汁和醋少許灌穀道中一飯頃當大  
便自利

○已上諸方外導之法

○廣按燥結之証有虛實二者之分何則或因風寒邪  
從外入或因七氣火自內起此是濕熱怫鬱燥結有  
時乃為實也實則宜蕩滌腸胃開結軟堅如大黃芒  
硝枳實厚朴承氣湯之類是也或因病久飲食少進  
或因年高將息失宜此是血液枯涸燥結無時乃為

虛也虛則宜滋養陰血潤燥散熱如當歸地黃龜仁  
條芩潤燥湯之類是也凡燥結之症苟不審虛實而  
輕用藥死生如反掌之易也耶

丹溪心法附餘卷之十三

干

十五

丹溪心法附餘卷之十三

丹溪心法附餘卷之十四

休寧東山古方廣約二類集

# 鬱門

## 六鬱七十

丹溪心法

○氣血冲和萬病不生一有拂鬱諸病生焉故人身諸病  
多生於鬱 蒼木撫芎總解諸鬱隨証加入諸藥 凡鬱  
皆在中焦以蒼木撫芎開提其氣以升之假如食在氣上

六鬱 心法附餘卷之十四

九

提其氣則食自降矣餘皆倣此

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者  
不得降當變化者不得變化也此為傳化失常六鬱之  
病見矣氣鬱者胸脇痛脉沉澁濕鬱者周身走痛或關  
節痛遇陰寒則發脉沉細痰鬱者動則喘寸口脉沉滑  
熱鬱者瞤悶小便赤脉沉數血鬱四肢無力能食便紅  
脉沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊  
盛者是也

入方

氣鬱

香附童便

蒼木米泔

撫芎

白芷	蒼木	川芎
茯苓		
海石	香附	南星 <small>姜製</small>
瓜蒌 <small>一本無南星瓜蒌有蒼木川芎梔子</small>		
山梔 <small>炒</small>	青黛	香附
蒼木	撫芎	
菴仁 <small>去皮</small>	紅花	青黛
川芎 <small>撫芎亦可</small>	香附	
蒼木	香附	山查
神麴 <small>炒</small>	針砂 <small>醋炒七次研極細</small>	
春加撫芎	夏加苦參	秋冬加吳茱萸
越鞠丸	解諸鬱	又名芎木丸
蒼木	香附	撫芎
梔子 <small>炒各等分</small>		神麴
右為末水丸如菴豆大每服五十丸		
附論		
王節齋曰丹溪先生治病不出乎氣血痰三者故用藥之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯又云久病屬鬱立治鬱之方曰越鞠丸蓋氣血痰三病多有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或誤藥雜亂而		

<p>成鬱故子每用此三方治病時以鬱法參之氣病無鬱則用四君子加開鬱藥血痰病皆然故四法者治病用藥之大要也</p>	<h1>氣滯</h1>	<p>七十一</p>	<p>附氣刺痛 諸氣</p>
<p>丹溪心法</p> <p>○破滯氣須用枳殼高者用之夫枳殼者損胸中至高之氣二三服而已又云滯氣用青皮勿多用多則瀉真氣如實熱在內相火上衝者如氣滯宜知母黃柏黃連黃芩如陰虛氣滯者宜四物加玄參黃柏以補血</p>	<p>氣滯</p>	<p>心法附餘卷之十四</p>	<p>三</p>
<p>○氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可若稟受素壯而氣刺痛宜枳殼烏藥 若肥白氣虛之人氣刺痛者宜參朮加木香 若因事氣鬱不舒暢而氣刺痛當用木香</p>	<p>○諸氣</p>	<p>新增</p>	<p>附諸賢論</p>
<p>張子和云夫天地之氣常則安變則病而况人稟天地之氣五運迭侵於外七情交戰於中是以聖人審氣如持至寶庸人投物而反傷太如此軒岐所以論諸痛皆因於氣諸病皆生於氣遂有九氣不同之說氣本一也因</p>			

所觸而為九怒喜悲恐寒熱驚思勞也其言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心絛急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣滯矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣太僕云恐則傷精却上而不下流下焦亦迴還而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣還故氣不行也寒則腠理閉氣不行故氣收矣太僕云身涼則衛氣沉故皮膚文理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂于中而不散也

氣滯 心法附餘卷之十四

吳則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣太僕云人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出也驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣太僕云疲勞役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸止氣晉而不行故氣結矣太僕云繫心不散故氣亦停滯而結也此素問之論九氣其變甚詳其理甚明矣

原病式曰氣為陽而主輕微諸所動亂勞傷乃為陽火之化神狂氣亂而為病熱者多矣子和云河間治五志獨

得言外之意凡見喜怒哀思悲恐之証皆以平心火為主至於勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心火便屬火二者亦以平心火為主今之醫者不達此旨遂有寒涼之謗

劉宗厚曰捍衛冲和不息之謂氣擾亂妄動變常之謂火當其和平之時外護其表復行於裏周流一身循環無端出入升降繼而有常源出中焦總統於肺氣曷嘗病於人也及其七情之交攻五志之間發乖戾失常清者遽變之為濁行者抑遏而反止表失衛護而不和裏失健悍而少降營運漸速肺失主持妄動不已五志厥陽

氣滯 心法附餘卷之十四

之火起焉上燔於肺氣乃病焉何者氣本屬陽反勝則為火矣河間有曰五志過極皆為火也何後世不本此議而一緊類聚香辛燥熱之劑氣作寒治所據何理且言指迷七氣湯製作者其皆用青皮陳皮三稜蓬朮益智官桂甘草遂為平和可以常用通治七情所傷混同一意未喻其樂以治其氣已下諸方尤有甚焉者茲不復叙况所起之情各各不同且夫經言九氣之變未嘗略而不詳如怒則氣上等証其言治法高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者溫之結者散之喜者以恐勝之悲者以喜勝之九氣之治各有分別

何嘗混作寒論而類以香熱之藥通言而治諸氣豈  
之謂歟若香辛燥熱之劑但可劫滯氣衝快於一時以  
其氣久抑鬱借此暫行開發之意藥中不佐制伏所起  
之氣服甚則增熾鬱火蒸熏氣液而自成積積滋長而  
成痰痰飲下膈氣乃氤氲清虛之象若霧露之著物雖  
滯易散內挾痰積開而復結服之日久安有氣實而不  
動氣動而不散者乎此皆人所受悞之由習俗已久相  
沿而化卒莫能救升發太過香辛散氣燥熱傷氣真氣  
耗散濁氣上騰猶曰腎虛不能攝氣歸原遂與蕪子降  
氣湯四磨湯下黑錫丹養氣丹鎮墜上升之氣且疏黃  
氣滿心法附餘卷之十四 六  
黑錫佐以香熱又無補養之性藉此果能生氣而補腎  
乎請熟詳之夫濕痰甚者亦或當之初服未顯增變由  
喜墜而愈進形質弱者何以收效不悟肺受火邪子氣  
亦弱降令不行火無以制相扇而動本勢空虛命絕如  
縷積而至深丹毒濟火一旦火氣狂散喘息奔急而死  
吁以有形丹石丸藥重墜無形之氣其氣將何抵受隨  
而降之乎譬以石投水水故未嘗沉也豈不死歟丹溪  
有曰上升之氣自肝而出中挾相火其熱為甚自覺其  
冷非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故有此證  
認假作真似是之禍可勝言哉內經雖云百病皆生於

氣以正氣受邪之不一也今七情傷氣鬱結不舒痞悶  
壅塞發為諸病當詳所起之因滯於何經上下部分臟  
氣之不同隨經用藥有寒熱溫涼之同異若枳殼利肺  
氣多服損胃中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣與  
夫木香之行中下焦氣香附之快滯氣陳皮之泄逆氣  
紫蘂之散表氣厚朴之瀉衛氣檳榔之瀉至高之氣藿  
香之馨香上行胃氣沉香之升降真氣腦麝之散真氣  
若此之類氣實所宜其中有行散者有損泄者其過劑  
乎用之能却氣之標而不能制氣之本豈可又佐以燥  
熱之藥以火濟火混同謂治諸氣使之常服多服可乎  
氣滿心法附餘卷之十四 七 三百五十一  
氣之與火一理而已動靜之變反化為二氣作火論治  
與病情相得丹溪發揮論之冷生氣者出於高陽生之  
謬言也自非身受寒氣口食寒物而遽論寒者無恐十  
之無一二也  
附脉理  
脉訣舉要曰下手脉沉便知是氣沉極則伏瀆弱難治其  
或沉滑氣兼痰飲  
又曰沉弦細動皆氣痛證心痛在寸腹痛在關下部在  
尺脉象顯然  
附諸方

藶合香丸 和制方 專能順氣化痰并治傳尸骨蒸諸項勞

瘵卒暴心痛鬼魅瘴癘赤白下痢小兒驚搐等證

沉香 麝香 研 訶子 煨用 丁香

青木香 安息香 酒別為末用無灰 香附 炒去

藶合香油 入安息香膏內 白檀香 各錢 薑陸香 別研

烏犀角 錢各二 龍腦 一錢 硃砂 研

右為末入研藥極勻用安息膏并煉蜜和劑丸如櫻桃

大空心用溫水化下四丸酒服亦可

三和散 和劑方 治五臟不調風氣壅滯面目虛浮腸胃燥

氣滯 見燥結類 心法附餘卷之十四

流氣飲子 治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胸悶痞

咽塞不通腹脹嘔吐不食及上氣喘急咳嗽痰盛

面目浮四肢腫大便秘澀小便不通及治憂思太過陰

陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治脚氣腫痛喘急腹脹

大便不通及氣攻肩背脇肋走注痼痛

紫蘘葦 青皮 去白 當歸 洗焙 芍藥

烏藥 茯苓 去皮 桔梗 半夏 湯洗

川芎 黃芪 枳實 炒 防風 各五

甘草 陳皮 去白 木香 二錢

連皮大腹子 一兩 姜製

右咬咀每服半兩水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去

滓不拘時溫服 按料方有枳殼檳榔各半兩

分氣紫蘘葦 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼

痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止 見喘類

藶子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅

盛 見痰類

秘傳降氣湯 和劑方 治上盛下虛氣不升降上盛則頭目

昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽乾喉燥下虛則腰脚無力

小便頻數或大便秘結

氣滯 心法附餘卷之十四 九

骨碎補 炒去毛 訶子 炮去 草果仁 煨 半夏曲

桔梗 各半 桑白皮 兩 地骨皮 炒黃 枳殼 炒去穢

五加皮 酒浸半 陳皮 去白 紫胡 去芦

甘草 各一

右為麤散和勻再就蒸一伏許晒乾每服二錢紫蘘三

葉姜三片水一盞同煎六分食後溫服又能調順榮衛

通利三焦如痰嗽倍加半夏麴心肺虛滿加人參茯苓

上膈熱加黃芩下虛加熟附子婦人氣血虛加當歸

沉香降氣湯 和劑方 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘

促短氣又治脾胃雷飲忘寐吐酸脇下胸膈常覺妨悶



沙仁 <small>四兩</small>	甘草 <small>炙十兩</small>	香附 <small>去毛四兩</small>	沉香 <small>錢半</small>	末每服二錢入鹽少許沸湯點服	沉香升氣湯 <small>御藥院方</small>	治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞	紫沉通氣湯 <small>御藥院方</small>	治三焦氣滯不能宣通腹脇脹大便秘	紫蘇葉	枳殼 <small>麩炒</small>	陳皮 <small>去白</small>	赤茯苓 <small>去皮</small>	甘草 <small>炙</small>	枳榔 <small>各一兩</small>	沉香	木香	麥門冬 <small>去心</small>	五味子	桑白皮	黃芪	乾生薑	薄荷葉	荊芥穗	枳實 <small>錢各五</small>	右咬咀每服半兩水一盞半煎八分空心溫服	香橘湯 <small>聖惠方</small>	治一切氣不快久病服藥不下者	香附子 <small>大者去毛</small>	陳皮 <small>去白</small>	枳實 <small>生</small>	白木	甘草 <small>炙各三兩</small>	右為末每服二錢鹽湯調或姜棗煎尤妙如傷風用葱白姜棗煎	分心氣飲 <small>和劑方</small>	治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮分怒傷神或臨食憂感或事不隨意使抑鬱之氣滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹痞塞不通噎氣吐酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠
----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	-----	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----	----	-----------------------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----------------------	--------------------	------------------------	---------------	-------------------------	----------------------	---------------------	----	------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸中虛痞不思飲食皆可服之	木通 <small>去節</small>	赤芍藥	赤茯苓	官桂	半夏 <small>湯洗七次</small>	桑白皮	大腹皮	陳皮 <small>去白</small>	青皮 <small>去穢</small>	甘草	羌活 <small>各兩</small>	紫蘇 <small>四兩</small>	右咬咀每服一兩生薑三片棗二枚灯心十五莖水一盞半煎一盞去滓通口服之	分心氣飲 <small>和劑方</small>	治症同前	丁香	陳皮	半夏	甘草 <small>各一兩</small>	香附子	藿香	紫蘇	加枳實 <small>錢各一兩</small>	木香	人參	白木	大腹子	大腹皮	桑白皮	草菓	桔梗	麥門冬	厚朴 <small>各五兩</small>	右用水二盞生薑三片棗一枚灯心十莖煎至一盞溫服不拘時	大藿香散 <small>酒生方</small>	治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食	木香 <small>一兩</small>	藿香葉	半夏麴	白木 <small>各一兩</small>	白茯苓 <small>見火</small>	桔梗 <small>去穢</small>	人參	枇杷葉 <small>去毛</small>	官桂 <small>不見火</small>	甘草 <small>炙各五錢</small>
----------------------------------------	----------------------	-----	-----	----	------------------------	-----	-----	----------------------	----------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------	------	----	----	----	-----------------------	-----	----	----	-------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-----	-----	-----------------------	-----------------------	----------------------	----	-----------------------	-----------------------	------------------------

右咬咀每服三錢水二盞生薑五片棗子一枚煎至一	紫蘊子湯 <small>清生方</small> 治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促	胸滿腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而瀉	紫蘊子 <small>兩</small> 大腹皮 <small>兩</small> 草菓仁 <small>兩</small> 半夏 <small>湯洗七次</small>	厚朴 <small>去皮製</small> 木香 <small>不見火</small> 橘紅 <small>兩</small> 木通 <small>兩</small>	白木 <small>兩</small> 枳實 <small>炒</small> 人參 <small>兩</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	右咬咀每服四錢水二盞生薑五片棗二枚煎至一盞	溫服	橘皮一物湯 <small>直指方</small> 治諸氣攻刺及感風寒暑濕初證通	氣滯 <small>心法附錄卷之十四</small> 三	用凡酒食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸	橘皮 <small>洗淨不拘多少</small> 用新汲水煎服	木香流氣飲 <small>和劑方</small> 調順榮衛流通血脉快利三焦安和	五臟治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食	肩背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿	大便秘結水道赤澀又治憂思太過怔忡鬱積脾氣風	濕聚結腫痛喘滿脹急	半夏 <small>一錢五分</small> 厚朴 <small>一錢二分</small> 陳皮 <small>二錢四分</small> 青皮	甘草 <small>兩</small> 香附子 <small>兩</small> 紫蘊 <small>各一錢二分</small> 人參	赤茯苓 <small>兩</small> 白木 <small>兩</small> 麥門冬
-----------------------	-----------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	-----------------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

大黃 <small>錢各半</small> 白芷 <small>兩</small> 枳殼 <small>各二分</small> 草菓	官桂 <small>兩</small> 蓬朮 <small>兩</small> 大腹皮 <small>兩</small> 丁皮	枳榔 <small>兩</small> 木香 <small>兩</small> 沉香 <small>各四分</small> 木通 <small>六分</small>	右用水二盞生薑三片棗子二枚煎至一盞熱服不拘	時候	蠲散 <small>和劑方</small> 治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心	腹痛連胸脇膀胱小腸疝氣及婦人血氣刺痛	延胡索 <small>兩</small> 肉桂 <small>兩</small> 乾姜 <small>炮各二兩</small> 甘草 <small>炙</small>	縮砂 <small>去皮</small> 蒼朮 <small>米泔水浸一宿切焙各半兩</small> 丁皮	枳榔 <small>各四兩</small> 蓬朮 <small>兩</small> 三稜 <small>煨</small> 茯苓	青皮 <small>去白各六兩</small>	右為末每服二錢水一盞葱白一莖煎七分空心熱服	撞氣阿魏丸 <small>和劑方</small> 治五種噎疾九種心痛痞癰氣塊冷	氣攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫疝氣婦人血氣	茴香 <small>炒</small> 青皮 <small>去白</small> 甘草 <small>炒</small> 陳皮 <small>去白</small>	蓬朮 <small>兩</small> 川芎 <small>兩</small> 生薑 <small>四兩切片鹽半兩</small> 陳皮	胡椒 <small>兩</small> 白芷 <small>兩</small> 肉桂 <small>去皮</small> 縮砂	小茴香 <small>炒各半兩</small> 阿魏 <small>酒浸一宿同煎為糊各一錢半</small>	右為末阿魏和麩糊丸如雞頭大每服一斤用硃砂七	錢為衣每服三五粒丈夫氣痛炒姜鹽湯下婦人血氣
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	----------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

消積湯下

神保丸

和劑方

治諸積氣為痛宣通臟腑

乾竭

十個

木香

胡椒各二錢半

巴豆

十個去皮心膜別研取霜用

右為末入巴豆霜令勻湯化蒸餅丸如麻子大硃砂為

衣每服五七丸心膈痛柿蒂灯心湯下腸痛柿蒂

煨姜湯下血痛炒姜醋湯下肺氣甚者以白礬蛤

粉各二錢黃丹一錢同研煎桑白皮糯米飲下氣小

喘只用桑白皮糯米飲下脇下痛炒茴香酒下大

便不通蜜湯調枳榔末一錢下氣噎木香湯下宿

食不消茶酒漿任下

○廣按已上三方消積之藥也蓋五心之火動素常無

積則流注四體而病輕有積則阻滯一處而痛重故

此三方乃消積之藥也前諸方乃調氣之藥學者須

審輕重而用之可也

○已上諸方幸溫消散之劑

三因七氣湯治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如

破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所

為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或

因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

半夏五兩

茯苓四兩

厚朴三兩

紫蘇二兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至

八分去粗熱服若因思慮過度小便不濁此藥下青

州白丸子最妙婦人惡阻尤宜服之但半夏用姜汁

製過一治七情所傷中脘不快氣不升降腹脇脹

滿用香附子炒半片橘紅六兩甘草一兩尤快或者謂

其耗氣則不然有是病服是藥也

枳梗枳殼湯直指方治諸風痞結滿悶

枳殼

桔梗各二兩

甘草五錢

右咬咀每服四錢水二盞生薑五片煎至一盞溫服

烏附湯

和劑方調水快氣治心腹刺痛

香附子

烏藥半兩

甘草三錢

右為細末每服三錢入鹽少許沸湯調服不拘時候

快氣湯

和劑方

治一切氣疾心腹脹滿胸膈噎塞噯氣吞

酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解不思飲食

砂仁

甘草

香附子各三錢

加桔梗

一錢

陳皮一錢

右用水二盞入生薑三片煎至一盞去滓溫服不拘時

木香枳木丸

和劑方

破滯氣消飲食開胃進食

木香

枳實

白朮

白細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十九丸  
水送下

木香化滯湯 枳殼方 治因憂氣濕食麪結於中脘腹皮底  
微痛心下痞滿不思飲食食之不散常帶痞氣

枳實 二錢 柴胡 四錢 木香 橘皮 各三錢

甘草 二錢 紅花 各半 半夏 一兩 草豆蔻 兩

當歸 二錢

右咬咀每服三錢水二盞生薑三片煎至一盞通口服

枳殼煮散 治悲衰傷肝氣痛引兩脇

防風 川芎 枳殼 細辛

氣滯 心法附餘卷之十四 六

桔梗 甘草 葛根 各等分

右用水煎服

木香枳榔丸 御藥院方 疎導二焦寬利胸膈破痰逐飲快

氣消食

木香 枳殼 麩炒 青皮 去白 杏仁 去皮尖

枳榔 各一 郁李仁 去皮 皂角 去皮 半夏 麩炒 各二

右為末別以皂角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更入熟

蜜少許和丸如梧子大每服五十九丸食後溫生薑湯下

復元通氣散 聖惠方 治諸氣閉滯耳聾耳疼腹癰便難瘡

瘡無頭一切氣刺活血止痛內消瘡腫

瘡無頭一切氣刺活血止痛內消瘡腫

甘草 半兩半生

青皮 陳皮 各四兩

右為末每服一錢熱酒下瘡無頭者津液調塗

東垣木香順氣散 治濁氣在上則生填脹

木香 三分 厚朴 四分 青皮 陳皮

益智 茯苓 澤瀉 生薑

半夏 吳茱萸 當歸 各五升麻

柴胡 各一 草豆蔻 煨 蒼木 各二

右作一服水煎溫服

木香導氣丸 秘方 治憂思傷脾停積飲食常服消食化氣

氣滯 心法附餘卷之十四 十七

神麪 麥蘖 各四 蘿蔔子 牽牛末

杏仁 麩炒 各 木香 陳皮 青皮 各二兩

右為末將蘿蔔子杏仁研泥同麪糊丸如梧桐子大每

服三五十丸鹽湯下

木香破氣散 又名不老湯

木香 甘草 各半 香附子 四兩 烏藥

片姜黃 各二兩

右為末每服二錢鹽湯空心調下

木香順氣丸

木香 半兩 枳殼 麩炒 陳皮 補骨脂

本香 半兩

枳殼 麩炒 陳皮 補骨脂

<p>○廣按此方補氣消氣之藥也</p> <p>治氣六合湯 治亡血後七情所傷或婦人產後月信後</p> <p>著氣</p>	<p>右為末水丸如梧子大每服五十九溫水下不拘時</p> <p>青木香丸 和劑方 治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔吐</p> <p>痰逆不思飲食常服寬中利膈</p>	<p>香附子 各一兩十六兩 大腹皮 蘿蔔子 各一兩</p>	<p>黑牽牛 二十四兩炒香 木香 三兩 補骨脂 炒</p> <p>葶澄茄 各四兩 枳榔 中散令結焦去飯四兩</p>	<p>右為末入牽牛末令勻以清水和為丸葉豆大每服三十丸茶湯熟水任下</p>	<p>○廣按氣病用氣藥而不効者氣之所藏無以收也蓋</p> <p>肺主氣腎藏氣已上二方用補骨脂所以使氣升降</p> <p>而歸於腎臟也</p>	<p>東垣升陽順氣湯 治忿怒傷肝思想傷脾悲哀傷肺以致各經火動有傷元氣發熱不思飲食</p>	<p>升麻 柴胡 陳皮 各一兩 半夏 各一兩</p> <p>人參 各二錢 黃芪 四錢 甘草 各半錢 栝皮 各半錢</p>	<p>當歸 一錢 草豆蔻 各一錢 神麴 炒半</p>	<p>右咬咀每服半兩入姜煎服</p>
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------

<p>木香枳殼丸 寬胸膈進飲食消食快氣 見劑類</p> <p>木香枳殼丸 瑞竹堂方 治因氣胸膈痞塞腹脹滿</p> <p>木香 枳殼 去穢 陳皮 去白 香附子</p>	<p>○廣按此方補血消氣之藥也</p> <p>○已上諸方辛平消散之劑</p> <p>是齋推氣丸 百一選方 治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿</p> <p>大便秘澀小便赤少宜服</p>	<p>當歸 川芎 芍藥 地黃 各一兩</p> <p>木香 五分 枳榔 一錢</p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫水下量虛</p> <p>氣滯 心法附餘卷之十四</p>	<p>實加減</p>	<p>木香順氣丸 秘方</p> <p>木香 半兩 枳榔 青皮 去白 各一兩 大黃 三兩 微炮</p>	<p>黑牽牛末 生一兩 枳殼 一兩</p> <p>右為末每服末四兩加神麴末一兩三錢蜜丸梧子大</p> <p>每服四十丸溫水下</p>	<p>木香枳殼丸 寬胸膈進飲食消食快氣 見劑類</p>	<p>木香 枳殼 去穢 陳皮 去白 香附子</p>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

黃柏去粗

蓬朮各一兩

黃芩二兩

牽牛頭末各二兩

大黃酒浸四兩

右為末水丸如梧子大每服五七十丸姜湯送下

○已上諸方辛寒消散之劑

○廣按張子和云諸痛皆因於氣諸病皆生於氣誠哉

斯言是氣也常則為氣導引血液升降三焦周流四

體變則為火有升無降燔灼中外以致血液稽留為

痰為積充乎臟腑溢乎經絡膠乎咽膈為嘔欬為痞

塞為脹滿為疼痛之所由也局方不分新久類用香

辛燥熱之藥以治之宜乎丹溪先生之所謂也今予

氣滯心法附卷之十四予

所集不然分而為三曰辛溫曰辛平曰辛寒使後之

人凡遇氣動痛作之時即以辛溫以散之稍久即以

辛平以和之辛寒以折之如此則邪易退正易復而

病安庶乎不為以火濟火病根愈深真氣愈耗而死

期逼矣然於風動痛作之初非辛溫消散不可必須

詳其所起之因觸動何臟之今於辛溫藥中加以苦

寒之藥尤佳如喜動心火加黃連怒動肝火加柴胡

悲動肺火加黃芩恐動腎火加黃柏思動脾火加芍

藥之類是也夫病源屬火而辛溫之藥止能開鬱行

氣豁痰消積而已加以苦寒之藥方能降火而去其

病根矣或曰諸痛皆因於氣治例固宜如此而諸痛皆主於氣治法當何如哉予曰於上三類方中觀其所出之證審其所用之藥分火分痰分積而施治之是其法也

氣滯心法附卷之十四王

法附餘卷之十四

休寧東山古庵方廣約之類集

# 寒鬱門

## 心脾痛 七十二

丹溪心法

○心痛即胃脘痛雖日數多不喫食不死若痛方止便喫物還痛必須三五服藥後方喫物 痛甚者脉必伏用溫藥附子之類不可用參朮 諸痛不可補氣 大凡心膈

心痛

心法附餘卷之十五

一

卷之十五

之痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒物而得病者於初得之時當與溫散或溫利之藥若曰病得之稍久則成鬱久鬱則蒸熱熱久必生火原病式中儘言之矣若欲行溫散溫利寧無助火添病耶古方中多以山梔子為熱藥之向導則邪易伏病易退正易復而病安然病安之後若縱恣口味不改前非病復作時反咎醫之失良可嘆哉方用山梔子炒去皮每服十五枚濃煎湯一呷入生姜汁令辣再煎水沸又入川芎一錢尤妙山梔子大者或七枚或九枚須炒用 大槩胃中有熱而作痛者非山梔子不可須佐以姜汁多用台芎開之 痛發者或用二陳湯加

川芎蒼朮倍加梔子痛甚者加炒乾姜從之反治之法也

輕者川芎一兩蒼朮一兩山梔炒去皮二兩姜汁蒸餅

調九如梧子大服七八十九熱辣姜湯下 重者桂枝麻

黃石鱸各等分姜汁和蒸餅九梧子大服五十九熱辣姜

湯下 一本輕者散之麻黃桂枝之類重者加石鱸川芎

蒼朮炒山梔子去皮作丸服 凡治此證必要先問平日

起居何如假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於

胃口作痛用莖仁承氣湯下之切記輕者用韭汁桔梗能

開提其氣血藥中兼用之 以物柱按痛處則止者挾虛

以二陳湯加炒乾姜和之 有虫痛者面上白斑唇紅能

食屬虫治以苦練根錫灰之類 痛定便能食時作時止

者是虫上半月虫頭向上易治下半月虫頭向下難治先

以肉汁及糖蜜食下則引虫頭向上然後用藥打出練樹

根皮檳榔鶴虱夏取汁飲冬濃煎湯下萬應丸最好 脉

堅實不大便者下之 心痛用山梔并切藥止之若又復

發前藥必不効可用玄明粉一服立止 左手脉數熱安

脉濡者有死血 右手脉緊實痰積弦大必是久病 胃

脘有濕而痛者宜小胃丹下之

六方

黃連 炒

山梔

吳茱萸湯洗各五錢

荔枝核 <small>燒存性</small> 三錢		滑石 五錢	
又方 右為末姜汁糊丸如梧子大每服五十九粒空心溫水下			
山梔子仁 <small>炒黃色</small>			
右為末姜汁調粥丸亦得冷痛者加草豆蔻仁炒末姜汁炊餅丸服			
又方			
白朮 五錢	白芍 藥	砂仁	半夏
當歸 各三錢	菖仁	黃連	神麴 <small>炒</small>
陳皮 各二錢	吳茱萸 <small>半錢</small>	人參	甘草 各一錢
心痛 <small>心法附餘卷之十五</small> 三			
又方 右為末蒸餅丸如菉豆大每服五六十粒食遠白湯下			
白朮 三錢 <small>半</small>	白芍 炒	陳皮	歸尾 <small>錢半</small>
人參	黃連 <small>錢半</small>	吳茱萸 <small>半錢</small>	
右為末蒸餅丸如菉豆大每服五六十粒食遠白湯下			
又方 治氣實心痛者			
山梔子 <small>炒焦</small>	香附 錢	吳茱萸 錢	
右為末蒸餅丸如菉豆大以生地黃酒洗同生薑湯煎送下二十九			
又方			

胡椒 薑撥 各半兩		右為末以醋調捏作團子吞之	
又方 治心疼亦治哮喘又治痰涎			
半夏 <small>油切碎香</small>			
右為末姜汁炊餅丸姜湯下三二十九			
又方			
黃荊子 <small>炒焦</small>	為末米湯調下亦治白帶		
一人脉溢心脾常痛			
白朮	半夏 <small>各兩</small>	蒼朮	枳實
神麴	香附	茯苓	台芎 <small>各半兩</small>
心痛 <small>心法附餘卷之十五</small> 四			
右為末神麴糊丸如菉豆大每服五十九粒食遠溫水下			
治死血胃脘作痛者			
玄胡 一兩 <small>半</small>	桂	滑石	紅花
紅麴 各五錢	菖仁 三十個		
右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服三十九粒淡醋湯下			
治痰飲積胃脘痛			
螺螄殼 <small>燒上年久者燒</small>	滑石 炒	蒼朮	
山梔	香附	南星 各二兩	枳殼
青皮	木香	半夏	砂仁 各半兩
右為末生薑汁浸蒸餅為丸菉豆大每服三四十粒姜湯下			



湯下春加芎夏加黃連冬加吳茱萸各半兩 有痰喘

明雄膠開就丸如雞頭大熱姜湯吞下一丸 青黛亦

治心痛 藍華槌碎取汁姜汁和服亦可如無華處用

水一小瓶用靛安在刀頭火中燒紅燂水服

○治脾痛用海粉佐以香附末用川芎山梔生薑汁煎辣

湯調服為佳又方治脾痛氣實者可用牡蠣煨為粉用

酒調一二錢服 有脾痛大小便不通者此是痰隔中

焦氣聚下焦

附諸賢論

王節齋曰凡治心腹疼痛但是新病須問曾喫何飲食因

心痛 心法附錄卷之十五 五 劉文利

何傷感有無積滯便與和中消導之藥若日數已多曾

多服過辛溫燥熱之藥嘔吐不納胸膈飽悶口舌乾燥

大小便澀難則內有鬱熱矣或原有舊病因感而發綿

延日久見證如前者俱用開鬱行氣降火潤燥之藥加

川芎香附炒山梔黃連姜汁之類甚者再加芒硝但治

心腹久痛須於溫散藥內加苦寒鹹寒之藥溫治其標

寒治其本也

附脉理

脉訣舉要曰沉弦細動皆是痛證心痛在寸腹痛在關下

部在尺脉象顯然

附諸方

落蓋湯 治急心痛

陳皮 香附子 良姜 吳茱萸

石菖蒲 各等分

右水煎先用碗一個用香油三五點在內小蓋蓋之將

藥淋下熱服

丁香止痛散 治心氣痛不可忍

良姜 五兩 茴香 炒 甘草 各一兩 丁香 半兩

右為末每服二錢沸湯點服

一方 治卒心痛

心痛 心法附錄卷之十五 木

用乾姜為末每服一錢七米飲調服

二姜丸 和劑方 治心脾冷痛溫胃消痰

乾姜 炮 良姜 去皮各等分

右為末麩糊丸如梧子大每服三十丸食後橘皮湯下

桂靈散 治心腹大痛危急者

良姜 麩炒 厚朴 五靈脂 明淨者各等分

右為細末熱醋湯調一錢立止世不可闕此

安痛散 治心胃痛

五靈脂 去沙 玄胡索 炒去 蒼朮 煨 良姜 炒

當歸 去芦洗 各等分

右為末每服二錢不拘時熱酒醋湯調下

順氣木香散和劑方治氣不升降胸膈痞悶時或引痛及

酒食過傷噎氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛

蒼朮米泔浸桔梗去芦茴香炒各三兩乾姜炮

陳皮去芦厚朴去粗皮砂仁各丁香不見火

良姜肉桂去粗皮甘草炙各三兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分熱服

或鹽少許點沸湯下亦可

燒脾散濟生方治飲啖生冷果菜停滯中焦心脾冷痛

乾姜炮厚朴姜炒草菓仁縮砂仁

心痛心法附餘卷之十五七三指手執

甘草炙神麴炒麥蘖炒陳皮

高良姜炙各等分

右為末每服三錢執鹽湯點服不拘時

溫胃湯按粹方治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

益智五錢砂仁各二分姜黃

白豆蔻陳皮澤瀉乾生薑各三

黃耆七分厚朴人參各二分

右咬咀每服八錢用水一盞煎至八分食前服之

一方

用延胡索胡椒等為末每服二錢酒調下

袖刀散 治急心疼

用斑蝥七個胡椒四十九粒同炒令斑蝥焦碎去斑蝥不用取淨胡椒為末作一服熱酒調下不拘時

一方

用胡椒四十九粒乳香一錢為末男用姜湯下女用當

歸湯下

扶陽助胃湯 治寒氣客於腸胃胃脘當心而痛得熱則已

已

乾姜錢一揀參 草豆蔻 甘草炙

官桂 白芍藥各一錢陳皮 白朮

心痛心法附餘卷之十五八吳茱萸各五分附子炮二錢益智五分

右剉作一服水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞溫服

不拘時 有積聚備急丹良 見傷食類

神保丸 治心膈痛腹脇痛腎氣痛血積痛 方見諸氣

○已上數方治寒痛之劑 初則為寒

草豆蔻丸按粹方治客寒犯胃痛者宜此丸熱痛亦可服

只可一二服

草豆蔻錢四分吳茱萸湯炮益智

橘皮 僵蚕 人參 黃芪各八分

生甘草 炙甘草各三歸身 青皮各六分

神麴炒	姜黃各四	半夏 <small>一錢洗</small>	麥芽 <small>一錢炒</small>
澤瀉 <small>一錢小便數者減半</small>		薤仁 <small>七箇去皮另研</small>	
柴胡 <small>四分詳用</small>			
右除薤仁另研餘為末和勻湯浸蒸餅丸如梧子大每			
三十丸白湯下食遠旋斟酌多少用之			
應痛丸 <small>瑞竹堂方</small>	治心氣痛不可忍		
好茶 <small>四兩</small>	陳乳香 <small>二兩</small>		
右為細末用臘月兔血和丸如雞頭大每服一丸溫醋			
下不拘時			
金鈴子散 <small>聖惠方</small>	治熱厥心痛或發或止久不愈		
心痛	心法附餘卷之十五	九	
金鈴子	玄胡索各一兩		
右為末每服二三錢酒調下溫湯亦可			
治心氣疼不可忍			
用真蛤粉炒轉色白湯滓隨意服之			
一方 治熱心氣疼			
生蛤粉 <small>多用</small>	百草霜 <small>少許</small>		
右為細末冷水茶清皆可調下			
一方			
取鍋底墨以童子熱小便調服三錢即愈			

用枯礬為末煉蜜丸如芡實大每服一丸空心細嚼淡			
姜湯下如食後白湯下有重舌參煎湯下	又方用醋		
半酒盞白礬三分鐵杓內化開溫服痛即止蓋白礬有			
去熱涎之功			
沒藥散 <small>宣明方</small>	治一切心腹疼痛不可忍		
沒藥	乳香 <small>各三錢</small>	川山甲 <small>五錢炙</small>	木鱉子 <small>四錢</small>
右為細末每服半錢至一錢酒大半盞同煎溫服			
○已上數方治熱痛之劑	久則為熱		
失笑散	治心氣痛不可忍及小腸氣痛		
蒲黃	五靈脂 <small>酒研淘去砂土各等分</small>		
心痛	心法附餘卷之十五	十	
右先以醋調二錢煎成膏入水一盞煎食前熱服			
手拈散	治心脾氣痛		
草果	玄胡索	五靈脂	沒藥
乳香 <small>各等分</small>			
右為細末每服三錢空心溫酒調服			
愈痛散	治急心疼痛		
五靈脂 <small>去沙</small>	玄胡索 <small>炒去皮</small>	蓬莪木 <small>煨</small>	當歸 <small>去芦</small>
良姜 <small>炒各等分</small>			
右為末每服二錢熱醋湯調服不拘時			
一方 治九種心痛	心吐水腹脇積聚滯氣		

用乾漆二兩炒烟出為末醋糊丸如梧桐子大每服五  
七丸熱酒或醋湯下

○已上數方治血痛之劑 婦人宜此

萬應丸 治虫噉心痛

八仙丹 治虫咬心痛 俱見積聚

烏梅丸 治胃冷蛇虫攻心痛嘔吐四肢冷

烏梅 三百 黃柏 炙 細辛 肉桂

附子 炮各 黃連 十六兩 人參 六兩

蜀椒 炒去閉口 當歸 各四 乾姜 炮十兩

右為末取烏梅肉和蜜丸如梧子大每服五十丸空心

鹽湯下 心法附餘卷之十五 十一

一方

不拘新久用生地黃搗汁隨人所食多少漉麪作餅飪

或令淘食良久下虫長一尺頭似守宮不復患矣

枳榔散 治男婦心脾痛

五靈脂 枳榔 各等分

右為末煎薑蒲湯調三錢服隔夜先將猪肉鹽醃煮熟

令患人細嚼休吞了吐出却服前藥空心食前服

○廣按用肉味所以引虫頭向上用藥所以殺虫也

○已上數方 之劑

仁承氣湯 見吐血

小胃丹 見痰類

○廣按痛則不通通則不痛夫胃脘痛者或因身受寒

氣口得冷物鬱遏陽氣而不得上升也或因胃脘素

有頑痰死血阻滯氣氣而不得條達也然寒冷自外

而入初則是寒鬱久變熱熱氣自內而起始終俱是

熱也遇此証者若不分寒熱而治之若之何而能愈

乎今予將古方分作寒熱血虫四條是寒則溫之是

熱則清之是血則散之是虫則殺之庶乎臨證而不

眩惑也矣

心法附餘卷之十五 十一

腹痛 七十三

丹溪心法

○腹痛有寒 積熱 死血 食積 濕痰 脉弦食脉

滑蒼 作瀉 清痰多作腹痛台蒼蒼木香附白芷為末以

生薑汁入棗子服大法之方若此 腹痛者氣用氣藥如

木香枳榔香附枳殼之類 血用血藥如當歸川芎桃仁

紅花之類 初得時元氣未虛必推蕩之此通因通用之

法久必難壯實與初病宜下虛弱衰與久病宜升之消之

腹中水鳴是火擊動其水也用二陳湯加黃芩黃連梔

有寒而鳴者 凡心腹痛者必用溫散此是鬱結  
阻氣不運故痛 在上者多屬食食能作痛宜溫散  
之如乾姜炒蒼朮川芎白芷香附姜汁之類不可用峻利  
藥攻下之蓋食得寒則凝熱則化更無行氣快氣樂助之  
無不可者 一老人腹痛年高不禁下者用川芎蒼朮香  
附白芷乾姜茯苓滑石之類

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者是熱  
也死血痛者每痛有處不行移者是也食積者甚欲大  
便利後痛減者是濕痰凡痛必小便不利

入方

腹痛

心法附餘卷之十五

十五

微三十二

枳榔

三稜

莪朮

香附

官桂

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

茯苓

木香  
各等分

右為末神麴糊丸每服五十丸白湯下

腹痛治例

心治附錄曰凡腹痛以手不可按者屬實宜大黃芒硝下  
之實痛不可用參芪白朮蓋補其氣氣旺不通而痛  
愈甚也

凡腹痛以手重按者屬虛宜參朮姜桂之類

東垣云腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃

栝或云白芍藥口治血虛腹痛諸腹痛不可用蓋諸  
痛宜辛散芍藥酸收故也

如感寒而腹痛宜姜桂嘔者加丁香

如傷暑而腹痛宜王龍丸

如損撲損傷而腹痛者乃是瘀血宜桃仁承氣湯加當

歸蘇木紅花入童子小便并酒煎服下之

凡肥人腹痛者屬氣虛兼濕痰宜人參蒼朮白朮半夏

或曰痰豈能作痛殊不知氣鬱則痰聚痰聚則碍氣

道不得運行故作痛也

如飲食過傷而痛者氣實宜木香枳榔丸下之

腹痛

心法附餘卷之十五

十五

微三十二

如薰受素弱飲食過傷而腹痛者當補脾胃以消導宜

參朮山查麥蘗枳實木香

有全不思食其人體素弱而腹冷痛者以養胃湯仍加

桂柴芎各半錢木香三分又或理中湯建中湯皆可

用內加吳茱萸良

絞腸沙作痛以樟木煎湯大吐或白礬調湯吐之腹湯

亦可探吐宜刺委中出血

瘡下忽大痛人中黑色者多死

附諸方

王龍丸

又名黃龍丸

見中暑

食胃湯 見瘧類		理中湯 見中寒		小建中湯	
芍藥 三兩		甘草 一兩		生薑 一兩	
桂枝 兩半		膠飴 半斤		大棗 六個	
右剉每服五錢水一盞半生薑三片大棗一枚煎至八分去滓不飴膠兩匙許再煎化溫服		七氣湯 和劑方		治七情之氣鬱結于中心腹絞痛不可忍	
人參 一兩		甘草 炙一兩		半夏 湯泡七次	
肉桂 一兩		去皮		右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎七分空心熱服	
檀氣阿魏丸		治五般噎痰九種心痛痞滿氣塊冷氣攻		刺腹痛 見諸氣	
異香散 和劑方		治心腎不和腹脇膨脹飲食難化噫氣吞		酸一切冷氣結聚腹中刺痛此藥最能治之	
石連肉 去皮		甘草 炙		蓬莪朮 益智仁 炒去	
三稜 炮各		青皮 去白		陳皮 去白各	
右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚鹽一捻同煎		士芬熱服		治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛	
蟾蜍散		治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛		胸脇痛	

馳氣及婦人血氣刺痛 見諸氣		沉香降氣湯 御藥院方		治三焦痞滯氣不宣暢心腹滿	
嘔吐痰沫五噎五隔並皆治之		沉香 木香		丁香 藿香	
人參 去芦		甘草 炙		白朮 肉豆蔻	
桂花 枳實 炒		陳皮 去白		砂仁	
川姜 炮		白檀 各一兩		白茯苓 去皮	
青皮 去白		白豆蔻 各半		右咬咀每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分溫服不	
拘時		治心腹大痛甚危急者		桂靈散	
手拈散		治腹痛心痛不止 俱見心脾痛		木香調氣散 和劑方	
治氣滯胸膈痞痞惡心宿冷不消心		腹刺痛		白豆蔻仁 丁香	
檀香		木香 各二兩		藿香葉 甘草 炙各	
砂仁 四兩		右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服 又名均氣散		燒脾散	
治飲啖生冷菜果停滯中脘心腹冷痛		左見心脾痛		香脾積丸 和劑方	
治諸般食積氣滯胃膈脹滿心腹					

痛

丁香

木香火不見

巴豆去皮

高良姜

米醋煮各半兩

蓬朮二兩

京三稜二兩

青皮

洗一兩 皁角三兩 燒存性

右八百草霜三匙同碾為末麪糊丸如麻仁大每服十

丸至二十九止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯下

嘔吐藿香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺

痛淡醋湯下嘔吐菖蒲湯下小兒疳氣史君子湯下此

藥以五更初服利三五行後用白粥補

○已上諸方辛溫消散疎利之劑

腹瀉

心法附餘卷之五

七

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

已上三方治心腹痛初得時元氣未虛用

此推蕩

俱見傷寒

薤仁承氣湯

治因跌撲損傷瘀血作腹痛者

內加當歸蘇木紅花入酒童便煎服下之

方見吐血

木香枳榔丸

治因飲食一切積聚作腹痛者用此藥消

導漸去為佳

方見鼓脹

神妙列仙散

治因酒所傷以致心腹痛此藥消導最妙

見傷食

治心腹諸痛卒暴百病用此藥推逐即愈

見傷食

○已上數方辛溫消導推蕩之劑

丹溪心法

○腹中窄狹須用蒼朮

若肥人自覺腹中窄狹乃是濕

痰流灌臟腑氣不升降燥飲用蒼朮行氣香附

如瘦人自覺腹中窄狹乃是熱熱氣薰蒸臟腑宜黃連蒼朮

腹瀉

心法附餘卷之五

六

法附餘卷之十五

# 火鬱門

## 脇痛 七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛 木氣實 有死血 有痰涎注 肝急

木氣實用蒼木川芎青皮當歸之類 痛甚者肝火盛

以當歸龍會丸姜汁下是瀉火之要藥 死血用桃仁紅

脇痛

心法附餘卷之十六

一

花川芎 痰涎注以二陳湯加南星蒼木川芎 肝若急

急食辛以散之用撫芎川芎蒼木血病入血藥中行血

治咳嗽脇痛以二陳湯加南星香附青皮青黛入姜汁

脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去尖并香附之類 有

火盛者當伐肝木 左金丸治肝火 有氣鬱而胸脇痛

者看其脉沉澁當作鬱治 痛而不得伸舒者蜜丸龍會

丸最快 脇下有食積一條杠起用吳茱萸炒黃連 控

涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加桃仁泥丸服 右脇

痛用推氣散出嚴氏方 左脇痛用前藥為君加柴胡或

小柴胡湯亦可治

入方

小龍會丸

當歸

草龍膽 酒洗

山梔炒

黃連炒

川芎 各半

大黃 煨半兩

蘆會錢三

木香 錢

一方有黃芩柴胡各半兩無大黃木香

右為末入麝香少許粥糊丸如菉豆大每服五十丸薑

湯下仍以琥珀膏貼痛處 龍會丸亦治有積因飲食

大飽勞力行房脇痛

當歸龍會丸 治內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處

却以生薑汁吞此丸 痛甚者須炒令熱服

脇痛

心法附餘卷之十六

二

三

草龍膽

當歸

大梔子

黃連

黃芩 各一

大黃

蘆會半兩

木香 錢

黃栢 一兩

麝香 五分

右十味為末麝糊丸

一方加柴胡川芎各半兩 又方加青黛半兩 蜜丸

治脇痛 麝丸降肝火

抑青丸

瀉肝火

黃連 半斤

右為末蒸餅糊丸服

附諸方



<p>推氣散 治右脇疼痛腹脹不食</p>		枳殼	桂心	片子薑黃	各半兩一
<p>甘草 炙一錢</p>		<p>右為末每服二錢薑棗湯調下酒亦可</p>			
<p>枳芩散 治左脇痛刺不可忍著</p>		枳實	炒	川芎	各半兩
<p>右為末每服二錢薑棗湯下酒亦可</p>		枳實	炒	川芎	各半兩
<p>鹽煎散 和劑方 治男子婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不</p>		能已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉腸脫小腸氣婦人血氣	<p>縮砂 仁 去殼 甘草 炙 茯苓 去皮 草果 仁 煨 去皮</p>		
<p>肉豆蔻</p>		川芎	洗	茴香	炒
<p>大麥芽</p>		檳榔	良薑	枳殼	
<p>蒼朮</p>		陳皮	去白	羌活	厚朴
<p>右咬咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分去粗空</p>		<p>心溫服</p>			
<p>沉香降氣散 治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈</p>		沉香	各二錢	人參	訶子 煨 去核
<p>大腹皮</p>		枳殼	半	白木	紫蘇葉
<p>神麴</p>		麥蘖	烏藥	各一兩	陳皮 去白

甘草	炒	姜黃	各四兩	京三稜	煨	蓬莪朮	煨
益智	炒去殼	厚朴	各二兩	去皮姜製			
<p>右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去渣溫服</p>							
<p>方氣熱蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼</p>							
<p>痛氣促喘急 見喘類</p>							
<p>調中順氣丸 按粹方 治三焦氣滯水飲停積脇下虛滿或</p>							
<p>時刺痛</p>							
<p>木香 白豆蔻仁 青皮 去白 陳皮 去白</p>							
<p>三稜 各一兩 大腹子 半夏 湯泡七次 各二兩</p>							
<p>縮砂仁 煨榔 沉香 各半 兩</p>							
<p>脇痛 心法附餘卷之一下 四 二五九十六角</p>							
<p>右為末水糊丸如梧桐子大每服三十九至五十丸陳</p>							
<p>皮湯送下</p>							
<p>復元通氣散 和劑方 治氣不宣通或成瘡癰并閃對腰脇</p>							
<p>氣滯不散 方見腰痛</p>							
<p>枳殼煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇 方見氣滯</p>							
<p>一方 治脇下疼痛如神効</p>							
<p>小茴香 炒 枳殼 五錢 雙炒</p>							
<p>右為末每服二錢鹽湯調下</p>							
<p>十棗湯 治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用</p>							
<p>甘遂 芫花 煨火炒 紫色 大戟 各等分</p>							

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更加一錢量虛實加減

控涎丹 見痛風

二陳湯 見痰類

左金丸 見火類

小柴胡湯 見傷寒

琥珀膏 見積聚

○或謂予曰脇痛之証多是肝火上升不得條達之故

而局方鹽煎散沉香降氣散分氣紫蘇飲調中順氣

丸俱是辛溫之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其

脇痛

於降火未之有也病源是火而用辛溫之藥治之則

是以火濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經

有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不

善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰

流注子每度之凡左脇痛甚者即是肝火盛木氣實

也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之凡右脇痛

微者即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸等藥

辛溫之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二

証婦人多有之以其憂思忿怒之氣素鬱于中發則

上衝被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也

故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山藥從容男子之佳珍此之謂也

### 跌撲傷損

七十五 金傷

丹溪心法

○跌撲傷損須用蘇木和血黃連降火白朮和中童便煎

妙在下者可先須補接從下瘀血在上者宜飲韭汁

或和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心

即死

脇痛

入方 治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治損傷骨折及血出者

片滑石甘草為末人參湯調服次用生薑自然汁一

盞米醋一盞獨核肥皂四個敲破投於姜汁米醋中

紗帛濾過去粗入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆

可

接骨散

沒藥

龍骨 三錢

乳香 各五錢 自然銅 一兩 滑石 一兩

赤石脂 三錢 麝香 一字

右為末好醋浸浸多為上乾就炒燥為度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極効

○世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之又方

冬爪皮 阿膠 各等分

右炒乾為末以酒調飲醉為度

跌損 心法附餘卷之六

附諸方

加味芎藭湯 三因方 治打撲傷損敗血流入胃脫嘔黑血如豆汁

當歸

白芍藥 芎藭 荆芥穗

百合 水浸半日等分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散 楊氏家藏 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹悶

紫金藤皮 二兩 降真香 續斷 補骨脂

無名異 研細酒 琥珀 別研 蒲黃

牛膝 酒浸 當歸 洗焙 桃仁 去皮尖 大黃 紙裹

朴硝 研各一兩半

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即安

復元活血湯 按梓方

治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡 五錢 花粉 當歸 各三錢 紅花

甘草 各一錢 大黃 酒浸一兩 穿山甲 三錢 桃仁 五十箇酒

右咬咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以利為度

跌損 心法附餘卷之六

當歸導滯散 聖惠方

治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通浮腫痛昏悶蓄血內壅欲死

大黃 一兩 當歸 二錢 麝香 少許

右為末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒調下或以酒煎服亦可

雞鳴散 治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃 酒浸 桃仁 七粒去 當歸尾 五錢

右為末酒一碗煎去粗五更雞鳴時服取下惡血即愈若氣絕不能言急以熱小便灌之即醒

奪命散 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血

凝積心腹疼痛大小便不通

大黃

黑牽牛各二錢 用石炭慢火炒

右為末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡為愈

○已上諸方辛涼疎導瘀血之劑

花藥石散

和劑方

治一切金刃所傷打撲傷損身體出血

者急於傷處搽藥其血自化為黃水如有內損血入臍腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立効若牛臍腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線縫合肚

跌損

心法附餘卷十六

九

蘇合香

皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮用生麻線亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃

黃色明淨者四兩 搗為粗末

花藥石

一兩 搗為粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一個候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠疊周圍自己午時從下着火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了羅極細磁盆內盛依前法服

浸藥降聖丹 和劑方 治打撲閃肋筋斷骨折緊急疼痛不

能屈伸及管衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩從皮

肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力並皆治之

自然銅 火煨醋淬十二次 川烏頭 生去骨碎補 去毛

白芍藥 沒藥 別研 乳香 別研 當歸 洗焙各

生乾地黃 川芎 各一錢半

右並生用為細末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和丸每一兩作四九每服一九槌碎水酒各半盞入蘇木少

許同煎至八分去蘇木熱服空心食前服

治打撲內損筋骨疼痛 本事方

跌損

心法附餘卷十六

蘇合香

沒藥

乳香

芍藥

川芎

川椒 去目及當歸各半 自然銅 炭火燒

右為末黃蠟二兩浴開入藥末不住手攪勻丸如彈子

大每服一九用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥霎時連

進有効

乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香

沒藥

川芎

白芷

芍藥

甘草

牡丹皮

生地黃

石為細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散 御藥院方 治打撲損傷痛不可忍

白朮 <small>兩對五</small> 當歸 <small>倍</small> 白芷 沒藥 <small>別研</small>	肉桂 <small>去皮</small> 乳香 <small>別研</small> 甘草 <small>炒各一兩</small>	右為末入研藥并研令勻每服二錢溫酒調下不拘時	乳香黃耆散 <small>應驗方</small> 治打撲損傷筋骨及瘡腫癰作疼	乳香 <small>五錢</small> 沒藥 <small>五錢</small> 黃耆 當歸 <small>酒浸</small>	赤芍 川芎 甘草 麻黃	陳皮 <small>各一兩</small> 粟殼 <small>炒去頂蒂蜜</small> 人參 <small>去芦</small>	右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去渣	溫服	接骨散 <small>和劑方</small> 治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可	跌損 <small>心法附餘卷之十六</small> 土	忍若此藥能接骨續筋止痛活血	定粉二錢 當歸二錢 鵬砂二錢	右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯	補損當歸散 <small>和劑方</small> 療墜馬落車傷腕折臂呼吸疼痛連	進此藥其痛即止筋骨接續	澤蘭 <small>炒</small> 附子 <small>泡去皮臍</small> 當歸 <small>炒</small>	蜀椒 <small>炒出</small> 甘草 <small>炙</small> 桂心 <small>各二分</small> 川芎 <small>炒六分</small>	右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水	菰菜	治打損接骨方 <small>本事方</small>
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	-----------------------------------------	------------------------------	---------------	----------------	-----------------------	-----------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	---------------------------

接骨木 <small>半兩</small> 乳香 <small>五分</small> 赤芍 川當歸	川芎 自然銅 <small>各一兩</small> 煅醋淬十二次	右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫眾手丸如龍眼	大如只打傷筋骨及悶胸疼痛者用藥一九好陳酒一	盞浸化藥蒸熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後	服食	治打撲損傷骨折 <small>百一選方</small> 此藥專能接骨	夜合樹俗謂之萌葛即合歡花越人謂之烏鰲樹	去粗皮炒 芥菜子 <small>炒一兩</small>	右為末酒調二錢澄清臨卧服又以粗滓瘡瘡上扎縛	跌損 <small>心法附餘卷之十六</small> 土	治打損骨折損斷 <small>經驗方</small> 服此藥自頂心尋病至下兩手	遍身遇受病處則呱呱有聲覺藥力習習往來則愈矣	乳香 沒藥 蘇木 降真香	松明節 川烏 <small>去皮</small> 自然銅 <small>火煨醋淬七</small>	龍骨 <small>半兩</small> 地龍 <small>半兩</small> 水蛭 <small>油炒</small> 血竭 <small>三錢</small>	土狗 <small>十個</small> 油浸 <small>乾為末</small>	右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下	食前服	治打撲傷損 <small>經驗方</small>
---------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----	------------------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------	-----	--------------------------

用胡孫姜研爛取汁以酒煎服渣傳傷處

接骨散 張子方 并治惡瘡

金頭蜈蚣 一個 金色自然銅 半兩 燒紅醋末用乳香 一錢 研

銅錢 重半兩者或二文或五文燒紅醋末用乳香 一錢 研

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打

勻又入前藥接骨散半錢再用銀釵子打成膏子用

鷄翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便効

如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴

跌損 心法附餘卷之十六 主

末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接定

不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方累經効驗

不可具述

神聖接骨丹 治打撲傷損跌折肢體

水蛭 用糯米炒去米三錢 兔絲子 髮灰

好綿灰 沒藥 乳香 血竭 各一錢

半兩錢 一文燒七次醋 射香 一錢

右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下

空心服約車行六七里聞骨作聲忌聽鐘鼓砧杵之聲

震動恐生蘆節忌食驢肉一服見効

續股散 治折傷筋骨

用半兩錢七個以桑柴火燒紅好醋內淬之取錢上碎

末再入珍珠末一分乳香沒藥少許同研極細好酒調

服

接骨散 治跌撲閃胸骨折疼痛

麻黃 燒灰 頭髮 燒灰 乳香 五錢

右為末每服三錢溫酒調服立効

茴香酒 直指方 治打墜肢體凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙 炒 茴香 炒 辣桂 各一錢

右為末每服二錢食前熱酒調服

跌損 心法附餘卷之十六 主

木香調氣散 治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香 各二錢

藿香 甘草 各一錢 砂仁 四錢

右為末每服二錢加紅曲末少許童子小便同酒調空

心熱服如無紅曲紅酒亦可

應痛丸 經驗方 治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼朮 一斤 破故紙 一斤半 骨碎補 一斤

舶上茴香 穿山甲 去膜去灰煨亦可

生草烏 一斤 如麥大

右除草烏一斤用生蔥二斤連皮生薑二片搗爛將草

烏一處淹兩宿焙乾連前藥一處焙為細末酒煮麵糊  
九如梧桐子大每服

五十九酒湯任下忌熱物

○已上諸方辛溫散痛接骨之劑

乳香消毒散 即藥院方 治一切傷折跌厥腫痛疼不可忍

乳香另研沒藥另研白飲 白芍藥各一兩 白芥子

當歸各半 黃柏另研細末二兩 骨石二兩 黃丹三兩加血竭

右為細末入另研者一處再另研勻每用新水調如

稠膏推在紙花上貼患處

烏金散應驗方治打撲損傷敷藥

跌損 心法附餘卷之十六

用小黃米粉四兩葱白細切一兩同於砂鍋炒至黑色

杆為細末

用好醋調成膏子攤在紙上貼於損傷病處後用杉木

皮或板以紙包裏四面用絹袋扎縛不可動搖三

日一換內服前接藥

一方

用葱白砂糖二味相等爛研傳之病立止且無癰痕

治打撲傷折手足

用葉豆粉新鉄鍋內炒令索色用新汲井水調稀厚傳

損處以紙將杉木片縛定立効

馬散 心法附餘方 治折傷接骨

栢葉 生少 皂角 生多 骨碎補 去毛 荷葉 生各等

右為末於折傷處入原位以姜汁調藥加糊攤在紙

上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令搖動三

五日後開看以溫葱湯洗之後再貼藥復加七日如痛

甚加沒藥

治打傷損 醫方大成

南星 白芷 半夏 白芨

黃柏皮 赤小豆 各等分

右為細末姜汁調傳患處蜜糖亦好

跌損 心法附餘卷之十六

沒藥散 拔粹方 專治箭傷止血定痛

定粉一兩 枯白礬二錢 另研 乳香 另研各

風化石灰 一兩

右各研為末和勻糝上

治諸般打撲傷損皮破血出痛不可忍若

右用赤石脂研末傳之効

金絲膏藥 應驗方 治打撲傷損閃肭疼痛風濕氣痛

當歸 川芎 蒼朮 香白芷

赤芍藥 木鱉子 大黃 草烏頭 各半

香油 四兩 瀝青 半斤 松香 半斤 乳香 二錢半

沒藥 二錢半

右前八味同香油四兩熬去粗瀝青松香着熬軟硬冬  
軟夏硬夏乳香沒藥攤膏藥特用之

立應金絲膏 經驗方

當歸尾 香白芷 杏仁 草烏 生剉用

猪牙皂角 不經者去 葱連葉肥者十莖

白膠香 三錢 瀝青 八兩 黃蠟 一兩 乳香 另研末

沒藥 另研末 清油 七兩

右將前項六味入清油內依法熬濾去粗入白膠香瀝

青鎔化攪勻入黃蠟又攪勻待冷入沒乳末攪勻

跌損 心法附餘卷之十六

至聖黑龍膏 御藥院方 治一切筋骨損傷疼痛

米粉 四兩於鐵器內炒成塊子 乳香

沒藥 研細各

右研極細每用以好酒或醋調如膏攤在紙花上貼患

處

一方 治跌撲損傷及金刃兩傷 此藥止血散痛消腫

風化石灰 重難過半兩五月五 海螵蛸 半兩

老松香 血竭 輕粉 乳香

沒藥 黃丹 飛過 無名異 去土 松白脂 去皮各

右為極細末濕者乾粉乾則水調蜜調傳患處

淋瀝頑刺散 治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荊葉 一兩 蔓荊子 白芷 細辛 去苗

防風 去芦 川芎 桂心 丁皮

羌活 各一兩

右為末每用一兩鹽半匙葱白連根五莖漿水五升煎

七沸去渣通手淋瀝痛處冷即再換宜避風

○已上諸方外治傳貼之劑

疥瘡 七十六 附天庖瘡 楊梅瘡凍瘡  
脚上爛瘡 頭面瘡

丹溪心法

疥瘡 心法附餘卷之十六

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根稍

用及引經藥則可 又云諸瘡以當歸黃連為君連翹甘

草黃芩為佐 諸痛痒瘡瘍屬火若稟受壯盛宜四物加

大承氣湯下之 若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜

四物加黃連黃芩大力子甘草在下焦者加黃柏 若肥

胖之人生瘡而痛乃是濕熱宜防風羌活荊芥白芷蒼朮

連翹取其氣能勝濕

○諸瘡藥 膿稟治熱燥濕為主用無名異 乾疥開鬱

為主用吳茱萸 虫瘡如癰狀退熱殺虫為主用蕪荑黑

狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺虫樟腦松香退熱 頭上多



<p>加黃連方解石蛇床定痒殺虫松皮炭主膿腫多者加 白芷開鬱痛多加白芷方解石虫多加煎蘆班猫 痒多加枯礬陰囊加茱萸濕多香油調乾痒出血 多加大黃黃連猪脂調紅色加黃丹青色加青黛 虫多加錫灰蕪荑栝柳在上多服通聖散在下多須用 下脚腫出血分濕熱用藥</p>		<p>入方瘡有三種 膿泡瘡治血為主</p>		<p>黃芩黃連大黃各三蛇床 寒水石三黃丹五分白礬一錢輕粉少許 疥瘡心法附餘卷下木香少許痛 白芷五分無名異少許木香少許痛</p>		<p>右為末油調傳 沙瘡</p>		<p>蕪荑二錢剪草二錢蛇床三錢白礬 吳茱萸黃柏各一蒼朮厚朴 雄黃各五分寒水石二錢輕粉十貼</p>		<p>右為末油調傳 疥瘡藥春天發瘡疥開鬱為主不宜抓破傳 白礬吳茱萸各二樟腦五分輕粉一盛 寒水石二錢蛇床三錢黃柏大黃</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------	--	----------------------	--	----------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------	--

<p>研黃各一栝榔一個 右為末香油調傳</p>		<p>又方 蕪荑白礬枯軟石膏大黃 樟腦各半兩管仲蛇床研黃 雄黃各二錢半</p>		<p>右為末香油調須先洗瘡去痂傳之 一上散 雄黃三錢寒水石一兩蛇床白膠香 黑狗脊各一黃連半兩研黃三錢半吳茱萸三錢 疥瘡心法附餘卷之十六 白礬枯五班猫去翅足</p>		<p>右研黃雄黃寒水石另研如粉次入班猫和勻蛇床狗 脊等為極細末同研勻洗瘡令湯透去痂用臘猪油調 手心中擦熱裏中嗅二三次却擦上一上即愈如痛甚 腫滿高起加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒 只加蛇床子如瘡中有虫加雄黃如喜火炙湯洗加研 黃只嗅不止亦可愈也</p>		<p>附諸方 四物湯見補損 大承氣湯見傷寒</p>	
-----------------------------	--	-----------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------	--

升麻牛旁子散		治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於頭面胸膈之際	
升麻	牛旁子	甘草	桔梗
葛根	玄參	麻黃	連翹 各一錢
右咬咀姜二片水二盞煎一盞服			
升麻和氣飲	治瘡腫癰疥痒痛增寒發熱		
甘草	陳皮 各一兩半	芍藥 七錢半	大黃 半兩 煨
乾葛	蒼朮	桔梗	升麻 各一兩
當歸	半夏	茯苓	白芷 各二錢
乾姜	枳殼 各五分		
疥癩	心法附餘卷之十六 主		
右咬咀每服一兩水煎服			
加味羌活散	三因方 專治四氣外搏肌膚發為癰疹增寒發熱燥痒		
羌活	前胡 各兩	人參	桔梗
茯苓	甘草 炙	枳殼 麩炒	川芎
天麻 各半兩	蟬蛻 各一錢	薄荷 各三錢	
右咬咀每服五錢水一盞姜三片煎七分溫服			
當歸飲子	治內蘊風熱發為瘡疥濕癬濕毒燥痒瘡		
當歸	白芍	川芎	生牛
白蒺藜	防風	荆芥 各一兩	何首烏

黃耆 甘草 各半					
右咬咀每服一兩水煎或為末每服一二錢亦得					
苦參丸 御藥院方 治肺受熱毒遍身生瘡					
用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十九空					
心米飲下					
○已上諸方內消之劑					
輕粉散		寒水石 一斤	硫黃	朴硝 各二兩	松香 五兩
枯礬 二兩 輕粉 五錢					
右為細末香油調搽					
瘡癰 心法附餘卷之十六 主					
硫黃散		硫黃	川椒	石膏	白礬 等分
右為細末香油調搽					
立効散		全蝎 三十枚	巴豆 三十粒	皂角 七箇	炒焦
右為粗末以清油四兩熬至焦黃色去粗次入大楓子					
蛇床子白礬末各一兩黃蠟二兩同熬成膏以磁器收					
貯任意搽瘡					
一方					
白芷白礬各等分為細末入硫黃少許以香油調搽					

治諸般疥癩瘡藥

蛇床子一斤 大楓子取肉 白礬五兩為末

末一兩

右用油半斤調搽小兒頭瘡少加松香輕粉

水銀膏

大楓子取肉 輕粉一錢 水銀要茶研不

樟腦二錢 礬生熟二錢

右先將楓肉研膏次入餘藥勻臘月猪脂和稀用絹布

最任意搽

又秘方

疥癩心法附餘卷之十六

黑狗脊 蔞茹 藁本 蛇床子

硫黃 井泉石 剪草 百部

藜蘆各等分

右碾為細末用香油搽手心內搽鼻聞之

一方 治疥癬諸瘡

雄黃五錢 樟腦五分 大楓子取肉 斑猫去足翅

狗脊 蛇床子 寒水石 硫黃各五錢

右為極細末疥瘡用柏油調搽癬瘡用柏油調搽亦可

治疥瘡

大楓子 杏仁各十粒

右同羊脂搗勻絹裹火烘油出搽之

胡粉散治一切瘡癬癢甚者

胡粉一分 砒霜半分 大草烏生用 蝎梢七枚

雄黃各另研 斑猫一枚 射香少許

右為末先用羊蹄菜根蘸醋搽動次用少許藥搽患處

如意散宣明方 治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸 牛旁子 荆芥穗各二錢半 輕粉五分

信砒二分 牡蠣半兩

右為細末研勻每臨卧時抄一錢油調遍身搽摩上一

半如後痒不止更少旋塗之服解之開關香悉愈

又治疥藥方

蜜陀僧 蛇床子 硫黃 枯礬

胡椒各等分

右為細末香油調傳

○已上諸方外散之劑

丹溪心法

○天庖瘡 用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒蜜調傳極

妙 從肚皮上起者是裏熱發於外也還服通聖散見斑

疹類

楊梅瘡

新增

附諸方

治楊梅瘡方

硃砂 二錢

雄黃 半錢

苦參

荊芥穗

天麻

麻黃

牛旁子

面粉

槐角子 錢各三

右為細末用糖心雞蛋為丸梧子大每服三十九丸用鷄湯或羊肉湯送下一日一服表出毒氣再不服忌一月

房室神効

又方

土茯苓 四兩

牙皂

地骨皮

五加皮

疥癬

白鮮皮 兩各一

心法附錄卷之十六

主治

右作二十服用燈草車前子為引子煎服

又方

冷飯團 一斤一名

白芍

五加皮

白鮮皮

防風

木瓜 各一

皂角子

白丑 各三

生地黃 酒洗

地骨皮

牛膝 去芦

黃連 去須

槐花

川芎

尋風藤

威靈仙

白茯苓

杜仲 炒斷

白芷

當歸 酒洗

甘草 炙半

荊芥穗 兩半

右剉作二十服每服水一鍾半酒半鍾共煎至一鍾飯

後溫服服動此藥可用後又開薰楊梅瘡藥並治

又方

當歸

連翹

羌活

荊芥穗

薄荷葉

枳殼

黃柏

茯苓

車前子

防風

木通

芍藥

川芎 頭上用

山梔

桔梗

天花粉

蔓蚤

白芷

甘草

金銀花

獨活 兩各一

柴胡

前胡 各半

右咬咀作二十服每服用水二鍾煎至八分溫服上多

食後服下多食前服服此仍用薰藥並治

疥癬

心法附錄卷之十六

主治

溫酒

薰楊梅瘡方

雄黃

沉香 各三

乳香

沒藥

硃砂 各五

血竭 各三

黑鉛

水銀 各一

右為末均作紙撚七條用香油點燈放床上令病人兩

腿抱住上用單被通身蓋之口噙冷水頻頻換之則不

損目頭一日用三條後每日用一條薰之有効

又方

水銀

板硃

黑鉛 各二

白蛇 一錢

右研為末作紙撚七條頭一日用三條後每日用一條

用香油點燈放兩腿單被連頭蓋了口噙冷水頻換

治楊梅瘡後腫塊方

冷飯團兩十五 防風

木通 薏苡仁

防已

茯苓

金銀花

木爪

白鮮皮

皂角刺錢五

白芥子四錢

當歸身七錢

右作三十服每服用水鍾半煎至八分空心午飯前晚飯前各一服忌魚鷄生冷房事及煎炒茶酒十餘日立効如虛弱人加人參五錢其妙不可盡述

一方 專治年久楊梅頑瘡

水花硃

一錢 枯礬

硃砂各一錢二分

三味共研細末用全蝎酒煎膏為丸作六九分作三日服用羊肉鮮魚等湯送下九日全好

一方 治楊梅癰

柏油二兩

全蝎三個

蜈蚣一條

鉛粉一兩

右先將香油二兩煎全蝎蜈蚣待焦去渣次入柏油鉛粉柳條攪勻梘成餅子照瘡大小攤貼二日一換九次全好

一方 治楊梅瘡漏瘡

用大鷄甲一個去肉湯洗淨加刺蝟皮一個象手末三錢共為細末棗肉為丸如櫻桃大每服一丸空心童子小便送下服七日後仍用三味末猪膽汁調傳

丹溪心法

○凍瘡 用煎熟桐油調蜜陀僧末傳

丹溪心法

○脚上爛瘡久不愈 先以豆腐漿水洗二三次懸鉤粗葉地幕粗葉搗細入鹽漿少盆之

附諸方

治凍瘡 百一選方

用茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

治手足皸裂 百一選方

瀝青二兩黃蠟一兩共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗

令皮軟拭乾將藥於慢火上畧炙擦傳

治手足皸裂春夏不愈者 瘡藥方

生薑汁

紅糟

鹽

猪膏臘月者佳

右研爛炒熟擦入皸內一時雖痛少頃使皮軟皸合再擦即安

治脚跟皸

用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯泡洗皸裂令軟拭乾傳其上即安 一方加米粉

又方 醫方大成

用五倍子為末同牛骨髓填縫內即安

治手足裂 張子和方

用白芨不拘多少為末水調塗裂處

治脚指縫爛瘡

宰鷲時取鷲掌黃皮焙乾燒灰存性為末濕則搽之

治脚指縫爛瘡及因暑手抓兩脚爛瘡

用細茶口嚼碎爛塗之鮮熱燥濕其瘡立愈

神應散 治脚指濕爛

枯礬 六錢 黃丹 五分

右為細末乾糝患處經夕立瘥

○頭面瘡 新增

附諸方

摩風膏 聖惠方 摩風止痒消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡

肌肉裂痛者悉治之

沉香 白附子 木香 獨活

白斂 白芨 天麻 各一錢半 當歸 共一錢

白芷 檀香 零陵香 藿香

杏仁 去皮 桃仁 去皮各三錢 茅香 甘草

防風 白芍 各一錢半 川芎 木通 各一錢

黃耆 龍腦 研四錢 半夏 十二兩 清油 一斤二兩

黃蠟 冬月用九兩 大瓜蔓 連蔓一箇剉碎

右剉用油浸七日於石器內慢火煎候白芷微黃色以

白綿濾去渣放淨罐內密封澄一宿再濾過於上等磁

碗中慢火再輕溫動次下黃蠟攪勻放溫次下研細龍

腦糝面於磁盒內盛定每用少許摩患處

治頭面生瘡燥痒黃水出

蜜陀僧 硫黃 各二錢 輕粉 少許

右為末酥油調搽

一方 治白禿瘡

用金頭蜈蚣一條皂角不蛀一箇劈開去皮弦以蜈蚣

納入夾內以麻絮緊沉於糞缸底七日取出焙乾碾為

細末先以溫湯將瘡浸洗濕潤然後敷之如乾以清油

調搽數次除根

一方

用熟皮烟膠一兩輕粉一錢研勻調搽又法用枯白礬

同烟膠調搽亦佳

禿瘡藥

輕粉 五錢 黃蠟 二兩

右用鷲油一二兩調搽

治小兒禿瘡 聖惠方

用淡豆豉一合炒令烟出色燻為末用飯飲調屋塵一

團於炭火內煨令灰燼並細研入輕粉少許油調刺頭

了捺之 一方治頭瘡無屋塵 一方有射香無輕粉

治面上耳邊浸淫瘡聖惠方有黃水出久不愈各香辨瘡

殺羊鬚 荊芥 乾棗去核各二錢

右燒存性入膩粉半錢同研末先用溫水洗香油調塗

王粉散 治熱汗浸漬頭面及遍身成瘡腫痒焮痛

定粉一兩 蛤粉九兩 石膏 白石脂各半

滑石八兩半 粟米粉 寒水石燒出火毒各二兩

白龍骨半兩 瘡癰心法附餘卷之十六

右為末研令極細每用少許乾擦患處

# 癰疽 七十七 附腸癰 乳癰

## 丹溪心法

○癰疽只是熱勝血 六陽經六陰經有多氣少血者有

少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處

近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟少

陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡

久未合必成死証遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不

旋踵 陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細

滯以寒治之陰滯以熱治之 人中年以後不可

有痛腫參之脉症但見虛弱便於滋補氣血可保

用尋常驅熱拔毒紆氣之藥虛虛之過如指諸掌 內托

之法河間治腫焮于外根盤不深形證在表其脉多浮病

在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托以救其裏宜復煎

散除濕散鬱使胃氣和而平如或未已再煎半料飲之如

大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復

煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也然世俗多

用排膿內補十宣散若用之於癰小瘡與冬月時令即可

若潰瘍於夏月用之其桂枝之溫散佐以防風白芷吾恐

雖有參耆難為倚仗 一婦年七十形實性急而好酒腦

生疽繞五日脉緊急且瀉急用大黃酒煨細切酒拌炒為

末又酒拌人參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得腫而

上半身汗睡覺病已失此內托之意 又一男子年五十

形實色黑背生紅腫及脾骨下痛其脉浮數而洪緊食亦

嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附瓜蒌子甘草節

羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此正內托之法

非精要內托散乳香秦艽等藥想此方專為服丹石而發

症者設不因丹石而發恐非必用之劑 瘡先發為腫氣

血鬱積蒸肉為膿故其痛多少瘡之始作時也膿潰之後

腫退飢寬痛必漸減而反痛者此為虛宜補亦有穢氣所觸宜和解風寒逼者宜溫散

入方

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破當養血初腿腫以人參黃連茯苓各二錢瓜蒌子四十八粒作二貼入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮作黃柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條子苓體虛者加牛膝以生甘草為使大料煎入姜汁帶

癰疽

心法附錄卷之十六

主三

癰疽

辣食前飲之病深者恐木相桂枝十數貼發不動加少麻黃二三貼又不動恐癰將成矣急掘地坑以火煨紅沃以小便赤體坐其上以被席圍抱下截使熱氣熏蒸腠理開氣血暢而愈

鐵圍散 治癰疽腫毒

乳香

沒藥半兩

大黃

黃柏

黃連

南星

半夏

防風

角皂刺

木鱉子

瓜蒌

甘草節

草烏

阿膠各一兩

右為末醋調成膏砂石器內火熬黑色搗鋼傅之

諸般癰疽傳上消散

乳香

沒藥各三錢

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃柏

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌

阿膠

皂角刺各五錢

右為研細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

團藥鐵井欄

貝母

南星各七錢

連翹

五倍子

經霜芙蓉葉各一兩

右為細末用水調傳四向腫處止留中間一竅出毒氣

隔皮取膿治

心法附錄卷之十六

主三

癰疽

驢蹄細切

一兩

蕎麥麵

一兩

白鹽半兩

草烏四錢

去皮

右為末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末醋調成膏用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫自退

騎馬癰

大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草泔焙水盡為末入皂角炭少許作四服湯調頓服効

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用

敷疽癰方



草烏	黃連	紫金皮	白芷
大黃	芙蓉皮	朴硝	稷米 <small>各等分</small>
右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雄黃末圍定瘡穴大小前後數前藥末			
取朽骨 久疽及痔漏者愈之			
取烏骨雞脰骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火煨通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙燃送入孔中竅內更用膏藥貼之			
便毒			
山梔子	大黃	乳香	沒藥
<small>瘡疽 心法附餘卷之十六 二百三十一</small>			
當歸 <small>各半錢</small>	瓜蒌仁 <small>二錢</small>	代赭石 <small>一錢</small>	
右作一服煎			
又方			
木鱉子	大黃	瓜蒌仁	桃仁
<small>草龍膽<small>各等分</small></small>			
右咬咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈			
又方			
白殭蚕槐花為末酒調服 一方加酒大黃			
附諸賢論			
河澗宣明論曰人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕			

之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所乘脾氣濕而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根結壅盛則為膿赤核腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒則為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也痒者美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炙之以火潰之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越拂熱內作故也瘡痒皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉菓菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癰疹也瘤氣赤瘤丹燥熱勝氣火之色也

附脉理

脉訣舉要曰癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脉數發熱而疼者陽不數不熱不疼陰瘡發癰之脉弦洪相搏細沉而直肺肝俱數

附諸方

狗寶丸 濟生方 專治癰疽發背附骨疽諸般惡腫將發時  
先覺口中煩渴四肢沉重遍身壯熱乃其候也此藥功  
効不可具述

蟾酥 一錢 金頭蜈蚣 七條全者 輕粉

雄黃 滴乳香 沒藥 烏金石 即石炭

狗寶 一錢 又云一兩 狗膽 一箇乾者用之 去

鯉魚膽 一箇乾者用 粉霜 黃蠟 各三

硃砂 半兩 射香 一分 孩兒乳 一合頭

鉛白霜 一錢 本無此

右先將乳汁黃蠟放在罐內文武火化開次將各藥末  
癰疽 心法附餘卷之十六 三

和成劑用時大人丸菴豆大小兒丸芥子大每服三九

病重者加至五九用白丁香七個研爛新汲水調送下

腰以下食前服腰以上食後服如人行五里用熱葱白

粥投之即以衣被蓋定汗出為度已後只喫白粥常服

十宣散留頭其四邊以烏龍膏

烏龍膏 濟生方 治一切腫毒癰疽收赤暈

木驚子 去殼 半夏 各一 水粉 四兩 草烏 半兩

石於鐵鉋內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調

傳瘡四邊留頭出毒氣

追毒丹 濟生方 治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服狗寶丸

次貼烏龍膏收腫解毒去赤暈然後用針刀開瘡納追  
毒丹覆以乳香膏使之潰去敗肉排膿然後用生肌藥  
白丁香 一錢 雄黃 二錢 巴豆 七粒去殼磨心  
黃丹 二錢 輕粉 一錢 不去油研如泥

右研和加白麯三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納之上  
覆以乳香膏追出膿血毒物痛瘡四壁死肌不去不可  
治者亦以此法追毒去死肌生新肉疾小者一粒大者  
加用之

乳香膏 濟生方 追膿血消惡毒

木驚子 去殼 當歸尾 各一 柳桂 七八寸

癰疽 心法附餘卷之十六 天

此已上用清油四兩慢火煎令黑色次用

白膠香 明淨者四兩共研細 乳香

沒藥 各半兩 入油變色以綿濾之

右再治淨鐵鉋又傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩

半以兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起手

下直待注在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅

傾在水盆中出火毒搜成劑收之過用以絹帛攤貼

桃花散 宣明方 一切瘡生肌藥

白芨 白斂 黃柏 黃連

乳香 另研 射香 另研 黃丹 各等分

右為極細末糝在瘡上二三日生肌平滿

○已上諸方治癰疽次第之劑如無狗寶丸以

內疎黃連湯 治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便燥結脉洪

實者

黃連 芍藥 當歸 枳榔

木香 黃芩 梔子 薄荷

桔梗 甘草各一兩 連翹二兩 大黃二兩半

右咬咀每服一兩入姜煎

秘方奪命散 治一切癰疽無名惡瘡皆可治之其効不

可盡述

當歸尾 乳香各一錢 穿山甲用蛤粉炒黃

皂角針燒 陳皮 金銀花各三錢 貝母一錢

赤芍 甘草節各六錢 沒藥二錢 花粉八錢

防風 白芷各五錢

右咬咀每服一兩用無灰酒一大碗煎至半碗紙糊口

勿令走氣病在上食後服病在下食前服

當歸消毒散 應効方 治癰腫初發

荊芥 牛旁子 甘草 防風

當歸 赤芍各半錢

右用水二盞煎至八分去渣溫服食後

神仙活命飲 治癰疽發背發腦發髀發脇癰毒騎毒腫

肚癰腿癰附骨癰疽惡瘡惡漏瘡血塊氣塊面目手足

浮腫隨病加減並皆治之

金銀花一兩 皂角針一兩 貝母去心 天花粉各四錢

當歸尾 滴乳香 大黃各五錢 沒藥

木鱉子去殼 甘草 穿山甲川蛤粉炒

赤芍各三錢 防風去芦 香白芷各二錢 橘皮去白一錢半

右每服五錢水煎服若老人及體虛者加生黃芪半兩

若臟腑閉澀者服九寶飲量病上下服之

九寶飲

當歸 白芷 甘草 瓜蒌

黃芩 生地黃 赤芍 熟地黃

川芎各等分

右每服五錢水酒共一鍾半煎病上下食前服食後服

九珍散 簡易方 治一切癰疽瘡癰腫毒因邪壅血熱而生

者 赤芍 白芷 當歸 川芎

大黃 甘草 生乾地黃 瓜蒌

北黃芩各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣熱服每治乳癰及疔瘡

赤芍藥散 治一切惡瘡癰疽疔腫初覺不消增寒疼痛

金銀花 赤芍藥各半 大黃半錢 當歸

枳實 甘草各三錢 大瓜蒌一個

右每服五錢水酒各一鍾不拘時溫服

玄參散 治癰疽腫痛不進飲食

玄參一兩 升麻 射干 大黃各五錢

甘草二錢

右每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時溫服

懸壺散 治發背惡瘡

懸壺一個 大黃 金銀花 皂角刺各一兩

當歸半兩

右剉碎每服五錢酒一碗煎七分去渣溫服如有頭者

加鼠黏子

消毒湯 德生堂方 一名紫花地丁散治惡瘡膿已成未成

者腫大等証

紫花地丁 金銀花 當歸 大黃酒浸

赤芍 黃耆各半 甘草一錢 加升麻

右剉為末作二服每服酒一碗銀石器煎五分服

當歸連翹散 治一切風熱癰腫瘡疽咽膈不利舌

腫喉閉鼻衄出血咳嗽痰實腸胃燥澀大小便結滯消

癰腫解風毒活血脉保真元宜通遍身結滯

連翹 當歸 大黃 梔子

芍藥 金銀花

右各等分每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞去渣

熱服甚者加大黃

一方治發背惡瘡

瓜蒌一個 金銀花 皂角刺各一錢 沒藥一錢

甘草節 當歸各半兩

右每服五錢以酒一碗煎至半碗溫服加鼠黏子更佳

治七十二種無頭惡瘡

荆芥 梔子各二錢 茯苓 白朮

人參各三錢 川芎 芒硝 大黃

當歸 芍藥 升麻 薄荷

蒼朮 連翹 石膏 桔梗

滑石 黃芩各半 黃耆 甘草各二錢

右咬咀病重者一兩病輕者五錢葱白一根并金銀

花同煎去粗熱服汗出為度如痛加乳香咽喉痛加竹

葉燈心同煎

藤黃飲子 秘方治一切疔腫惡瘡癰疽疼痛

大黃 四兩 甘草 茯苓 牡蠣 主用各一兩

人參 川芎 梔子 赤芍

金銀花 各半 木香 白芷 各六錢 當歸 七兩

右咬咀每服八錢水二盞煎至一盞溫服

加減藤黃飲子 應驗方治一切癰疽瘰癧

金銀花 黃耆 赤芍 薄荷

羌活 大黃 當歸 石膏

連翹 麻黃 白朮 白茯苓 各八分

黃芩 桔梗 山梔子 一分二厘半

荆芥 心法附錄卷之六 防風 川芎 各八分

人參 二分 滑石 一分七厘半 芒硝 二厘半

右用水二盞生薑三片煎至一盞去渣食後溫服

漏蘆湯 治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧丁腫魚睛五發

瘰癧初覺三日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱大便秘小便赤黃宜服之惟妊娠忌服

漏蘆 白斂 黃芩 去心 麻黃 去節

枳實 炮炒去穢 升麻 芍藥 甘草 各一錢

大黃 二錢 朴硝 一錢

右作一服姜三片水二鍾煎一鍾空心熱服

千金漏蘆湯 精要治証同前

漏蘆 連翹 黃芩 白斂

枳殼 去穢 升麻 粉草 炙 麻黃 去根節

大黃 一錢半 升麻 一錢

右作一服用水一盞半煎至八分去渣空心熱服

解毒丸 通玄論治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬

牙羈憊一切熱毒宜治之方見火類

○已上諸方辛涼內疎之劑

內托復煎散 機要癰疽托裏健胃

地骨皮 黃芩 茯苓 白芍

人參 黃芪 白朮 桂

甘草 防已 當歸 各一兩 防風 三兩

右咬咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入前十

二味再煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之又煎

蒼朮和湯去粗依前又煎十二味相分飲之

神效奪命丹 治一切發背丁瘡及破傷風陰証傷寒

枯礬 一錢 蝸牛 二十箇 血竭 二錢 銅綠 一字

蟾酥 一錢 輕粉 二錢 硃砂 三錢 烏

右用小兒母乳汁和丸如梧桐子大硃砂為衣遇此病

令患人自嚼生葱二三根爛吐出裹藥一丸在內吞下  
前藥恐藥未嚥逆之狀却以熱酒二三盃送如重車行  
十里路通身汗出天氣斟酌衣被蓋易汗出毒氣腫自  
消如病人昏沉代嚼葱白如前服

淵然真人奪命丹 專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一  
切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成  
者服之立愈此乃惡証藥中至寶病危者服之亦可矣  
萬無一失不可輕易

蟾酥二錢乾者  
老酒化

血竭 一錢

乳香

沒藥

銅綠

硃砂各二錢  
以各輕粉五分

癰疽

心法附餘卷之十六

聖藥

腫毒

寒水石各一錢

雄黃 三錢

射香 五分

腦子五分無  
亦可

蝸牛二十一箇  
連殼用

蜈蚣一條酒浸炙  
黃去頭足

右為細末將蝸牛研作泥和前藥為丸如菉豆大若丸  
不就以好酒煮麩糊為丸每服只二丸先用葱白三寸  
令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子裹在葱白內  
用無灰熱酒三四盃送下於避風處以衣被蓋覆約人  
行五里之久再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗出為  
度如汗不出重者再服二丸汗出即効初覺者二丸即  
消三五日病重者再進二丸如疔瘡走黃過心者難治  
汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗爛裹藥仍以熱酒

吞下瘡存上食後服瘡在下食前服後忌冷水黃瓜  
子灼猪羊雜肉魚一切發風瘡毒等物及婦人洗滌  
狐臭犯之難治

蟬酥丸半箇兩方

治一切諸惡瘡已發未發服之微汗即

愈

雄黃

乳香各一錢 蟬酥 一厘

右三味用黃酒熟麩糊為丸如菉豆大每服三丸葱白  
湯下不退再一服

止痛當歸散精義 治腦疽發背穿潰疼痛

當歸

黃耆

人參

官桂

芍藥

甘草

生地黄各二錢半

右用水一盞半煎至一盞去渣溫服日進三服

內托散 治一切惡瘡疼不可忍神効

甘草

御米殼半兩去灰

乳香

沒藥

右為細末用雌雄黑豆十粒生薑半兩棗五枚水一大

盞半同煎五七沸隨病上下食前後服

乳香散 本事方 治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多

令人嘔吐

菉豆 四兩

乳香

右同研極細為末每服三錢新汲水濃調食後服

乳香護心散 治癰疽發背疔瘡預防毒氣攻心

茶豆粉 四兩 乳香 一兩 硃砂 一錢

右為細末每服二錢濃煎甘草湯調下

一方 治癰疽無頭者

用蜀葵花子一粒新汲水吞下須臾即破如要多破服

三四粒有驗

透膿散 瑞竹堂方 治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀

一服不移時而自透累有効驗

蛾口齰 用出丁蛾

癰疽 心法附餘卷之十六

右將癰兒一箇燒灰用酒調服即透切不可兩箇三箇

癰兒燒服若服一箇只一箇瘡口服兩個三個即兩箇

三箇瘡口切莫輕忽

竹葉黃耆湯 精義 治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大

渴者

淡竹葉 二分 生地黃 一兩 黃耆 黃芩 去腐

當歸 川芎 甘草 芍藥

人參 麥門冬 去心 半夏 湯洗 石膏 各四分

右用水一盞半竹葉五片生薑五片煎至一盞溫服

內托千金散 瑞竹堂方 治腦背癰疽乳便等惡瘡

人參 當歸 黃耆 芍藥

川芎 甘草 瓜蒌 白芷

官桂 桔梗 金銀花 防風 各七

右用水二盞煎至七分入酒半盞去渣溫服如痛甚者

倍加當歸芍藥或乳香二錢日進三服一服之後瘡口

內有黑血出者或遍身汗出皆藥之功效如病勢猛惡

須秤藥一兩水一大碗煎服未成膿者自散已成膿者

不用針砭自透此藥累經功效

黃耆茯苓湯 精義 治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃耆 五味子 白茯苓 官桂 去皮

麥門冬 川芎 各一

右用水一盞生薑三片棗子三枚煎至一盞去渣溫服

食前日三服

內補十宣散 精義 治一切癰疽瘡癰未成者自消之已成

者速潰敗膿自出不用手擠惡肉自去不用針刀服藥

疼痛頓減其効如神

黃耆 湯洗 人參 當歸 各四 厚朴

桔梗 桂心 川芎 防風

甘草 白芷 各七錢

右為細末每服五錢熱酒調服不飲酒木香湯調下

內托散

綿黃耆

甘草

金銀花

牡蠣煅 二錢

右為末作一服水一盞煎至七分入酒一盞再煎七分

隨瘡上下食前後服

參蘇內托散

李俞甫方

川芎

當歸

薄荷

甘草各一錢

紫蘇二錢

苦參三錢

右吹咀用水二鍾棗二枚煎七分服不拘時

神効托裏散

和劑方 治癰疽發背腸癰無名腫毒松作

疼痛增寒壯熱若傷寒不問老幼虛人並皆治之

癰疽

心法附餘卷之十六

兎

治癰疽

忍冬草

五兩 黃耆 五兩

當歸

二錢

甘草

錢八

右為細末每服五錢酒二盞煎至一盞病上食後病下

食前少頃再進留渣外傳未成內消已成即潰也

○已上諸方辛溫內托之劑

一方 治癰疽發背初起

用獨蒜一片厚半指置患處以熟艾灸二十七壯如無獨

蒜大蒜亦可

南星膏

治皮肌頭面上生瘡瘤大者如拳小者如

果或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸

天南星大者一枚細研稠粘滴好醋五七滴和膏如蠟

生者則以乾者為末醋調如膏先將小針刺腫處令氣

透却以膏攤紙上象瘤大小貼之覺痒則頻貼取効

消腫毒方

簡易方

專用塗諸瘡疽

川芎

蚌粉

草烏

海金沙

赤小豆

天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

蜀葵膏

直指方

治癰疽腫毒

以黃蜀葵花用鹽摻服入磁器密封經年不壞每用患

處傳之如無花根葉皆可用

治發背未潰已潰最有神効

舊方大成

癰疽

心法附餘卷之十六

手

西谷

厚朴

二錢

陳皮

二錢

蒼朮

五錢

甘草

二錢

右入桑黃五錢同為末瘡已潰則乾摻之未潰則油

調塗之

拔毒散

消腫定痛

蒲黃

白芷

半夏

黃丹

各一

赤小豆

半兩

右將半夏白芷為末入蒲黃黃丹豆末和勻金銀藤搗

自然汁調傳四圍頻頻水潤腫退

拔毒膏

李俞甫方

治腫毒諸惡瘡神効

南皂角

五倍子

各五

乳香

沒藥



雄黃 各一錢

右五味各生用為末用好醋熬貼瘡上留頂

乳香散 止痛消腫

乳香

沒藥

粉霜

輕粉 各一錢

黃米粉

四兩

赤皮葱

一兩

蝟牛

十四箇

三味

一

處砂

鍋內炒黑

右為末津調紅絹攤貼留孔貼周圍

敷腫毒未破者

右用蝦蟇一箇先炒石灰後用剝開炒研泥用絹攤工

貼患處自破

拔毒散 治癰腫丹毒肉色變異或著四肢或在胸背遊

走不定熾熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏

半

寒水石

半

甘草

黃蘗

各半

兩

右為細末水調時復以鷄翎刷掃以芭蕉自然汁調妙

水澄膏

治熱毒腫痛大効

黃連

黃柏

白芷

沒藥

各五

白鯁

各四

錢

右為細末水調鷄翎掃在瘡腫處

治一切惡腫及發背高起未破膏藥方

草麻子

一百粒

男髮一塊

石以熬膏入黃丹成膏貼之只一個便消加黃蠟少許

鐵箍散 治諸瘡發背瘡癰腫毒杖瘡

用芙蓉花及葉曬乾為細末以好醋調敷貼患處如杖

瘡赤腫用鷄蛋清調貼冷水亦可加皂角少許尤妙

一方 治癰疽發背及惡腫毒

飯姜石

一斤

出淮

安清河

野西瓜藤

茨菇箭

各四

兩

右為細末用雞子清調敷患處如乾汲井花水勤掃妙

一方 用五葉藤即五爪龍搗爛敷患處立瘥

一方 治癰疽未潰

用瓜蔓根赤小豆等分為末以醋調敷之

一方 治發背癰疽疔瘡腫毒吸出膿血惡水此法甚佳

用苦竹筒三五七個長一寸一頭留節薄削去青皮太

小用之以蒼木白鯁為相皮厚朴艾葉茶芽白芨白蔞

藜等分為粗末將竹筒并前藥水煮十數沸藥乾為度

垂竹筒熱以手按上緊吸於瘡口上候膿血水滿自然

脫落不然用手拔脫易換竹筒如此三五次其毒盡消

即敷生肌藥肉滿後用膏藥即愈

一方 用蜂蜜同葱研為膏先將瘡口撥動或見血或不見血

將藥塗在瘡上中留一孔一帛縛定如人行約五里其

瘡覺疼更待多時其疔自出然後敷生肌藥忌一切毒物

一方 治癰疽腫毒

用蒼耳根及葉燒灰存性同乾靛以醋和勻塗上乾易之不過十餘次拔出其根

一方

用景天草一名慎火草不拘多少搗爛取汁塗之

水澄膏 治熱腫毒疼痛

大黃 黃栢 鬱金 白芨

天南星 朴硝 黃蜀葵花 各一兩

癰疽 心法附餘卷之六

右為細末每服二錢以新水一鍾半攪勻候藥澄底去面上浮水取藥攤紙上貼於腫處如覺燥津唾潤之若皮膚白色者勿用

一方只用白芨末半錢水碗內沉下澄去水却於皮紙上攤貼瘡上亦名水澄膏

圖藥 治諸般腫毒傳上消散

用黃栢白芨草烏南星白芷天花粉石膏鬱金甘草貝母大黃木鱉子皂角刺各等分為細末用雞子清調傳

神効加石灰尤妙

針頭散 治瘡疽毒腫如木硬者

瘡覺疼更待多時其疔自出然後敷生肌藥忌一切毒物

蟾酥 射香 各一錢

右同研極細以人乳汁調和如泥入磁盒內盛乾不效

每用少許以唾津調敷於腫處更以膏藥貼之主毒氣

自出不能為瘡雖成瘡亦輕

針頭散 通玄論 治惡瘡追毒去死肉

人言一錢 雄黃五分 乳香一錢 射香少許

右為細末每用少許以唾塗瘡上用膏藥貼之

桃花散 通玄論 治一切惡瘡去死血生肌肉去風活血

龍骨 虎骨 各二錢 白芨 白斂

烏魚骨 赤石脂 白石脂 各一錢 黃丹 少許

癰疽 心法附餘卷之六

寒水石 用炭火燒赤 各一兩六錢

右為細末量大小貼之立効

生肌散 治癰疽瘡毒斂口生肉

赤石脂 海鱉 龍骨 各一錢 乳香

沒藥 血竭 各二錢 輕粉 一錢 硃砂

鬱金 黃丹 飛過 黃連 白芷 各五錢

右為細末糝瘡口上用燈心數莖却用膏藥貼之

木香散 治瘡口久不斂者

木香 檳榔 各一錢 黃連 二錢

右為細末糝瘡上如痛加當歸一錢

紅玉散 治一切腫毒癰疽生肌肉

用寒水石不拘多少以鹽泥包裹火煨黃丹少許水飛過用皮紙攤於火上烘乾為度研細末搽瘡上

洗毒散 通玄論 治諸般惡瘡風濕陰蝕瘡宜此洗之

用蛇床子地骨皮地丁麻黃荊芥防風枯礬各三錢

右用水三碗葱白三根煎至二碗無風處洗

軟膏膏 治一切風熱瘡及小兒頭瘡

巴豆 七箇 瀝青 黃蠟 香油 各五兩

膩粉 一錢

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆

癰疽 心法附餘卷七十六

焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

神仙太乙膏 治一切惡瘡軟癰不問年月

深遠已成膿未成膿並宜貼之如蛇虎傷蝎螫大咬并

湯火刀斧所傷打撲傷損者無不可治如發背先以溫

水洗瘡淨用無極軟帛拭乾却用排絹帛子攤膏藥貼

之其膏藥可收十年不壞愈久愈烈可用磁罐盛之

玄參 白芷 川當歸 去芦肉桂 去粗皮

大黃 赤芍 生乾地黃 各半兩俱到

右用麻油一斤浸春五夏三秋七冬十日熬白芷紫色

濾去渣再熬油滾下黃丹半斤滴水成珠為度

七應膏 應驗方 治一切癰疽腫毒發背腦疽漏瘡癰子金

瘡便毒腫瘡及小兒頭瘡丹毒寒濕冷痺肢節疼痛手

足頑麻打撲傷損內腫瘀血蜈蚣咬蝎螫婦人乳癰月

間敗血臍腹疼痛並用此拔散毒氣立効先須洗淨瘡

腫然後貼藥

黃丹 半斤 沒藥 乳香 各二錢 白欬

木鱉子 去皮 白芨 當歸 官桂

杏仁 白芷 各二錢 血竭 一錢 三槐枝

柳枝 各一兩二錢 真麻油 一斤

右件十味內除丹乳沒竭外七味剉碎入油浸三日文

癰疽 心法附餘卷七十六

武炭火鍋內熬黃色濾出粗藥方下黃丹以新柳枝長

五六寸如小錢大攪勻令熬丹褐色撥下鍋子在地却

用柳枝攪藥出盡烟方入乳香沒藥血竭入鍋內仍用

柳枝攪勻三五十遍候藥冷傾在甕器內盛春三月間

合如常貼用

千槌膏 治一切無名惡瘡

草麻子 四十粒 山豆仁 胡桃仁 杏仁 各四十

楓香脂 四兩 加乳香 沒藥 各二錢 半

右為一處槌一千下成絲者新水拔之為度

七應膏 治癰疽發背諸般惡瘡打撲傷損筋骨疼

痛並皆治之

乳香

沒藥

血竭各五錢

阿魏二錢

麝香一錢

大黃

黃連

黃柏

防風

荊芥

芍藥

白芷

玄參

當歸

連翹

巴豆

蘇木

大楓子各兩

木鱉子八箇

穿山甲八片

黃丹一斤

槐桃柳嫩枝各二十

清油二斤

右除乳香等五味另為末將其餘藥剉碎入清油內煎

令黑色濾去滓入黃丹不住手攪成膏却入前五味藥

末再攪令勻攤貼患處

癰疽

心法附餘卷五十六

至

元

青金九龍膏

治癰疽瘡毒

香白芷如梔

巴豆去殼

草麻去殼

木鱉子去殼

百二

槐條

柳條各二十

乳香

沒藥各三錢

白礬五錢

黃丹二兩

香油三斤

右將前藥同香油煎以槐柳條不住手攪熬香白芷紫

色濾去粗再熬却下黃丹攪勻將白礬逐時入內後下

乳香沒藥攪勻務要煎熬得法然後收貯攤貼忌婦人

雞犬見之

千槌膏

瀝青六兩

杏仁四兩

乳香

沒藥各兩

輕粉二錢

香油五兩

黃蠟四兩

右將瀝青香油黃蠟同鎔化攪勻却入前四味取出於

石上槌千餘下用紅絹攤貼之

綠膏藥 治諸般惡瘡腫毒軟癰

銅青

草麻子去殼各

松香四兩

木鱉子去殼五

杏仁五錢

巴豆五箇

乳香二錢

輕粉五

右各為末搗令勻於淨石上用斧槌千餘下成膏收貯

水浸旋用

紅膏藥 治癰瘡及諸般瘡毒湯火金瘡等傷

癰疽

心法附餘卷五十六

至

元

黃蠟一兩

香油三錢

黃丹半兩

右先以黃蠟鎔化次下香油黃丹攪勻再熬以覓罐收

貯臨用攤貼

妙應膏 治癰瘡一切惡瘡腫毒及杖瘡

桃柳槐枝各半斤

當歸一兩

木鱉子去殼

黃丹一斤

乳香

沒藥各半兩

右先將香油三斤慢熬次下桃柳槐枝木鱉子當歸候

焦濾去粗再熬油滾方下黃丹候滴水成珠為度待冷

入乳香沒藥仍以槐條攪勻用覓罐收貯臨時旋攤用

神効

○已上諸方外消之劑

忍冬酒 治癰疽發背初發不問何處或眉或頤或頭或項或腰或脇或手足及婦人乳癰當服此藥神効

忍冬藤 五兩 洗淨 碎不

大甘草節 一兩 生用

右同入砂罐內以水二碗文武火慢煎至一碗入好酒

一大碗再煎數沸去滓分作三次溫服一日一夜盡如病重一日一夜要服兩劑候大小腸通利則藥力到若無生藤乾者亦好若取忍冬葉研爛入白酒少許調和敷疽瘡四圍中留一口洩其毒氣亦妙

遠志酒 三圓方 治一切癰疽發背癰毒

遠志 心法附錄卷之六

五九

用遠志一味洗淨去心焙乾為末酒調二錢澄清服之以滓傳患處

一醉膏 楊氏家藏方 治發背發腦一切惡瘡

甘草 半兩 為末 沒藥 研二錢 大瓜蒌 一枚 去皮

右用無灰酒二升煮至一升放溫頓服如一服不盡作

三飲

一方 治癰疽發背疔瘡

野紅花 即小五葉草 龍胎草 大蒜 一箇

右搗爛用好熱酒一椀調汁服之立効

一方 治發背癰疽惡瘡丁腫疥癬及遍身生瘡如蛇頭

用生白礬一兩為末黃蠟七錢鎔開和勻為丸如梧

子大每服十丸至二十丸不拘時米飲送下溫熱水

亦可如瘡未破則內消如已破則便合若服金石藥中毒宜服此藥最妙欲治咳嗽化痰用人參五味子湯臨

卧吞下

一方 治癰疽疔腫惡瘡及黃疽

用茨菇連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾濾汁溫服若以乾末每服三四錢溫酒調服

一方 治癰疽腫毒一切惡瘡

稀荬草 一兩 卷爾燒灰 乳香 一錢

右為末每服二錢熱酒調服如毒重連進三服得汗妙

○已上諸方專治之劑

救苦散 和劑方 治便癰疽等瘡

大黃 桔梗 金銀花 黃耆

甘草 梔子 紫花地丁 各等

右吹咀每服一兩酒半碗煎隨瘡上下服

五聖散 聖惠方 治症同前

瓜蒌 一箇 生薑 一兩 大黃 一兩 皂角刺 二兩

甘草 金銀花 各一兩

右吹咀每服一兩水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿

空心服

又方 治症同前

猪牙皂角七箇燒存性

梔子七箇燒

穿山甲七箇燒

油核桃七箇燒

右為末作一服空心溫酒調下

又方 治症同前

木鱉子七箇去殼 甘草

荊芥

當歸各一兩

右咬咀水酒煎露空心服併進三服成膿亦散

一方鼠黏子二錢炒細末入蜜一匙淨朴硝一匙溫酒

空心服亦効

癰疽心法附餘卷六

一方蜈蚣三條搗碎好酒調服有膿即散

一方牙皂為末南星生姜搗乘濕貼上

又方 治症同前

大黃 梔子

貝母

川芎

白芷 牡蠣

大瓜蒌

當歸各等分

右咬咀水酒各一盞煎至一盞露一宿空心服

又方皂角膏

皂角炒焦 韶粉炒

右等分和勻以熟醋調仍以紙攤貼患處頻頻以水潤

之即効

治便毒 不問日久有膿者其効如神

大黃

梔子

木鱉子去殼 皂角

牡蠣

地丁

連翹

甘草各一兩

右咬咀水酒煎露一宿空心服以利為度

治毒散聖惠方 治便毒

當歸

甘草

大黃各五錢

金銀花少許

右咬咀水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿空心溫服

消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂角刺

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草

瓜蒌仁各等分

癰疽心法附餘卷六

右咬咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立効

○已上諸方治便毒之劑

丹溪心法

○腸癰

大腸有痰積死血流注 桃仁承氣湯加連翹

秦艽近肛門破入風者難治防風之類

附脉理

脉訣舉要曰腸癰難知脉滑可推數而下熱腸癰何疑遲

緊未膿下以平之洪數膿成不下為宜

附諸方

桃仁承氣湯

見吐血

復元通氣散 按萃方 治諸氣逆耳聾腹癰便癰癰疽無頭

止痛消腫

青皮

陳皮 各四兩

穿山甲 炮

瓜蒌根 各二兩

金銀花

一兩連翹二兩

甘草 二兩生熟各半

右為細末每服二錢熱酒調下

治腹內癰腫

大黃

一兩取末四錢半

破故紙

一兩取末二錢

牛旁子

一兩取末一錢

牽牛

一兩取末二錢半

右和作二服蜜水調空心服以利為度

丹溪心法

癰疽

心法附餘卷之六

聖

癰疽

○乳癰 乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行

故竅不得通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿

亦有所乳之子膈有滯痰口氣愀熱含乳而睡熱氣所吹

遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟晚令汁透自可

消散失此不治必成癰癰治法疎厥陰之滯以青皮清陽

明之熱細研石膏行汗濁之血以生甘草之節消腫導毒

以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或

散或加減隨意消息然漬以少酒佐之若加以艾火兩三

壯於腫處其効尤捷不可輒用針刀必致危困若不得於

夫不得於舅姑憂怒鬱悶斯夕積累脾氣消阻肝氣橫逆遂成隱核如大碁子不痛不痒數十年後方為瘡名曰疔岩以其瘡形嵌凹似岩穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

入方

乳癰方

青皮

瓜蒌

橘葉

連翹

桃仁

皂角刺

甘草節

如破多加參芪

右以水煎入酒服

癰疽

心法附餘卷之六

六

癰疽

乳癰疔勞瘰癧

石膏

煨

樺皮

燒

瓜蒌子

甘草節

青皮 各等分

右以水煎五錢溫服

治乳有核

南星

貝母

甘草節

瓜蒌 各兩

連翹 半兩

右以水煎入酒服

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮	連翹	瓜蒌	白芍
甘草節等	乳岩小破加	紫胡川芎	
右以水煎入酒服			
乳硬痛			
沒藥	甘草	當歸各三錢	
右作一服水煎入酒少許食後熱服			
吹奶			
金銀花	天蕎麥	熟葛藤等分	
右以醋煎洗患處立消如無下二物只金銀花亦可			
乳栗破	少有生必大補		
癰疽	心法附餘卷之六	奎	三百三十一
人參	黃芪	白朮	當歸
川芎	連翹	白芍	甘草節等分
右以水煎服食後			
附諸方			
秘傳湧泉散	應驗方	治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡	
凝滯如乳脹痛或作癰腫			
王不留行	白丁香	漏蘆	天花粉
白殭蚕	穿山甲	火燉黃也	
右為細末每服四錢用猪蹄湯調下			
秘傳金銀花散	應驗方	治乳脉不行結成癰腫疼痛不可	

忍香			
金銀花	當歸	黃耆	甘草各二錢
右作一服水二鍾煎至一鍾入酒半鍾去滓溫服食後			
桐皮散	聖惠方	治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍	
者藥下即不疼神效蓋因小兒吹乳變成			
陳皮	不拘多少	浸去	
右為末麝香研酒調下二錢			
治婦人吹乳奇効			
用大車頭邊油垢圓如梧桐子大每服五十丸溫酒下			
勝金丸	治吹乳		
癰疽	心法附餘卷之六	奎	三百三十一
用百齒霜即梳上髮垢是也九如桐梧子大黃丹為衣			
每服三丸倒流水送下服後如患左乳左卧右乳右卧			
溫覆出汗倒流水者取水傾屋上流下是也			
瓜蒌散	治乳癰如勞		
瓜蒌	一箇大	甘草	三錢
乳香	一錢	當歸	酒浸焙
沒藥	二錢	另研	
右用無灰好酒三升銀石器內慢火熬取一升清汁分			
作三服飲之			
通和湯	治乳癰疼痛不可忍者		
穿山甲	炮黃	川木通	各一兩
自然銅	半兩	醋	七次



右為細末每服二錢熱酒調食遠服之

一方 治乳癰無名腫毒初起

用五葉藤即五爪龍不拘多少生姜一塊好酒一椀搗爛去粗熱服汗出為度仍以植敷患處

一方

用新栢葉去枝梗一握洗淨以朴硝一勺同入臼內杵之旋加清水紐取自然汁半碗先令病人飲三兩口仍用雞翎蘸汁掃於患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消

一方 用生地黃搗汁塗之一日三五次立効

○廣按丹溪云癰疽之証陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱瀋陽滯以寒治之陰滯以熱治之此

乃治癰疽之大法也請陳其旨夫所謂陽者氣也鬱而為火無形之物也陰者血也鬱而為痰有質之物也陽無形故浮而在表淺而大所謂癰也陰有質故沉而在裏深而惡所謂疽也癰脉浮洪弦數陽之象也疽脉沉細弱瀋陰之象也癰屬氣滯於血疽屬血滯於氣總而言之皆是熱勝血也治癰以寒藥是正治之法也治疽以熱藥是從治之法也夫藥性熱則開行性寒則疎泄疽乃有形之陰非熱藥從治豈能

開行之乎此古人用藥內疎內托乃正治從治之義也

### 疔瘰 七十八

丹溪心法

○疔瘰用針刀鏟破頭上以蟾酥敷之後用菜豆野菊莎末酒調飲醉睡覺即痛定熱除不必去疔自愈也 治一切疔瘡用槲櫟花根莖葉皆可研碎取汁滴口中飲之○瘰癧 血氣痰熱 以牡蠣煨過為末玄參搗膏為丸以桑椹黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者晒乾為末湯調服

師云大田螺連肉燒灰存性為末入麝香少許濕則乾敷乾則油調敷 夏枯草大能散結氣而有補養血脉之功能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効

入方 治瘰癧

海藻洗去沙土昆布洗去土同何首烏木曰搗

皂角刺炒令黃色公蛇退一條上或牆上是雄

右五味為細末和勻一處諸項下刀口肉燒熟蘸前藥末吃食後倒患處眠一伏時每核灸七壯口中覺烟起為度膿盡即安初生起時灸曲池男左女右

附諸方

寶鑑保生挺子 治疔瘡背疽癰瘰一切惡瘡

金脚信 雄黃 硃砂各二 麝一錢

輕粉 大厘巴豆 武火炒研

右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥合成挺子冷水浸

少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一

餅子次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服

破棺丹

神聖膏 治一切惡瘡

當歸 葉本各半 沒藥 二錢 黃丹

黃蠟 各二兩 乳香 一錢 琥珀 二錢半 膽礬

粉霜 各一錢 白膠香 三兩 清油 二斤 巴豆 十五箇

槐枝 柳枝 各一百 木鱉子 五十箇

右件一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下

餘藥熬至焦黑亦澆出不用將油澄清下黃丹再熬成

膏用緋帛攤之立効

千金托裏散 治疔瘡發背一切惡腫

官桂 人參 甘草 川芎

白芷 芍藥 各一 木香 沒藥 各三錢

乳香 二錢 當歸 半兩 連翹 二錢 黃芪 一兩半

防風 桔梗 厚朴 各二

右十五味為細末每服三錢酒一盞煎三沸和粗溫

服無時

破棺丹 治瘡腫一切風熱

大黃 二兩半 芒硝 甘草 各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清溫酒任

化下童便半盞研化服亦得忌冷水

○已上數方治疔瘡次第之劑

蟾酥丹 危氏方 治疔瘡

蟾酥 不拘多少

右以黃丹白麵等分搜和為丸如麥粒大針破疔瘡以

一粒納之 又方單用蟾酥每用粳米大重者針瘡口

納入輕者不須針用水澄膏以白芨末半錢水盞內澄

去水脚於皮紙上攤開貼瘡上 聖惠方取蟾酥油調

封瘡口立効

蟬蛻散 聖惠方 治疔瘡最有効

蟬退殼 白蠟 各等分

右為末酸醋調塗四圍留瘡口候根出稍長然後拔根

出再用藥塗瘡

一方不用醋只用油調塗

一方用蟬蛻為末蜜水調半碗服之仍以津唾調搽  
上即愈

一方 治疔腫初發

用蒼耳根莖苗子一色者燒灰為末用醋泔調塗瘡上  
毒根即出或監齋調尤好

一方用蒼耳草一大握生薑四兩同研爛入生頭酒一  
碗去渣熱服大汗即愈仍用渣傳瘡

回生錠子精義方 治疔瘡

草烏去皮尖 麝香一字用 蟾酥七粒梗 巴豆七粒

右為末麵糊丸作錠子如有疔瘡先針刺至痛見血用

疔瘡心法附錄卷十六 主 疔瘡三十一

此錠子紐入用膏藥貼之重者於疔瘡四面紐之三二  
日根自拔下藥最宜緊用

立馬回丁丹 治疔瘡走亂不止

金脚信 蟾酥 血竭 硃砂

沒藥各五 輕粉 片礞 麝香各一字

右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長大用時將瘡頭  
刺破納入二錠第二日瘡腫為効以膏藥貼之

雷楔 一名紫金錠子 治疔瘡諸惡腫毒

續隨子五兩 川烏頭 甘草各二 蟾酥

雄黃 白礬各一 麝香七錢 辰砂五兩

片腦二錢 人言 輕粉各五 桔梗一兩

黃連三錢 白丁香三錢 巴豆四十九粒去

右各為細末再入乳鉢內投蟾酥巴豆同研勻麪糊丸  
成錠子如指彈大陰乾如遇諸瘡以井花水磨塗瘡上  
如乾再搽

飛龍奪命丹聖惠方 治一切惡疔瘡

人言二錢 斑貓十二箇 巴豆十二箇 硃砂三錢

礞砂 礞砂 乳香 沒藥

黃丹各二 南星水洗 半夏水洗各 血竭二錢

麝香分半

疔瘡心法附錄卷十六 主 疔瘡三十一

右為末蟾酥汁為丸如紅豆大五分內分一分加入斑  
貓四箇然後捻成錠子如小麥大每一瘡針破下一錠

子用飯粘白紙封口用前四分內一丸嚥在舌上覺麻

凉水吞下忌熱物片時如蟾酥乾用人乳汁化開

一方有雄黃二錢

○已上數方疔瘡外治之劑

一方 治疔瘡

用白芷二錢生薑一兩同搗爛熱酒一碗調服出汗立

愈

鐵柱杖 治疔瘡發背頭風

用草烏頭不拘多少去皮淨為末用葱白去鬚葉搗爛為丸如豌豆大以雄黃為衣每服一丸先將葱油嚼熱酒送下或有惡心吐三四口用冷水一口止之即臥以被厚蓋汗出為度

返魂丹 瑞竹堂方 治十三種疔瘡

硃砂 錢各一 膽礬 錢半 血竭 銅綠

蝸牛 各一錢 雄黃 白礬 各二錢 輕粉

沒藥 蟾酥 各五分 麝香 少許

右將七味為末和搗蝸牛蟾酥極爛和藥時先入藥內為丸如雞頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在

疔瘡 心法附錄卷五 圭 治疔瘡

手心將藥丸裹在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行

五里許有汗出即瘥如不能嚼葱研爛裹藥下曾有一

僧貨此藥極有効子自合救人累獲効驗真妙方也

寸金丹 治疔瘡 又名返魂丹再生丹延命丹延壽丹

來甦丸得道丸此藥嚥下即活

辰砂 二分 蟾酥 輕粉 各五分 枯礬

寒水石 銅青 各一錢 海羊 二十箇 麝香 一字

右為末研蝸牛一處搗爛丸如菴豆大難丸添酒成之病輕者二丸重者三丸未効再服服法先嚼葱白一大口極爛置手心中放藥在內裹熱酒下暖處卧汗出即

愈忌冷水

○已上數方疔瘡幸溫內托之劑

治魚臍疔瘡 醫方大成

虞刺葉 瓜葉連鬚葱 韭菜 各等

右入石鉢內研末如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左手貼左腋下在右手貼右腋下在左脚貼左胯在右腳貼右胯如在身中則貼心臍並用帛縛住候肉下紅線處皆白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救矣

一方 治疔瘡

疔瘡 心法附錄卷五 圭 治疔瘡

用菊葉一握搗爛取汁灌入口即活用根亦妙

一方 治疔瘡

土蜂房 巢全 蛇蛻 一條

右作一處納瓦器中以黃泥封固火煨存性研為細末

空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡化為黃

水仍服五聖散

五聖散

大黃 生薑 金銀花 甘草 各一兩

瓜蒌 一箇 皂角 針二兩

右吹咀每服一兩用好酒二盞煎至一盞溫服

破棺丹 瑞竹堂方 治疔黃走壘不止

甘草 京三稜各二錢 山梔 牽牛各一錢半

地丁 連翹 金銀花 牡蠣各一錢半

瑞竹堂加大黃三錢 赤芍藥 當歸各二錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用童子小便

化開服之食前忌酒并生冷硬物

治疔瘡 醫方大成

黃連 羌活 白姜蚕 青皮

獨脚茅 防風 赤芍藥 獨活

蟬蛻 細辛 甘草節各等分

○已上數方疔瘡辛涼內疎之劑

右咬咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許姜一兩同

研爛熱酒和服然後用酒水各半蓋姜三片煎服熱不

減後再加大黃少許煎服畧下一兩行蕩去餘毒更用

白梅蒼耳子研末貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之

甚若不切然効驗神速累試之驗

連翹丸 治瘰癧結核已破或未破者

薄荷新者一升 皂角一挺水浸去

以上二味一處於銀石器內熬成膏次入

青皮一兩不皂角子仁搗碎末半兩

陳皮一兩不連翹半兩 黑牽牛一兩半半

右五味為末用前膏子為丸如梧桐子大每服二十九

煎連翹湯食前送下

治瘰癧 楊氏家藏方

斑猫二十八箇去頭 荆芥穗 姜蚕

黑牽牛各二錢

右為末臨睡時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時

再一服五更初却以溫酒調藥一錢服訖如小便無惡

物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白

糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末

一錢服之以小便內利去惡毒乃為愈也

一方 治瘰癧 張子和方

白殭蚕 直者 白丁香 直者 斑猫 去翅

磨刀泥 苦丁香 赤小豆 各等分

右為末十歲以上每服一錢二十歲以上服二錢病人

不要吃晚飯五更時用新汲水一盞調服至辰時見効

男子大便中女人小便中利下赤白色二三次或膿血

如鼠狀為効當日食粥不得吃別物忌油膩患三四年

者只一服七八年者再一服

尅効散 治瘰癧子瘡

官桂

硃砂各半

赤小豆

粳米各四十九粒

斑貓四十九粒

不去翅足

右五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字煎商陸根湯送下空心服小便淋瀝為効如惡心嘔吐黃水無妨瘰癧日日自消矣

無比丸 治瘰癧

白朮

檳榔

防風

牽牛半生

密陀僧

郁李仁炮去

班貓糯米炒

右為末麵糊丸如梧桐子大每服二十丸空心臨卧甘草檳榔湯送下至一月後覺腹中微痛於小便中取下

瘰癧

心法附餘卷之六

主治

瘰癧

瘰癧子毒如魚眼大已破者自合未破者自消有驗

一方 治瘰癧

用斑貓一兩去翅足以粟米一升炒黃色去米細研入

薄荷末四兩以雞彈清丸如菉豆大空心臘茶湯下一

丸每日加一丸加至五丸每日減一丸減至一丸又每

加一丸加至五丸後每日仍服五丸

一方 治瘰癧

用烏雞彈一箇頂上開一竅攪清黃令勻以班貓一箇

去頭翅足入雞彈中以細糊封之飯上蒸熟剝去殼去

班貓空心喫雞彈一日一箇以瘰癧為度

一方 治瘰癧

雄黃

鬱金各五錢

巴豆去油殼

班貓七箇去頭翅

足糯米炒

右為末麵糊為丸如菉豆大每服五七丸臨卧以冷茶清送下

五香連翹湯精要方治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

舶上青木香

沉香

乳香

丁香

麝香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

射干

木通去節各七分

大黃蒸一錢

瘰癧

心法附餘卷之六

主治

瘰癧

右用水二盞煮取一盞以上去滓取八分清汁空心熱

服半日以上未利再喫一服以利下惡物為度未生肉

前服不妨以折去毒熱之氣本方有竹瀝芒硝恐泥者

不能斟酌故缺之知者自當量入

一方有黃耆藿香無獨活麝香一名五香大黃湯

玉燭散 治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日

助効

方見婦人門

東垣升陽調經湯 治瘰癧遠頸或至夾車此皆出足陽

明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來

乃戊脾傳於癸腎是夫傳於妻俱作塊子堅硬大小不

等並皆治之或作丸亦可

升麻八錢

葛根

龍膽草酒製

黃芩酒洗

莪術酒洗

三稜酒炒

甘草炙

黃連酒洗

連翹

桔梗各三錢

生黃芩四錢

歸稍

芍藥各三錢

黃柏酒炒

知母酒洗

一兩

右另秤一半作末煉蜜為丸菜豆大每服百餘丸一半作咬咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七八錢水二盞先浸半日煎至一盞去滓臨卧熱服足高於枕仰卧噉一口作十次嚥下留一口在後送下丸藥服畢其卧如常

赤腫

○已上數方療癰內消之劑

主九

太乙膏 治癰子瘡神効

腦子一錢

輕粉

乳香各二錢

麝香二錢

沒藥四錢

黃丹五兩

右用清油一斤先下黃丹熬用柳枝攪又用葱兒葱七枝先下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手攪觀冷熱得所入腦子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤一方

用瀝青草麻子去殼同研成膏先用葱椒湯洗瘡淨以

紅絹攤膏貼患處

一方

用石灰一塊自辰時晒至午時將瀝青槌細杏仁四十粒草麻子十四粒同搗成膏依前攤貼

一方

用白膠香一兩磁器內鎔開去滓再鎔以草麻子六十粒研爛入膠內更入油半匙熬勻滴水中試軟硬得所量瘡大小以絳帛攤貼先以葱椒湯洗瘡淨後貼一膏可治三五瘡并治惡瘡軟癰皆効

一方

用荊芥煎湯待冷洗瘡淨揀黑紫處以針刺破却用雄黃樟腦為末清油調搽三四次候黃水出處仍取未見日蛭蚓糞如雞彈大一塊火內燒紅穿山甲九片或十一片微炙為末入乳香沒藥少許香油調搽妙

一方

梧桐淚一錢 巴豆去皮 皂角刺各一錢

右為末於淨室中勿令人見以不語嚙調和捻成錠子如黃虫糞大陰乾每用先刺開瘡入藥一錠已潰者就內入藥用紙封之勿令透氣待膿水出或有硬塊在內擠出惡物瘡口自斂即愈忌生冷油膩葷腥麪食

又方

以雞肫脰燒灰末搽未破香油調傳已破乾搽

又方

用夏枯草不拘多少於鍋內煮爛除草將汁熬膏貼之  
治項上生瘰癧瘡未破灸法

以男左女右中指屈過用草量中節橫紋名為同身寸  
量三寸半為則於手板盡處量三寸半臂中立穴灸兩  
三壯半月瘰癧處水如泥惡物盡膿流出後以膏貼妙

○已上數方瘰癧外散之劑

### 諸瘡 七十九

丹溪心法

心法附餘卷之六

全

微音

○金瘡 五倍子熟蘇等分為末傳

又方 白膠香三錢龍骨一錢

金瘡及狗咬

五月五日午時用陳石灰一斤搗為末韭一斤搗汁和

成餅陰乾為細末敷之

治陽証腫毒并金瘡

大粉草剉細用竹筒一段割去青兩頭留節節上開一

竅入粉草在內滿後用油灰塞孔竅從立冬日放糞缸

內待立春先一日取起豎立在有風無日陰處二十一

日多最好却破竹取草為細末用傳金瘡乾者水調  
附諸方

花藥石散 和劑方 治一切金刃所傷打撲傷損身體出血

者急於傷處搽藥其血自化為黃水 方見損傷類

一方 治金刃所傷一切腫瘡及馬斷梁等瘡

用冬月黑牛膽一箇裝新石灰四兩白礬一兩陰二十

七日待乾取出再用黃丹一兩另炒紫色研細同一處

再研勻敷瘡即差

刀箭藥 治金刃跌撲狗咬湯火所傷

端午日採一去草花藥擇嫩者搗爛量入舊石灰搗極

諸瘡

心法附餘卷之六

全

微音

勻或丸或餅陰乾碾為末濕則搽之乾則油調搽

一方

用初生小鼠同石灰搗勻陰乾傳金刃跌撲出血甚妙

如聖散 秘方 治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治大

有効驗

香白芷

川芎

防風 各五錢 細辛 五錢

雄黃 二錢

蒼朮

米泔浸一宿

草烏

各四兩

兩頭尖 四錢

右為極細末血不止乾貼破傷風牙關緊急用熱酒一

盞調服一錢又貼破處風牙疼乾擦之流涎即愈狗咬



蛇傷煎鹽湯洗淨乾貼用熱酒調半錢服如重車行五里並服三服如重服一錢小兒量力減服多年不効惡瘡煎葱白鹽湯將水口含洗去膿血一二次拭乾貼一切蜂蝎小虫所傷唾調於痛處貼之婦人產後敗血上衝下注熱酒調服一錢忌腥葷麪食油膩之物	丹溪心法	○湯火瘡 臘月猪膽塗黃柏炙乾為末傳之	湯澆 以淋了第二次灰祖傳患處	火燒	桐油 二錢 水膠 二錢 溶開入油	諸瘡 心法附錄卷之六 金 瘡 治法	右二味以挑柳枝不住手攪成膏再入少水浴外用猫兒肚底毛細剪摻之	附諸方	治湯火傷未成瘡者	用小麥炒黑為度研為末膩粉減半油調塗之	赤石脂散 經方 治湯火所傷亦爛熱痛	赤石脂 寒水石 大黃 各等分	右為末以新汲水調塗傷處	治湯火所傷	州大黃當歸各等分為末以清油調傳之濕則乾摻之
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------	----------------	----	------------------	-------------------	-------------------------------	-----	----------	--------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	-----------------------

水霜散 治火燒損傷熱油澆傷皮爛肉大痛	寒水石 生 牡蠣 煨 明朴硝 青黛 各一兩	輕粉 一錢	右為末新水調或油調濕則乾散痛處立止如神	治火傷	凡被火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物激之熱不爛人筋肉	一方 治火傷	以杉木皮燒灰存性為末濕則乾摻乾用雞子清調塗	治湯盪火燒瘡立効	諸瘡 心法附錄卷之六 金 瘡 治法	用搗猪毛燒灰香油調搽患處	四黃散 瘡方 治湯盪火燒熱瘡連痛	大黃 黃連 黃蘗 黃芩	白芨 各等分	右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上	治湯火瘡 瘡方	用罌榔殼多年乾白者火煨為末如瘡破用乾摻之如不破輕粉清油調傳之	丹溪心法	下疳瘡
--------------------	-----------------------	-------	---------------------	-----	---------------------------------	--------	-----------------------	----------	-------------------	--------------	------------------	-------------	--------	----------------	---------	--------------------------------	------	-----

蛤粉	蠟茶	苦參	蜜陀僧
右為末河水洗淨臘猪油調傳	無治膿瘡		
又方			
米泔水洗瘡淨用頭髮以鹽水洗淨去油再用清湯洗			
晒乾燒灰傳瘡上即時生肌			
附諸方			
治下疳			
用黃栢以礮瓦割下細末同蛤粉末等分摻上即愈蓋			
黃栢去執蛤粉燥濕故也			
又方			
諸瘡	心法附餘卷之六	金	聖言下
用米泔水洗瘡淨以雞肫腔內黃皮焙乾為細末傳之			
又秘方			
用透明白膠香為末入輕粉麝香少許乾摻乾則用油			
調傳之			
立効方	瑞竹堂方		
治下疳			
燈草灰入輕粉麝香少許乾貼			
治下疳秘方			
旱田螺燒及腦子	麝香	輕粉少許	
右為末香油調傳患處即愈			
下疳藥聖方			

用五倍子為細末先以漿水洗淨瘡乾貼			
治下疳妬精瘡秘方			
七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之			
聖粉散	治下注疳瘡蝕臭腐爛疼痛不可忍		
黃栢	蜜陀僧	黃丹	孩兒茶
乳香	輕粉	麝香	
右為末用葱湯洗瘡後次貼此藥無治小兒疳瘡			
下疳瘡洗藥			
黃連	黃栢	當歸	白芷
獨活	防風	朴硝	荊芥
諸瘡	心法附餘卷之六	金	聖言下
右等分水煎入銅錢五十文烏梅五箇鹽一匙同煎溫			
洗日五十次用下藥敷			
木香	檳榔	黃連	銅青
輕粉	枯礬	蜈蚣	麝香
右為極細末洗後至夜敷上			
黃連散	治下疳		
黃連	黃栢	蜜陀僧	輕粉
黃丹	沒藥		
右為細末瘡濕乾搽瘡乾香油調搽			
麝香杏仁散	宣明方	治婦人陰瘡	

杏仁不拘多少 麝香少許

右為細末如瘡口深用小絹袋子一箇盛藥滿緊口臨上藥炙熱安在陰內

丹溪心法

○癬瘡

防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺

又紫蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯洗

又方

浮萍一兩 蒼耳 蒼朮 苦參各一兩半

黃芩半兩 香附二錢

諸瘡心法附餘卷六

右用酒糊為丸服

又方

蘆薈一錢 大黃三錢 輕粉 雄黃各一錢

蛇床子三錢 槿樹皮三錢 檳榔一錢

右為末先刮癬後用米醋調藥末塗之

又方

蘆薈研三錢 江子去殼十粒 草麻子去殼十粒

斑貓七箇去足 白蠟一兩

右以香油二兩熬江子草麻斑貓三藥以黑為度去藥

入蠟并蘆薈末在內用磁罐盛貯微微刮癬令破以油

塗上過夜畧腫即愈

附諸方

碧玉散 治癬

銅綠 硼砂 白礬各等分

右為細末香油調搽

極皮散 治頭面荷葉癬

用川極樹皮為末醋調湯頓如膠敷上候瘡癬抓破再

搽數日即愈

連粉散 風癬濕瘡並皆治之

黃連一錢 輕粉五分 膩粉 黃柏

諸瘡心法附餘卷六

黃丹 枯白礬各一錢 龍骨 蘆甘各五分

右為細末每用少許濕則乾搽乾則香油調搽

如聖散 治疥風癬瘡

蛇床子一兩 黃柏 苦參 蘭茹各五錢

白礬 狗脊 藜蘆 剪草各二錢半

輕粉一錢二分 胡粉一錢二分

右為細末清油調搽

白礬散 聖惠方 治遍身生癬日久不愈上至頭面

用獨活羊蹄根別搗白礬為末一處以極酸米醋調搽

破搽藥候痒極拭藥即止隔日再搽不過兩上即愈

又治癰風以等藤刮熟以此藥搽之三四度愈

黃藥子散 綠髮方 治疥癬瘡經不瘥

黃連 玄參 赤芍藥 各五錢

右件為細末隨以多少入輕粉少許嚼碎麻取汁調先煎韭菜湯洗令淨以藥傳之愈

何首烏散 和劑方 治脾肺風毒遍身癬疥瘡痒或致肌肉

木麻并紫癰白癰風並皆治之

荊芥 威靈仙 洗淨 蔓荊子 去皮 蚬蟆草 去土

何首烏 防風 去芦 甘草 炙各

右為細末每服二錢食後溫酒調下

諸瘡 心法附餘卷十六

丹溪心法

○癰瘡

乳香 沒藥 水銀 當歸 各半

川芎 貝母 各二錢半 黃丹 一錢半 云二兩半

真麻油 五兩

右咬咀除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑色去粗

下黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨 生用 血竭 赤石脂 各三錢 頭油 如指大

黃蠟 一兩 白膠香 三錢 香油 多少

右件先以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却

入龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁

器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箸貼在外二

日後番過再貼仍服活血藥

又方

用砂糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將藥貼瘡上

日換三次

又方

以頭垢燒灰和棗肉搗作膏先以葱椒藥煎湯洗淨用

輕粉搽上却以前膏兩傘紙攤貼之

諸瘡 心法附餘卷十六

又方

地骨皮 一兩 白蠟 半兩 甘草節 半兩

右以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去粗入黃丹

一兩半緊火熬黑提起白紙攤貼之次用冬青葉醋煎

過以藥貼

附諸方

夾紙膏 貼癰瘡久不愈者

乳香 三錢 血竭 二錢 沒藥 四錢 鬱金 五錢

麝香 一錢 杜鰭 半兩 黃連 黃柏 各二

大黃 黃丹 各一兩 輕粉 貼三十

右為細末清油調勻攤油紙上貼瘡每一箇貼三日每  
日以冷水洗三次膏藥亦翻轉三次兩層夾紙以線縫  
四邊針刺眼透藥氣其藥末同和一處收要用旋調  
至聖隔紙膏

水龍骨 另研 輕粉 研 黃丹 飛各二錢 樟腦

黃連 各四錢

右為細末桐油調勻以油紙隨瘡眼大小糊袋以藥內  
袋內貼在瘡上用軟綿緊束之

臙瘡膏藥

輕粉 赤石脂 黃丹 甘草

諸瘡

心法附餘卷之六

生

黃柏 去粗皮切為末 火龍丹 即煉爐口上燒紅土或用伏龍肝即龍心紅土亦可

右各等分先將五味研為極細末後下輕粉用真香油  
調勻再用油單紙夾住勿令藥侵瘡貼上絹帶繫住一  
日三番拭去瘡上血沫

治外臙脚瘡 秘方

用累經燒過蜜窰黃土研極爛入黃柏赤石脂黃丹輕  
粉拌勻以清油調稀用油紙盛藥傳瘡上却以布絹縛  
定縱痒不可以手開動直候十數日後瘡愈却去之  
○廣按此方與前方相類其用窰心黃土以燥濕清熱  
用黃柏之辛以散火邪真諸方所不及但再加沒藥

與乳香以散瘀血可謂十全矣

又方

白膠香末以臘酒瓶上箬葉夾藥在內貼之

治遠年近日臙瘡 聖惠方

黃丹 飛 輕粉 蜜陀僧 龍骨 各等分

麝香 少許

右為細末漿水洗淨瘡口乾貼之

又秘方

輕粉 二錢 黃蠟 一兩 猪膽 一箇

右溶化攤油單紙上貼

諸瘡

心法附餘卷之六

生

○漏瘡 新增

附諸賢論

劉宗厚曰諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭內  
無互肉宜用附子浸透切作大片厚三二分於瘡上著  
艾灸之仍服內托之藥隔三二日再灸之不五七次自  
然肌肉長滿矣至有膿水惡物漸潰根深者郭氏治用  
白麝硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚  
約三分於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易復隔四  
五日方用翠霞錠子并信効錠子互相用之紙入瘡內  
互肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑

調理即瘥矣

附諸方

灸法 冷漏多在腿足之間先是積熱所注久則為寒附

子破作兩半用人唾浸透切成片安漏孔上用艾灸之

內托散

川芎 半兩

細辛

白芷稍 各二錢半

右為末每日作湯服之病在下食前服在上食後服有瘡大小討隔年黃麻根刮去皮搥成繩子入孔中至入不去則止瘡外膏藥貼之

內補十宣散

治冷漏在遍身用此內托補虛 方見雜類

諸瘡

心法附錄卷五

聖

當歸拈痛湯

治冷漏在腰腿之間期此以補虛散邪

方見脚氣類

翠霞錠子

治年深冷漏日久惡瘡有肉用之

銅綠

寒水石 各三錢

滑石 各三錢

明礬

膩粉

砒霜

雲母石 研如粉各一錢二分半

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡內深淺紙之如脩合此候天色清明則可

信効錠子 治一切惡瘡

紅娘子

黃丹

砒霜

鷹屎

土硝

白芨 各一錢半

銅綠 二錢

腦子

麝香 各少許

右研細末廝兒乳汁和為錠子用中病即止

生肌散

歛口生肉

太乙膏

護瘡散邪

並見癰疽類

丹溪心法

○杖瘡疼

黃栢生地黃紫金皮皆要藥熱血作痛 涼血去瘀

血為先須下雞鳴散之類 生地黃黃栢為末童便

調傳或加韭汁 不破者以韭菜蔥頭舂碎炒熱貼

冷則易 膏藥用紫金皮乳香沒藥生地黄黃栢大

黃之類

心法附錄卷五

聖

二百一十

又方

用大黃黃栢為末生地黄汁調傳乾則再傳

又方

野生苧麻根嫩者不拘多少洗淨同鹽搗傳瘡上効

傷重多用鹽

附諸方

雞鳴散

見跌損類

乳香散

治杖瘡腫痛

乳香

另研 沒藥 另研 各一錢

大黃

黃連

黃栢 黃芩 <small>錢各三</small> 腦子 <small>少許</small>	右為細末冷水調勻攤於緋絹上貼之	當歸散	乳香 沒藥 <small>各二錢</small> 茴香 <small>四錢</small> 當歸 <small>一兩</small>	自然銅 <small>火燒醋淬七次</small>	右為細末每服五錢溫酒調服	五黃散	黃丹 黃連 黃芩 黃栢	大黃 乳香 <small>各等分</small>	右為細末冷水調成膏攤緋絹上貼之	陳巡檢方	大黃 當歸 芍藥 川芎	木鱉子 巴豆 白芷 白芨	乳香 沒藥 射干 槐枝	柳枝 <small>已上十三兩</small> 黃丹 <small>飛過</small> 香油 <small>六兩</small>	右除乳香沒藥外十一味用香油浸三月熬至焦黃色	濾去滓入飛丹再熬滴水中不散為度候油溫下乳香	沒藥去火毒	丹溪心法附餘卷之十六終
-----------------------------------------------	-----------------	-----	--------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------	-----	-------------	--------------------------	-----------------	------	-------------	--------------	-------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------------

丹溪心法附餘卷之十七	休寧東山古菴方 <small>廣約之類集</small>	濕鬱門	腰痛 八十 附腎著	丹溪心法	腰痛主濕熱 腎虛 瘀血 挫閃 痰積 脉大者 腎虛杜仲龜板黃栢知母枸杞五味之類為末猪脊髓和丸服 脉瀉者瘀血用補陰丸加桃仁紅花 脉緩者濕	熱蒼朮杜仲黃栢川芎之類 痰積作痛者二陳加南星	半夏 腰曲不能伸者針委中 凡諸痛皆屬大寒涼藥	不可峻用必用溫散之藥 諸痛不可用參補氣則痛愈	甚人有痛面上忽見紅點者多死	戴云濕熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也腎虛者疼之不已者是也瘀血者日輕夜重者是也	入方 治濕痰腰痛大便泄	龜板 <small>一兩</small> 蒼朮 椿皮 滑石 <small>各半</small>	白芍 酒炒 香附 <small>各四錢</small>	右為末糊丸如內傷白朮山查湯下
------------	------------------------------	-----	-----------	------	--------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------	----------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------	-----------------------------	----------------

又方 治腰腿濕痛

龜板酒炙二兩 蒼木

黃柏酒炒 蒼耳

威靈仙酒浸一兩 匾栢半兩

右為末酒糊丸每用黑豆汁煎四物湯加陳皮甘草生

姜煎湯下

又腰痛必用官桂以開之方止其腹脇痛亦可

又方

龜板酒炙兩半 炒栢

白芍藥各一兩 陳皮

威靈仙 知母

蒼木 蒼耳各半兩

右為末水調服

又方

龜板酒炙兩半 酒炒栢四錢 青皮三錢 生甘草一錢半

二

又方

又方

龜板酒炙兩半 酒炒栢四錢 青皮三錢 生甘草一錢半

右為末姜一大片同前藥末一錢研勻以蒼耳汁湯起

煎令沸服之

摩腰膏 治老人虛人腰痛并婦人白帶

附子尖 烏頭尖 南星各二錢半 雄黃一錢

樟腦 丁香 乾姜 吳茱萸各一錢半

朱砂一錢 麝香五粒 大者

右為末蜜丸如龍眼大每用一丸姜汁化開如粥以火

上頻熱置掌中摩腰上候藥盡粘腰上烘綿衣包縛定

隨即覺熱如火日易一次

附脉理

脉訣舉要曰腰痛之脉皆沉而弦兼浮者風兼緊者寒濡

細皆濕實則閃肭指下既明治斯不忒

附諸方

五積散 利劑方 治寒濕傷于腎經腰痛不可使仰兼氣加

茱萸婦人血氣加桃仁 見中寒

木附湯 濟生方 治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

附子炮去 白木各一兩 杜仲去皮半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心溫服

腰痛

心法附錄卷之七

三

附子

牽牛楊氏家藏方 治冷氣流注腰痛不可使仰

延胡索 黑牽牛 破故紙各二兩

右為末研煨蒜為丸梧桐子大每服三十九丸葱酒鹽湯

任下

一方

用黑丑四兩半生半炒研細取頭末水凡梧子大硫黃

為衣每服三十九丸空心鹽酒送下四服即止

速効散 治腰疼不可忍

川練子用肉以巴豆去殼五箇同炒赤去巴豆

茴香去鹽炒

破故紙炒各一兩



右同為末每服一錢食前熱酒調服

獨活湯 治因勞後得腰痛沉重如水似折

羌活 防風 獨活 肉桂

大黃 澤瀉 三錢 桃仁 五十 當歸

連翹 各半 甘草 二錢 防已 酒連 各

右以咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

一方 治積年久患腰疼

用地膚子為末酒調一錢日三五服即愈

威靈仙散 治腰脚痛

威靈仙 生不以 多少

腰瀉 心法附錄卷之七 四 三百四十五

右為末每服二三錢食前酒調下

立安散 杜仲 去皮炒 橘核 炒取

右各等分為末每服二錢入鹽少許食前溫酒調下

青娥丸 三因方 治腎經虛冷腰腿重痛常服壯筋補虛

破故紙 四兩 杜仲 斷絲 生薑 炒乾 二兩半

右為末用胡桃仁三十箇研膏入蜜丸如梧子大每服

五十九鹽酒下

杜仲酒 三因方 治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲 一兩 去粗皮 用薑汁製炒

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服効

一方為末溫酒調一錢空心服

立安丸 三因方 治五種腰痛常服補暖腎經壯健腰脚

破故紙 續斷 乾木瓜 各一 革薢 二兩

杜仲 去皮姜 續斷 酒浸 各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫酒鹽湯空

心任下

○已上諸方散邪理氣之劑

獨活寄生湯 治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或舉

拳掣痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力

腰痛 心法附錄卷之七 五 三百四十六

獨活 三兩 桑寄生 斷代 無以續 細辛

牛膝 秦艽 茯苓 白芍藥

桂心 川芎 防風 人參

熟干 當歸 杜仲 炒 甘草 炙 各二兩

右剉每服三錢水煎空心服 下利者去地黃 血滯

於下委中穴刺出血妙仍灸腎俞崑崙尤佳

牛膝酒 三因方 治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍

地骨皮 五加皮 薏苡仁 川芎

牛膝 各一兩 甘草 一兩 生地黄 十兩 海桐皮 二兩

羌活 一兩

右咬咀用絹帛裹藥入無灰酒內冬浸七日夏三五宿  
每服一盃日用三四服長令酒氣不絕  
一法加炒杜仲二兩

虎骨木瓜丸 治飲食過度寒濕停駐經絡不和傷取風  
血走注筋骨疼痛晝靜夜其殘風冒露所傷筋骨走注  
并婦人血風痠痛

虎骨 醋炙

乳香 沒藥 各研

木瓜

天麻

茯苓

牛膝 浸上四味各二兩好酒  
各一兩 浸十日取焙乾存酒

右為末將浸藥酒打糊丸如梧子大每服三十九至五

腰痛

心法附餘卷之七

六

三言 即反切

十九九空心食前溫酒送下

如神湯 治男子婦人腰痛

玄胡索

當歸

桂 等分

一方有杜仲

右為末每服二三錢食前酒調下

治腰痛 聖惠方

青小香

乳香 各二錢

右件酒浸藥飯上蒸乳香化以酒調服

菴蘭丸 濟生方

治墜墮閃肭氣血凝滯腰痛

菴蘭子 半兩

沒藥 一錢

乳香 半錢

補骨脂 炒

藏靈仙 洗去

杜仲 炒令

官桂 不見

川當歸 酒浸

兩半

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空心溫酒  
湯下俱可

復元通氣散 和劑方 治氣不宣流或成瘡癰并閃挫腰膝  
氣滯疼痛

舶上茴香 炒

穿山甲 粉炒去

粉各二兩

玄胡索

白牽牛 炒

甘草 炒

陳皮 去白各

南木香 二兩半

右為末每服一錢熱酒調下病在上食後服病在下食  
前服不飲酒者煎南木香湯調下

補陰丸

易補損

腰痛

心法附餘卷之七

七

元

○已上諸方散邪理血之劑

安腎丸 三因方

治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢體羸

瘦

葫蘆巴

補骨脂

川練子

茴香

續繼 各三兩

桃仁

杏仁 各去皮尖

炙炒別研

山藥

茯苓 各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯服五十丸

溫腎散 三因方

腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色

並皆治之

熟乾地黃 洗焙

牛膝

茯苓

五味子 <small>各八兩</small>	杜仲 <small>三兩</small>	甘草 <small>炙</small>	巴戟 <small>各八兩</small>
茯苓 <small>各五兩</small>	乾姜 <small>各五兩</small>	麥門冬 <small>各八兩</small>	
右為末每服二錢空心溫酒調下			
草薢 <small>治腎損遺精不能起床腰背痛</small>	杜仲 <small>絲炒去</small>	從蓉 <small>酒浸</small>	兔絲子 <small>酒浸</small>
右等分為細末酒煮猪腰子搗爛為丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸空心溫酒下			
無敵丸 <small>治腰疼腎虛</small>	川草薢	虎骨 <small>酥炙</small>	續斷 <small>酒浸一宿</small>
穿山甲 <small>酥炙</small>	乳香 <small>五錢</small>	沒藥 <small>二錢</small>	茴香 <small>炒</small>
腰痛 <small>心法附餘卷之七</small>	狗脊	當歸 <small>酒浸</small>	砂仁 <small>炒</small>
杜仲 <small>二兩炒</small>	地龍 <small>去土七錢半</small>	青鹽 <small>去土七錢半</small>	鹿茸 <small>各一兩</small>
兔絲子 <small>四兩酒浸</small>			
右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽酒下			
補髓丹 <small>百一選方</small>	升降水	火補益心腎	強筋壯骨治腎虛
腰痛			
沒藥 <small>一兩</small>	杜仲 <small>去皮炒</small>	鹿茸 <small>二兩刮去皮</small>	
補骨脂 <small>十兩用芝麻五兩同炒切芝麻</small>			
右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉三十箇湯泡去皮杵為膏入麪少許酒煮糊丸			

梧桐子大每服一百丸溫酒鹽湯任下

二至丸濟生方 治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

鹿角二兩 麋角二兩 附子泡去皮桂心不見

補骨脂炒 杜仲去皮炒 鹿茸酒蒸焙 青鹽別研

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心嚼胡桃肉鹽酒湯任下惡熱藥者去附子加肉從蓉一兩

○廣按腰痛之証多因腎臟真陰衰虛或外風寒之鬱遏或內濕熱之流注以致榮衛不通故作痛也然腎臟不虛則外邪不能襲內邪不能占榮衛周流何痛之有哉已上六方治腰痛乃散邪兼補虛之藥也

腰痛心法附餘卷之七

○已上諸方散邪補虛之劑

丹溪心法

○腎著為病其體重腰冷如水飲食如故腰重如物在腰治宜流濕兼用溫暖之藥以散之

附諸方

腎著湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩

右以咀每服五錢水煎空心服

參濕湯濟生方 治寒濕所傷身體重著如在水中小便澀

大便澀

蒼木

白木

甘草

茯苓

乾姜

橘紅

丁香

白芍藥

溫服

勝濕湯

治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱關節

疼痛發熱惡寒或多汗惡風小便不利大便泄瀉

白木

人參

乾姜

白芍藥

附子

白茯苓

桂枝

甘草

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分溫

服

丹溪心法

# 疝痛

八十一

陰水腎偏墜

腎囊濕癰

○疝痛濕熱痰積流下作病大槩因寒鬱而作即是痰飲

食積并死血 專主肝經與腎經絕無相干大不宜下

痛甚者不宜麥朮 癰濕多 疝氣宜灸大敦穴在足大

指甲後一韭葉聚毛間是穴 食積與死血成痛者梔子

桃仁山查枳子 吳茱萸並炒以生韭汁順流水煎湯

服一方加茴香附子 却有水氣而腫痛者 又有按

虛者當用麥朮為君佐以疎導之藥其脉沉緊豁大者

按之不定者屬虛必用桂林山梔炒烏頭細切炒右為

末姜汁為丸每服三四十九姜湯下大能切痛

戴云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸膀胱下

部氣者皆妄言也

入方 治諸疝定痛速効

枳實 十五片一 山梔 炒 山查 炒

吳茱萸 炒或濕勝加荔枝核 炮

右為末酒糊丸服 或為末生薑水煎服或長流水調

下二錢空心服

疝痛 治疝之要藥不痛者

守効丸 治疝之要藥不痛者

蒼木 南星 白芷 散水 山查 各一

川芎 枳核 又云枳 半夏 各半

右為末神麴糊丸服 又云有熱加山梔一兩 堅硬

加朴硝半兩 又或加青皮荔枝核

又方 治諸疝發時服

海石 香附 各等

右為末生薑汁調下亦治心痛

又方 治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小便連毛際

間悶痛不可忍者

山梔		桃仁	枳子	俱炒	山查
右各等分研入姜汁用順流水盪起同煎沸熱服					
一方加吳茱萸					
橘核散					
橘核	一錢	桃仁	十五	梔子	一錢
吳茱萸	五分	川芎	細切		
右咬咀水煎服 橘核散單止痛此蓋濕熱因寒鬱而					
發用梔子仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱況二藥皆下					
焦之藥而烏頭又為梔子所引其性急速不容胃中留					
也					
疝痛 心法附餘卷之七					
又方 治疝切藥					
用烏頭細切炒梔子仁炒等分為末或加或減白湯					
丸服					
又方 治疝					
枇杷葉	野紫蘇葉	椒葉	蒼耳葉		
水晶葡萄葉	各等分				
右以水煎薰洗					
腎氣方					
茴香	破故紙	吳茱萸	鹽炒各		
胡蘆巴	七錢	木香	半錢		

右為末蘿蔔搗汁丸梧子大每服三十九空心鹽湯下					
積疝方					
山查	兩	茴香	炒	柴胡	二錢
右為末酒糊丸如梧子大每服五六十丸鹽湯下				牡丹皮	一錢
○疝病黃病久者皆好倒倉					
又方 治疝痛					
山查	兩	枳核	炒	茴香	炒
柴胡	兩	牡丹皮	炒	桃仁	炒各
八角茴香	兩	吳茱萸	炒		
右為末酒糊丸梧子大每服五十九空心鹽湯下					
疝痛 心法附餘卷之七					
又方 治疝作痛					
蒼朮	香附	俱炒	黃柏	酒炒	已上
玄胡索	益智	甘草	已上	桃仁	已上
附子	炒	甘草	已上	茴香	炒
右為末湯調服後一痛過更不再作矣					
又方 治癰疝					
南星	山查	蒼朮	各二	白朮	
半夏	製	枳核	神麴	各一	海藻
昆布	半兩	玄明粉	吳茱萸	各二	
右為末酒糊丸如梧子大空心溫酒下五十九					

一人疝痛作腹內塊痛止疝痛止塊痛作

三稜 莪木 醋黃 炒麴 姜黃

南星 各一 山查 二兩 木香 沉香

香附 各三 黃連 用茱萸炒去茶 蘿蔔子

桃仁 山梔 枳殼 炒各

右為末姜汁浸蒸餅為丸梧子大每服五十九白湯下

○予嘗治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦穴適有摩

腰膏內用烏附丁香麝香將與摩其囊上橫骨端火溫帛

以覆之痛即止一宿腫亦消 予舊有柑橘積後因山行

饑甚過橘芋食之橘動舊積芋復滯氣即時右丸腫太寒

熱先服調胃劑一二貼次早注神思氣至下焦嘔逆覺積

動吐復吐後和胃氣疎通經絡而愈 摩腰膏見腰痛

附脉理

脉訣舉要曰疝脉弦急積聚在裏牢急者生弱急者死沉

遲浮瀉疝瘕寒痛甚則伏或細或動

附諸方

立効散 本事方 治疝氣

川芎 川練子 青皮 去白 舶上茴香

黑牽牛 桃仁 各一

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分溫服

失笑散 治小腸氣痛及婦人血氣痛欲死者

五靈脂 蒲黃 等分

右為末每服二錢先用醋一合熬藥成膏水一盞煎服

茴香練實丸 校萃方 治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶

下皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

川練子 炒 茴香 山茱萸 吳茱萸 湯洗

食茱萸 青橘皮 去白 馬蘭花 醋炒 芫花

陳橘皮 各一

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送

下食前量人虛實加減丸數以利為度

疝痛 心法附餘卷之七 主

金鈴丸 本事方 治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水

出 茴香 炒 馬蘭花 炒 海蛤 破故紙

海帶 兔絲子 各三 金鈴子 肉 兩 木香

丁香 各兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒鹽湯下

烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香 良姜 炒

青皮 去白 檳榔 各五 川練子 十箇

巴豆 七十箇 打碎同炒 川練子

黑色去殼巴豆只用川練子

右為末每服一錢溫酒調下痛者炒生薑熱酒服

一方 治小腸氣痛不可忍者

烏藥洗一宿

高良姜

茴香船上者煮

青皮去白

右為末每服二錢遇發時熱酒調下

青木香丸 治腎冷疝氣脹疼

用吳茱萸一兩分作二分酒醋浸一宿焙乾香附子一

兩華澄茄青木香各半兩為末米糊為丸如梧桐子大  
每服七十丸空心鹽湯下或乳香葱白湯亦可

一方 治疝氣發作痛不可忍者

疝痛心法附錄卷之七

十六

疝痛心法附錄卷之七

真料五苓散一貼連根葱白一寸燈心七莖煎湯吞下

青木香丸五十粒即効五苓散見中暑

玄胡索散 治小腸氣痛

用玄胡索鹽炒乾姜各等分為細末空心鹽酒調下

川練子散 治小腸氣痛

木香不見火

茴香鹽炒黃

川練子用巴豆十粒健碎

巴豆各一兩

右為末每服二錢溫酒空心食前調服

一方 治遠年近日疝氣

吳茱萸

八角茴香

小茴香

川練子

花椒各一兩 青鹽半兩

右為細末以連根葱頭入酒同藥搗成餅晒乾糯米半

升同藥餅用文武火炒黃色研為末酒糊為丸如梧桐

子大每服一百丸空心溫酒鹽湯任下忌發氣之物

一方 治小腸氣臍腹攪疼陰中痛悶不省人事

用茴香鹽炒枳殼各一兩沒藥半兩為末每服二錢熱

酒調下日三服

四神丸直指方 治腎冷疝氣脹不已

吳茱萸揀淨一半用陳酒浸一半

青木香用米醋浸各浸一宿焙乾

香附子各半兩

大香附子一兩

疝痛心法附錄卷之七

十七

疝痛心法附錄卷之七

右為末米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯吞

下或乳香葱白煎湯下

一方

公猪腰子一箇去

玄胡索

黑牽牛各半兩

右將猪腰切作二片入藥末在內濕紙裏煨熟不要焦

空心鹽酒連藥嚼下必瀉下惡物忌食生冷

一方 治疝氣腫疼痠痛

用猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川練子各

等分填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食猪脬以

酒下之將內藥晒乾或焙乾碾為末酒糊為丸如梧子

大每服五六十丸空心溫酒或鹽湯下

○已上諸方辛溫散氣之劑

大烏頭桂枝湯三因方治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁

身體拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭五箇實者去皮尖蜜一

芍藥

桂心各三錢甘草炙二錢半

右咬咀每服四錢水盞半姜五片棗二枚入煎烏頭

蜜半呷同煎七分食前服

一方去烏頭用附子一箇名蜜附湯

葱白散三因方治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛及婦

人產後血氣刺痛皆宜服之

川芎當歸

木香官桂去皮枳殼去白厚朴姜製

茴香炒人參川練炒茯苓

麥芽炒三稜炮蓬朮醋浸一宿焙乾地黄

神麴芍藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞葱白二寸煎七分去粗入鹽

少許空心熱服大便秘澀加大黃瀉利加訶子

聚香飲子濟生方治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可

俛仰

檀香 木香 乳香 沉香

丁香正不藿香各一玄胡索 片子姜黃洗

川烏炮去桔梗去芦桂心不見甘草炙各

右咬咀每服四錢水盞半姜五片棗一枚煎七分去粗

溫服

益智仁湯濟生方治疝氣痛連小腹呼叫不已診其脉沉

緊是腎氣積冷所致

益智仁 乾姜炮甘草炙茴香炒各

烏頭炮去生薑各半青皮去白

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心熱服

疝痛心法附錄卷之十七

玄附湯濟生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大

腑瀉泄

木香不見火玄胡索炒附子炮去皮臍

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分去粗溫服

狼毒丸濟生方治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺

痛不已

芫花醋炒狼毒炒川烏炮去皮臍

全蝎去毒三稜 乾姜炮椒紅炒

沒藥 鱉甲醋煮乾漆炒燬盡

右為末醋糊丸如梧桐子大每服四十丸空心姜湯溫



酒任下甚者以鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處

茱萸內消丸 和劑方 治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成

寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黃水

山茱萸 去核 桔梗 水浸一 川烏 炮去 白蒺藜 炒去

茴香 炒用 吳茱萸 湯洗七

青皮 去白 肉桂 去皮各 大腹皮 酒洗 五味子 揀淨

海藻 洗滌 玄胡索 各二 木香 一兩 川練子 炒二

薤仁 去皮尖 枳實 炒 陳皮 去白各 食茱萸 二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫酒下

葫蘆巴丸 和劑方 治大人小兒小腸蠕腸氣奔猪氣疝氣

疝痛 心法附錄卷之十七 子

偏墜陰腫小腹痛形如卵上下走痛不可忍

葫蘆巴 炒一斤 茴香 去土炒 吳茱萸 湯洗七次

川練子 炒二兩 大巴戟 炒用

川烏 炮去皮尖

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸空心溫

酒下小兒五丸茴香湯吞下 一方加黑牽牛

丁香練實丸 拔翠方 治男子七疝痛不可忍婦人凝聚帶

下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病治法同歸于一

當歸 去芦 附子 炮去 川練子 茴香 炒

右四味各一兩剉碎以好酒三升同煮酒盡為度焙作

細末每服一兩再入下項藥

丁香 木香 各二 全蝎 十三 玄胡索 二兩

右四味同為細末入前項藥末內拌和酒糊丸九如梧

桐子大每服二十丸至百丸空心溫酒送下

神砂一粒丹 宣明方 治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止

者

附子 一兩 鬱金 橘紅 各五

右為末醋麪糊丸如酸棗大以硃砂為衣每服一丸男

子酒下婦人醋湯下服罷又服神聖代針散

神聖代針散

乳香 沒藥 當歸 香白芷

川芎 各半 元青 一兩去足翅 當歸 即青紅娘子

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞

次搽藥末在茶上不得吹攪立地細細急呷之心驚欲

死者小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并

婦人血癖血迷血暈血刺血衝心胎衣不下難產但一

切痛疾脈之大有神効只是要詳疾証用藥

十補丸 百一選方 治小腸寒疝膀胱伏梁奔猪氣等症

附子 一兩用防風一兩剉如黑豆大盞四兩黑

胡蘆巴 木香 巴戟 去心 川練子 炮炙

官桂去皮 延胡索 萆澄茄去蒂 舶上茴香炒

破故紙炒各一兩

右為末用糯粉酒打糊丸如梧桐子大辰砂為衣每服五十九空心酒下婦人醋湯下若加益智仁亦可

○已上諸方辛熱消積之劑

○廣按疝痛之証其人平素外因風濕轉入經絡或是內因怒氣衝上小腹以致榮衛欠順血液稽留日新月盛積聚牢堅每遇風寒之氣外鬱或是五心之火內起則小腹作痛下連陰股或是小腹作痛上連脇肋甚則搐入角弓咬牙戰掉冷汗交流須臾不救古疝痛心法附餘卷之十七 方以為小腸氣膀胱氣腎經寒氣用辛溫之藥以散氣則是治其標也丹溪以為痰飲食積死血流注歸於厥陰肝之一經用辛平之藥以豁痰消積破血則是治其本也夫疝証痛有定處是有形之積也非痰飲與食積死血相聚而何哉若是無形之氣作痛則走注於滿腹而滲散於偏身矣

○木腎偏墜新增

附諸方

入方 治木腎

楮樹葉又云雄者晒乾為末酒糊丸桐子大空心鹽

湯下五十九

又方 治木腎不痛

枸杞子五錢 南星 半夏各七錢 黃柏酒炒

蒼朮鹽炒各一兩 山查 白芷 神麴炒各五錢

滑石炒八錢 昆布 三錢 吳茱萸四錢

右為末酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十九

治小腸氣及木腎偏墜

黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米

醋各一碗於砂鍋內煮乾為度取去黑牽牛用青紅

娘子十九箇於鉄鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛碾

取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二兩醋糊丸如

梧桐子大每服三十九空心鹽酒送下不可多服如

多服令人頭眩可服黑錫丹

奪命丹和劑方 治遠年近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏

墜腫硬陰間濕痒疥成瘡癰

吳茱萸一斤酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸四兩各浸一宿用火焙乾

澤瀉去土二兩

右為末酒煮麴糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒鹽

湯任下

金鈴子丸海藥方 治鈞腎氣膀胱偏墜痛不可忍

<p>川練子 <small>五兩剉作五分製○一分用斑蝥一箇去</small></p> <p>右將練子去核同破故紙炒香培乾為末酒糊丸如梧</p>	<p>金鈴丸 <small>本事方</small> 治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水</p> <p>出方見前</p>	<p>三茱萸 <small>百一選方</small> 治小腸氣外腎腫痛</p>	<p>山茱萸 吳茱萸 食茱萸 <small>各二兩</small> 黑牽牛 <small>炒一兩</small></p>	<p>破故紙 <small>七錢</small> 青鹽 青皮</p>	<p>茴香 <small>三錢</small> 川練子 <small>足同炒赤色去斑蝥不用</small></p> <p>右為末醋煮麴湖丸如梧桐子大每服三五十丸預先</p>	<p>喫炒茱仁十五箇以溫酒或鹽湯下藥或炒茴香湯亦可空心食前服</p>	<p>一方 治外腎大如升斗</p>	<p>茴香 青皮 荔枝核 <small>炒碎</small></p>	<p>右各等分炒出火毒為末每服二錢空心酒調下</p>	<p>一方 治陰疝或偏墜大小子痛欲死者</p>	<p>木鱉子 <small>一斤取肉</small> 芙蓉葉末 黃栢皮末</p>	<p>右將木鱉子同醋調二藥末敷核上痛即止</p>
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------------------	--------------------------

<p>腎囊濕瘡</p> <p>蜜陀僧 乾姜 滑石</p> <p>右等分為末擦患處</p>	<p>又方 先用茱萸煎湯洗</p> <p>吳茱萸 <small>半兩</small> 寒水石 <small>三錢</small> 黃栢 <small>二錢</small> 樟腦</p>	<p>蛇床子 <small>半兩</small> 輕粉 <small>十錢</small> 硫黃 <small>二錢</small> 白礬</p>	<p>換椰 白芷 <small>各二錢</small></p> <p>右為末麻油調搽</p>	<p>又方 治腎上風濕瘡及兩腿</p>	<p>全蝎 換椰 蛇床子 硫黃 <small>各一錢</small></p>	<p>疝痛 <small>心法附餘卷之十七</small> 主</p> <p>右四味研為細末用麻油調入手心搽熱吸三口用手</p>	<p>抱囊一項穴搽藥兩腿上</p>	<p>脚氣 八十二 附足跟痛 脚轉筋</p>	<p>丹溪心法</p> <p>○脚氣須用升提之藥提起其濕隨氣血用藥 有脚氣</p>	<p>衝心者宜四物湯加炒黃栢再宜湧泉穴用附子末津</p>	<p>唾調傳上以艾灸泄引熱下</p>	<p>入方</p>	<p>防已飲</p>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------	------------

白朮	木通	防己	枳榔
川芎	甘草梢	犀角	蒼朮 鹽炒
黃柏	生苳 各酒炒		
大便實加菴仁小便澀加杜牛膝有熱加黃芩黃連			
大熱及時令熱加石膏有痰加竹瀝姜汁如常腫者			
導主平濕熱先生別有方			
又方 治濕熱食積痰流注			
蒼朮	黃柏	防己 各一兩	南星
川芎	白芷 各七錢	犀角	枳榔 各一兩
血虛加牛膝龜板			
腳氣 心法附餘卷之十七			
右為末酒糊丸服肥人加痰藥			
健步丸			
生苳 半兩	歸尾	芍藥	陳皮
蒼朮 各一兩	吳茱萸	條芩 各半兩	牛膝 一兩
桂枝 二錢	大腹子 二箇		
右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白朮水			
通湯下			
又方 一婦人足脛腫			
紅花 五錢	牛膝 俱酒洗	生苳 六分	黃柏 一錢
蒼朮 一錢	南星 七分	草龍膽 五分	川芎 一錢

若筋動於足大指上至大腿近腰結了因奉養厚遇風			
寒宜四物湯加酒芩紅蒼朮南星姜煎服			
濕痰脚氣大便滑泄			
蒼朮 二兩	防風 一兩	枳榔 六錢	香附 八錢
川芎 六錢	條芩 四錢	滑石 一兩	甘草 三錢
右為末或丸或散皆可服			
脚軟筋痛			
牛膝 二兩	白芍 半兩	龜板 酒炙	黃柏 酒炒
知母 炒	甘草 半兩		
右為末酒糊為丸如梧子大空心白湯下五十丸			
腳氣 心法附餘卷之十七			
應痛丸 治脚氣痛不可忍此藥為劫劑			
赤芍藥 半兩 煨	草烏 半兩 煨		
右為末酒糊丸梧子大空心服十丸白湯下			
又方 治脚氣腫痛			
芥子	白芷 等分		
右為末姜汁和敷貼或用仙朮菴活獨活白芷細辛為			
末入帛內作襪用			
又方 蝶洗脚氣			
威靈仙	防風	荆芥	地骨皮
當歸	升麻	胡蘆 各等	

右煎湯燂洗

附脉理

脉訣要曰脚氣之脉其壯有四浮弦為風濡弱濕氣遲  
瀯因寒洪數熱鬱風汗濕溫熱下寒熨

脚氣治例

心法附錄曰脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕  
勝濕以仙木白朮防己川芎為主或六物附子湯或當

歸拈痛湯

脚氣氣鬱甚者丹車丸除濕丹有飲者東垣開結導飲

丸

脚氣

心法附錄卷二十七

天

清生酒

脚氣解表用麻黃左經湯等藥隨經選用有兼痰氣寒

濕者五積散加木瓜

若雙解以大黃左經湯東垣羌活導滯湯

若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黃

栢南星或健步丸

若踈風養血用獨活寄生湯最効

春夏氣溢腫而痛者用香薷散加五加皮木瓜換柳川

練子 熱而紅腫者敗毒散加木瓜蒼朮

秋冬以後用五積散加木瓜牛膝換柳吳茱萸

附諸方

麻黃左經湯 三因方 治風寒暑濕流注足大陽經腰足攣  
痺關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩  
暈

麻黃 去節

乾葛

細辛

白朮 米泔浸

茯苓

防己

桂心 不見火

羌活

甘草 炙

防風 各等分

右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎空心服自  
汗去麻黃加肉桂芍藥重者加白朮陳皮無汗減桂加  
杏仁澤瀉並加等分

半夏左經湯 三因方

治足少陽經為風寒暑濕流注發熱

脚氣

心法附錄卷二十七

天

三因

腰脇疼痛頭眩暈嘔吐不食

半夏 湯洗七次

乾葛

細辛

白朮

麥門冬 去心

柴胡

茯苓

桂心 不見火

防風

乾姜 炮

黃芩

小草

甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心

服熱悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

大黃左經湯 三因方 治風寒暑濕流注足陽明經使脚痛

赤腫痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛 去苗

茯苓

羌活

大黃

甘草	炙	前胡	枳殼	厚朴
黃芩	杏仁	研各等分	枳殼	厚朴
右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘊小便澀少加澤瀉四肢瘡瘍浸淫加升麻並等分	大料神祕左經湯	三因方	治風寒暑濕流注三陽經腰足拘攣大小便秘澀喘滿煩悶並皆治之	
半夏	湯洗	乾葛	細辛	麻黃
麥門冬	去心	小草	白姜	厚朴
茯苓	防己	枳殼	甘草	
桂心	羌活	防風	柴胡	
黃芩	各等分			
右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎服自汗加牡蠣白朮去麻黃黃腫加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻腹痛或利去黃芩加芍藥附子大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘊並等分對証加減尤宜審之	六物附子湯	一因方	治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫	附子
皮	桂心	防己	甘草	

白朮	茯苓	右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎六分食前溫服	換腿丸	步艱辛
薏苡仁	南星	石楠葉	石斛	
檳榔	華蘼	川牛膝	羌活	
防風	木瓜	黃芪	當歸	
天麻	續斷			
右為末酒打麴糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯任下	一方加大附子肉桂蒼朮各一兩			
○已上諸方治各經邪氣之劑				
香蘊散	治風濕脚痛踈通氣道			
加檳榔木瓜各枚蘊散	方見傷寒			
右咬咀每服四錢水一盞姜葱煎服				
活血應痛丸	治風濕客於腎經血脉凝滯脚重疼痛項背拘攣不得轉側常服活血脉壯筋骨			
狗脊	蒼朮	沒藥		
草烏頭	香附子	陳皮		
右為末酒糊丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒熱水任				

下		活絡丹 <small>和劑方</small> 治諸般風邪濕毒之氣傷滯經絡流注	間筋脉攣拳腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝	心腹一切痛風走注	川烏 <small>泡去皮</small> 沒藥 <small>研</small> 乳香 <small>研各二錢</small> 草烏 <small>泡去</small>	地龍 <small>去土</small> 南星 <small>泡各六兩</small>	右為末入乳沒和勻酒糊丸如梧桐子大每服二十九	空心酒下荆芥湯下亦可	經進地仙丹 <small>和劑方</small> 治腎氣虛憊風濕流注脚膝酸疼行	步無力	脚氣 <small>心法附餘卷之十七</small>	川椒 <small>去目及開口者</small> 兔絲子 <small>酒浸</small> 覆盆子 <small>各二兩</small>	白木 <small>一兩</small> 白附子 <small>一兩</small> 羌活 <small>一兩</small> 防風 <small>去土</small>	人參 <small>一兩</small> 烏藥 <small>二兩</small> 川烏 <small>泡一兩</small> 附子 <small>泡二兩</small>	茯苓 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 狗脊 <small>去毛各</small> 地龍 <small>去土</small>	赤小豆 <small>二兩</small> 骨碎 <small>補去各</small> 木鱉子 <small>去殼</small>	草薢 <small>二兩</small> 茯苓 <small>酒浸焙</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 南星 <small>姜製</small>	何首烏 <small>各二兩</small> 黃芪 <small>二兩</small>	右為末酒糊丸如梧子大每服四十丸空心溫酒下	加減地仙丹 <small>濟生方</small> 治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣腫	滿疼痛
---	--	----------------------------------------	-----------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------------	-----	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	-----

地龍 <small>炒去土</small> 五靈脂 <small>去石</small> 烏藥	白膠香 <small>別</small>	五加皮 椒紅 <small>出汁</small> 威靈仙 木瓜 <small>去穢</small>	赤小豆 <small>炒</small> 川烏 <small>泡</small> 黑豆 <small>炒去皮</small> 天仙藤	蒼朮 <small>米泔浸</small> 木鱉子 <small>去殼油</small>	右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯鹽酒	狂下	不老地仙丹 <small>直指方</small> 治腎臟風毒輕脚壯筋	茯苓 <small>浸用酒</small> 當歸 <small>酒浸</small> 虎骨 <small>酒炙</small> 牛膝 <small>酒浸</small>	赤小豆 <small>半兩</small> 蒺藜 <small>炒去刺</small> 川椒 <small>去目</small> 川芎 <small>各一兩</small>	草薢 <small>鹽水煮</small> 血竭 <small>半兩</small> 白南星 <small>泡</small> 白附子 <small>泡</small>	脚氣 <small>心法附餘卷之十七</small>	何首烏 <small>黃芪蜜炙各</small> 防風 <small>半兩</small> 杜仲 <small>姜製</small>	羌活 <small>一兩</small> 沒藥 <small>別研</small> 獨活 <small>各七錢</small> 木鱉子 <small>去油</small>	地龍 <small>去土</small> 茴香 <small>炒</small> 乳香 <small>別研各</small>	右為末酒糊丸如梧子大每服四十丸木瓜陳皮湯	下	神翁地仙丹 <small>醫方集成</small> 專治風痺脚氣	天仙子 <small>一兩</small> 川椒 <small>并開口者</small> 木鱉子 <small>四兩</small>	赤土 <small>九兩</small> 白膠香 <small>五兩</small> 黑豆 <small>六兩</small>	黑牽牛 <small>六兩</small> 五靈脂 <small>三兩</small> 陳黑 <small>色好者用</small> 好醋	草烏 <small>七箇小</small> 而堅實者淨洗用籠在鍋中并炒
------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------	----	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

右為末麪糊凡如梧桐子大每服六十九丸姜湯下		沉香 一兩		枳榔 木瓜 川芎 各一兩 木香 一兩		透骨丹 廉叔家傳方 專治脚氣		一方除紫金皮木瓜加防風小黑豆		一方加赤芍藥		一方除紫金皮石膏加白木木香川芎		好酒一盞送下多以酒助藥力服後一時久用外應散		薤蒸淋洗		右為末蜜凡如彈子大每服一丸嚼生薑一塊空心以		白膠香 三兩 淨水 煮數		紫金皮 三兩 淨水 煮數		白蔞藜 三兩 淨水 煮數		骨碎補 三兩 淨水 煮數		石膏 三兩 淨水 煮數		風濕		加減至寶丹 廉叔家傳方 專治脚氣止疼痛除		千百下丸 如梧桐子大每服三十丸茶清下病甚煩服		右為末開水白膠香末蜜子末用隔年好醋打麪糊拌	
----------------------	--	-------	--	--------------------	--	----------------	--	----------------	--	--------	--	-----------------	--	-----------------------	--	------	--	-----------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	----	--	----------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--

右為末麪糊凡如梧桐子大每服五十九丸空酒下		麻黃 各二兩 蒼朮 十二箇 肉桂 一兩		厚朴 枳殼 白朮 乾姜 泡		芍藥 當歸 桔梗 各一兩 陳皮		白芷 川芎 茯苓 甘草		搜風散 廉叔家傳方 治寒濕脚氣愈後可常服之		尤宜內加木瓜 方見中寒		五積散 和劑方 治寒濕流注兩脚酸疼有兼痰氣者用之		右吹咀每服四錢水一盞煎服不可多進		杏仁 各一兩		麻黃 各一兩 甘草 各一兩 淮烏 川草解		瘡風散 廉叔家傳方 專治寒濕脚氣先以此發散		○已上數方治風濕之劑		右為末麪糊凡如梧桐子大每服五十九丸空酒下		虎脰骨 白蔞藜 各一兩 羌活 半兩		生蒼朮 杜仲 當歸 川牛膝		白茯苓 赤芍藥 熟地黃 烏藥 各一兩		黑豆 半升 附子 川烏 黃芪		白朮 五加皮 肉桂 各半兩 枳榔 一兩		黑虎丹 廉叔家傳方 治脚氣筋骨軟弱步履不隨	
----------------------	--	---------------------	--	---------------	--	-----------------	--	-------------	--	-----------------------	--	-------------	--	--------------------------	--	------------------	--	--------	--	----------------------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------------	--	-------------------	--	---------------	--	--------------------	--	----------------	--	---------------------	--	-----------------------	--



散去白木加半夏是也

導氣湯存方治寒濕脚氣赤腫疼痛心腹膨脹頭目手

足浮腫身體腰背疼痛並皆治之

羌活 獨活 木瓜 薏苡仁

青皮 陳皮 桑白皮 大腹皮

枳殼 枳榔 青木香 紫蘼

甘草 大腹子 木通 赤茯苓各等分

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服熱加大

黃寒加蒼木

沉香大腹皮散御藥院方治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫

滿疼痛筋脉不利

大腹子連皮 沉香

茴香炒 白茯苓去皮 木通 桑白皮炒 枳榔

紫蘼子炒 蘼葉各一兩 乾木瓜去穢炒 荊芥穗

枳殼去穢炒 甘草炙 陳皮去白

烏藥各一兩

右咬咀每服五錢水一盞姜五片乾蘿蔔五大片同煎

七分溫服如無蘿蔔用蘿蔔子一錢微炒搗碎同煎如

覺大腸乾燥即服加減神功丸

柴更丸三因方治脚氣入腹腹中不仁喘急欲死

吳茱萸湯洗木瓜各等分乾

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸至百丸酒飲

任下或以木瓜另蒸爛研膏為丸九妙

勝駿丸三因方治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳

脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣

壯筋骨

附子一箇泡當歸酒浸 天麻 牛膝酒浸

木香一兩 酸棗仁炒 熟地黃酒浸 防風去蘆

木瓜四兩 羌活一兩 乳香半兩 射香二兩

全蝎去毒 沒藥另研 甘草一兩

右為末用生地黃二斤研爛如泥入無灰酒四升煮爛

如膏以前藥和勻杵令堅每兩作十九丸每服一丸細嚼

臨睡酒下如冬月無地黃煉蜜丸如梧桐子太每服二

十丸鹽湯溫酒任下

一方加枳榔萆薢薢蓉破故紙各一兩當歸地黃

各五錢

葫蘆芭楊氏家藏方治一切寒濕脚氣脚膝疼痛行步

無力

葫蘆芭酒浸一 破故紙炒香

右為末用大木瓜一枚切頂去穢置藥在內以滿為度

復用頂蓋之以竹簽定蒸熟爛研同前餘藥末和為

丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下

越痛散楊氏家藏方治濕氣攻注腰脚疼痛行步少力

杜仲炒斷絲肉桂去皮延胡索 萆薢

沒藥當歸酒洗焙

右為末每服三錢空心溫酒送下

一方 治濕脚氣溫酒居歌括

濕氣同流髀膝疼 香薷散煮忍冬藤

木香芍藥仍增入 攻効如神喚得應

東垣開鬱導飲丸 治食積痰涎注

白朮陳皮澤瀉茯苓

神麴炒麥蘖半夏各二枳實炒

巴豆霜錢半青皮 乾生薑各半

右為末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十九或六七

十九溫水下

○已上諸方治寒濕之劑

當歸拈痛湯板萃方治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸

膈不利及遍身疼痛下症手足脛痛不可忍

羌活 甘草 黃芩酒浸茵陳酒炒各

人參去芦升麻 苦參酒洗葛根

蒼朮錢各二防風去芦當歸身 知母酒洗

茯苓炒澤瀉 猪苓錢各三白朮半錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗空心溫服

舟車丸 治濕熱勝氣鬱甚者方見中濕

除濕丹 治濕熱勝氣鬱甚者方見濕熱

越痛丸御藥院方治脚氣毒攻兩脚痛不可忍

白甘遂 白芥菜子炒大戟白麴各二

右滴水捏作餅子瓦上焙令黃赤碎碾作末醋煮糊丸

如菉豆大冷酒下十九利即止

又方 治下痒瘡脚腫痛行履難者

脚氣心法附餘卷之十七 木鱉子去皮

右為末猪腰子一箇去皮膜切片用藥四錢在心濕紙

包定煨熟空心米飲送下量虛實加減服後便伸直兩

脚如行不便利者只吃白粥二三日為妙

夢中神授方醫方集成治脚氣神効

右用木鱉子每箇作兩邊麩炒炒畢切碎再炒用皮紙

滲盡油為度每一兩用厚桂一兩同為末熟酒調服以

得醉為度蓋覆得汗即愈

治脚氣百日選方治脚氣上攻流注四肢結成腫核不散

赤熟椒痛及療一切腫毒

右用甘遂為末以水調傳腫處却濃煎甘草湯服之其腫即散二物本相反須兩人置各處安頓不可相和則不驗清流中子韓詠苦此只一服病者十去七八再服而愈

○已上諸方治濕熱之劑

栝榔湯治一切脚氣順氣防壅

栝榔香附子去毛 陳皮去白 紫蘊葉

木瓜五加皮 甘草炙各

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服婦人脚氣加當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘

脚氣心法附錄卷之十七 四十

加枳殼熱者加大黃

烏藥平氣湯三因方 治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行

步艱苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神去木 甘草炙 白芷 當歸

白木川芎 五味子 紫蘊子

乾木瓜人參 烏藥去木各 等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

大腹皮散治諸証脚氣腫痛小便不利

栝榔荆芥穗 烏藥 陳皮

紫蘊葉各一兩 薤子炒半 沉香不見 桑白皮炙

枳殼去穢各一兩半 大腹皮三兩 乾宣木瓜去穢一兩半

紫蘊子炒一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

○已上諸方理氣之劑

獨活寄生湯治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或攣

拳掣痛不得屈伸或緩弱冷痺行步無力 見腰痛類

全匱八味丸治足少陰經脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘

急腎經虛寒所致也此證最急以腎秉心水尅火死不

旋踵見補損

三因神應養真丹治足厥陰經為四氣進襲左癱右瘓

痰涎壅盛半身不遂手足頑麻語言蹇澀脚膝無力業

氣凝滯偏身疼痛

四物湯內加羌活天麻

右為末蜜丸雞子黃大每丸木瓜兔絲子浸酒化下

○已上諸方理血之劑

加味敗毒散治足三陽經受熱毒氣流注脚踝止炊赤

腫痛寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活獨活 前胡 柴胡

枳殼桔梗 甘草 人參

茯苓川芎 大黃 蒼木等分

<p>右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗通口食前服</p> <p>赤芍藥 甘草各五錢 龜仁製五粒</p>	<p>芒硝各一兩 防己 官桂 牡丹皮</p>	<p>川牛膝 羚羊角 栝榔 大黃炒</p>	<p>牛膝散 治脚氣浮腫心神煩悶及婦人月經不通</p>	<p>倍丸數以利為度</p>	<p>十九溫水溫酒米飲任下食後臨卧服如大便不通可</p>	<p>右為細末入麻仁搗研勻煉蜜丸如梧桐子大每服四</p>	<p>人參二兩 心法附餘卷之十七</p>	<p>訶梨勒 牽牛微炒 火麻仁各四兩</p>	<p>胸煩燥腫不安及治脚氣并素有風人大便秘結燥</p>	<p>大便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心</p>	<p>加減神功丸 御藥院方 治三焦氣澁心腹痞悶六腑風熱</p>	<p>右咬咀每服五錢或七錢水煎</p>	<p>大黃酒浸煨 枳實炒二錢</p>	<p>羌活 獨活各半 防己 當歸各二錢</p>	<p>便溺阻隔先以此藥導之後用當歸粘痛湯</p>	<p>東垣羌活導滯湯 治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛</p>	<p>右咬咀每服半兩姜三片水一鍾半煎七分空心溫服</p>
-----------------------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------

<p>覆不隨如受風寒濕氣以致脚痛者最宜服之</p>	<p>加味四斤丸 清生方 治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步</p>	<p>凡空心煎木小酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨</p>	<p>右為細末用浸藥酒打麴糊丸如梧桐子大每服五十</p>	<p>虎骨 治了用無灰酒五斤浸春秋各五日夏</p>	<p>從蓉 洗淨各一 附子 炮去皮</p>	<p>宣州木瓜 去穢 天麻</p>	<p>已履地艱辛脚心隱痛一應風寒濕痺脚氣緩弱並宜</p>	<p>四斤丸 和劑方 治腎經虛寒十攻腰脚筋脉拘攣掣痛不</p>	<p>○已上諸方治風熱之劑</p>	<p>右為末米糊丸如梧桐子大每服五十丸食前飯湯服</p>	<p>大黃 枝榔 枳實各半 黑牽牛生二兩</p>	<p>搜風丸 仁存方 治脚氣腫痛</p>	<p>一兩行痛止</p>	<p>右剉都作一服水一盞半煎至八分去粗空心服下利</p>	<p>羌活半錢 當歸身一錢 枳實 大黃各五錢</p>	<p>枳實大黃湯 治脚氣腫痛</p>	<p>以下惡物量強弱用</p>
---------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------	------------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------

虎脰骨 <small>一兩</small> 天麻 <small>一兩</small> 宣木瓜 <small>一兩</small> 蒸	肉苁蓉 <small>一兩</small> 酒浸 <small>一兩</small> 沒藥 <small>別研</small> 乳香 <small>別研</small>	川烏 <small>一兩</small> 泡去皮 <small>一兩</small> 川牛膝 <small>一兩</small> 法 <small>一兩</small> 酒浸	右為末入木瓜膏和酒糊杵搗為丸如梧桐子大每服七十九空心溫酒鹽湯任下	木瓜丸 <small>和劑方</small> 治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘攣腫滿疼	痛行履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀	熟地黃 <small>洗焙</small> 陳皮 <small>去白</small> 烏藥 <small>各四兩</small> 黑牽牛 <small>炒三</small>	杏仁 <small>去皮</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 石楠藤 <small>葉</small> 當歸 <small>酒浸</small>	從蓉 <small>酒浸</small> 續斷 <small>乾木瓜</small> 各二兩赤芍藥 <small>一兩</small>	肝氣 <small>心法附餘卷之十七</small> 聖藥	右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下	木瓜牛膝丸 <small>三四方</small> 治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫	急疼痛	木瓜 <small>大者三四兩</small> 切開 <small>蓋去穢</small> 先用糯米攪過 <small>鹽焙</small>	研為末 <small>即將蓋木入小內</small> 今滿 <small>仍用蓋</small> 釘定 <small>蒸</small>	萆薢 <small>一方</small> 無 <small>苗香</small> 焙 <small>牛膝</small> 酒浸 <small>狗脊</small> 炒去皮	巴戟 <small>海桐皮</small> 各一	川烏 <small>大者</small> 去皮 <small>尖用無灰酒一升</small> 浸	右為末入青鹽 <small>拌勻</small> 將前二膏 <small>搜和</small> 如硬再入酒杵數
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

千下丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒鹽湯任下	神烏丸 <small>濟生方</small> 治遠年近日乾濕脚氣	川烏 <small>泡去皮</small> 切 <small>川牛膝</small> 酒浸 <small>肉苁蓉</small> 酒浸 <small>海桐皮</small>	川萆薢 <small>各二兩</small> 川牛膝 <small>酒浸</small> 肉苁蓉 <small>酒浸</small> 海桐皮	金毛狗脊 <small>毛半兩</small> 去皮	右為末用木瓜膏為丸如梧桐子大每服七十九空心溫酒下	思仙續斷丸 <small>本事方</small> 治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一	切風毒流注並皆治之	萆薢 <small>四兩</small> 防風 <small>去苗</small> 薏苡仁 <small>各三兩</small> 五加皮 <small>三兩</small>	生地黄 <small>五兩</small> 思仙 <small>木</small> 即 <small>杜仲</small> 炒 <small>牛膝</small> 酒浸	川續斷 <small>羌活</small> 各三兩	右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半斤去皮子以鹽酒	煮木瓜成膏杵丸如梧桐子大每服七十九空心鹽酒	鹽湯任下	十全丹 <small>三四方</small> 治脚氣上攻心腹足心隱痛小腹不仁關	節攣痺疼痛無時煩渴引飲大小便或秘或利	石斛 <small>酒浸</small> 狗脊 <small>去毛</small> 萆薢 <small>從蓉</small> 酒浸 <small>各</small>	熟地黃 <small>二兩</small> 牛膝 <small>酒浸</small> 地仙子 <small>茯苓</small>	遠志 <small>各一兩</small> 杜仲 <small>二兩</small> 去皮 <small>炒</small>
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

右為末煉蜜凡如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯送下空心服

○已上諸方治虛寒之劑

外應散 康叔家傳方 治肺氣用此薰蒸淋洗

石楠葉 矮樟葉 杉片 藿香

紫金皮 藁本 獨活 大蓼

白芷 紫蘘 羌活 各等分

右剉碎加花椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分器

盆內令病者以足加其上用厚衣蓋覆薰蒸痛處候溫

可下手時却令人淋洗

脚氣 心法附餘卷之十七 聖方

五枝湯 聖方 洗脚氣

右用茺柳楮桑槐三件枝條煎湯洗脚消腫住痛先喫

酒三五盃

一方

用無名異末化牛皮膠調勻貼痛處

一方

用單麻子七粒去殼研爛同蘘合香丸和勻貼脚心其

痛即止

一方

用草烏末以麴酒糟搗爛貼患處即止若無麴糟用生

姜汁亦可

一方 治脚氣衝心

用白礬二兩水一斗五升畧煎三五沸浸洗

一方 治寒濕脚氣不可忍者

用團魚一兩筒水二斗煮至一斗去團魚止用汁加蒼

耳昇風藤蒼朮各半斤煎至七升去粗以盆盛之乘熱

薰蒸待溫浸洗神効

○已上諸方外治之法

丹溪心法

○足跟痛 有痰有血熱 血熱四物加黃柏知母牛膝

脚氣 心法附餘卷之十七 聖方

之類 有痰唾者五積散加木瓜

四物湯 見補損

五積散 見中寒

○脚轉筋 新增

附諸方

一方 治脚轉筋疼痛攣急

用松節二兩剉細乳香一錢以銀石器內慢火畧炒焦

存性研細每服一錢至二錢木瓜酒調下

一方 治脚轉筋

取赤蓼莖細切用水四合酒二合煎至四合分二服

二方

急將大蒜磨脚心令通熱即瘥

一方 治脚氣筋骨疼痛

用金銀花為末每服二錢熱酒調下或剉碎同木瓜白芍藥官桂當歸甘草酒水各半鍾煎去粗空心熱服

治喘服方

川貝母 四月

陳香圓 二隻

花粉 二兩

桂圓 二斤

白糖 四兩

先將厚杜仲一斤鹽酒炒斷然用水一大鈔鍋煎數拾沸濾淨次將陳香圓桂貝煎至三碗將貝母花粉末同白糖收貯瓶內不拘時服

丹溪心法附餘卷之十七終中

丹溪心法附餘卷之十八

休寧東山古庵方 廣約之類集

積門

積聚痞塊 八十三

丹溪心法

○痞塊在中為痰飲 在右為食 一云痰積 在左為血塊

氣不能作塊成聚塊乃有形之物也痰與食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬朮朮仁紅花五靈脂香

積聚

丹溪心法附餘卷之十八

言又附

附之類為丸石礮白朮湯吞下 瓦礮子能消血塊次消

痰 石礮一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積

治塊當降火消食積食積即痰也 行死血塊去須大

補○凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積

藥使之融化則除根矣 凡婦人有塊多是血塊

戴云積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或有或

無或上或下或左或右者是瘕

○積聚癥瘕朱先生醫台州潭浦家用蜀葵根煎湯去

粗再入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛膝煎成湯入細

研桃仁玄胡粉各少許熱飲之二服當見塊下如病重

者須補接之後加減再行

入方

消塊丸 即千金方硝石大黃丸止可磨塊不令人困須

量度虛實

硝石 六兩

人參

甘草 各三兩

大黃 八兩

右為末以三年苦酒三升又斗置礬器中以竹片作準

每入一升作一刻柱堅器中先納大黃不住手攪使微

沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸

如雞子中黃大每一丸米飲下如不能大丸作小丸如

梧桐子大每服三十丸服後當下如雞肝如米泔赤黑

積聚 心法附餘卷之十八 二 等色下後避風冷啖軟粥將息之 吾酒即米醋也

三聖膏

末化石灰半斤為末瓦器中炒令淡紅色提出火候

熱稍減次下大黃末一兩就爐外炒候熱減下桂心

末半兩畧炒入米醋熬攪成黑膏厚紙攤貼患處

○瘡塊在皮裏膜外須用補氣藥香附開之薰二陳湯

加補氣藥先須斷厚味

又方琥珀膏

大黃 朴硝 各一兩

右為末大蒜搗膏和貼患處

又方 治茶癖

石膏

黃芩

升麻 各等分

右為末沙糖水調服

又方 一人愛喫茶

白朮

軟石膏

片苓 各三錢

牛膽星

白芍藥 各二錢 薄荷 一錢 大者

右為末沙糖水調作膏食後津液化下

又方 治脇下有塊

龍會丸

二錢半 起科

姜黃

桃仁 各五錢

右為末蜜丸如梧桐子大每服五十丸食速溫水下

又方 龍會丸和鵝鴝糞大能消食積或入保和丸治塊着

在何部分

治血塊丸 尾龍子能消血塊

海粉 醋煮 三稜 莪朮 醋煮 紅花

五靈脂 香附 各等分 石鱗 減半

右為丸白木湯吞下三十丸

又方 治婦人血塊如盤有孕難服峻利

香附 醋煮 苑仁 去皮 白朮 各一兩 海粉 醋煮

右為末神麩為丸如菉豆大每服五十丸空心溫水下



又方 治婦人食積先血痰積成塊在兩脇動作腹鳴  
雜眩暈身熱時作時止男子可服

黃連 一兩半 一兩半 用吳茱萸炒去茱萸 山梔 炒

川芎 三稜 神麴 桃仁 去皮尖

香附 童便浸 羅蔔子 炒 一兩 山查 莪朮 醋煮各

右為末蒸餅丸如桐子大每服五六十丸食遠白湯下

一方有青皮半兩白芥子一兩半炒

保和丸 治一切食積

山查 六兩 神麴 半夏 茯苓 各二兩

陳皮 連翹 羅蔔子 各一

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大每服七十八丸食遠

白湯下

又方

山查 白朮 各四 神麴 二兩

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服七十九丸食後白湯下

又方

山查 三兩 白朮 二兩 陳皮 茯苓

半夏 各一 連翹 黃芩 神麴

羅蔔子 各半

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服五十九丸食後姜湯下

阿魏丸 治肉積 諸阿魏丸脾虛者須以補脾藥作湯  
使下之切不可獨用虛虛之禍疾如反掌

連翹 二兩 山查 二兩 黃連 一兩 阿魏 二兩 醋煮

右為末醋煮阿魏作糊丸每服三十九丸白湯下

小阿魏丸

山查 三兩 石礬 三錢 半夏 一兩 阜角水

右為末粥糊丸每服三十九丸白湯下

又方 治飽食停滯胃壯者宜此脾虛勿服

山查 羅蔔子 神麴 麥芽

陳皮 青皮 香附 各二 阿魏 一兩 醋煮

右為末炊餅丸如桐子大每服三十九丸食遠白湯下

又阿魏丸 去諸積聚

山查 南星 各一 半夏 阜角水 麥芽 炒

神麴 黃連 各一 連翹 阿魏 醋煮

瓜蒌 貝母 各半 風化硝 石礬

羅蔔子 各半 黃連 一錢 半如無 宜連代之

右為末姜汁浸蒸餅丸如桐子大每服二十四丸白湯

下

佐脾丸

山查 三兩 半夏 茯苓 各一 連翹

陳皮	蘿蔔子	各半兩
右為末粥丸如菰豆大每服六七十丸食遠溫水下		
小溫中丸		
青皮	一兩	香附
		便浸四兩
蒼朮		半夏
		各二兩
白朮	半兩	陳皮
		一兩
苦參	半兩	黃連
		一兩
針砂	一兩	醋炒
右為末麴糊丸如桐子大每服三十九丸食遠白湯下		
又方		
針砂	三兩	醋煮
香附	四兩	童便浸
山查		神麴
		炒二兩
黃連	一兩	姜汁炒
厚朴	半兩	姜汁炒
半夏	一兩	
積聚	心法附餘卷之十八	六
台芎	半兩	蒼朮
		一兩
一方加人參白朮炒一兩半有苦參用白朮人參不用黃連		
枳實丸		
白朮	二兩	枳實
		半夏
神麴		
麥芽	各一兩	姜黃
陳皮	各五錢	木香
		半錢
山查	一兩	
右為末荷葉蒸飯為丸如梧桐子大每服一百丸食後		
生姜湯下		
大溫中丸	又名大消痞丸	

黃連	炒	黃芩	各六錢	姜黃	白朮	各一兩
人參	陳皮	炙甘草	澤瀉			
砂仁	乾生薑	炒麴	各二錢	枳實	炒半兩	
半夏	四錢	川朴	三錢	猪苓	半錢	
右為末炊餅丸如梧子大每服一百丸溫水下不拘時						
附諸賢論						
或問人有積塊疝氣心腹痛等証者雖多服久服附子姜桂等熱藥而不發藥毒不生他病然本病日深者何也						
王節齋曰諸積諸痛喜溫而惡寒熱藥與病情相和積久成鬱而火邪深矣鬱熱既深則見寒愈逆見熱愈喜						
積聚	心法附餘卷之十八	七				
兩熱相從故不生他病所謂元則害成廼制火極而似水者也然真氣被食陰血乾枯病日深痼而不可為矣						
世人不識但見投熱不熱誤認為沉寒痼冷而益投之至死不悟悲夫然則治之當如何曰當用從治法內經						
曰熱因寒用寒因熱用伏其所主先其所因者是也						
附脉理						
脉訣舉要曰胸痞脉滑為有痰結弦伏亦痞滿則氣劣肝						
積肥氣弦細青色心為伏梁沉花色赤脾積氣浮大						
而長其色脾土中央之黃肺積息黃淫毛色白奔豚屬						
腎沉急而黑五臟為積六腑為聚積在本位聚無定處						

緊浮牢小而沉實或結或浮為聚為積實強者

小者死生先之別病同脉異

脉理提綱曰鬱脉沉澹積脉弦堅

附諸方

肥氣丸 三因方 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜

驚狀久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭

蒼朮

青皮

莪朮

三稜

鉄子粉

同入醋煮一伏時久

蛇含石

五錢

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十丸當歸浸酒下

積聚

心法附餘卷之十八

八

伏梁丸 三因方 治心積起於臍上至心大如臂久不已病

煩心身體脛肢皆腫環臍而痛其脉沉而芤

枳殼

炒去穢

茯苓

厚朴

人參

白朮

半夏

三稜

等分

右為末麵糊丸如梧桐子大米飲下二十九丸作散酒調

亦可

痞氣丸

三因方

治痞積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢

不收黃疸飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心其脉浮

大而長

附子

半兩

赤石脂

煨醋

川椒

炒出汗

乾姜

桂心 半兩

大烏頭

二錢半

右為末蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服十九丸米飲下

息賁湯

三因方

治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病酒

洒寒熱欬逆喘發肺壅其脉浮而毛

半夏

湯洗

吳茱萸

湯洗

桂心

人參

甘草

炙

桑白皮

葶藶

各一兩

右剉每服四錢水鍾半姜七片棗二枚煎食前服

奔豚湯

三因方

治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀

上下無時久不愈病喘逆骨痠少氣其脉沉而滑

甘李根皮

焙乾

乾葛

各一兩

川芎

積聚

心法附餘卷之十八

九

當歸

白芍藥

甘草

炙

黃芩

各二兩

右剉每服四錢水鍾半煎七分

○已上數方治五積之劑

勝紅丸

簡易方

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清

水丈夫酒積婦人血積氣塊小兒食積並皆治之

陳皮

義朮

二味同

青皮

三稜

乾姜

泡

良姜

各一兩

香附子

炒去皮

右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十九丸姜湯下

木香通氣丸

聖惠方

治疰瘕氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽順

氣消痰進飲食消痞

人參

木香各一兩半

玄胡索一兩

陳皮

黑牽牛各六兩

枳榔

丁香各半兩

三稜炮

廣茂各三兩

半夏製

茴香炒

木通

神麴

麥蘖各二兩

青皮一兩

右為末水糊丸如小豆大每服三四十丸生薑湯下食後日二服

導氣枳殼丸

宣明方

治氣結不散心胸痞痛氣逆上攻喘急咳嗽

枳殼去穢炒

木通

青皮去白

陳皮去白

桑白皮炒

蘿蔔子

白牽牛炒

黑牽牛炒

我木煨

茴香炒

荆三稜煨各半兩

右為細末生薑汁打麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸橘皮湯送下

消滯丸

治酒食所傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑牽牛二兩

香附子炒一兩

五靈脂一兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後生薑湯下

升降陰陽

刺蓬煎丸

援萃方

破痞癰消癥塊積聚胸膈痞悶通利三

蓬朮

二兩酒浸冬三夏一

三稜二兩酒浸冬三夏一

上二味用巴豆三十八粒銀器內炒乾黃色去巴豆不用

豆不用

木香

枳殼

青皮

茴香

枳榔各一兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸食後生薑湯下

馬梅丸

治酒積消食化痰

馬梅一斤

半夏半斤

生薑一斤

右仲石臼搗細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜為度次下

神麴

麥芽

陳皮

青皮

我木

丁皮

大腹子

枳殼各四兩

右共為細末酒糊為丸如梧桐子大每服四五十丸姜湯下

木香

三稜宣明方治一切氣閉胸膈痞滯榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問新久

青木香

破故紙

茴香炒

黑牽牛

甘遂

芫花

大戟

荆三稜

蓬朮

川練子

胡蘆巴

巴戟去心各六錢

巴豆 <small>去皮心不出 油各七分半</small>	陳米 <small>將巴豆同陳米 三合一處炒黑</small>	砂仁 <small>二錢</small>	右一十五味用好醋半升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋者乾為度碾為細末醋糊為丸如菜豆大每服五七丸食後湯水送下	寶鑑破積導飲丸 治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶	檳榔	陳皮 <small>去白</small>	廣木香	青皮 <small>去白</small>	枳殼 <small>去穢 炒</small>	枳實 <small>去穢 炒</small>	廣茂泡	荊芥稜泡	半夏 <small>湯泡 七次</small>	神麴 <small>炒</small>	大麥芽 <small>炒</small>	乾生薑	積聚 <small>心法附餘卷之十八 十二</small>	茯苓 <small>去皮</small>	甘草 <small>炙</small>	澤瀉 <small>各五錢</small>	牽牛 <small>錢一兩 一分</small>	巴豆 <small>三十箇去心 膜油取霜</small>	右為細末入巴豆霜勻生薑汁打糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前溫生薑湯送下	○已上數方辛溫消導之劑	開結枳實丸 街藥院方 宣導凝滯消化痰飲升降滯氣行	三焦蕩滌脾胃去結潤燥流暢大小腸專主中痞痰涎惡心嘔噦醉飽膈實宿物停積兩脇膨悶咽嗑不利上氣喘嗽等疾	枳實 <small>去穢 炒</small>	苦葶藶 <small>隔紙 炒</small>	白木	半夏 <small>湯洗</small>
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------	-------------------------	----	----------------------	-----	----------------------	----------------------------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	---------------------	----------------------	-----	-----------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----	----------------------

天南星 <small>炮</small>	白礬 <small>枯</small>	大黃	青皮 <small>去白各 半兩</small>	木香 <small>三錢</small>	黑牽牛 <small>一兩 明木</small>	皂角 <small>去皮子 一兩</small>	右為細末生薑汁煮麴糊為丸如梧桐子大每服四十丸溫生薑湯送下 如單腹脹上喘涎多四肢腫滿食後生薑湯下 如婦人乾血氣膈實腫滿或產後有傷面目浮腫小便不利生薑葱白湯下 酒疸溫酒下沉香降氣丸 瑞竹堂方 治胸膈痞滿升降水火調順陰陽和中益氣推陳致新美進飲食	沉香	木香	草澄茄	枳殼 <small>去穢 炒</small>	砂仁	白豆蔻仁	青皮	陳皮	積聚 <small>心法附餘卷之十八 十三</small>	廣木	枳實 <small>去穢 炒</small>	黃連	半夏 <small>美製</small>	白茯苓 <small>去皮各 一兩</small>	蘿蔔子 <small>另研 半兩</small>	香附子 <small>炒去毛 二兩</small>	右為細末生薑自然汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七十九丸臨卧煎橘皮湯下姜湯亦可忌生冷	香稜丸 治五積六聚氣塊	三棱 <small>醋六兩 炒</small>	青皮	陳皮	莪朮 <small>炮或 醋炒</small>	枳殼 <small>炒</small>	枳實 <small>炒</small>	蘿蔔子 <small>炒</small>	香附子 <small>各一 兩</small>	黃連	神麴 <small>炒</small>	麥芽 <small>炒</small>	驚甲 <small>醋炙</small>	乾漆 <small>炒烟</small>	芥仁	硃砂	砂仁
----------------------	---------------------	----	------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-----	----------------------------	----	------	----	----	-----------------------------------	----	----------------------------	----	----------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------	-------------	-----------------------------	----	----	-----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	----	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----	----	----

歸尾

木香

甘草各一兩

枳榔六兩

山查四兩

右為末醋糊為丸每服三五十丸白湯下

一方治腹中癖塊及諸般積塊脾胃怯弱飲食不消腹

脹面黃四肢酸疼無力

麤麴

四斤 炒黃色 蒼朮 米泔浸 皂礬 一斤以好醋一碗煮 去粗皮 乾蓋地上一宿取出

右同為末酒糊為丸梧桐子大每服三十丸至五十丸

空心米湯或酒任下一日三服

積氣丹聖惠方治新久一切沉積氣塊癥瘕積聚面黃肌

瘦沉困無力口吐酸水

積聚

心法附餘卷之十八

十五

黃連

枳榔二箇

芫花

三稜

黃連

牛膝

商陸根

廣茂各一兩

礪砂一錢

肉豆蔻

青皮

陳皮

石菖蒲

巴豆生

木香各一錢半

大戟

大黃

甘遂

白牽牛

乾姜

青磁石

乾漆各五錢

右為末醋糊丸如梧桐子大每服十丸臨卧燒棗子湯

下若是有積者肚內作聲病退為度不退每夜十丸

○廣搜此方用陳皮青皮木香枳榔之類所以治無形

之氣積用牛膝乾漆三稜菝木之類所以治有形之

血積用大戟芫花甘遂牽牛商陸磁石礪砂之類

以治水穀魚肉之積也余用乾姜巴豆以治新積之

寒用大黃黃連以治久積之熱可謂周而且備矣然

此晒眩之劑中病當已而不可服之大過也歟

○已上數方辛平消導之劑

宣毒丸

大黃炮二錢

青皮

陳皮

蒼朮各一兩

當歸去頭一兩

黑牽牛四兩

右為末煮羅蔔丸如梧桐子大每服五十丸溫水臨卧

下米粥補之

積聚

心法附餘卷之十八

十五

妙功丸治飲食不節起居失常七情所感動勞不一以

致氣凝血滯於榮衛之中或冒風寒濕氣凝結於經絡

之間臟腑之內或為癥瘕或為積聚癖塊此藥功效不

可具述

大黃四兩

黃連

鬱金各二兩

乾粉二錢

礪砂二錢

粉霜半錢

川芎二兩

黑牽牛頭末八兩

滑石四兩

白豆蔻

沉香

木香各半兩

蓬朮

枳榔

黃芩各一兩

右件除粉霜輕粉礪砂另研豆蔻等另研和勻水丸或

稀糊丸如梧桐子大量虛實加減

木香和中丸 聖惠方 消腸胃中積聚癥瘕痼塊宣暢三焦

利胸膈主治氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢筋脉拘急身體困倦潤大便秘利小便和脾氣進飲食

木香 去腐 沉香 枳榔 枳殼 去穢

蓬莪朮 去皮 青皮 去穢 陳皮 去白 當歸 酒浸

黃芩 去腐 木通 去皮 黃連 去穢 白豆蔻

三棱 去皮 牙皂 連子 炙郁李仁 去皮各

大黃 蒸四兩 縮砂 二兩 黃柏 去粗皮 香附子 去毛

牽牛 頭末二兩 或四兩

右為末水丸如梧桐子大每服一錢半加至三錢生薑

積聚 心法附餘卷之十八

湯下或茶酒亦得不拘時候

木香枳殼丸 神藥方 治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋

脹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噎醋吞酸飲食遲

化並宜服之

枳殼 去穢 茯苓 去皮 白朮 厚朴 去粗皮

半夏 湯泡 人參 去頭 木香 青橘皮

陳橘皮 二味各湯浸 荊三稜 炮 莪朮 二味

枳榔 神麴 炒 麥芽 炒各 乾生薑 半兩

枳實 兩半 牽牛 微炒 大黃 各二兩

右為細末生薑汁加麴糊為丸如梧桐子大每服七十

丸食後姜湯下

○廣按凡人有積病則氣滯而飲此方用藥攻補兼施真得古人養正積自除之理有疾病而涉虛者用此

最當

木香枳榔丸 瑞竹堂方 治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹

大小便結滯不快

木香 商枳殼 去穢 青皮 去白 陳皮 去白

枳榔 廣茂 黃連 各二兩 黃柏 去粗皮

香附子 畧炒 大黃 各三兩 黑牽牛 半斤取頭

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後溫

積聚 心法附餘卷之十八

生薑湯下

全真丸 端効方 治三焦氣壅結痞心胸大便不通傷寒下

証已服承氣不利服此數粒安穩而通

川大黃 商枳殼 去穢 枳榔 黑牽牛 半生

以上各半兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十丸或七十

丸米飲下

解毒枳榔丸 治男子婦人嘔逆酸水痰涎不利大便膿

血口苦煩燥涕唾稠粘嗽血血崩腹脹氣滿手足痿弱

四肢無力酒疸食黃口舌生瘡寒熱往來瘧疾腸風痔

瘰癧瘰癧血積諸惡瘡疥疽皆治之

檳榔

黃連

青皮

陳皮

木香

沉香

巴戟

當歸

瘰癧

枳殼

香附子

甘草

大黃

黃柏

牽牛末

一兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服七十丸溫生薑湯下

取積丹 聖惠方

用好大黃不以多少為末用好醋熬膏子為丸如梧桐子大每服一百丸量虛實大小休吃晚飯用好墨研濃好酒送下次日見濃

○已上數方辛涼消導之劑

七轉靈應丹 治一切山嵐瘴氣蠱毒不問新舊諸積諸氣及婦人血瘀血閉小兒肚大面黃疳積及一切心痛諸般蠱積凡人面上白斑唇紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路者便有虫也此丹四時宜服不損真氣無病之人春秋各服一服打下虫積終歲無病惟孕婦不宜服之

燕薹

牽牛

木香

檳榔

大黃

雷丸

錫灰

白蕪荑

木香

錦文大黃

雷丸

錫灰

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

五錢

雷丸

錫灰

右取各淨藥末一處拌勻葱白湯露一宿為丸如黍米

大每服四分病深年遠者加至五分用葱白湯露一宿

早晨空心冷下取出病根日晚用溫粥補之忌生冷硬

物葷腥等物三十日若失聲音加沉香琥珀各五錢又

方以茵陳阜角各四兩煎膏為丸或入史君子鶴虱各

五錢為末更好

八仙妙應丹 治男子婦人小兒外感內傷以致水穀停

留腸胃生蠱成積惡心嘔吐苦酸噯雜瘧痢黃疸水腫

鼓脹膈噎翻胃及婦人癥瘕積聚心腹疼痛小兒疳証

積聚 心法附餘卷之十八

而黃肌瘦肚大腰細一切蠱積並治

雷丸 錫灰 白蕪荑 木香

錦文大黃 檳榔 史君子 黑丑

右八味為細末葱白一斤煮沸露一宿為丸如粟米大

每服四錢病重年深體實者加至五錢葱白湯送下或

木香湯下十五歲以上者可服三歲七歲者每一服作

三服早晨空心冷下務在房內坐桶不要見風出外通

泄或見積如絮筋不斷或如爛魚腸肚或如雞彈黃色

或如米泔水色稠粘不斷或如馬尾虫或血紫虫或胡



吞至或蝦蟆樣子一切等物一服即出有至即取下  
有積即取下積有氣即消了氣必効之藥加以硃砂其  
遂允妙如虛老之人用此推蕩後服四君子湯數帖尤  
好也

木香三稜散 瑞竹堂方 治腹中有至面色痿黃一切積滯

黑牽牛 半生半炒 取末五錢 大腹子 二錢 枳榔

雷丸 錫灰醋炒 三稜煨 蓬朮煨

木香 錢二 大黃 三錢

右為末每服五錢用砂糖水調服先將燒肉一片口中  
細嚼吐出然後服藥 一方加阿魏一錢蕪荑仁三錢

萬應丸 心法附餘卷之十八 下諸虫

枳榔 五錢 末 大黃 八兩 末 黑牽牛 四兩 末 苦練根皮 一斤

阜角 十挺 不蛀者

右先將阜角苦練根皮二味用水一大碗熬成膏子一  
處搜和前藥三味碾細末為衣先用沉香衣後用雷丸  
木香衣每服三九四更時分用砂糖水送下

取寸白虫

紫枳榔 十箇 向陽石橘皮 七十片

右水煎露一宿飲之以下至為度

治吐至有積

川黑錫灰枳榔末米飲調下

一方 治茶積

用花椒為末麪糊為丸如梧桐子大每服十九茶湯下  
一方 治酒積面黃黑色腹脹不消

用甘遂一錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗爛和末作

一丸紙裏火煨令香熟取出臨卧細嚼酒嚥取出病根

○已上數方追虫取積之劑

龍會丸 見脇痛

○廣按積聚痞塊之証諸書所載皆以內為喜怒憂思  
悲恐驚七情所致此言良有以也但云五臟傳刺成

積聚 心法附餘卷之十八 主 胃空五

積不無求之太過乎蓋人之氣血榮衛一身上下周

流無時少息一旦七情感動五志之火火性炎上有

升無降以致氣液水穀不能順序稽留而為積也必

矣丹溪曰氣不能成塊成聚塊乃有形之物痰與食

積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為血

塊誠然言也何以明之夫左關肝膽之位肝膽藏血

液右關脾胃之位藏飲食所以左邊有積則為血塊

右邊有積則為食積而其中間則為水穀出入之道  
路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間有積則  
為痰飲也其理昭矣治法調其氣而破其血消其食

而豁其痰是矣如木香枳榔去氣積三稜義木去血積麥芽神麴去酒積香附子枳實去食積牽牛耳遂去水積山查阿魏去肉積海粉礞石去痰積堆黃白礬去蟲積乾姜巴豆去寒積黃連大黃去熱積各從其類也大抵積之初固為寒而積之久則為熱矣予今分辛溫辛平辛涼三例正欲人知新久之義爾抑嘗論之醫為病所困首惟陰虛之難補久積之難除王山自倒陰虛之謂也養虎遺患久積之謂也嗚呼人之罹此二者須節慾以養性內觀以養神澹泊自如從容自得然後委之於醫不然雖張劉李諸子復生亦不能為我保也

休寧東山古庵方 廣約之類集

# 虛損門

## 發熱八十四

附胸中煩熱 虛熱 虛煩不眠

### 丹溪心法

○陰虛發熱証難治 戴云凡脉數而無力者便是陰虛也 四物湯加炒黃柏黃芩龜板蒸氣虛加人參黃芪黃芩白朮 四物湯加炒柏是降火補陰之妙劑甚者必加

### 發熱

心法附餘卷之十九

謝清野

### 龜板

契酒人發熱難治 不飲酒人因酒發熱者亦難

治 一男子年二十三歲因酒發熱用青黛瓜萸仁入姜汁每日數匙入口中三日而愈 陽虛發熱補中益氣湯 手足心熱屬熱鬱用火鬱湯 傷寒寒熱當用表散 發熱柴胡惡寒蒼朮虛人用蒼朮恐燥 發熱惡風人壯氣實者宜先解表 發熱惡寒亦宜解表 入方

### 蒼朮

半兩 片苓 三錢 甘草 錢半

右為末湯浸炊餅丸服

### 治手心發熱

山梔子 香附子 白芷

半夏生用 川芎 或加蒼朮

右為末神麴糊丸如桐子大每四五十丸食遠白湯下

治大病後陰虛氣鬱夜熱

酒芍藥一兩二錢五分 香附一兩 蒼朮半兩

炒片苓二錢 甘草一錢半

右為末炊餅丸如菉豆大每服五十丸食遠溫水下

濕痰發熱

炒片苓 炒黃連各半兩 香附二兩半 蒼朮二兩

右為末用瓜蒌穰丸如桐子大每服五十丸溫水下

退勞熱食積痰

發熱卷二十九 二 上甲 下甲 側栢 瓜蒌子各五錢

半夏四錢 黃連 黃芩 炒栢各三錢

右為末炊餅為丸桐子大每服五十丸食遠白湯下

○胸中煩熱須用梔子仁 有實熱而煩燥者亦用梔子

仁 有虛熱而煩燥者宜參芪麥門冬白茯苓竹茹白芍

藥 若脉實數有實熱者

神芎丸

○虛熱用黃芪止虛汗亦然又云肌熱及去痰者須用黃

芩肌熱亦用黃芪 如肥白人發熱宜人參黃芪當歸芍

藥浮小麥炒止虛汗同

補中益氣湯 治虛中有熱或肌表之熱

○治虛煩不得眠

六一散加牛黃

補中益氣湯 見內傷

火鬱湯

升麻 葛根 柴胡 白芍藥各一兩

防風 甘草各五錢

右剉每服五錢入連翹葱白三寸煎稍熱服不拘時

神芎丸 見火類

附諸賢論

發熱卷二十九 三 王節齋曰世間發熱證論傷寒者數種治各不同外感內

傷乃大關鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒感

於外自表入裏故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義

也以其感於冬春之時寒冷之日即時發病故謂之傷

寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當以變矣如

春溫之月則當變以辛涼之藥如夏暑之月即當變以

甘苦寒之藥故云久傷寒不即病至春變溫至夏變熱

而其治法必因時而有異也又有一種冬溫之病謂之

非其時而有其氣蓋冬寒時也而反病溫焉此天時不

正陽氣反泄用藥不可溫熱又有一種時行寒疫却在

溫煖之時時本溫煖而寒反為病此亦天時不正陰氣  
 返逆用藥不可寒涼又有一種天行溫疫熱病多發於  
 春夏之間沿門闔境相同者此天地之厲氣當隨時令  
 察運氣而施治宜用劉河間辛涼甘苦寒之藥以清熱  
 解毒已上諸證皆外感天地之邪者也若夫飲食勞倦  
 內傷元氣此則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益  
 氣之論用人參黃芪等甘溫之藥大補其氣而提其下  
 陷此用氣藥以補氣之不足者也又若勞心好色內傷  
 真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火矣是為陰虛火  
 旺勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物湯  
 加黃柏知母補其陰而火自降此用血藥以補血之不  
 足者也益氣補陰皆內傷證也一則因陽氣之下陷而  
 補其氣以升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降  
 下之一升一降迥然不同矣又有夏月傷暑之病雖屬  
 外感却類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪客表有餘  
 之證故宜汗之暑傷氣元氣為熱所傷而耗散不足之  
 証故宜補之東垣所謂清暑益氣者是也又有因時暑  
 熱而過食冷物以傷其內或過取涼風以傷其外此則  
 非暑傷人乃因暑而自致之之病治宜辛熱鮮表或辛  
 溫理中之藥却與傷寒治法相類者也凡此數證外形

相似而實有不同治法多端而不可妄謬故必審其果  
 為傷寒傷風及寒疫也則用仲景法果為溫病熱病及  
 溫疫也則用河間法果為氣虛也則用東垣法果為陰  
 虛也則用丹溪法如是則庶無差悞以害人性命矣今  
 人但見發熱之證一緊認作傷寒外感率用汗藥以發  
 其表汗後不解又用表藥以涼其肌設是虛證豈不死  
 哉聞有頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血之分  
 或氣病而補血或血病而補氣悞人多矣故外感之與  
 內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如水炭相反治之  
 若差則輕病必重重病必死矣可不畏哉可不謹哉予  
 每欲會此數證合為一書使界限判然而治法昭若以  
 惠斯人而未遑也故畧發其槩以為後日張本云  
 附諸方  
 補中益氣湯 按梓方 治陽虛久患虛勞  
 黃芪 甘草 各半錢 當歸身二錢 人參三錢  
 白朮七錢 柴胡五錢 升麻五錢 陳皮七錢  
 一方加白芍藥紅花黃柏  
 右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾食前溫服  
 地仙散 按方 治骨蒸肌熱一切虛煩  
 地骨皮 防風 各人參 雞蘇

甘草 各二錢半

右剉每服一兩生薑三片淡竹葉五片水二鍾煎至一鍾去粗通口服不拘時候

四白散 按方 治男子婦人諸虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不能行動

黃芪

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮 各一錢

半夏

白茯苓

人參

烏藥

甘草

白豆蔻仁 各五錢

芍藥 一兩半

檀香

沉香 各二錢半

發熱 心法附餘卷之十九

六

三頁八和

右剉每服一兩生薑三片棗一枚水一鍾半煎至七分

食後溫服

黃耆 飲子 濟生方

治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱乏力日漸

羸瘦胸膈痞塞咳嗽痰多甚則唾血

黃耆 兩半

當歸 酒浸

紫苑草 去土

石斛 去根

鹿茸 酒蒸

地骨皮 去心

人參

桑白皮

鹿茸

酒蒸

款冬花 兩

附子 炮去

半夏 湯泡

甘草 各

七次

半兩

右剉每服四錢水一鍾姜七片棗一枚煎服此藥溫補

榮衛枯燥者不宜進唾血加阿膠蒲黃各半兩

○已上數方治陽虛氣虛發熱之劑

當歸黃芪湯 治虛火上攻頭目渾身胸背發熱

當歸 酒浸

黃芪 五錢

右剉水一鍾煎至七分去粗食後溫服

子苓散 按方 治心肺解勞熱

黃芩 一兩

白芍藥

子苓

人參

白茯苓

麥門冬

桔梗

生地黃 各半兩

右剉每服一兩水二鍾竹葉一握小麥二十粒姜三片

煎至一鍾去粗通口服食後服

人參柴胡散 按方

治邪熱客於經絡肌熱痰喘五心煩

燥頭目昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜服之

發熱 心法附餘卷之十九

七

三頁八和

白茯苓 去皮

赤芍藥

人參 去土

白朮

柴胡 去土

當歸 去土

半夏 麴

葛根

甘草 各一兩

右剉咀每服一兩水二鍾姜三片棗一枚煎至一鍾去

粗食後服

人參地骨皮散 按方 治臟中積冷榮中熱按之不足舉

之有餘此乃陰不足陽有餘也

茯苓 去皮

知母

石膏 各一兩

地骨皮

人參

柴胡 去土

生地黃

黃耆 各一兩

右剉每服一兩姜三片水二鍾煎至一鍾去粗通口服

拘時服

人參黃耆散 和劑方 治諸虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠

五心煩熱口燥咽乾煩赤心中日晡潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴咳嗽痰唾稠粘時有膿血

天門冬 去心三

半夏 製

知母

桑白皮 炒

赤芍藥

黃耆

紫苑

甘草 炙各十

白茯苓 去皮

柴胡 去芦

秦艽 去土

生乾地黄 各十

地骨皮 各二

人參

桔梗 各十

鱉甲 去裙醋

一方有生薑

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服不拘時

發熱

心法附餘卷之十九

八

三消治論

鱉甲地黃湯 清生方 治虛勞手足煩熱心下怔忡及婦人

血室枯乾身體羸瘦飲食不為肌肉

柴胡 去芦

當歸 酒浸

麥門冬 去心

鱉甲 醋炙

石斛 去根

白朮

茯苓 去皮

熟地黄 酒浸

秦艽 去土各

官桂 不見火

人參

甘草 炙各

右咬咀每服一兩生薑五片烏梅一個水二鍾煎至一

鍾溫服

人參散 方集成 治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛

夜多盜汗四肢倦怠一切熱血虛勞宜服

黃芩 五錢

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

柴胡

甘草

當歸

半夏 麩

葛根 各一

右咬咀每服一錢生薑四片棗二枚水二鍾煎至八分

去粗溫服

知母散 楊氏方

治虛勞心肺熱咳嗽唾膿血大能解勞除

熱調順榮衛

黃耆 一兩

白芍藥

生地黄

黃芩

麥門冬 去心

人參 去芦

白茯苓 去皮

桔梗 去芦

知母 各七

甘草 五錢

右咬咀每服八錢水一鍾生薑三片小麥一撮竹葉一

片煎至八分食後溫服

心法附餘卷之十九

九

音卒五中

柴胡梔子飲 聖惠方 治勞熱等証

柴胡

梔子

桔梗 各一兩

生地黄

地骨皮

人參

茯苓

白朮

甘草

當歸 各一兩

薄荷 五錢

滑石 一兩

沙參 二錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至八分去粗食

後溫服

柴胡散 拔粹方 治寒熱體虛羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

柴胡

黃芪

赤茯苓

白朮 各一兩

人參	地骨皮	枳殼	桑白皮
赤芍藥	生熟地黃	各七錢	麥門冬
甘草	錢五	桔梗	七錢半
右咬咀每服一兩生姜三片水二鍾煎至一鍾溫服			
樂令建中湯	治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞		
療此藥大能退虛熱生血氣			
前胡	去芦	細辛	黃耆
桂心	橘皮	去白	當歸
茯苓	去皮	麥門冬	去心
右咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎服不拘時			
人參保肺湯	宣明方	治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨	
蒸潮熱			
人參	去芦	柴胡	去芦
桑白皮	知母	白朮	川芎
黃耆	去芦	紫苑	荊芥
茯苓	去皮	黃芩	連翹
薄荷	山梔子	各五錢	甘草
石膏	滑石	寒水石	各五錢
右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至七分去粗溫			
服泄者去大黃			

防風當歸飲子	宣明方	治煩渴發熱虛煩骨蒸
柴胡	人參	茯苓
滑石	三兩	大黃
防風	各半兩	當歸
右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至一鍾去粗通		
口服不拘時如有痰嗽加半夏		
泄者去大黃		
○已上諸方治陰陽氣血兩虛發熱之劑		
青蒿散	楊氏方	治虛勞骨蒸咳嗽聲啞皮毛乾枯四肢倦
怠夜多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱		
天仙藤	鱉甲	醋炙
香附子	炒去毛	桔梗
前胡	去芦	秦艽
甘草	炙一兩	川芎
右咬咀每服一兩生姜三片棗一枚水二鍾煎至一鍾		
去粗食前溫服		
秦艽鱉甲湯	援粹方	治骨蒸壯熱肌肉消瘦唇紅頰赤困
倦盜汗		
地骨皮	柴胡	鱉甲
知母	當歸	各五錢
右咬咀每服一兩水二鍾烏梅一個青蒿數莖煎至一鍾		
去粗通口服		

地骨皮枳殼散 按粹方治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多因

夜多盜汗

地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼

知母 當歸 鱉甲 醋炙黃等分

右咬咀每服一兩水一鍾半柳菴各七枚生薑三片烏

梅一個煎至八分去粗通口食後服

秦艽鱉甲散 和劑方治氣血勞傷四肢倦怠面黃肌瘦骨

節煩疲潮熱盜汗咳嗽痰唾山嵐瘴氣並皆治之

荊芥 去根 具母 去心 天仙藤 前胡 去芦

秦艽 去芦洗 青皮 去白 柴胡 去芦 甘草 炙

發熱 心法附餘卷之十九 主

陳皮 白芷 鱉甲 去裙醋浸各一兩

乾葛 二兩 肉桂 去皮 羌活 各半

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎至八分熱服酒調亦可

○已上數方治陰虛血虛發熱之劑

○廣按發熱之證實非一端王節齋先生論之詳矣尚

有痰飲脚氣食積虛煩四証未之及也其治各證發

熱之方已隨本證不復重舉外今於發熱證下只具

治陽虛陰虛二者之一古人於陽虛陰虛二証論之

未詳而方之未辨至丹溪出而後明矣何則晝夜發

熱晝重夜輕口中無味陽虛之證也午後發熱夜半

則止口中有味陰虛之証也陽全陰半陽得以兼陰

陰不得以兼陽自然之理也陽虛之証實在胃陰虛

之證實在腎蓋饑飽傷胃則陽氣虛矣房勞傷腎則

陰血虛矣古人以飲食男女為切要厥有旨哉以藥

而論之甘溫則能補陽氣苦寒則能補陰血如用四

君以補氣四物以補血是也若氣血兩虛但以甘溫

之劑以補其氣氣旺則能生血也若只血虛而氣不

虛忌用甘溫之劑以補其氣氣旺而陰血愈消矣故

陽虛之與陰虛其藥之與苦藥不可不詳審而明辨

也歟

小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪 去芦 當歸 酒浸 麥門冬 去心

酸棗仁 炒去 石斛 各一 人參 甘草 炙各半兩

右剉每服四錢水一鍾姜五片煎八分溫服不拘時

人參竹茹湯 三因方治胃口有熱嘔吐欬逆虛煩不安

人參 半兩 半夏 一兩 竹茹 一團

右作六服用水一鍾半姜十片同煎溫服

一方加橘皮一兩去白

地仙散 治骨蒸肌熱一切虛煩 見發熱



張砂炒香散和劑方治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

麝香一錢 另研 山藥一兩 汁炙 人參半兩 木香二錢 半兩

茯苓去皮 另研 茯神去皮 木 黃耆各一兩 桔梗半兩

甘草炙半兩 遠志去心炒 辰砂三錢 別研

右為末每服二錢溫酒調服不拘時

人參竹葉湯三因方治汗下後表裏虛煩不可攻者

竹葉二把 人參 甘草各一兩 半夏二兩 半

石膏 麥門冬各五兩

濟生方去石膏加茯苓小麥

右對每服四錢水鍾半姜五片粳米一撮煎至七分去

粗空心服

橘皮湯三因方治動氣在下不可發汗發之反無汗心中

大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入

橘皮一兩 半 甘草炙半兩 人參二錢 半 竹茹半兩

右對細每服四錢水一鍾姜三片棗一枚煎空心服

活人書加生姜一兩棗八枚作六味

竹葉石膏湯 治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心燥

及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可汗

下

溫膽湯 治大病後虛煩不得睡臥及心膽虛怯觸事易驚短氣悸乏或腹自汗並見傷寒類

○已上數方治虛煩之劑

惡寒八十五 附面熱 面寒

丹溪心法

○陽虛則惡寒用參芪之類甚者加附子少許以行參芪

之氣 一婦人惡寒用苦參赤小豆各一錢為末薑水調

服探吐之後用川芎南星蒼朮酒炒黃芩為末麴糊丸服

五六十丸白湯下冬月苓減半加姜汁調麴煮糊丸虛

勞冬月惡寒之甚氣實者可利亦宜解表柴胡乾葛惡

寒久病亦用解鬱

戴云凡背惡寒甚者脉浮大而無力者是陽虛也

○面熱火起 寒鬱熱

○面寒 退胃熱

自汗八十六

丹溪心法

○自汗屬氣虛 血虛 濕 陽虛 痰 東垣有法有

方 人參黃芪少佐桂枝 陽虛附子亦可用須小便

魚 火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之 痰症

亦有汗 自汗大忌生薑以其開腠理故也

附脉理

脉訣舉要曰汗脉浮虛或濡或濡軟散洪大竭飲無餘

附諸方

黃耆建中湯 治男子婦人血氣不足體常自汗方見補

著附湯清生方 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃耆去芦

附子炮去皮

右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去粗臨臥通口服

王屏風散 治自汗

自汗心法附餘卷之十九

防風 黃芪各一兩 白朮二兩

右剉每服三錢水一鍾半煎至七分溫服

大補黃耆湯 治自汗虛弱之人可服

黃耆各一兩

防風 川芎

山茱萸肉

當歸

白朮各一兩

肉桂

甘草炙

五味子

人參各一兩

白茯苓半兩

熟艾二兩

肉蓯蓉一兩

右剉每服五錢棗二枚水一鍾半煎至七分溫服

一方 治諸虛不足津液枯竭體常自汗晝夜不止日漸

羸瘦

防風

黃耆

白朮

麻黃根

牡蠣洗淨煨過

右剉用水一鍾小麥一撮煎至六分溫服

防已黃耆湯 治風濕相搏時自汗出方見中濕

撫芎湯清生方 治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎

白朮去油

橘紅各一兩

甘草炙

右咬咀每服四錢水一鍾姜二片煎八分溫服

涼膈散 見火類

溫粉

牡蠣

麥皮

麻黃根

黨本

自汗心法附餘卷之十九

糯米

防風

白芷

右為末周身撲之

又方

何首烏為末津調封臍妙

盜汗 八十七

丹溪心法

○盜汗屬血虛 陰虛 小兒不須治 忌用生薑 東

垣有方 用當歸六黃湯甚効但藥性寒人虛者只有黃

芪六一湯 盜汗發熱因陰虛用四物加黃柏無效

黃芪白木

黃芪云盜汗者謂睡汗出也不睡則不能汗出方其睡熱也奏奏然出焉覺則止而不復出矣非若自汗而自出也雜病盜汗責其陽虛與傷寒盜汗非此之亦是心虛所致宜欬心氣益腎水使陰陽調和水火升降其汗自止

附諸方

麥煎散和劑方治榮衛不調夜多盜汗四肢煩熱肌肉清瘦

瘦

知母

石膏

甘草

滑石

盜汗

心法附餘卷之十九

白茯苓

人參

地骨皮

赤芍藥

葶蘆

麻黃根

杏仁

去皮尖麤炒各半兩

右為末每服一錢浮麥煎湯調服

當歸六黃湯聖惠方治盜汗之聖藥也

當歸

生地黃

熟地黃

黃柏

黃芩

黃連

各一兩黃耆加一倍

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾去粗臨臥通口服

黃芪六一湯治虛人盜汗

黃芪

六兩甘草一兩

右各用蜜炙十數次出火毒每服一兩水煎服

治盜汗百一選方心液為汗此藥收欬心經

人參

當歸各等分

右二味剉每服五錢先用猪心一枚破作數片并心內

血煎湯澄清汁煎藥服

麥煎湯秘方治虛人盜汗

人參

甘草

白扁豆

乾葛

茯苓

陳皮

白木

黃耆

山藥

半夏麤各等分

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去粗溫服不拘時

悸心丹和劑方治心腎不交盜汗遺精

盜汗

心法附餘卷之十九

元

方見補損

○按此寧心神之藥也

又方

白木四兩分作四分

一分用黃芪同炒

一分用石斛同炒

一分用麤皮同炒

一分用牡蠣同炒

右各微炒黃色去餘藥只用白木研細每服三錢粟米湯調下盡四兩炒

○按此燥脾濕之藥也

正氣散治盜汗

黃柏

知母

錢半各一甘草炙五分

右作一服水煎食前熱服

○按此去相火之藥也

又方 治別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多病在於心宜養心血

以艾煎湯調茯苓末一錢服之

又方

青桑第二葉焙乾為末空心米飲調最止盜汗

又方

五倍子為細末以唾調填臍內絹帛縛定立効

一方 治陰囊汗

盜汗

心法附餘卷之十九

汗

盜汗

用蜜陀僧研令極細加蛤粉撲患處

○廣按自汗盜汗之証為病雖一其源不同自汗者乃陽虛氣虛有濕也陽氣虛則不能衛護肌表故醒時津津然而汗出矣盜汗者乃陰虛血虛有火也陰血虛則不能榮養於中故睡時湊湊然而汗出矣何以知之如古方用玉屏風散治自汗効者其間防風黃芪所以實表氣白朮所以燥內濕也用當歸六黃湯治盜汗効者當歸黃耆生熟地黃所以補陰血黃芩黃連黃柏所以去內火也其藥性與病情相對豈有不愈者乎

# 痿

八十八

丹溪心法

○痿證斷不可作風治而用風藥 有濕熱 濕痰 氣虛 血虛 瘀血 濕熱東垣健步丸加燥濕降陰火蒼木黃芩黃柏牛膝之類 濕痰二陳湯加蒼木白木黃芩黃柏竹瀝姜汁 氣虛四君子湯加黃芩黃柏蒼木之類 血虛四物湯加黃柏蒼木煎送補陰丸 亦有痰積死血妨礙不得下降者 大率屬熱用參朮四物湯黃柏之類

痿症

心法附餘卷之十九

主

痿症

附諸賢論

或曰手陽明大腸經肺之腑也足陽明胃經脾之腑也治痿之法取陽明一經何也願明以告我丹溪先生曰內經云諸痿生於肺熱只此一句便見活法大意經曰東方實西方虛瀉南方補北方此固是就生剋言補瀉而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有二腎雖有二水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所

養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱隆吉亦曰風火既熾當滋腎水東垣先生取黃柏為君黃芪等補藥之輔佐以治諸痿而無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病製方其善於治痿者乎雖然藥中肯綮矣若將理

**附脉理**  
患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

**附脉訣**  
脉訣舉要曰尺脉虛弱緩瀯而緊病為足痛或是痿病

**附諸方**  
二陳湯 見癰類

**四君子湯**

**四物湯**

**補陰丸** 並見補損

**東垣健步丸**

防已 酒洗 羌活 柴胡 滑石

甘草 炙 瓜蒌根 酒洗 各 澤瀉

防風 各 三 苦參 酒洗 川烏 各 一 肉桂 五 分

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九葱白煎愈

風湯下

愈風湯 見中風

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生

化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動

黃芪 一 錢 蒼朮 一 錢 白朮 橘皮

澤瀉 各 半 人參 白茯苓 升麻 各 三 分

麥門冬 歸身 生苧 麴末

猪苓 各 二 分 酒栢 柴胡 黃連 各 一 分

五味子 九 個 甘草 炙 二 分

右剉每服半兩水煎空心服

五獸三匱丹 治因氣血耗損肝腎不足兩脚痿弱

鹿茸 酥炙 麒麟竭 虎胥骨 酥炙 牛膝 酒浸

狗脊 各 等 分

右脩事為末即五獸丹料也

辰砂 一 兩 附子 大者 一 個 去皮臍剉旋

宣木瓜

一個剝去心仍剝去皮入上附子於內以酒十分蓋附子口正坐於銀石罐中重湯煮為度即三體丹也

右為三體丹研膏調五獸末勻為丸如雞頭大木瓜酒或降氣湯下

加味四斤丸 治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨 見脚氣

五斤丸 楊氏方 治筋血不足腰脚緩弱行步艱辛一切寒濕脚氣並治

沒藥別研

川烏頭炮去山藥各四兩天麻透明者

大木瓜

牛膝去芦用無灰酒浸

肉桂

酒浸

各一斤切

虎骨塗酥炙金

右將木瓜蒸爛研作糊和藥末如丸不就更加原浸牛膝酒打糊搜勻杵一二千下丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯任下

黑虎丹

治脚氣筋骨軟弱步履不隨

方見脚氣

一方 治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒

用大何首烏牛膝各一斤酒一升浸七宿晒乾於木臼內搗為末煉蜜丸如梧桐子大每服二五十九丸空心溫酒白湯任下

芫花散

治背腿間忽一二點痛入骨不可忍者

右用芫花根為末米醋調敷痛處以絹帛扎之婦人產後有此疾貼之妙

○廣按風痿之別痛則為風不痛則為痿經曰痛則為實不痛則為虛曰風曰痿虛實二者而已矣東垣曰氣盛病盛氣衰病衰何則人之氣血充實而風寒客於經絡之間則邪正交攻而疼痛作矣人之氣血弱而痰火起于手足之內則正不能勝邪而痿痺作矣故丹溪先生曰痿症切不可作風治而用風藥蓋以風為實而痿為虛也曰散邪曰補虛豈可紊亂矣乎

厥

八十九

附手足十指麻木

丹溪心法

○厥逆也手足因氣血逆而冷也 因氣虛為主 有因

氣虛 氣虛脉細 血虛脉大 熱厥脉數 外感脉沉

實 有痰脉弦 因痰者用白木竹瀝 氣虛四君子

血虛四物 痰厥用承氣 外感用雙鮮散加姜汁酒

有陰厥陽厥陰寒於下則熱陽衰於下則寒

○手足麻者屬氣虛 手足麻木者屬濕痰死血 十指麻

本是胃中有濕痰死血

附諸賢論

心法附錄曰厥者甚也逆也手足逆冷也其症不一散之方書者甚多今姑撮其大槩且如寒熱厥逆者則為陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則發厥也不可作陰証而用熱藥治之精魄絕而死矣急宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者始得之身冷脉沉四肢逆足蹇卧唇口青或自利不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩仍速灸關元百壯尸厥飛尸卒厥此即中惡之候因胃犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面有黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏不知人頭旋暈倒此是卒厥客忤飛尸鬼繫凡吊死聞喪入廟登塚多有此病以蘊合香丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣和胃散痰厥者乃寒痰迷悶四肢逆冷宜姜附湯以生附代熟附 蛇厥者乃胃寒所生經曰蛇者長虫也胃中冷即吐蛇宜理中湯加炒川椒五粒枳榔半錢吞烏梅丸効蛇見椒則頭伏故也 氣厥者與中風相似何以別之風中身溫氣中身冷以一味順氣散或調氣散如有痰以四七湯導痰湯服之

附諸方

大小水氣湯 見前

雙解散 見傷寒

四逆湯

理中湯

姜附湯 並見中寒

蘊合香丸

一味順氣散 並見中風

調氣散

白豆蔻

丁香

檀香

木香 各二錢

藿香

甘草 各二錢

砂仁 四錢

木香 各二錢

厥症

心法附錄卷之十九

右烏末每服二錢入鹽少許沸湯點服

平胃散

見中濕

烏梅丸

見心齋

四七湯

並見癰類

導痰湯

補氣湯 按方治皮膚間有麻木此肝氣不行也

黃耆

甘草 一兩

白芍藥 一兩 澤瀉 五錢

橘皮 一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時候

# 勞瘵九十

丹溪心法

○勞瘵主手陰虛痰與血病 虛勞漸瘦屬火陰火銷藥即是積熱做成始健可用子和法後若羸瘦四物湯加減送消積丸不做陽虛 骨蒸發熱積病最多 勞病四物湯加炒栢竹瀝人尿姜汁大補為上肉脫熱甚者難治入方

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗去蒿再熬至一斗入猪膽汁七枚再熬數沸再入厥症 心法附餘卷之十九 天 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十

附脉理 脉訣舉要曰骨蒸勞熱脉數而虛熱而瀯小必殞其軀加汗加咳非藥可除

附諸方 黃芪驚甲散 和劑方 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴咳嗽有血

驚甲 去酒 醋煮 天門冬 去心 各五兩 知母 焙 黃耆 赤芍藥 各三兩 地骨皮 白茯苓 秦艽 柴胡 各三錢

半夏 湯洗 紫苑 甘草 炙 各二兩 人參 肉桂 桔梗 各一兩 生乾地黄 洗 各三兩

右咬咀每服五錢水 盞煎至七分食遠溫服

秦九驚甲散 和劑方 治氣血勞傷四肢倦怠面黃肌瘦骨節煩痛潮熱盜汗咳嗽痰唾 見發熱

秦九扶羸湯 和劑方 治肺痿骨蒸已成勞嗽或熱或寒聲不出體虛自汗四肢怠惰

柴胡 去苗 二兩 地骨皮 一兩 紫苑 米醋 秦艽 當歸 洗 焙 半夏 湯洗 七次 紫苑茸 甘草 各

右咬咀每服四錢水一盞姜五片烏梅大棗各一枚煎至七分去粗食後溫服

青蒿散 楊氏方 治虛勞骨蒸咳嗽聲啞皮毛乾枯四肢倦怠夜多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱 方見發熱

經効阿膠丸 清主方 治勞嗽并嗽血唾血 卷栢葉 山藥 阿膠 蛤粉 炒 生地黃 酒洗

防風 去芦 雞蘇 各一兩 栢子仁 研 另 大薊根 五味子 百部 洗 去 遠志 去心 茸 人參 茯苓 去皮 麥門冬 去心 各五錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼晨前小麥湯送下



寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

方見

蠟煎散 治虛勞久咳嗽多氣喘或咯膿血

杏仁 去皮尖及仁 人參 去芦 麥門冬 去心

乾山藥 具母 去心 白茯苓 去皮 百合 去苗

黃明鹿角膠 炙如無以 甘草 炙各

右為末將杏仁別研拌勻每服二錢水一盞入黃蠟皂

角子大一塊同煎七分食後服

麥香散 直指方 治勞瘵嗽喘咯血聲焦潮熱盜汗

紫胡 阿膠 炒 黃耆 蜜炙 白茯苓

紫苑茸 當歸 川芎 半夏 製

貝母 去心 枳殼 炙 桔梗 秦艽 洗

甘草 炙各 人參 五味子 羌活

防風 杏仁 去皮 欬冬花 鱉甲 醋炙

桑白皮 炙各五

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至

八分食後服

○已上諸方止嗽寧肺之劑

加味十全大補湯 治發熱漸成勞瘵者

十全大補湯加柴胡黃連煎服如熱在骨髓更加青蒿

紫甲煎服 方見補攝

一方 治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱

青蒿 春夏用葉秋冬用子用子不用葉用根不用莖

白茯苓 桑白皮 炙 粉草 炙 地骨皮

北柴胡 去芦 瓜蒌實 各半兩 揀人參 去芦

右為末每服二錢姜三片煎湯調服不拘時

膏甲地黃湯 治虛勞手足煩熱心下怔忡及婦人血室

枯乾身體羸瘦飲食不為肌肉 方見發熱

青骨散 治男子婦人五心發熱欲成勞瘵

生地黃 二兩 人參 防風 去芦 熟地黃 各一

壯柴胡 一兩 薄荷葉 七錢 秦艽 赤茯苓

胡黃連 各半

右咬咀每服五錢水一盞煎七分溫服患骨熱先服荆

蓬煎丸一服使臟腑微利然後服此 見精聚類

○廣按丹溪云骨蒸發熱積病最多此云先服荆蓬煎

丸後服青骨散暗合其妙

白朮黃耆散 宣明方 治五心煩熱自汗四肢痿弱飲食減

少肌瘦昏昧並皆治之

白朮 黃耆 當歸 黃芩 去皮

芍藥 各半兩	人參	川芎 各半兩	石膏
甘草 各一兩	寒水石	茯苓 各一兩	官桂 半兩
右為末每服三錢水一盞煎至六分去粗溫服食前一			
日三服			
地骨皮和穀散	治骨蒸壯熱肌肉瘦痿多困夜夢盜汗		
柴胡梅連散	瑞竹堂方 治骨蒸勞熱久而不痊三服除根		
其効如神及五勞七傷虛弱皆治			
胡黃連	柴胡	前胡	烏梅 各二錢
右咬咀作一服取童子小便二盞豬膽一個猪骨髓一			
條蘆白半錢煎至一盞去粗服無時			
○廣按此切劑也胃虛者斟酌用之			
太上混元丹	醫方集成 治勞損五臟補真氣		
紫河車	一具用少婦首生男子者長帶子全者於東流水洗斷血脈入射香一錢在內以線縫定用生絹包裏懸胎於沙苑內入無灰酒五升慢火熬成膏		
沉香 別研	硃砂 別研飛過		人參
肉苳蓉	酒浸 乳香 別研	安息香 酒煮去沙	白茯苓 各三兩
右為末入河車膏子和藥末杵千百下九如梧桐子太			
每服七十丸空心溫酒下沉香湯下尤佳服之可以輕			
身延年			

○已上諸方補虛除熱之劑			
當歸地黃湯	宣明方 治咳血衄血大小便血或婦人經候不調月水過多喘嗽者		
當歸	芍藥	川芎	白朮
染槐子	黃藥子 各半兩	生地黃	甘草
茯苓 去皮	黃芩	白龍骨 各一兩	
右為末每服五錢水一盞煎至七分去粗食前溫服			
一方 治陰虛內多食積痰			
川芎 七錢	黃連	瓜蒌仁	白朮
神麴	麥芽 各一兩	青黛 半兩	人中白 三錢
右為末姜汁蒸餅丸服	外丹溪退勞熱食積		
遇仙灸	和劑方 治瘰癧法取癸亥日二更後六神皆聚時解去下水直身平立以墨點記腰上兩傍陷處謂之腰眼穴然後上床合而卧每穴灸七壯勞重或吐或瀉而出取後用火焚之棄於江河中恐害人故也或依崔氏穴法灸之宜服後將軍丸		
將軍丸	秘方 治傳屍勞瘵前灸法并此藥乃異人傳授累經効驗		
錦文大黃	九兩	僻香 一錢	管仲
牙皂 去皮	龜仁 去皮	槐柳	雷丸 各一兩

右為末先將葛葉二兩東壁花柳李桑葉各七片水一碗煎至七分去粗入蜜一大匙再熬至成膏入前藥末及麝香安息香搗丸如梧桐子大每服三十丸食前棗湯下

○廣按此方追取積之藥也

神授散 三因方 治諸傳屍勞氣殺虫去毒

川椒 二斤揀去子并合口者炒去汗

右為末每服一錢空心米湯調下必麻痺暈悶少頃如不能禁即以酒糊丸如梧桐子大空心服五十丸

勞瘵

心法附錄卷之十九

三

三

○已上諸方治血痰虫積之劑

○廣按人之五臟各一惟腎有二左腎以藏真水右腎以藏相火少年之人嗜慾無節以致真陰衰虛相火獨旺火寡于畏自下衝上自裏達表故名為骨蒸勞瘵病也夫証有二其火衝乎上焦者發熱之中則兼咳嗽喘急吐痰吐血肺痿肺癰等証其火結於下焦者發熱之中則兼淋瀝結燥遺精盜汗腹痛驚悸等証為可久先生保和湯保真湯中已具其端倪矣東垣先生曰火與元氣不相兩立一勝則一負經曰少火生氣壯火食氣可見火為元氣之賊火既熾而氣

傷矣氣傷則不能運化水穀水穀停滯而為濕熱生

五生積之所由也治之之法滋陰降火是澄其源也

消痰和血取積追虫是潔其流也醫者可不以補虛

為主而兼去邪矣乎

勞瘵治例 出明醫雜著

王節齋曰男子二十前後色飲過度損傷精血必生陰虛

火動之病腫中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲

食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或咳血吐血衄血身

熱脉沉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治輕者用藥數

十服重者期以歲全然必須病人殫命堅心定志絕房

勞瘵

心法附錄卷之十九

三

三

室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥

無用也此病治之於蚤則易若到肌肉消燼沉困着床

尺脉沉取細數則難為矣又此病大忌服人參若曾服

過多者亦難治今製一方于後治色慾証先見潮熱盜

汗咳嗽倦怠起早服之

主方

川芎

熟地黃 各一錢

白芍藥 炒一錢

當歸 一錢

黃蘗 七分

知母 一錢

生地黃 五分

甘草 五分

白木 一錢

陳皮 七分

天門冬 一錢

心皮

乾姜 三分

紫

十劉用生薑三片水煎空心溫服

若咳嗽盛加桑白皮馬兜鈴瓜蒌仁各七分五味子粒

若痰盛加姜製半夏具母瓜蒌仁各一錢

若盜汗多加牡蠣酸棗仁各十分浮小麥一握

若潮熱盛加桑白皮沙參地骨皮各七分

若夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸各七分

若赤白濁加白茯苓一錢黃連三分

若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮一錢黃芩山梔仁各五分

各五

若兼嗽血痰血出於脾也加桑白皮具母黃連瓜蒌仁各五分

勞瘵 心法附錄卷之十九 姜汁 少許

若兼嘔血吐血出於胃也加山梔黃連乾姜蒲黃各一錢

韭汁 半銀 薑汁 少許

若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏葉各一錢

若先見血証或吐衄盛大者宜先治血治法輕少者涼

血止血盛大者先消瘀血次止血涼血蓋血過多必

有瘀於胸膈者不先消化之則止之涼之不應也葛

可久十藥神書方可次第檢用方內惟獨參湯止可

用於大吐血後昏倦脉微細氣虛者氣雖虛而復有

火可加天門冬五錢若如前所云陰虛火動潮熱盜

汗咳嗽脉數不可用也說見本草集要人參條下明

白

此病屬火大便多燥然須節調飲食勿令泄瀉若胃氣

復壞泄瀉稀薄則前項寒涼之藥難用矣急宜服藥

理脾胃用白朮茯苓陳皮半夏神麴麥芽甘草等藥

候胃氣復然後用前本病藥

收功保後可合補陰丸常服之及用葛可久方

又治勞証方法 出十藥神書

心法附錄曰夫人之生也稟天地氤氲之氣在乎保養真

元固守根本則萬病不生四體康健若曰不養真元不

固根本疾病由是生焉且真元根本則氣血精液也余

嘗聞葛先師有言曰萬病莫若勞証最為難治蓋勞之

起因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性

命酒色是貪日夜耽嗜無有休息以致耗散真元虛敗

精液則嘔血吐血以致骨蒸體熱腎虛精竭面白額紅

口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火

盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡況醫者不究其

源不窮其本或投之以大寒之劑或療之以大熱之藥

妄為施治絕不取効殊不知大寒則愈虛其中大熱則

愈竭其內所以世之醫勞者無一人焉先師用藥治

勞如昇之射無不中的今開用藥次第于後用藥之法  
 如嘔吐咯嗽血者先以十灰散遇佳如甚者須以花蕊  
 石散止之 大抵血見熱則行見寒則凝見灰則止理  
 之必然 止血之後其人必倦其體次用獨參湯一補  
 令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五分後服諸藥  
 保和湯止嗽寧肺 保真湯補虛除熱  
 太平丸潤肺除痰 消化丸下痰消氣  
 保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味  
 和之 保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗六  
 事加味用之餘無加用 服藥之法每日仍濃煎薄荷  
 湯濯嗽喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次嚥一丸  
 緩緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥流入  
 竅中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌消化丸一百丸  
 吞下次又依前嚥嚼太平丸令其仰面卧而睡 服前  
 七藥後若肺有嗽可者潤肺丸食之如常七藥之前有  
 餘暇煮此服之 亦可續煮白鳳膏食之固其根源完  
 其根本 病可之後方可合十珍丸服之此為收功起  
 身之妙用也  
 甲字號十灰散 治勞証嘔血吐血咯血嗽血先用此藥  
 止之

大薊	小薊	栢葉	荷葉
茅根	茜根	大黃	山梔
牡丹皮	棕櫚皮	各等分	

右各燒灰存性研極細用紙包碗蓋於地上一夕出火  
 毒用時先將白藕搗絞汁或蘿蔔汁磨京墨半碗調服  
 五錢食後下如病勢輕用此立止如血出成升斗者用  
 後藥止之

乙字號花蕊石散 五內崩損湧噴出血斗升用此止之  
 花蕊石 火煨存性 研如粉

右童子小便一鍾煎溫調末三錢甚者五錢食後服下  
 如男用酒一半女用醋一半與小便一處和藥服使瘀  
 血化為黃水服此訖以後藥補之

丙字號獨參湯 止血後服此藥補之  
 大人參 去苗 二兩

右咬咀水二鍾煮五個煎不拘時細細服之服後宜熟  
 睡一覺後服諸藥除根

丁字號保和湯 治勞嗽肺成痿者服之決効

知母	貝母	天門冬	款冬花
各三錢	各三錢	各三錢	各三錢
麥門冬	天花粉	薏苡仁	杏仁
各三錢	各三錢	各三錢	各三錢
五味子	粉草	馬兜鈴	紫苑
各三錢	各三錢	各三錢	各三錢

百合	桔梗	阿膠 <small>炒</small>	當歸
生芋	紫蘊	薄荷 <small>各半錢</small>	
一方無生芋有百部			
右以水煎生薑三片入飴糖一匙入藥內服之每日三服食後進加減于後			
○血盛加蒲黃茜根藕節大薊小薊茅花			
○痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實括實 <small>炒</small>			
○喘盛加桑皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘆子			
○熱盛加梔子 <small>炒</small> 黃連黃芩黃栢連翹			
○風盛加防風荊芥金沸草甘菊細辛香附			
勞瘵 <small>心法附餘卷之十九</small>			
○寒盛加人參芍藥桂皮五味子蠟片			
戊字號保真湯 治勞証體虛骨蒸服之決補			
當歸	生芋	白木	黃芪
人參 <small>各三錢</small>	蓮心	赤茯苓	白茯苓 <small>各半錢</small>
天門冬	麥門冬	陳皮	白芍藥
知母	黃栢 <small>炒</small>	五味子	柴胡
地骨皮	熟芋 <small>各一錢</small>	赤芍藥	甘草 <small>各一錢半</small>
右以水煎生薑三片棗一枚食後服			
○驚悸加茯苓遠志栢子仁酸棗仁			
○淋濁加車前天白烏藥諸苓澤瀉			

○便溺加木通石菖蒲			
○遺精加龍骨牡蠣蓮蓬連子			
○燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲			
○盜汗加浮麥子 <small>炒</small> 牡蠣黃芪麻黃根			
己字號太平丸 治勞証久嗽肺痿肺癰並皆驗服			
天門冬	麥門冬	知母	貝母
款冬花	杏仁 <small>各二兩</small>	當歸	生地黃
熟地黃	黃連	阿膠 <small>珠各一兩半</small>	蒲黃
京墨	桔梗	薄荷 <small>各一兩</small>	白蜜 <small>四兩</small>
麝香 <small>少許</small>			
勞瘵 <small>心法附餘卷之十九</small>			
右為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火入麝香畧熬三二沸丸如彈子大每日三服食後細嚼一丸煎薄荷湯緩緩化下次噙一丸臨臥時如痰盛先用錫糖拌消化丸吞下却噙此丸仰臥使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除七日病痊凡一切咳嗽只服此藥立愈			
庚字號沉香消化丸 治熱痰壅盛			
青礞石 <small>煅黃</small>	明礞石 <small>煅黃</small>	猪牙皂角	南星 <small>火地</small>
半夏 <small>各一兩</small>	白茯苓	陳皮 <small>各二兩</small>	枳殼
枳實 <small>各一兩半</small>	薄荷	沉香	黃芩 <small>各五錢</small>

右為細末和勻姜汁浸神麴攪糊為丸如梧桐子大每服一百丸每夜臨卧飴糖拌吞次嚙嚼太平丸二藥相

痰嗽除根

辛字號潤肺膏 治久嗽肺燥肺癆

羊肺 且 杏仁 柿霜 真酥

直粉 各一 白蜜 二兩

右先將羊肺洗淨次將五味入水攪粘灌入肺中白水

者熟如常服食前與七藥相間服之亦佳

士字號白鳳膏 治一切久勞怯弱虛憊咳嗽吐血

發熱

勞瘵 心法附餘卷之十九 聖

黑嘴白鴨 一隻 大京棗 二升

參苓平胃散 一升 陳煮酒 一瓶

右將鴨縛定腳量患人飲酒多少隨量酒在器中盪溫

將鴨項割開滴血入酒攪勻一氣飲之直入肺經潤補

其肺却將鴨乾搗去毛於脇邊開一孔取其腸雜拭乾

次將藥去核每個中納參苓平胃散末填滿鴨肚用麻

扎定以沙窰一個置鴨在內四圍用火慢煨將陳煮酒

分作三次添入煮乾為度取出先食鴨肉其棗陰乾隨

意食用人參湯送下後服補髓丹則補髓生精和血順

氣

癸字號補髓丹 一名十珍丸 治久勞虛敗髓乾精竭血枯

氣少服前藥愈後服此藥

諸脊脊 一條 羊脊脊 一條 圓魚 一枚 烏雞 一隻

四味製淨去骨存肉用酒一大碗於沙窰內煮熟搗細

再入後藥

勞瘵 心法附餘卷之十九 聖

大山藥 五條 蓮肉 半斤 京棗 一百枚 霜柿 十枚

四味脩製淨用井花水一大瓶於沙窰內煮熟搗細與

前熟肉一處再用慢火熬之却下

明膠 四兩 真黃蠟 三兩

右二味逐漸下與前八味和一處熬成膏子和平胃散

末四君子湯末知母黃柏末各一兩共一十兩搜和成

劑如十分硬再入白蜜同熬取起放青石上用木槌打

如泥丸如梧桐子每服一百丸不拘時候棗湯下

補損 九十一 附諸虛

丹溪心法

大補丸 去腎經火燥下焦濕治筋骨軟氣虛以補氣  
下血虛以宜血藥下並不單用

川黃柏 炒褐色

右以水丸服

龍虎丸 補下焦

白芍藥

陳皮 各二兩

瑣陽 酥炙

當歸 各一兩半

虎骨

酒浸酥炙

知母 酒炒

熟葶 各三兩

黃柏 半斤

龜板

酒浸酥炙

右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加乾姜半兩

補損

心法附餘卷之十九

聖

補腎丸 治痿厥重者湯使與大補丸同此冬令之正藥

春夏去乾姜

乾姜 二錢

黃柏 炒

龜板

酒炙各一兩半

牛膝 一兩

陳皮 半兩

右為末姜汁糊丸或酒糊丸每服七十丸白湯下

補天丸 治氣血俱虛甚者以此補之多與補腎丸並行

若治虛勞發熱者又當以骨蒸藥佐之

紫河車淨洗用布繳乾同前補腎丸搗細焙碾末酒

米糊丸夏加五味子半兩

虛潛丸 治痿與補腎丸同

黃柏 半斤

龜板 四兩

知母 三兩

熟葶

陳皮 各二兩

瑣陽 一兩

虎骨 一兩

乾姜 半兩

白芍藥 二兩

右為末酒糊丸或粥丸 一方加金箔一片 一方用

生地黃懶言語加山藥炒黃柏知母炙龜板各等分乾

姜三分之一酒糊丸名補血丸 一方無乾姜冬月方

加有當歸一兩半熟葶比前多一兩餘同

補虛丸

人參

白朮

山藥

枸杞

瑣陽 各等

補損

心法附餘卷之十九

聖

右為末麩糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽湯下

湯藥

補心肝脾腎

蓮肉 去心

枸杞

山藥

瑣陽 各等

右為細末沸湯調服若加酥油些少尤妙

補陰丸

側柏

黃柏

烏藥 各二兩

龜板 五兩

苦參 三兩

黃連 半兩

冬加乾姜夏加縮砂

右為末地黃膏丸梧桐子大每服五十丸滾水下

又方

黃柏 半兩

知母 酒浸

熟葶 各三兩

龜板 四兩



<p>白芍藥<small>炒</small> 陳皮 牛膝<small>各二兩</small> 瑣陽</p>	<p>當歸<small>各一兩</small> 虎骨<small>一兩酒浸</small></p>	<p>右為末酒煮羊肉為丸每服五十丸鹽湯下冬加乾姜半兩</p>	<p>又方</p>	<p>下甲<small>二兩</small> 黃柏<small>炒</small> 牛膝 人參<small>各半兩</small></p>	<p>香附 白芍藥<small>各一兩</small> 甘草<small>二錢</small> 砂仁<small>三錢春不用</small></p>	<p>右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽湯下</p>	<p>又方</p>	<p>下甲<small>二兩</small> 黃柏<small>一兩</small></p>	<p>補損<small>心法附錄卷之十九</small> 四天</p>	<p>右細切地黃酒蒸熟搗細丸</p>	<p>又方</p>	<p>龜板<small>二兩酒炙</small> 黃柏<small>半兩</small> 知母<small>三錢</small> 五味子<small>二錢</small></p>	<p>右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽湯下</p>	<p>又方</p>	<p>白木 白芍藥 人參 蓮肉</p>	<p>知母 黃柏<small>各等分</small></p>	<p>右為末酒糊丸朱砂為衣空心鹽湯下一百丸</p>	<p>又方 治抑結不散</p>	<p>下甲<small>二兩</small> 側柏<small>二兩</small> 香附<small>二兩</small></p>
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------

<p>右為末姜汁浸地黃膏為丸如梧桐子大空心鹽湯下</p>	<p>七八十九</p>	<p>加減補陰丸</p>	<p>熟干<small>八兩</small> 兔絲子<small>四兩酒浸</small> 當歸<small>酒浸</small></p>	<p>白芍藥<small>炒</small> 瑣陽<small>三兩</small> 杜仲<small>二兩炒</small> 牛膝<small>四兩</small></p>	<p>破故紙 枸杞<small>各一兩</small> 虎骨<small>二兩</small> 龜板<small>三兩</small></p>	<p>黃柏 山藥 人參 黃芪<small>各二兩</small></p>	<p>冬加乾姜<small>一兩</small></p>	<p>右為末猪骨髓入蜜丸梧子大空心鹽湯下一百丸</p>	<p>三補丸 治上焦積熱泄五臟火</p>	<p>補損<small>心法附錄卷之十九</small> 聖</p>	<p>黃芩 黃柏 黃連<small>各等分</small></p>	<p>右為末蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸食遠白湯下</p>	<p>一方 治酒色過傷少陰</p>	<p>黃柏<small>炒一兩</small> 黃連<small>炒一兩</small> 條芩<small>炒半兩</small> 龜板<small>酒炒黑</small></p>	<p>冬加乾姜<small>三錢</small> 夏加砂仁<small>三錢</small> 五味子<small>五錢</small></p>	<p>右為末蒸餅丸如桐子大每服三十丸食前白湯下</p>	<p>一方 治陰虛</p>	<p>人參<small>一錢</small> 白木<small>三錢</small> 麥門冬<small>半兩</small> 陳皮<small>二錢</small></p>	<p>右剉作一服水煎吞補陰丸</p>	<p>一方 治體弱肌肥血虛脉大</p>
------------------------------	-------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

龜板 三兩	側柏 七錢半	生苧 一兩	白芍藥 一兩
烏藥 藥酒浸七			
右除生苧細切熬膏餘皆作末同搗為丸以白朮四錢			
香附一錢半煎湯下			
一方 益少陰經血解五臟結氣			
山梔子 炒令十分有			
右為末以姜汁入湯煎飲之此方甚驗於他也			
五補丸			
枸杞子	瑣陽 各半	續斷	蛇床子 炒各
兩頭尖 二錢半			
補損 心法附錄卷之十九			
右為末酒糊丸桐子大每服三十丸淡鹽湯下			
瑣陽丸			
龜板 炙	知母 酒炒	黃柏 酒炙各	虎骨 炙
牛膝 酒炙	杜仲 姜炒	瑣陽 酒浸各	破故紙
續斷 酒浸各	當歸	地黃 各一	
右為末酒糊丸梧子大每服五十丸			
○諸補命門藥須入血藥則能補精陽生陰長故也陽			
藥若多則散火			
補心丸			
硃砂 二錢	瓜蒌 五錢	黃連 三錢	歸身尾 三錢
砂 五分			

右為末猪心血為丸如菜豆大食後白湯下三十丸			
天方 寧心益智			
人參	茯苓	茯神	牡蠣
酸棗仁	遠志	益智 各半	辰砂 二錢半
右為末棗肉丸如菜豆大每服三十丸食後白湯下			
大補陰丸 降陰火補腎水			
黃柏 炒 知母 酒浸炒	熟苧 酒蒸	龜板 酥炙各	
右為末猪脊髓和蜜丸梧子大每服七十丸空心淡鹽			
湯下			
濟陰丸			
補損 心法附錄卷之十九			
黃柏 二兩七錢	龜板 炙 一兩三		
陳皮 七錢	當歸 一兩	知母 一兩	虎骨 炙 七錢
瑣陽 一兩	牛膝 一兩三	山藥	白芍藥
砂仁	杜仲 炒斷	黃芪 各七錢	
枸杞 五錢	熟苧 七錢	破故紙 半炒	
兔絲子 二錢半			
右為末以地黃膏為丸如梧子大每服七十丸鹽湯下			
充按丹溪書並無補損專條諸補陰藥兼見于各症			
之下楊氏類集于此又取燥熱與陽諸方混於其間			
殊不知丹溪之補乃滋陰益血之藥與燥烈壯陽之			

劑其意天壤懸隔今故去之不復錄也

附諸腎論

王節齋先生曰男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣虛冷固有之矣然亦有鬱火甚而致痿者經云旺火食氣譬如人在夏暑而倦怠痿弱遇冬寒而堅強也予嘗親見一二人腎經鬱火而有此証今服黃柏知母清火堅腎之藥而効故須審察不可偏認作火衰也

附諸方

補陰丸 明醫雜著 論曰人之一身陰常不足陽常有餘况

節慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈

補損 心法附餘卷之十九

辛

三首

消而勞瘵咳嗽咯血吐血等証作矣故宜常補其陰使與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣故丹溪先生發明補陰之說謂專補左尺腎水也古方滋補藥皆無補右尺相火不知左尺原虛右尺原旺若左右平補依舊火勝於水只補其左制其右庶得水火俱平也右尺相火固不可衰若果相火衰者方宜補火但世之人火旺而致病者十居八九火衰成疾者百無二三且人在少年腎水正旺似不必補然慾心正熾妄用太過至於中年慾心雖減然少年斷喪既多焉得復實及至老年天真漸絕只有孤陽故補陰之藥自少以至老不可

缺也丹溪先生發明先聖之旨以正千載之訛其功甚哉今立補陰丸方備加減法於後

黃柏 生皮酒拌 炒褐色 知母 生皮酒拌 炒褐色

敗龜板 酥炙透 熟地黃 酒拌蒸忌 五味子 一兩 枸杞子 半兩 天門冬 去心

瑣陽 酥炙乾 二兩 白芍藥 酒炒各 二兩 乾姜 炒紫色三錢 寒

右為極細末煉淨蜜和入猪骨髓二條和藥末杵極勻

丸如梧子大每服八九十九丸空心淡鹽湯送下寒月可用溫酒下

愚按乾姜宜換作肉桂蓋肉桂引諸藥入腎又和知母黃柏為從治法也

補損 心法附餘卷之十九 若有夢遺精滑病者加杜蠟 童便煨七次 白木 各一兩

山茱萸 去核 椿根白皮 炒過各七錢

若有赤白濁病者加白木白茯苓 各二兩半

山梔仁黃連 各炒各五錢

若有軟弱無力者加牛膝 酒洗 虎脰骨 酥炙透 各二兩

防己 酒浸 木瓜 各五錢

若有疝氣病加蒼朮 鹽炒一兩半 黃連 生薑汁炒

山梔子仁 炒各六錢 川芎 一兩 吳茱萸 炒

青皮 去穢各五錢

若脾胃虛弱畏寒易泄者加白朮 三兩 陳皮 一兩

乾姜炒加至七錢

若眼目昏暗者加當歸酒洗 川芎 菊花 各一兩

柴胡黃連酒炒 烏犀 各五錢

蔓荊子防風 各三錢

若兼氣虛之人加人參黃芪蜜炙各二兩

若左尺既虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加黑附子

小便浸 肉桂去皮各 沉香 五錢

金匱腎氣丸 即六味地黃丸

治形體瘦弱無力多困腎氣久虛久新憔悴汗發熱

五臟齊損遺精便血消渴淋濁等証及婦人血虛無子

補損心法附錄卷十九

者服之有效

乾山藥 山茱萸肉各四兩 澤瀉去芦

牡丹皮去心 白茯苓去皮各 熟芋八兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五六十丸空心白湯

下寒月溫酒下如腎虛有飲作痰唾生薑湯下

○廣按腎惡燥而脾惡濕前補陰藥中多是濕藥若只

腎虛而脾胃壯實者宜服苟脾胃兩虛則不可服也

惟此六味地黃丸及八味丸八物腎氣丸雖專補腎

虛又兼理脾胃不濕不燥而於脾胃兩虛者甚得其

宜也矣

八味丸 治腎氣虛之下元冷憊臍腹疼痛夜多旋溺

膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或顰黑及虛勞氣足渴飲

飲水腰重痠痛小腹急痛小便不利

熟芋八兩 澤瀉 牡丹皮 白茯苓各三

山茱萸肉 山藥各四兩 附子炮 桂心各一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸溫酒送下或

淡鹽湯送下婦人淡醋湯送下空心服

○廣按六味地黃丸專補左尺腎水之藥八味丸既補

左尺腎水兼補右腎相火之藥少年水虧火旺宜服

六味地黃丸老年水火俱虧宜服八味丸况老年腎

補損心法附錄卷十九

臟真水既虛邪水乘之而為濕熱以作腰痛足痿痰

唾消渴小便不禁淋閉等証非桂附之溫散而能治

之乎

八物腎氣丸 平補腎氣堅齒駐顏

熟芋半斤 山茱萸肉 山藥各四兩 澤瀉

牡丹皮 白茯苓各三兩 五味子 桂心各一兩

右為末蜜丸服六七十丸空心白湯下

三一腎氣丸古方 補心腎諸臟精血瀉心腎諸臟火濕

○廣按人之一身陽常有餘陰常不足氣常有餘血常

不足故滋陰補血之藥自幼至老不可缺也古方如

腎氣丸固本丸補陰丸俱是滋陰補血之劑然固本丸胸滿有痰者忌之補陰丸脾虛有濕者忌之惟腎氣丸專於補血滋陰而無理痰濕最為切當但品味數少不足以盡其變今廣將三方合而為一畧用加減名曰三一腎氣丸其間補瀉兼施庶乎可也

熟地黃 生地黄

山藥 鹿角

山茱萸肉 各四兩

牡丹皮 赤白茯苓

澤瀉 瑣陽

龜板 各三兩 牛膝 各二兩

枸杞子 各三兩 人參 遠志

麥門冬 天門冬 各二兩

知母 黃柏

五味子 遠志 肉桂 各一兩

補損 心法附錄卷之十九

書

醫方

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸漸加至六七十丸空心淡鹽湯下或溫酒下 虛甚加鹿茸一兩虎脰骨一兩

此藥其間有補有瀉其故何哉夫五臟藏精血者也精血一虛邪火乘之而為濕熱補者所以補其精血也瀉者所以瀉其濕熱也世人徒知五臟精血虛而生火殊不知五臟精血虛而邪火得以乘之此方既用知母黃柏以瀉火又用茯苓澤瀉以滲濕尤為備也

補腎丸 有効無燥

熟地 八兩

兔絲子 酒浸 歸身 三兩

肉苁蓉 酒浸 五兩

破故紙 酒炒 山茱萸肉 三兩

黃柏 酒色

知母 酒浸 各一兩

右為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心服

滋血百補丸

熟地 酒浸 兔絲子 酒浸 各半斤

當歸 酒浸

杜仲 酒炒 各四兩 知母 酒浸 黃柏 酒炒 各二兩 沉香 一兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽湯下

沉香百補丸

熟地 六兩 兔絲子 四兩 杜仲 酒炒 三兩 知母 酒炒

黃柏 酒炒 人參 各二兩 山藥 當歸

補損 心法附錄卷之十九

圭

從蓉 各三兩 沉香 一兩

滋腎百補丸

當歸 酒浸 知母 酒浸 沉香 五錢 黃柏 酒色

山藥 菊花 楮實 各二兩 青鹽 炒一兩

免絲子 酒炒 杜仲 酒炒 熟地 八兩

右為末酒糊丸或煉蜜丸桐子大空心白湯下五十丸

○廣按已上三方兼補右尺之藥也

人參固本丸 補易方 夫人心藏血腎藏精精血充實則鬚髮不白顏貌不衰延年益壽其大間者多由服性熱之

藥不能滋生精血也而藥之滋補精血者無出於生熟  
二地黃世人徒知服二地黃而不知服二門冬為引也  
蓋生地黃能生心血用麥門冬引入所生之地熟地黃  
能補腎精用天門冬引入所補之地四味互相為用本  
草又以人參為通心氣之主故宜加焉

生地黄

熟地黄各酒洗

天門冬去心酒洗

麥門冬

去心酒洗

人參一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九空心溫酒淡  
鹽湯任下 如有痰者生熟地黃各用姜汁炒過恐泥

補救也

補損

心法附餘卷之十九

桑

鹿栢固本丸

鹿角霜

半斤以角之新者截寸入布囊置長湯水中  
七日去水煮每角一斤入黃蠟半斤注口  
用露酒一壺燒之別沸流水洗盡勿令下口  
桑柴火足十二時其角乾矣用竹刀切去黑  
皮取白者為霜

天門冬

四兩酒洗

麥門冬

四兩酒洗

生地黄

四兩酒洗

熟地黄

四兩酒洗

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十九溫酒送  
下不飲酒白湯下

玄兔固本丸

生地黄

酒洗熟地黃酒洗蒸餅不

天門冬去心

麥門冬去心五味子去枝茯神各四兩蓮肉

人參去芦

枸杞子

各二兩

乾山藥白

三兩

兔絲子

作餅晒乾淨秤入兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九漸加至八  
九十九空心滾白湯下或淡鹽湯下溫酒俱可

冷補丸

治腎水燥少不受峻補口乾多渴目暗耳

聾腰痛腿軟小便赤澀大便或秘

天門冬

去心麥門冬

去心生地黃

酒洗川牛膝

白芍藥

地骨皮

石斛

去根

玄參

沉香

另研不熟乾地黃酒磁石火焙七次研水

補損

心法附餘卷之十九

至

書

右為末煉蜜為丸如梧子大每服七十九空心鹽湯酒下

○廣按此方云冷補丸者蓋因當時不明心屬火而惡  
熱腎屬水而惡燥反用熱燥之藥見傷之意也

明目益腎丸

枸杞

甘州當歸

兔絲子

生苧各一兩

五味子

半兩知母

黃栢

酒炒各一兩

山藥

巴戟去心

人參

甘菊

天門冬

去心各五錢

右為末煉蜜為丸如梧子大空心鹽湯下五十九

三才封髓丹 降心火益腎水

天門冬去心 熟地黃酒洗 人參各五錢 黃柏炒

砂仁一兩 甘草七錢半

右為末水糊丸如梧子大每服五十九丸用從蓉半兩切  
作片子酒一盞浸一宿次日煎三四沸去粗空心下

古庵心腎丸

論曰子嘗見年高之人有患其無子者有惡其白髮者  
子謂之曰無子責乎腎髮白責乎心何則腎主精精盛  
則孕成心主血血勝則髮黑今也嗜慾無窮而虧其本  
然之真憂慮太過而損其天然之性心君火也腎相火  
也君火動而相火翕然從之相火動則天君亦腎亂而  
補損心法附錄卷之十九

不寧矣是二者有相須之道焉夫髮白者古方皆責之  
於心蓋以心之所藏者神神之所附者血血之所動者  
火也心火動則血沸騰血沸騰則神不安神不安則夢  
寐紛紜而髮漸白矣雖然天地間不過陰陽五行而  
已五行有相生者有相制者今心火上炎由乎腎水虧  
之不能制耳是髮白不獨由於心也夫無子者古方皆  
責之於腎蓋以腎之所藏者精精盈則有子精虧則乏  
嗣耳今腎精之妄泄由乎心之所逼而使之然是無子  
不獨由於腎也子雖不敏粗具一方補血生精寧神降  
火庶乎並治

熟苳 生苳俱懷慶者酒

茯苓去木 山茱萸肉

枸杞子酒洗

鹿茸火去毛酥

黃柏火去毛酥

黃連去毛酒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸漸加至

一百丸空心溫酒或淡鹽湯任下辰砂為衣不遍再加

一兩

法曰心惡熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎  
補損心法附錄卷之十九

之聖藥也不獨施於髮白無子二者其驚悸怔忡遺精

盜汗目暗耳鳴腰痛足痿諸症無不治也

五精丸治腎虛痿弱大補元氣

秋石剛硬者 鹿角霜

茯苓去皮 陽起石

山藥各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九丸須要常近火邊

使乾燥庶幾服之無懸隔之患

鹿峻丸 鹿稟純陽一名班龍峻者天地初分之氣化壯

相感之精也醫書稱鹿茸角血髓大補益于人此峻則

入神矣 其法用初生壯鹿三五隻苑圃馴養每日以

人參煎湯同一切料草任其飲食久之以硫黃細末和入從少至多燥則漸減周而復始大約二年之內一旦毛脫筋露氣勝陽極別以杜鹿隔死誘之欲交不得或洩精于外或令其一交即設法取其精置磁器內香粘如錫是蛟也 隨人所宜補藥古方如六味地黃丸八味丸補陰丸固本丸之類以此蛟加陳蜜三分之一同和丸劑或和鹿角霜一味為丸空心鹽酒送下用起虛察危疾尤捷于之軀羸賴此再造願與人人共之

異類有情丸 此方并前作四

鹿角霜 製法見前鹿

龜板 八字文具者酒浸

補損 心法附餘卷之十九

李 字文具者酒浸

鹿茸 新如紫者乾為細末

虎脛骨 新而真者長水浸七日

右霜板末各三兩六錢茸脛末各二兩四錢重羅極細

火煉白蜜入猪猪脊髓九條同春劑為丸每空心鹽湯

下五七八十九周而復始丈夫中年覺衰者便可服餌

此方鹿純陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石

草木例也如厚味善飲之人可以猪膽汁一二合于和

劑中以寓降火之義

○廣按丹溪補損條中多主滋心血而補腎精為事夫

心惡熱而腎惡燥故凡熱燥之藥皆損心腎而虧精

血也今附已上訪方皆是補精益血清熱潤燥之劑或專補腎或兼補心或補腎左尺或兼補腎右尺在人分而用之

○諸虛 新增

附脉理

脉理提綱曰氣虛脉細或緩而無力右手弱血虛脉大或數而無力左手弱陽虛脉遲陰虛脉弦真氣虛脉緊指男子久病氣口脉弱則死強則生女人久病人迎脉強則生弱則死

附諸方

補損 心法附餘卷之十九

李 字文具者酒浸

四君子湯 和補方補氣和胃進食

白朮

人參

茯苓

甘草 各等分

右咬咀水煎服

○廣按四君子湯用白朮人參茯苓甘草者白朮則健

脾燥濕人參則補肺扶脾茯苓則降氣滲濕甘草則

補胃和中譬如寬厚和平之君子而不為奸險卒暴

之行也和劑云等分愚以為藥之君臣劑之大小又

人之所處何如也

四物湯 和劑方補血和血調經

當歸

白芍藥

地黃 婦人用生

當歸 男子用熟



片隨各等分

右咬咀水煎服

○廣按四物湯用當歸芍藥地黃芍藥者當歸則和血歸經芍藥則涼血補腎生半則生血寧心熟半則補血滋腎芍藥則行血通肝其性不同所治亦異和劑云等分愚以為隨其所在而輕重之庶得通變之道也

也

○王節齋曰氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚者俱加熟附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熟藥本補損

心法附餘卷之十九

奎

治一

不可輕用但常病則雖在暑熱時月亦可用也予嘗

治一僕人五月間病熱口渴唇乾讞語診其脉虛細而遲用四君子湯加黃芪當歸芍藥熟附子進一服

愈甚狂言任走或曰附子差矣脉之如舊仍增附子

進一大服遂汗出而熱退脉還四至矣又嘗治一婦

人亦夏間病熱初用和調氣血兼清熱和解之劑服

三二服不應熱愈盛舌上焦黑膈間如火漱水不

診其兩手脉皆虛而遲右手微甚六七日內謔語操

空循衣摸床諸惡証俱見後用四物湯加黃芪人參

白朮陳皮麥門冬知母熟附子服之一二時汗出而

熱退次日復熱再進一服又退又次日復發知其

極也遂連進十服皆加附子脉始復而病安

八物湯 平補氣血調和陰陽

白朮 人參 茯苓 甘草

當歸 白芍藥 地黃 川芎

右咬咀水煎服

十全大補湯 和劑方 治男子婦人諸虛不足五勞七傷此

藥性溫平補常服生血氣壯脾胃

白朮 去芦 人參 去芦 茯苓 去皮 甘草 炙

當歸 酒洗 白芍藥 酒洗 地黃 酒洗 川芎

補損 心法附餘卷之十九 奎

黃芪 去芦 肉桂 去皮 各

右為粗末每服五錢水一盞半生薑三片棗二枚煎至

八分溫服

雙和湯 和劑方 治男子婦人五勞七傷血氣不足面色痿

黃四肢倦乏將為虛勞之証常服養氣益血

白芍藥 七兩 當歸 酒洗 熟地黃 酒洗 黃耆 去芦 炙

川芎 去芦 各 甘草 炙 肉桂 去皮 不見火 各

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心

溫服

養血散 按釋方 補益血氣治虛勞少力

黃芪 <small>去芦</small> 熟地黄 當歸 <small>去芦</small> 川芎 <small>各一兩</small>		官桂 <small>去皮七錢半</small> 甘草 <small>七分半</small> 人參 <small>二錢</small> 白芍藥 <small>去皮一錢半</small>		右咬咀每服五錢水二盞生薑三片棗一枚煎至八分		去粗溫服大病之後虛勞氣乏者宜此		太真丸 <small>御藥院方</small> 治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱		飲食不進腸胃滯泄津液枯竭久服生血補氣暖胃駐顏		羊肉 <small>七斤精者為鼓洗去筋</small> 肉蓯蓉 <small>一兩</small>		濕山藥 <small>去皮十兩</small> 當歸 <small>十二兩</small> 天門冬 <small>去心焙</small>		右四味為末置之羊肉內裏定以麻纒縛縛用無灰好酒四瓶煮令酒盡再入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩人參末三兩白朮二兩熱糯米飯焙乾為末將前後藥末同劑為丸如梧子大一日二次服二百粒溫酒送下須以漸而進如覺難丸入蒸餅五七枚焙乾為末同入臼杵千百下丸之		養血當歸地黃湯 <small>按粹方</small> 治病久血氣漸虛邪氣入胃和氣養血		芍藥 當歸 川芎 地黃		蒿本 防風 白芷 <small>各一錢</small> 細辛 <small>七分</small>		右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食後溫服	
---------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------	--	-----------------------------------------	--	------------------------	--	---------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	-------------	--	--------------------------------------------------	--	----------------------	--

黃耆建中湯 <small>和劑方</small> 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大生血氣補益榮衛		黃芪 <small>去芦</small> 肉桂 <small>去皮各三兩</small> 白芍藥 <small>六兩</small> 甘草 <small>炙二兩</small>		右咬咀每服五錢水一盞半姜三片棗一枚同煎八分		服 一法用炒浮小麥煎去粗入飭少許再煎令溶稍熱服虛甚加熟附子		十四味建中湯 <small>和劑方</small> 治榮衛失調血氣不足積勞虛損形體羸弱短氣嗜卧欲成勞瘵		當歸 <small>去芦</small> 白芍藥 白朮 麥門冬		黃芪 <small>炙</small> 甘草 肉蓯蓉 <small>酒浸</small> 人參 <small>去芦</small>		補損 <small>心法附餘卷之十九</small> 附子 <small>炮去</small> 半夏 <small>湯洗</small>		川芎 肉桂 <small>去皮</small> 附子 <small>炮去</small> 半夏 <small>湯洗</small>		熟地黃 <small>酒浸</small> 茯苓 <small>去皮各</small>		右咬咀每服五錢水一盞半姜三片棗一枚煎至八分		去粗空心溫服		未病蓮心散 <small>簡易方</small> 治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精		人參 白茯苓 蓮肉 <small>各一兩</small> 白朮		甘草 <small>炙</small> 白扁豆 <small>炒</small> 薏苡仁 <small>炒</small> 北桔梗 <small>炒</small>		黃耆 <small>炒</small> 當歸 <small>各半</small> 桑白皮 百合		半夏 <small>炒</small> 乾姜 <small>炮</small> 山藥 <small>炒</small> 五味子	
--------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------	--	-----------------------	--	--------	--	------------------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------	--

乾薑 <small>炒</small>	木香	丁香	杏仁 <small>炒去尖</small>
白芷	神麴 <small>炒各一兩</small>		
右咬咀每服五錢水一盞姜棗同煎空心溫服			
黃耆益損湯 <small>直指方治諸虛勞倦</small>			
官桂	熟地黃	半夏	甘草 <small>炙各三錢</small>
石斛 <small>酒浸</small>	當歸	川芎	黃耆 <small>炙</small>
白朮 <small>各一兩</small>	白芍藥 <small>半兩</small>	北五味子 <small>半兩</small>	木香 <small>三錢</small>
右咬咀每服一兩水二盞姜五片棗二枚有熱加柴胡煎至一盞通口服			
○已上諸方治氣血新虛之劑			
鹿茸大補湯 <small>和劑方治男子諸虛不足婦人亡血一切虛損</small>			
鹿茸 <small>酒洗數遍酥塗炭火炙令透為細末</small>	黃耆	當歸 <small>酒浸洗</small>	
白茯苓	熟地黃 <small>各一兩</small>	白芍藥	白朮
附子 <small>炮</small>	人參	肉桂	半夏
石斛	五味子 <small>各一兩半</small>	甘草 <small>半兩</small>	肉苁蓉 <small>酒浸焙</small>
杜仲 <small>炒斷絲各二兩</small>			
右咬咀每服四錢姜三片棗一枚水一盞煎七分去粗			
空心熱服			
饒原雙補丸 <small>簡易方治一切虛損五勞七傷面色黧黑唇</small>			

口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼煩熱盜汗			
鹿角霜 <small>三兩</small>	熟地黃 <small>酒洗</small>	沉香	兔絲子 <small>酒浸</small>
覆盆子 <small>去枝</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	人參 <small>去芦</small>	宣木瓜
薏苡仁	黃耆 <small>炙</small>	茯苓 <small>酒浸</small>	五味子 <small>去枝</small>
石斛 <small>去根</small>	當歸 <small>去芦酒浸</small>	澤瀉 <small>切塊再蒸</small>	
麝香 <small>別研一錢</small>	硃砂 <small>研為水</small>		
右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心鹽湯鹽酒任下			
饒原心腎丸 <small>簡易方理水火不既濟心忪盜汗夜夢遺精目暗耳鳴腰膝緩弱常服調陰陽補心腎</small>			
牛膝 <small>酒浸</small>	熟地黃 <small>酒洗</small>	茯苓 <small>酒洗各二兩</small>	人參 <small>去芦</small>
鹿茸 <small>酒洗炙去毛</small>	附子 <small>炮炙</small>	遠志 <small>水煮去骨</small>	當歸 <small>去芦酒浸</small>
白茯苓 <small>去木</small>	黃芪 <small>蜜炙</small>	山藥 <small>炒</small>	
龍骨 <small>煨各一兩</small>	兔絲子 <small>酒浸</small>	成餅 <small>三兩</small>	
右為末用浸藥酒煮麵糊丸如梧桐子大每服七十丸			
空心棗湯下			
○廣按此方補虛溫寒燥濕益為虛中有寒者設也然			
虛中有熱者又當以古庵心腎丸治之			
瑞蓮丸 <small>驗方</small>	定心煖腎生血化痰		
蒼朮 <small>去脾一斤內酒浸四兩醋浸</small>			

狗杞子 <small>主肝二兩</small>	止五味子 <small>主肺二兩</small>	熟地黃 <small>去心一斤去心皮酒浸乾為膏每一斤納諸肚內蒸二個</small>	破故紙 <small>主脾二兩</small>	右為末者猪肚膏同酒糊丸如梧桐子大空心溫酒下	四五十丸	說書從蓉丸 <small>簡易方治丈夫稟受氣血有偏勝者氣勝</small>	血則陽盛宜服此藥和陽助陰	熟地黃 <small>酒浸洗蒸一兩</small>	紫巴戟	嫩鹿茸 <small>酥炙</small>	龍齒 <small>各一兩</small>	川當歸 <small>洗焙一兩</small>	人參 <small>去芦</small>	石蓮肉	肉從蓉 <small>洗焙</small>	北五味子	嫩黃芪 <small>蜜炙</small>	補損 <small>心法附錄卷之十九</small>	白茯苓 <small>各一兩</small>	兔絲子 <small>蒸二兩研</small>	右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸溫酒鹽湯任下	鹿茸 <small>四斤丸</small>	和劑方治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不能自持起居無力足膝酸疼肌體瘦悴氣血不生	肉從蓉 <small>酒浸</small>	天麻	兔絲子 <small>酒浸</small>	牛膝 <small>酒浸</small>	熟地黃	杜仲 <small>酒浸</small>	鹿茸 <small>去毛</small>	乾木瓜 <small>各半</small>	右為末蜜丸如梧子大每服五十九丸米湯或酒空心下	五味子 <small>本方</small>	理肝腎俱虛收斂精氣補真陽止虛汗	益智仁 <small>炒</small>	肉從蓉 <small>酒浸</small>	川巴戟 <small>去心</small>	人參 <small>去芦</small>	五味子 <small>去核</small>	骨碎補 <small>去毛</small>	玉茴香	白朮
-------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------	--------------	---------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-----	-----------------------	------	-----------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------	----	-----------------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----	----

覆盆子	白龍骨	熟地黃	兔絲子	牡蠣 <small>童便煨淨七</small>	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心米湯下	板粹方名已戟丸	○廣按此方專為遺精盜汗已久虛脫者設也	金櫻丹 <small>御藥院方治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷衰憊之極身體瘦削四肢困乏虛勞骨蒸等疾</small>	金櫻	仙木	生地黃	仙靈皮 <small>各取</small>	木香	肉從蓉 <small>酒浸</small>	兔絲子 <small>酒浸</small>	牛膝 <small>酒浸</small>	生雞頭肉 <small>乾丁香</small>	生蓮子 <small>肉乾</small>	乾山藥	補損 <small>心法附錄卷之十九</small>	麝香 <small>別研</small>	栢子仁 <small>別研</small>	甘草	人參	茯苓 <small>去皮</small>	陳皮 <small>去白</small>	葛蒲 <small>各一兩</small>	右將兔絲子已下同為細末入栢子仁并白沙蜜入銀石器中於爐內置熟火五斤煉蜜微解入童男母乳汁二升以篦攪次入上項膏汁同攪勻勿令住手傾入藥末一處熬攪至火消續續緩添熟火勿令火緊熬至膏成取出就於銀石器中候稍溫入射末一處搜和成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十九丸每服一丸空心細嚼酒下	無比山藥丸 <small>和劑方治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦耳</small>
-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------------------	---------	--------------------	------------------------------------------------------------	----	----	-----	-----------------------	----	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----	----------------------------	----------------------	-----------------------	----	----	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

<p>聲目暗常服壯腎水</p>		<p>赤石脂 茯神 去皮木 巴戟 去心 澤瀉</p>
<p>乾熟地黃酒 山茱萸肉 各一兩</p>	<p>牛膝一兩 去酒浸杜仲 炒皮 兔絲子 酒浸各三兩</p>	<p>五味子 兩 五苓子 兩</p>
<p>右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸空心溫酒下</p>	<p>還少丸 楊氏方 大補真氣虛損肌體瘦悴目暗耳鳴氣血凝滯脾胃怯弱飲食無味</p>	<p>乾山藥 牛膝 酒浸一宿焙 白茯苓 去皮</p>
<p>山茱萸肉 楮實子 杜仲 去皮姜汁 補損 心法附餘卷十九 杜仲 和酒炙香</p>	<p>五味子 肉從蓉 酒浸 巴戟 去心 遠志 去心</p>	<p>茴香 各一兩 石菖蒲 枸杞子 熟羊 燒燬各</p>
<p>右為末煉蜜為丸入蒸熟棗肉和勻丸如梧子大每服五十丸空心溫酒鹽湯下</p>	<p>是齋雙補丸 簡易方 平補氣血不燥不熱</p>	<p>熟地黃 半斤 補 兔絲子 半斤 補</p>
<p>右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸人參湯下</p>	<p>氣不順沉香湯下 心氣虛茯苓湯下 心氣煩熱不得睡酸棗仁湯下 腎氣動茴香湯下 小便少車前子湯下 小便多益智湯下</p>	

<p>兔絲丸 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精又云心腹脹滿脚膝酸痿小便滑數股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之</p>		<p>石蓮肉 二兩 兔絲子 酒浸 白茯苓 一兩 山藥 二兩 七</p>
<p>右為末山藥打糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽湯下脚無力木瓜湯下</p>	<p>華氏十補湯 簡易方 治諸虛不足安益心腎</p>	<p>沉香 木香 半夏 湯泡七 白芍藥 各</p>
<p>當歸 酒浸一宿 黃耆 蜜炙 生乾地黃 洗 茯神 去木各</p>	<p>肉桂 去皮四錢 北五味子 酸棗仁 炒 陳皮 去白各</p>	<p>補損 心法附餘卷十九 主 天台烏藥 麥門冬 去心 人參 白木 各二錢</p>
<p>右吹咀每服五錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去粗服</p>	<p>返本丸 補諸虛百損</p>	<p>黃健牛肉 不拘多少以去筋膜切片以河水洗數遍令血不盡仍浸一宿次日再洗一二遍水清</p>
<p>山藥 酒浸 蓮肉 去心 炒 白茯苓 去皮</p>	<p>小茴香 四兩 各 妙去蔥鹽</p>	<p>右為細末和勻用好紅棗不拘多少蒸之候爛剥去皮</p>

核研為膏加好酒入前藥和劑為丸如梧子大晒乾空  
心溫酒下五十九日進二服久服止一服切忌用麵糊  
米飲之類為丸不効

海藏大五補丸 補諸虛不足

天門冬

麥門冬

茯神

葛蒲

人參

益智

枸杞子

地骨皮

遠志

熟羊

各等分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三十丸

茸珠丸

昔西蜀藥市中嘗有黑髮朱顏道人每大

醉高歌厲聲曰龍閣不禁滄浪竭九轉靈丹都莫說惟

有斑龍頂上珠能補玉堂閣下血即貨此藥也朝野遍

傳一名斑龍丸

鹿角膠

鹿茸

去皮毛切片酥炙

鹿角霜

陽起石

大附子

半錢

當歸

地黃

各八錢

辰砂

肉苁蓉

酸棗仁

去殼黃芪

各八錢

栢子仁

同藥仁搗膏

右為細末酒煮麴為丸如梧子大每服五十九丸空心溫

酒鹽湯任下

養氣丹 治諸虛百損真陽不固氣不升降或發喘促

小兒風熱

○廣按古虛方中多是燥熱之藥蓋為虛中生寒

者設也然虛中生熱者十常八九而虛中生寒者百

無一二世俗好溫而惡寒好甘而惡苦用藥處方故

至於斯不可盡棄謹錄可用者於右中間有用附子

者此又甚焉然肥白人陽虛氣虛脾虛有濕衰老人

命門火衰陽事不舉脉沉細而遲者又不可舍附子

也

降心丹 和劑方 治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上

盛下虛小便赤白濁常服鎮心益血

熟乾地黃

酒浸焙

乾三兩

天門冬

去心

三兩

補損

心法附錄卷十九

主

主

主

主

主

人參

茯神

去木

山藥

去皮

茯苓

去皮

遠志

其草煮去

骨各二兩

當歸

去芦

肉桂

去皮各

朱砂

研為末

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸人參湯下

平補鎮心丹 和劑方 治心血不足時或怔忡夜多異夢如

墮層崖常服安心腎益榮衛

白茯苓

去皮

五味子

去梗

車前子

茯神

去皮木

肉桂

各一兩

麥門冬

去心

各一兩

天門冬

去心

山藥

洗姜製

熟羊

酒蒸

遠志

去心

各一兩半

人參

五錢

龍齒

二兩

朱砂

研為末

酸棗仁去皮炒

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心米飲溫酒任下

十四友丸和劑方治心腎虛損神志不寧

白茯苓去木 酸棗仁炒 人參各一兩

龍齒別研 阿膠蛤粉炒 黃芪遠志酒湯浸

當歸酒洗 熟地黃 栢子仁別研 肉桂

紫石英別研各一兩 辰砂別研一錢

右為末同別研四味細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後棗湯下

補損心法附餘卷之十九 天王補心丹 寧心保神益血固精壯氣力強志令人不忘清三焦化痰涎去煩熱除驚悸療咽乾育養心神

熟地黃 白茯苓 人參 遠志去心

石菖蒲 玄參 栢子仁 桔梗

天門冬去心 丹參 酸棗仁炒 麥門冬去心

甘草 百部 五味子 茯苓

當歸 杜仲姜汁浸

右各等分為細末煮蜜為丸每兩作十九金箔為衣每服一丸用燈心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可  
○廣按已上四方兼治心腎二經之藥已下諸方獨治

心經之藥也

妙香散 治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神方見發熱類

寧志膏和劑方治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

乳香五錢生油 辰砂研細水

酸棗仁炒去皮取 人參取末

右和勻煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒棗湯下

茯苓補心湯 治心虛耗不藏精血以致面色黃悴五心煩熱咳嗽吐血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦服之方見咳

補損心法附餘卷之十九 靈砂寧志丸楊氏方治男婦大病後傷損榮衛失血過多

精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦弱

辰砂二兩不夾石者用夾網袋盛懸於銀石器中用

白木魚眼沸三晝夜為度取出辰砂細研水飛

人參去芦各 石菖蒲一兩

右為末次入辰砂研勻用棗肉和杵一二千下丸如梧

栢子大每服三十九丸溫酒米飲空心任下

兼氏鎮心與神湯簡易方治心腎不交上盛下虛心神恍惚睡多驚悸小便頻數遺精白濁常服鎮心安神

石菖蒲 <small>去毛</small>	甘草 <small>炙四</small>	人參 <small>去芦</small>	赤茯苓 <small>去皮</small>
酸棗仁 <small>湯浸去核</small>	當歸 <small>酒浸焙</small>	南星 <small>泡二錢</small>	
陳皮 <small>去白</small>	乾山藥	細辛 <small>去苗</small>	紫苑 <small>去芦</small>
半夏 <small>湯泡七</small>	川芎	五味子 <small>各二錢</small>	通草
麥門冬 <small>去心</small>	覆盆子 <small>各一錢半</small>	栝子仁 <small>炒</small>	枸杞子 <small>各一錢</small>
石咬咀	每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去粗取藥汁		
入射香	少許再煎一二沸溫服不拘時		
辰砂遠志丸 <small>本事方</small>	安神鎮心消風化痰		
石菖蒲 <small>去毛</small>	遠志 <small>去心</small>	人參	茯神 <small>去木各</small>
辰砂 <small>半兩</small>	川芎	山藥	鉄粉
補損 <small>心法附餘卷之十九</small>	麥門冬 <small>去心各</small>	細辛 <small>半兩</small>	天麻
半夏 <small>麵</small>	南星 <small>炒黃</small>	白附子 <small>生各</small>	
右為末用生姜五兩取汁入水煮糊丸如菜豆大別以			
朱砂為衣每服二十丸夜卧生薑湯下			
鎮心丹 <small>濟生方</small>	治男子婦人心氣不足神志不寧一切心		
疾並皆治之			
遠志 <small>甘草煮</small>	熟地黃 <small>酒洗</small>	新羅人參	木鱉子 <small>炒去</small>
白朮 <small>各五兩</small>	麥門冬 <small>去心</small>	當歸 <small>去芦酒</small>	石菖蒲
石蓮肉 <small>去心</small>	黃芪 <small>去芦</small>	茯神 <small>去木</small>	栝子仁 <small>懷淨</small>
茯苓 <small>去皮</small>	益智仁 <small>各三</small>	朱砂 <small>五</small>	

右將人參等十四味各如法修製到碎拌勻次將朱砂衣和以夾生絹袋盛貯用麻線繫緊袋口却用瓦鍋一口盛水七分重安銀罐一個於鍋內入白沙蜜十斤將藥袋懸之中心不令着底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足住火取出淘去衆藥洗淨朱砂令乾入牛心內入白沙蜜於重湯內蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡七次其砂已熟即用湯水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分細米粽為丸如豌豆大陰乾每服二十丸食後人參湯棗湯麥門冬湯任下

補損心法附餘卷之十九

○廣按本草云此物鎮養心神但宜生使煉服則有毒少有不作疾者以此觀之反不如生使之為愈也

一方 治心氣虛損百一選方

猪腰子一枚用水二碗煮至一碗半將腰子細切入人參半兩當歸身半兩同煎至八分將腰子吃以汁送下久服為妙也

補心神効丸百一選方

黃芪蜜炙 茯神去木 人參去芦 生乾地黃

遠志去心各 栝子仁 酸棗仁泡七次



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九米飲溫下  
盜汗不止浮麥湯下 亂夢失精人參龍骨湯下 卒  
暴心痛乳香湯下 虛煩發熱麥門冬湯下 吐血人  
參湯下 大便下血當歸地榆湯下 小便出血茯苓  
車前子湯下 中風不語薄荷生薑湯下 風瀾涎潮  
防風湯下

八物定志丸 板樟方 補益心神安定塊魄去邪熱治風癱

人參 一兩半 石菖蒲 遠志 去心 茯苓 去皮

茯神 去心各 朱砂 一錢 麥門冬 去心 白朮 各半兩

牛黃 三錢 別研 補損 心法附錄卷之十九 某

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大米飲下五十丸無時

大歸神丹 安鎮心神固濟元氣

顯塊朱砂 入酒蒸 酸棗仁 當歸

人參 白茯苓 去木各 龍齒

遠志 姜汁炒 琥珀 各二兩 金龜 銀箔 各二十

右為末酒煮稀糊丸如梧桐子大每服二十丸至二十  
丸麥門冬湯下 如寢不寐亂夢炒酸棗仁湯下

又方

石菖蒲 一分 茯神 人參 各五分 遠志 七分

右為細末白湯調服方寸匕

○已上諸方治臟腑久損之劑

○唐按古方滋補虛損之劑多不清切夫心腎主陰血  
心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉  
肺脾也肺脾主陽氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕  
之藥是補肺脾而瀉心腎也今一方而能通補之手  
五臟豈有齊損之乎如袖珍方中三建湯免絲子丸  
安腎丸射香鹿茸丸椒附丸薤菴大補丸橘皮煎丸  
起痿丸正元散固真丸丹溪心法附方中價寶丹延  
齡丹添精補髓丹巨勝子丸如意丸延生護寶丹延  
壽丹等劑皆是類聚辛香燥熱之藥補陽而消陰助  
衛損 心法附錄卷之十九 王九 劉友梅  
氣而耗血殊不知人身中陽常有餘陰常不足氣常  
有餘血常不足用此藥損不足而益有餘實實虛虛  
之禍誰任其咎今將此等偏方不錄外上錄簡當中  
和之劑以便後人也抑嘗論之局方用辛香燥熱之  
劑而不覺其非者蓋以其能健脾燥濕多進飲食也  
雖然則陰血潛消而心腎暗損容顏日改而壽筭日  
偷矣可不畏哉可不謹哉

或問曰長營集一少年索好風月今孟夏清河之時  
赴宴笑談間而足其故何也子曰此陰竭而陽暴絕  
也何以明之蓋人之陰血為陽氣之依附此少年平

日色慾過度陰血已竭一旦赴宴馬上勞役心中隱  
忿不無動火火性炎上陽無依附遂隨火而發越也  
譬如樹木賴土培養平日土虧根露一旦天地作變  
則樹木亦隨風而傾倒矣夫陽為陰之先導陰為陽  
之依附天先乎地夫先乎婦氣先乎血先導之義也  
天倚乎地夫倚乎婦氣倚乎血依附之義也不曰陽  
陰而曰陰陽蓋以陰有形為陽無形之依附也知此  
理者可不以陰血為子貴乎哉

補損 心法附餘卷之十九

八

知東海王

心法附餘卷之十九終



丹溪心法附餘卷之二十

休寧東山古庵方

廣

# 婦人門

上

## 經病

九十二

丹溪心法

○婦人經水過期血少也四物加參朮帶痰加南星半夏

陳皮之類 經水不及期而來者血熱也四物加黃連

過期紫黑有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連 過

經病

心法附餘卷之二十

一

過

期淡色來者痰多也二陳加川芎當歸 過期而來是血

虛宜補血用四物加黃芪陳皮升麻 未及期先來乃是

氣血俱熱宜涼氣血紫胡黃芩當歸白芍生芩香附之屬

經不調而血水淡白宜補氣血參芪芎歸香附白芍腹

痛加膠珠艾葉玄胡索 經候過而作痛者乃虛中有熱

所以作疼 經水將來作疼者血實也氣滯四物加桃仁

黃連香附 臨行時腰疼腹痛乃是鬱滯有瘀血宜四物

加紅花桃仁我朮玄胡索香附木香發熱加黃芩紫胡

紫色成塊者熱也四物加黃連紫胡之類 痰多占住血

海地位因而下多者目必漸昏肥人如此用南星蒼木川

芍香附作丸子服之 肥人不及日數而多者痰多血虛  
 有熱亦用前丸藥中更加黃連白朮丸服 血枯經閉者  
 四物加桃仁紅花 軀脂滿經閉者以導痰湯加黃連  
 芍不可服地黃泥隔故也如用以姜汁炒 肥胖飲食過  
 度之人而經水不調者乃是濕痰宜蒼朮半夏滑石茯苓  
 白朮香附川芎當歸臨經來時肚痛者四物湯加陳皮玄  
 胡索牡丹皮甘草痛甚者豆淋酒痛緩者薑便煮附入炒  
 條芩末為丸 經水去多不能住者以三補丸加香附龜  
 板金毛狗脊 陰虛經脈久不通小便澀身體疼痛四物  
 加蒼朮牛膝陳皮生甘草又用蒼沙丸加蒼耳酒芍藥為  
 丸就煎煎藥吞下

入方 治經水過多

黃芩炒 白芍藥炒 龜板炙各兩 黃柏炒三錢  
 椿根白皮半錢 香附子二錢

右為末酒糊丸空心溫酒或白湯下五十九

又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子一兩 黃連半兩 吳茱萸十粒 桃仁五  
 紅麴二錢 砂仁二兩 麻粗木

右為末生薑汁浸炊餅為丸如梧子大每服一百丸空

心滾白水下

又方 治一切瘀血為痛

香附四兩 瓦礫子煨二兩 桃仁二兩  
 牡丹皮 大黃蒸熟 當歸各一兩 川芎

紅花各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大空心溫酒下三五十丸

導痰湯 見痰類

三補丸 見補損

蒼沙丸 見咳嗽

附諸方

○月經不調

經痛 心法附餘卷之三  
 加減四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹疼痛

當歸 川芎 芍藥 熟各等分

右以水煎服加減于後

若經候微少漸漸不通手足煩疲漸瘦生潮熱脈微數

本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分 經行過

多本方去熟芩加生芩或只加黃芩白朮 經行身熱

脈數頭昏本方加柴胡黃芩 經行數少或脹或痛四

肢疼痛加延胡索沒藥白芷與本方等為末淡醋湯調

下

經候不調心腹疼痛只用芍歸二味名君臣散 氣沖

經行月事頻併臍下多痛加芍藥 經欲行臍腹絞痛加玄胡檳榔苦練炒木香減半 經水澁少加荊花紅花 經水適來適斷或有往來寒熱先宜服小柴胡湯後以四物和之 經候過而作痛血氣俱虛也宜本方對四君子湯服之	大溫經湯和劑方 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱	阿膠 碎炒 芍藥 當歸 人參 各二兩	肉桂 去皮 甘草 炙 芍藥 牡丹皮 各二兩	經痛 心法附錄卷之五 五 半夏 二兩半 湯 吳茱萸 二兩 湯 麥門冬 二兩 湯 右咬咀每服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服	南嶽魏夫人濟陰丹 和劑方 治婦人血海虛冷久無孕育及數墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸証	秦艽 二兩 京墨 醋醃 炒 一兩 川芎 一兩半	熟地黃 酒蒸 茯苓 三兩 人參 二兩 石斛 去根酒 蒼朮 米泔浸 去 香附 四兩 木香 炮 一兩	藥本 二兩 當歸 二兩 酒 肉桂 去粗皮 乾姜 二兩 山藥 七錢 澤蘭 葉 四兩 川椒 七錢 半	細辛 一兩 山藥 七錢 半 桃仁 一兩 炒
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------

大豆黃卷 炒 半 甘草 炙 二 香布 二兩	牡丹皮 一兩	右為末練蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子亦可	交加地黃丸 治經水不調血塊氣痞痞肚腹痛	生芋 一斤 老生薑 一斤 玄胡索 當歸	川芎 白芍藥 各一兩 沒藥 木香 各一兩	桃仁 去皮 人參 各一兩 香附 半斤	右將地黃生薑各搗汁以生薑汁浸地黃粗地黃汁浸生薑粗皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處日乾	經痛 心法附錄卷之五 五 同為末醋糊丸如梧子大空心服五十九丸姜湯下	內灸散 和劑方 治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或凝積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治	藿香葉 丁香皮 熟地黃 炮 肉桂 去皮 各	甘草 炙 當歸 洗 白朮 山藥	白芷 各八兩 茴香 一兩 藥本 去皮 乾姜 炮	川芎 黃芪 去苗 各一兩 木香 一兩	陳皮 去白 白芍藥 一兩	右為末每服三錢水一盞姜五片又十葉同煎空心熱服溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露不
-----------------------	--------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------	--------------------	--------------	--------------------------------------------

快加當歸紅花前咀吐加藿香生薑煎

活血散御藥院方治衝任經虛經事不調不以多少前後

並皆治之

當歸

川芎

白芍藥

玄胡索各四兩

肉桂去皮一兩

右以咀咀每服四錢水一盞煎至七分食後熱服

溫經湯大全良方治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

莪朮各半兩

人參

甘草

牛膝各一兩

痛經心法附錄卷之三

六

右以咀咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸濟衆方治婦人經候不調血氣刺痛腹脇彭

脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜服之

大香附

砂盆擦去皮以米醋浸半日用瓦銚慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧桐子大日乾每服五十丸淡醋

湯下一方香附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前法

治証一同名艾附丸

如聖丹聖惠方治婦人經脉不調赤白帶下

枯礬四兩

蛇床子二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中

如熱極再換

增損四物湯宣明方治月經不調心腹疼痛補血藏溫經

注類

川芎

芍藥

當歸

熟地黃

白朮

牡丹皮各五錢

地骨皮一兩

右以咀咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓通口服食前

丹參散大全良方治婦人經脉不調或前或後或多或少

產前胎不安產後惡血不下並治之無治冷熱勞腰脊

痛骨節煩疼

丹參

去其不

痛經心法附錄卷之三

右為末每服二錢酒調下經脉不調食前冷熱勞無時

桃仁散

大全良方治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復

來狀如瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行動

月水或前或後或月水不來舉體沉重惟欲眠多思酸

物

桃仁

甘草

半夏各一兩

赤芍藥

生地黃各二兩

澤蘭

牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎各一兩

右以咀咀每服一兩水二盞生薑三片煎至八分空心服

四製醋附丸 瑞竹堂方 治婦人女子經候不調

香附子 去毛一斤 作四分

一分好酒浸七日 一分小便浸七日

一分鹽水浸七日 一分米醋浸七日 各焙

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心食前鹽

酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓 各二兩

○廣按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附

子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各半兩

杜丹皮 玄胡 各二錢 人參 黃芪 各一錢二分半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米湯送

下

○廣按月信趨前為熱宜用涼藥以清熱退後為虛宜

用溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不

可使認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此證便

須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食

泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少

而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣

佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則

能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜

消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

紅花當歸散 和劑方 治婦人血虛虛竭經候不調或斷續

不來或積瘀塊腰痛腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴草 五兩 當歸 去芦 牛膝 酒浸各兩 肉桂 去芦

紅花 白芷 各一兩半 甘草 炙二兩 赤芍藥 一兩

紫葳 即凌霄花 蘇木 各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒

調下 經病 心法附餘卷之十 九

通經丸 齋生方 治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血

瘀

川椒 炒去汗 蓬朮 炒去烟 乾漆 炒去烟 當歸 去芦

青皮 去白 乾姜 炒 大黃 炒 桃仁 炒

紅花 桂心 各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑臼中

杵之丸如梧桐子大陰乾每服五十丸醋湯溫酒空心

下

千金桃仁煎 簡易方 治婦人血積瘀癥片水不行等疾

子 44—518

<p>三和湯 <small>傷寒見</small> 張子和方</p> <p>四物湯涼膈散當歸各中停水煎服</p>	<p>玉燭散 <small>張子和方</small></p> <p>四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服 <small>四物湯見補損承氣</small></p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服</p>	<p>赤芍藥 延胡索 <small>各等分</small></p>	<p>紅花 <small>酒浸候煎藥</small> 牡丹皮 <small>酒洗</small> 川白芷</p>	<p>當歸 <small>酒浸</small> 凌霄花 劉寄奴 官桂 <small>去皮</small></p>	<p>凌花散 <small>治婦人月水不行發熱腹脹</small></p>	<p>右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服</p>	<p>川芎 蓬朮 <small>各等分</small></p>	<p>當歸 白芍藥 官桂 <small>去皮</small> 熟地黃 <small>酒洗</small></p>	<p>六合湯 <small>治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛</small></p>	<p>五九至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟆各樣以盡為度</p>	<p>硝更不住攪良久出之丸如梧桐子大五更初溫酒下</p>	<p>以桃仁大黃蜜虫末入內不住手攪度可圓時却下</p>	<p>右和勻以醋醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却</p>	<p>桃仁 <small>去皮尖</small> 大黃 <small>各二</small> 蜜虫 <small>半兩</small></p>
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<p>當歸 川芎 芍藥 官桂</p>	<p>血相搏所以作痛宜溫經湯及桂枝桃仁湯</p>	<p>此由寒氣客於血室血凝不行又為氣所衝新氣與故</p>	<p>溫經湯 <small>大全良方</small> 若經道不行逆膈寒症痛徹其脉沉緊</p>	<p>虛實加減服之</p>	<p>右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸空心溫酒下量</p>	<p>紅花 <small>少許</small> 地膽 <small>二十箇</small> 大黃 <small>二兩</small> 血竭 <small>二錢</small></p>	<p>官桂 桃仁 <small>炒</small> 白芍藥 甘草 <small>炒</small></p>	<p>當歸 川芎 白芍藥 甘草 <small>炒</small></p>	<p>導經丸 <small>聖惠方</small> 治婦人經病不通膈脹連腰腿疼痛</p>	<p>雄鼠屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神効</p>	<p>通經散 <small>聖惠方</small> 治室女月水不通</p>	<p>右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心酒下</p>	<p>川芎 當歸 <small>四錢</small> 水蛭 <small>三錢</small> 桃仁 <small>去皮去雙</small></p>	<p>牛膝 <small>六錢</small> 大黃 細辛</p>	<p>一方 療月經不通腹中痛</p>	<p>右為末每服二錢空心酒調下</p>	<p>當歸稍</p>	<p>紫葳 <small>一兩</small> 乾漆 <small>炒</small> 芍藥 蓬朮</p>	<p>一方 治室女月經不通</p>
--------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------------------------	---------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------	------------	-------------------------------------------------------	-------------------

<p>右丹皮 蓬莪木 各半 人參 甘草</p> <p>牛膝 各二錢</p> <p>右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服</p> <p>桂枝桃仁湯 大全良方</p> <p>官桂 芍藥 生地黃 各二 甘草 一兩</p> <p>桃仁 去皮尖 五十箇</p> <p>右吹咀每服一兩姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去滓溫服</p> <p>當歸散 大全良方 治血脈不通</p> <p>當歸 川山甲 灰煅 蒲黃 炒各五錢 辰砂 一錢</p> <p>麝香 少許</p> <p>右為末研停每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可</p> <p>琥珀散 經驗方 治心膈迷悶腹脹撮痛氣急痞塞月信不通等疾</p> <p>烏藥 二兩 當歸 蓬莪木 各一</p> <p>右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生冷油膩等物產後諸疾用炒姜湯調下</p> <p>萬病丸 援粹方 治女人月經淋閉月候不來腹臍寒疝痛微及產後血氣不調腹中生瘕結而不散等疾</p> <p>乾漆 碎炒令烟盡頂 牛膝 大酒浸一宿</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>右為細末生地黄汁一升入二味銀石器慢火熬候可丸如梧桐子大每服二九空心米飲或溫酒下</p> <p>通經散 佛氏方 治衝任不調經脈閉塞久而不通漸成堅瘦服尋常通經藥不効者正宜服之</p> <p>班貓 去翅 炙虫 水蛭 炒黑各 杜牛膝 各半</p> <p>當歸 紅花 各三 滑石 一錢</p> <p>右為細末每服一錢用桃仁七箇研細末溫酒調下食前服</p> <p>○廣按此方善能通經然月候不通有血滯者有血枯者此方用之於血滯者可矣若用之於血枯者是猶求千金於乞丐也</p> <p>瑞金散 大全良方 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛</p> <p>片姜黃 四兩 牡丹皮 蓬莪木 紅花</p> <p>當歸 赤芍藥 川芎 延胡索</p> <p>官桂 各一</p> <p>右吹咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分食前溫服</p> <p>一方 治經候閉塞亦治乾血氣</p> <p>班貓 二十箇 桃仁 五十 大黃 錦文者</p> <p>右為細末酒糊丸如梧桐子大空心溫酒服五九甚者</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



十九 如或血枯經閉者用四物湯送下

血竭膏 治乾血氣

用錦文大黃酒浸乾四兩為末以好醋一升熬成膏丸

如鷄彈大每服一九熱酒化開待溫臨卧服大便利一

二行紅脉自下此藥調經水之仙藥也 又方加香附

千金散 治經候不通

篇蓄 瞿麥各四錢 檳榔 麥蘗

小茴香錢各三 大黃錢六錢

右為細末每服三錢臨卧溫酒調下

○經病疼痛

經病 心法附餘卷之十

大烏金丸 治婦人三十六病思慮過度變生多疾孕育

不成崩中帶下五心煩熱口苦乾飲食無味身疼羸

瘦面目痿黃手足酸軟經水不勻臍腹脹痛髮黃落

喜卧倦起產後惡血上行心腹刺痛敗血不止及子宮

一切惡疾

大艾葉 當歸醋炒 破故紙炒 茴香炒

熟地黃醋炒 南木香火不見 吳茱萸 三稜

莪木各二兩 川芎醋炒 芍藥醋炒各三兩 香附子六兩

延胡索二兩 紫荊皮醋炒四兩

右先將艾二兩香附子六兩米醋一升浸一日一夜冬

月三晝夜煮乾炒令赤黑色入後十二味同為末米醋

煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽酒

湯任下日二服如崩中下血不止加棕灰一兩綿灰五

錢蒲黃炒一兩百草霜七錢

玄胡索湯清生方 治婦人室女七情所感血氣相併心腹

疼痛或連腰脇甚作搐搦但是一切血氣經候不調皆

治有效

當歸去蘆 蒲黃 玄胡索 赤芍藥

片子姜黃 官桂不見火 乳香 木香各三錢

甘草一錢 沒藥三錢

經病 心法附餘卷之十

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前溫服

吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散清生方 治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆

攻心眩暈不省並皆治之

劉寄奴去梗 牡丹皮去木 熟地黃酒浸 玄胡索炒去

烏藥 赤芍藥 蓬朮木 京三稜

當歸酒浸 官桂不見火 一方有蒴花蒲黃炒各

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮

豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢空心溫酒

送下

<p>三神丸 <small>治室女血氣相搏腹中刺痛經候不調</small></p> <p>橘紅二兩 <small>玄胡索 醋炙當歸 炒各一兩</small></p> <p>右為末酒煮米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心艾醋湯下</p> <p>當歸煎丸 <small>大全良方 治婦人久積血氣發作刺痛肌瘦乏力月候不調</small></p> <p>當歸三兩 別檳榔 赤芍藥 牡丹皮</p> <p>玄胡索 各一兩</p> <p>右同當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子每服二十九溫酒下</p> <p>經病 <small>心法附餘卷七</small></p> <p>姜黃散 <small>大全良方 治血脈久冷月水不調臍腹刺痛</small></p> <p>片姜黃 四兩 蓬莪朮 紅花 官桂</p> <p>川芎 各一兩 玄胡索 牡丹皮 當歸 各一兩</p> <p>白芍藥 三兩</p> <p>右咬咀每服一兩水二盞酒少許煎至一盞去滓通口服食前</p> <p>蠲痛散 <small>大全良方 治婦人血氣刺痛</small></p> <p>荔枝核 燒存性 香附子 炒一兩</p> <p>右為末米飲調二錢食前服鹽湯亦可</p> <p>牡丹散 <small>按粹方 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食</small></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>牡丹皮 川大黃 <small>炒各一兩</small> 赤茯苓 生地黃</p> <p>桃仁 當歸 官桂 赤芍藥</p> <p>白木 石韋 <small>去皮</small> 木香 <small>各半兩</small></p> <p>右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓通口食前服</p> <p>牛膝散 <small>按粹方 治婦人月水不利臍腹疼痛</small></p> <p>牛膝一兩 官桂 赤芍藥 桃仁</p> <p>玄胡索 當歸 牡丹皮 川芎</p> <p>木香 <small>各七錢半</small></p> <p>右為細末每服三錢溫酒調下食前</p> <p>經病 <small>心法附餘卷七</small></p> <p>替灸丸 <small>秘方 治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脈不通面色痿黃脚手疼痛四肢無力久無子息此藥常服溫中暖臍調經有子服藥未盡即時有效</small></p> <p>茯苓 艾葉 <small>各八兩</small> 香附子 當歸 <small>各四兩</small></p> <p>吳茱萸 <small>炒三兩</small> 川芎 白芍藥 <small>各二兩</small></p> <p>右用酸醋五升沙鍋煮藥乾為末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸空心午前日二服用淡醋湯送下</p> <p>大延胡索散 <small>宜明方 治婦人經病疼痛并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛平心胃急痛尤宜服之</small></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

玄胡索	當歸	赤芍藥	京三稜
川練子	去核蓬木	官桂	厚朴
木香	川芎	桔梗	黃芩
大黃	甘草	檳榔	
右為末每服三錢水一盞煎六分去滓熱服食前日三服如惡物多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨			
延胡索散	大全良方	治婦人血氣攻心腹疼痛	
延胡索	當歸	川芎	官桂
木香	枳殼	赤芍藥	桃仁
熟地黃	一兩		
經病	心法附錄卷之三	太	
右父咀每服八錢水一盞生薑三片煎至八分去滓			
口食前服			
當歸散	大全良方	治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢無力不能食	
當歸	酒炒	赤芍藥	劉寄奴
枳殼	玄胡索	沒藥	
右等分為末熱酒調下二錢不拘時候			
失笑散	和劑方	治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者	
五靈脂	蒲黃	各等分	
右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎七			

分熱服	異方濟陰丹	秘方	治婦人內有血積經水不調腰腹疼痛
香附子	三稜	蓬木	陳皮
青皮	敗姜	各一兩	
右用黑豆半升米醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘醋打糊			
官桂	當歸	赤芍藥	白芍藥
生地黃	熟地黃	澤瀉	片姜黃
牡丹皮	乾姜	川芎	劉寄奴
澤蘭	人參	蒲黃	木香
經病	心法附錄卷之三	元	
白木	玄胡索		
右各一兩焙乾與前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸炒姜酒下艾醋湯亦得空心食前經事不行酒下			
下心脾疼姜湯下或酒下			
○經病發熱			
逍遙散	和劑方	治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱	
甘草	當歸	茯苓	芍藥
白木	柴胡	各一兩	
右父咀每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎上七			

分溫服

人參荊芥散 和劑方 治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目

澁煩渴盜汗或月水不調脰腹疼痛瘰癧硬等症

赤芍藥 五兩 荊胡 五兩 牡丹皮 五兩 荊芥穗

驚甲 醋浸去 酸棗仁 枳殼去穢

生乾地黃 人參去芦 白朮 肉桂去皮各

防風 去芦 當歸 甘草各五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎六分溫服不拘時

油煎散 和劑方 治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澁

五加皮 牡丹皮 赤芍藥 當歸 去芦各

經病 心法附餘卷下 右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入煎項

藥同煎七分煎不得攪攪不得吹常服此藥能肥婦人

滋血湯 和劑方 治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或

為乳腫肌體發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草 荊芥穗 各四兩 牡丹皮 一兩 赤芍藥

枳殼 去白 肉桂 去皮 當歸 去芦 川芎 各三

右咬咀每服四錢水一盞烏梅一箇煎服以經調為度

牡丹散 和劑方 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌

體羸困漸成骨蒸並宜服之

桂心 牡丹皮 芍藥 延胡索 炒

沒藥 別研 陳皮 去白各 真蓬莪朮 鬼箭 錢各半

紅花 當歸 去芦各 乾漆 炒半 蘇木 二錢

甘草 烏藥 各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時服

加味四物湯 治衛任虛損月水不行肌膚發熱如瘰癧

當歸 地黃 芍藥 川芎 各一兩

熟胡 半兩 黃芩 二錢

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

茯苓補心湯 唐療方 治婦人去血過多虛勞發熱

四物湯 一兩半 參蘇飲 三兩 和勻生姜五片煎八分

溫服 心法附餘卷下 主

四物湯 見前 參蘇湯 見胃寒

麥煎散 聖惠方 治少男室女骨蒸婦人血風攻瘰四肢心

胃煩墜 驚甲 醋炙 大黃 煨 常山 赤茯苓

熟胡 白芍藥 當歸 乾漆 炒烟

生地黃 石膏 各一兩 甘草 半兩

右咬咀每服一兩水二鍾小麥五十粒煎至一鍾去滓

溫服食前有虛汗加麻黃根一兩治骨蒸熱黃瘦口臭

肌熱盜汗

黃芪散 <small>大全良方</small> 治婦人熱勞癯瘦四肢煩疼心燥口乾			
不欲飲食			
人參	黃芩	當歸 <small>錢各七</small>	柴胡 <small>二兩</small>
黃芪	地骨皮	赤茯苓	麥門冬
生地黃	赤芍藥 <small>兩各一</small>	甘草 <small>半錢</small>	
右咬咀每服一兩水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服			
麥門冬散 <small>大全良方</small> 治婦人客熱四肢煩悶疼痛			
麥門冬 <small>去心</small>	前胡	赤茯苓 <small>兩各一</small>	羚羊角
赤芍藥	桑白皮	黃芪 <small>錢各七</small>	生地黃
甘草 <small>錢各五</small>	心法附餘卷五	生	
右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎一鍾通口服			
犀角散 <small>拔萃方</small>	治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食		
犀角屑	赤芍藥	地骨皮	紅花
甘草 <small>錢各五</small>	柴胡 <small>一兩</small>	黃耆 <small>一兩</small>	麥門冬
人參	枳殼	赤茯苓 <small>錢各七</small>	
右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓通			
口服不拘時候一方有生地黃七錢半			
地骨皮散 <small>大全良方</small> 治婦人血風氣體虛發渴寒熱			
柴胡	地骨皮 <small>兩各一</small>	桑白皮	枳殼

前胡		黃耆 <small>錢各七</small>		雪白茯苓		五加皮	
人參	甘草	官桂		白芍藥 <small>錢各五</small>			
右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至一鍾通口服		柴胡散 <small>大全良方</small> 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩		不欲飲食			
北柴胡	黃耆	赤茯苓		白朮 <small>各一</small>			
人參	地骨皮	枳殼 <small>製</small>		生地黃			
桔梗	桑白皮	赤芍藥 <small>錢各七</small>		鱉甲 <small>醋炙</small>			
麥門冬 <small>三兩</small>	甘草 <small>五錢</small>						
右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至七分溫服		小柴胡湯 <small>大全良方</small> 治婦人傷風七八日續得寒熱發作		有時經水通斷此為熱入血室其血必結故如瘧狀			
柴胡 <small>八錢</small>	半夏 <small>二錢</small>	人參		甘草			
黃芩	生地黃 <small>錢各三</small>	麥門冬 <small>二錢</small>					
右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎二枚煎至八分		去滓溫服		柴胡飲子 <small>宣明方</small> 治一切骨蒸積熱口乾煩燥寒熱往來			
肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病		柴胡		人參		黃芩	
當歸		芍藥		大黃 <small>錢各一</small>		甘草	

喘嗽者加半夏桔梗五味子各五

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾去渣溫服食後  
嗽胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱脉沉而乾

川芎 熟地黃 當歸 白芍藥各一

熟地黃 當歸 白芍藥各一

半夏錢各三

右每服一兩水一盞半生薑三片煎八分溫服

○廣按婦人經病有月候不調者有月候不通者然不

調不通之中有無疼痛者有無發熱者此分而為四

也然四者之中若細推之不調之中有趨前者有退

後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者

有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常

時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛

為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有

經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱

也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思忿怒

外因飲冷形寒何則人之氣血周流忽因憂思忿怒

所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則

惡露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也調

其氣而破其血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱

治之有道也歟抑嘗論之氣行血行氣止血止故治  
血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則凝  
結故治血病以熱藥為佐肉桂之類是也

### 崩漏 九十三

丹溪心法

○血崩東垣有治法但不言執其主在寒學者宜尋思之

急則治其標 用白芷湯調百草霜末甚者用棕櫚灰

後用四物湯加炒乾姜調理 因勞者用參芪帶升補藥

因寒者用乾姜 因熱者黃芩 崩過多者先用五靈

脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止 紫色或塊者

熱以四物湯加黃連之類 婦人血崩用香附白芷丸服

氣虛血虛者皆以四物湯加參芪 漏下乃熱而虛四

物湯加黃連 崩中白帶用椒目末又用白芷石炭炒去

灰為末茜草少許粥丸服 一方用生狗頭骨燒灰存性

或酒調服或入藥服 一方五靈脂半生半炒為末酒調

服 經血逆行或血腥或吐血或唾血用韭汁服効 夫

婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛故也二脉

為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調適

經下依時若勞傷過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制

其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜當大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣

### 附諸方

膠艾湯和劑方治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

阿膠炒

芍藥

甘草炙各二兩

艾葉炒各一兩

熟地黃

白芍藥各四兩

當歸去蘆炒二兩

右以咀每服三錢水一盞酒半鍾煎至八分空心熱服

崩漏

心法附餘卷之十

赤白帶下

伏龍肝散和劑方治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下

或如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛經久不止

川芎三兩

肉桂去皮五錢

當歸去蘆炒

乾姜炮各七錢半

赤石脂一兩

艾葉炒三兩

熟地黃

甘草炙半兩

麥門冬一兩 伏龍肝一兩 即年久灶心土

右以咀每服四錢水一鍾棗二枚煎七分食前溫服

神仙聚寶丹和劑方治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中帶下並宜服之

沒藥

琥珀各別研一兩 辰砂別研一錢 木香煨一兩

乳香錢別研二兩 當歸洗焙一兩 麝香別研一兩

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每服一九溫酒磨下如一切難產及產後敗血衝心惡露未盡並入

童子小便

艾煎丸 治崩傷淋瀝不已小腹滿痛常服益榮調經

食茱萸湯洗當歸各七錢半

熟地黃

白芍藥各一兩

石菖蒲炒 川芎

人參

熟艾四兩 米飲調

作餅

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸酒飲任下

鎮宮丸濟生方治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或

崩漏

心法附餘卷之十

赤白帶下

狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈目眩

代赭石

紫石英煨醋

禹餘糧煨用醋

川芎

陽起石炒紅

鹿茸去毛

蒲黃炒

香附子醋煮各二兩

當歸去蘆酒浸

右為末用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服七十

丸空心米飲下

栢子仁湯濟生方治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血

遂致崩中下血不止

鹿茸酒蒸焙 栢子仁炒各二兩

芎藭

香附子炒去毛

當歸一兩 甘草炙半兩

川續斷 <small>一兩 扶神一兩</small>	小阜 <small>一兩</small>	阿膠 <small>一兩 炒</small>
右以咀每服四錢水一鍾薑五片煎七分空心溫服		
一方 治婦人血崩屢驗		
當歸	白芍藥	棕櫚
乾薑		
右等分各燒存性為末醋湯調以有節朱砂左攪四十		
丸轉食前服		
一方 治月水不止		
用阿膠炒枯為末用好酒空心調服艾湯亦可		
一方		
艾葉 <small>如雞子大</small>	阿膠 <small>半兩</small>	乾姜 <small>一錢</small>
右為粗末用水五鍾先煮艾葉後入膠洋消分作二服		
空心		
鹿茸丸 <small>大全良方</small>	治衝任虛損以致經候過多又為風冷	
所乘尺脉微細甚者可灸關元百壯		
鹿茸 <small>大去毛</small>	赤石脂	禹餘糧 <small>各一兩</small>
附子 <small>炮去皮臍</small>	艾葉	
當歸 <small>酒浸</small>	續斷 <small>各二兩</small>	熟地黃 <small>洗焙</small>
右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下		
○廣按此方用附子的係虛寒者方可然崩症多屬虛		
熱其虛寒者容或有之或當老年萌久與夫寒冷所		

乘不可一藥作虛熱論也		
○已上數方補虛溫寒之劑		
涼血地黃湯 <small>按方</small>	治婦人血崩是腎水真陰不能鎮守	
包絡相火故血走而崩也		
生地黃	當歸 <small>各五</small>	黃連
知母	藥本	川芎
熟胡	羌活	防風 <small>各三</small>
甘草 <small>炙</small>	細辛	黃芩
紅花 <small>少許</small>	荊芥	黃荊子 <small>各二</small>
右以咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前		
金華散 <small>簡易方</small>	治婦人經血得熱崩漏不止	
延胡索	當歸	瞿麥
威靈仙 <small>錢半</small>	乾葛 <small>五錢</small>	蒲黃 <small>錢五</small>
桂心 <small>三分</small>		石膏 <small>一兩</small>
右為末每服二錢水一鍾薑三片煎七分食前溫服		
黃芩湯 <small>簡易方</small>	治崩中下血今人多用止血補血之藥少	
能見効此是陽乘陰則經水沸溢宜清之為愈		
黃芩研為細末燒秤銹淬酒調下三錢食前服		
一方 治婦人血崩不止		
槐花 <small>一兩</small>	棕毛灰	五錢



寧為末水二鍾鹽少許煎至七分去滓溫服  
如神散聖惠方治婦人血崩不止赤白帶下

香附子 赤芍藥

右等分為末鹽一捻水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

當歸龍骨丸 宣明方治月事失常經水過多及帶下淋瀝

無問久新赤白諸証并產後惡物不止或孕婦胎動不安  
安疼痛漏下及大人小兒下痢並宜服之

當歸 芍藥 黃連 桑槐子

艾葉 炒 茯苓 各五 龍骨 黃柏 各一

木香 半

崩漏 心法附錄卷五 手 三因方

右為末滴水丸如小豆大每服五十丸食前米飲送下  
鮮毒四物湯 治婦人經脉不住或如豆汁五色相雜面  
色痿黃臍腹刺痛寒熱往來崩漏不止並宜服之

黃連 黃柏 黃芩 山梔子

當歸 川芎 白芍 熟地黃 各一

用水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

栢黃散 永類錄方 療經血不止

黃芩 一兩 一 當歸 栢葉 蒲黃 各一兩

生薑 半兩 艾葉 二錢 生地黃 六兩 伏龍肝 二兩

右艾咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

寧心丸 瑞竹治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行  
或過多不止

黃芩 新校條者二兩重以米醋浸七  
日炙乾又浸又炙如此七次

右為末醋糊丸如梧子大每服七十丸空心溫酒下日  
三服

三服

黃藥子散 宣明方治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體  
困倦不美飲食

黃藥子 當歸 芍藥 生地黃

人參 白朮 知母 石膏 各一

川芎 桔梗 甘草 紫苑

崩漏 心法附錄卷五 手 三因方

紫胡 槐花子 各二

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前

小薊湯 治崩中不止

小薊 莖葉 研取汁 生薑汁 一盞 白朮 半兩

右三件入水一鍾煎溫服

奇効四物湯 聖惠方 治血崩

四物湯 艾葉 阿膠 炒 黃芩

右等分水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓空心食前溫  
服

○廣按此方與膠艾湯少異但膠艾湯純於補虛而此

方補虛中又兼退熱也崩証虛而有執者用此方與黃蘗子散最當

○已上數方涼血清熱之劑

如聖散 經聖方 治婦人血崩

棕櫚 烏梅各一 乾姜一兩 並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅湯酒空心調下久患三服愈

十灰丸 濟生方 治崩中下血不止

黃絹灰 馬尾灰 藕節灰 艾葉灰

蒲黃灰 蓮蓬灰 油髮灰 棕櫚灰

赤松皮灰 綿灰各等

右為末用醋煮糯米糊丸如梧桐子每服一百丸米飲下

下

荊芥散 大全良方 治婦人崩中連日不止

用荊芥穗以燈蓋多着燈心好麻油點燈就上燒荊芥

焦色為末每服三錢童子小便調下

獨聖散 大全良方 治婦人血崩不止

用防風去蘆義隨多少為末酒煮麴清調下二錢空心

日二服更以麴作糊酒投之極驗

當歸散 聖惠方 治婦人血崩不止

當歸 龍骨 燒赤 香附子 炒各一兩 棕毛灰 五錢

右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩猪魚雞等物

一方 大全良方 用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方 大全良方

用棕櫚燒存性為末湯泡酒令淡調下三錢空心服

一方 大全良方

用棕櫚白礬煅為末酒調二錢服

必効散 保真集方 治婦人月經不調及崩漏不止

棕皮 燒 木賊 去節燒灰存 射香 研 錢

右為末酒調二錢空心服

崩漏 心法附餘卷五

備金散 治婦人血崩不止

香附子 炒 四兩 當歸 二錢 五靈脂 一兩

右為細末每服五錢空心淡醋湯調下立効

蓮蓬散 經血不止

用蓮蓬燒灰存性為細末每服二錢調下

一方 治血崩

當歸 乾薑 烏梅 清木綿

棕櫚 各等

右並燒灰存性為末燒秤錘淬酒空心調服日三次

○已上數方止血住崩之劑

○廣按血虛陰也靜則循經榮內動則錯經妄行蓋今之七情過極則動五志之火五志之火尤甚則經血暴下失期而來久而不止謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩次第初用止血以塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其流而不澄其源則滔天之勢不能遏若止澄其源而不復其舊則孤子之陽無以立故本末勿違前後罔紊方可以言治也

## 帶下

九十四

丹溪心法

帶下 心法附餘卷三

三

帶下 赤屬血 白屬氣 主治燥濕為先 漏與帶俱是胃中痰積流下滲入膀胱無人知此只宜升提甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加蒼朮白朮仍用九子一本作瓦龍子又云赤白帶下皆屬血出於大腸小腸之分 肥人多濕痰海石半夏南星炒栢蒼朮川芎椿皮一方無椿皮有青黛 瘦人白帶少如有者多熱以炒黃栢滑石椿皮川芎海石如無海石以蛤粉亦可一方有青黛作九子服 赤白帶下炒黃荊子為末酒調下二錢或米湯亦可又治心痛羅先生法或十棗湯或神佑丸或玉濁散皆

可服實者可行虛者不可峻攻 血虛者加減四物湯氣虛者參朮陳皮間與之 濕勝者用固腸丸 相火動者於諸藥中少加黃栢 滑者加龍骨赤石脂 滯者加葵花葵花白者治白帶赤者治赤帶 性燥者加黃連 痰氣帶下者蒼朮香附滑石蛤粉半夏茯苓丸服寒月少加乾姜臨機應變必須斷厚味

入方

良姜

芍藥

黃栢各二錢俱炒成灰

椿白皮半一兩

右為末粥丸梧子大每服四五十丸空心

帶下

心法附餘卷三

三

又方 一婦人白帶兼風痛

半夏

茯苓

川芎

陳皮

甘草

蒼朮

黃栢酒炒

南星

牛膝酒洗

又咀水煎空心服

治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

南星

蒼朮

栢皮炒

滑石

半夏

川芎

辛夷

牡蠣粉炒

酒茶等分

右咀咀水煎去粗食前服

又方 治白帶

龜板 <small>炙</small> 枳子 <small>各二</small> 黃柏 <small>炒一</small> 白芍藥 <small>七錢</small>	香附 <small>半兩</small> 乾姜 <small>炒二錢</small> 山茱萸 苦參	椿根皮 <small>各半</small> 貝母 <small>二錢</small>	右為末酒糊丸梧桐子大空心米湯下五十丸	又方 治赤白帶下或時腹痛	龜板 <small>酒炙</small> 黃柏 <small>炒一</small> 乾姜 <small>炒一</small> 枳子 <small>半一錢</small>	右為末酒糊丸梧子大每服七十九日服二次	又方 治婦人有孕白帶	蒼朮 <small>三錢</small> 白芷 <small>二錢</small> 黃連 <small>炒二錢</small> 黃芩 <small>炒三錢</small>	黃柏 <small>炒半</small> 白芍 <small>二錢</small> 椿根皮 <small>炒半</small> 山茱萸 <small>半二錢</small>	右為末糊丸空心溫酒下五十丸	治結痰白帶 先以小胃丹半饑半飽津液下數丸候變	積開却宜服補藥	白朮 <small>二兩</small> 黃芩 <small>半兩</small> 紅白葵花 <small>二錢</small> 白芍 <small>七錢</small>	右為末蒸餅丸空心煎四物湯三五十丸	固腸丸 治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之疾用	此以燥其濕亦不可單用須看病作湯使	椿根白皮 <small>酒炒用</small>	右為末酒糊丸服	又方 椿根皮 <small>四兩</small> 滑石 <small>二兩</small>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------	------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------------------

右為末糊丸如梧子大空心白湯下一百丸	又方 治白帶因七情所傷而脉數者	蘆栝 <small>酒蒸</small> 黃柏 <small>炒各</small> 香附 <small>炒</small> 白芍	白朮 <small>各一</small> 椿根皮 <small>炒二</small> 白芷 <small>三錢</small> 黃連 <small>炒</small>	右為末糊丸梧子大每服七十九食前米飲下	又方 治赤白帶濕勝而下者	白芍 滑石 <small>炒各</small> 枳殼 <small>炒</small> 甘草 <small>各三</small>	椿根皮 <small>炒一</small> 乾姜 <small>炮二</small> 地榆 <small>半兩</small> 蒼朮 <small>一兩</small>	右為末糊丸空心米飲下一百丸	附諸方	帶下 心法附餘卷三	補宮丸 楊氏方 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸	中帶下並宜服之	鹿角霜 白茯苓 香白芷 白朮	烏賊魚骨 白薇 白芍藥 牡蠣 <small>煨</small>	山藥 <small>各等</small>	右為末麵糊丸如梧桐子大服五十丸空心米飲送下	內金鹿茸丸 楊氏方 治婦人勞傷血脉胞絡受寒小便白	濁晝夜無度脬腹疼痛腰膝無力	黃芪 鷄內金 杜鰭 鹿茸	遠志 肉從容 五味子 龍骨
-------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----	-----------	-------------------------	---------	----------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	---------------	--------------	---------------

附子

桑螵蛸各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸溫酒飲任下

當歸煎清生方治婦人赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日

漸羸瘦

當歸酒浸

赤芍藥

牡蠣火煨

熟艾酒浸

阿膠

白芍藥

續斷酒浸

地榆半兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

卷柏丸清生方治婦人室女腹臍冷熱相攻心腹疼痛赤

白帶下面色痿黃四肢羸乏

黃芪

熟地黃洗各一兩半

鹿茸

卷柏醋炙

帶下

心法附錄卷之三

赤石脂醋炙

川芎

艾葉

代赭石醋炙

桑寄生

當歸去芦酒

地榆各二兩

木香不見火

龍骨各半

乾姜七錢半

右為末醋煮糯米糊丸如梧桐大每服七十丸空心米

飲下

威喜丸和劑方治婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常

濕小便如米泔或無子息

白茯苓去皮

黃蠟四兩

猪苓二錢半

去皮同茯苓

沸出日乾

不用猪苓

右取茯苓為末溶蠟丸彈子大空心細嚼滿口生津徐

徐熾服忌米醋及使性氣

白芷散大全良方

治婦人赤白帶下

白芷一兩

海螵蛸燒一箇

胎髮一箇

右為末空心酒調服二錢

麝香丸御藥院方

治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷

久無子息

零陵香

藿香各二錢

蛇床子五錢

吳茱萸

枯礬

木香各三錢

射香二分

丁香

韶腦一錢

不灰木

白芷二錢

龍骨五錢

右為末煉蜜為丸每兩作四十九丸每用一丸綿裹納陰

中

心法附錄卷之三

帶下

大効拱辰丸秘方

治婦人血海虛冷白帶時下臍腹刺痛

久服令人延年精神充實多子嗣

琥珀二錢

當歸酒浸

沉香

木香

官桂各不見火

人參

黃芪

鹿茸酥炙

乳香

沒藥各一兩

酸棗仁半兩

鹿角霜

乾姜

延胡索

栢子仁各半

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一丸溫酒化下空心

暖宮妙應丸秘方

治婦人赤白帶下

艾葉

龍骨

當歸

川芎

牡蠣 白芍藥 牡丹皮 茯苓

赤石脂 熟地黃

右等分為末麵糊丸如梧桐子大每服五十九空心艾醋湯下

艾煎丸 經方治婦人諸疾腹痛赤白帶下

香附子 淨 艾葉 各一兩 蔓荊子 神麴

枳殼 去穢 當歸 各二兩 吳茱萸 蓬莪朮 各一兩

右用醋一大碗慢火煮香附艾葉以醋盡為度揀去艾

葉入糯米糊捻作餅子日乾同前藥為末醋糊丸如梧

桐子大每服二三十丸食前米飲下醋湯亦可

帶下 心法附餘卷之二十終

○已上數方辛溫去濕寒之劑

戴人玉燭散

當歸 芍藥 川芎 熟苧 各五錢

大黃 三錢 甘草 一錢半

右咬咀生姜三片煎服

十棗湯 見脇痛類

神佑丸 見中濕熱

○已上三方苦寒除濕熱之劑

○廣按婦人赤白帶下之症多是怒氣傷肝夫肝屬木脾屬土肝邪乘脾木氣尅土則脾受傷而有濕熱而

生熱熱則流通所以滑濁之物滲入膀胱從小便而出也古人作濕寒而用辛溫之藥治之者非而丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者是矣雖然古人曾用辛溫之藥治之而愈者殊不知用苦寒之藥是正治之法也用辛溫之藥是從治之法也蓋濕熱怫鬱於內肚腹疼痛赤白帶下非辛溫之藥從治而能開散之乎然濕熱未嘗怫鬱但止赤白帶下而無腹痛之症不若用苦寒之藥並治之為當也

帶下 心法附餘卷之二十終

丹溪心法附餘卷之二十終

婦人門下

產前 九十五

丹溪心法

○產前當清熱養血 產婦因火動胎逆上作喘急者急用條芩香附之類為末水調服條芩水中取沉者為佳

墮胎乃氣虛血虛血熱 黃芩安胎乃上中二焦藥能

產前

心法附餘卷之二十一

降火不行 益母草即芎藭子治產前產後諸病能行

血養血難產可煎作膏地黃膏牛膝膏皆可用 懷妊

受物乃一臟之虛假如肝臟虛其肝氣止能生胎無餘

用也又云不能榮其肝肝虛故愛酸物 產前安胎白

木黃芩為妙藥也條芩安胎聖藥也俗人不知以為寒

而不敢用反為溫熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱

令血循經而不妄行故能養胎 胎熱將臨月以三補

丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸外 抑熱以三補丸用

地芩膏丸 有孕八九箇月必用順氣須用枳殼紫蘇

梗 凡妊婦脉細勻易產大浮緩火氣散難產 生產

如抱船過填一般

入方 固胎

地黃半錢 婦身 人參 白芍各一錢

白朮一錢半 川芎五分 陳皮一錢 黃芩半錢

甘草三分 黃連少許 黃柏少許

桑生牛兒藤七葉 一本無芩

右咬咀每二錢入糯米二十粒煎服 血虛不安者用

阿膠 痛者用砂仁止痛安胎行氣故也

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩 夏一兩春秋七 白朮二兩不 陳皮三兩

茯苓 七錢半 火

右為末粥丸如梧桐子大每服五六十丸食遠溫水下

達生散 又名東胎散

大腹皮三錢 人參 陳皮各半錢 白朮

芍藥各一錢 紫蘇葉半 甘草二錢 婦身屋一錢

右作一服入青蔥五葉黃楊腦七箇此即黃楊樹葉稍

兒也或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九個月服十

數貼甚得力夏月加黃芩冬不必加春加川芎 或有

別証以意消息于后

氣虛加參朮 氣實倍香附陳皮 血虛倍當歸加地

黃 形實倍數 性急加黃連 有熱加黃芩

痰加滑石半夏 食積加山楂 食後易飢倍黃楊腦

有痰加半夏 腹痛加木香桂

又方 第九箇月服

黃芩 一兩酒炒不宜涼 白朮 一兩 枳殼 炒七錢

滑石 七錢半臨月十日服

右為末粥丸梧子大每服五十九丸空心熱湯下多則恐

損元氣氣實人宜服

又方 安胎

白朮 上 黃芩 上 神麴 炒中

產前 心法附錄卷之十一

右為末粥丸服 一本云用條芩一二兩為末每一錢

或半錢濃煎白朮湯調下每次用白朮五錢煎湯

○惡阻從痰治 多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者

有痰瘦者有熱須用二陳湯

入方 白朮 不以多少

右為末水丸隨所好或湯或水下

○子腫

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

入方

山梔子 炒用一合

右為末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮 五兩 茯苓 四兩 當歸 芍藥 各二兩

右細剉以鯉魚一箇脩事如食法煮取汁去魚不用每

服四錢入魚汁一鍾半姜七片陳皮少許煎至七分去

粗空心服

○胎漏 氣虛 血虛 血熱 可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

產前 心法附錄卷之十一

參朮飲 治妊娠轉胞

四物湯四錢加 人參 八分 白朮 八分

半夏 姜製 五分 陳皮 八分 甘草 三分

右吹咀入生薑煎空心服

治胎動不安已有所見

艾葉 阿膠 當歸 川芎 各三兩

甘草 兩 右每服五錢水煎次下膠令洋溫服

○難產氣血虛故也此蓋九月十月之際不謹守者有之

亦有氣血凝滯而不能轉運者臨月時服野天麻熱膏



白湯調下油蜜小便和極勻治難產

入方

砂仁中

香附醋煮上

枳殼中

甘草下

右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母草末

催生

白芷灰中

百草霜中

滑石上

右為末用芎歸煎湯調下或姜汁服亦可

天麻丸

天麻

即益母草六月間連根採除乾

產前

心法附餘卷之十一

五

生白芷

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時溫酒或白湯化一丸能除產後白病

附諸賢論

王節齋曰婦人半產多在三四五月及十箇月除跌撲

損傷不拘外若前次三箇月而墮則下次必如期復然

蓋先於此時受傷故後至期必應乘其虛也遇有半產

者產後須多服養氣血固胎元之藥以補其虛損下次

有胎先於兩個半月後即服固胎藥十數服以防三月

之墮至四箇半月後再服八九服防過五月又至六箇

半月後再服五七服以防七月及至九個月內服丹溪

達生散十數服可保無虞其有運墮數次胎元損甚者

服藥須多則可以晉方用四物湯加人參白朮陳皮

茯苓甘草同膠艾葉條芩多氣加香附縮砂有痰加姜

製半夏調理妊娠在於清熱養血條實黃芩為安胎聖

藥清熱故也暑月宜加用之養胎全在脾胃譬猶鍾

於梁梁軟則鍾下墜折則墮矣故白朮補脾為安胎君

藥若因氣惱致胎不安者宜用川芎陳皮茯苓甘草多

加縮砂少佐木香以行氣

附脉理

脉訣舉要曰男女之別以左右取左疾為男右疾為女

產前

心法附餘卷之十一

六

三言

實在左浮大在右右女左男可以預判離經六至沉細

而滑陣痛連腰胎即時脫血瘀弦急而大者生虛小弱

者即是死形半產漏下革脉主之弱即血耗立見傾危

附諸方

驗胎方 經脉不行已經三月者

用川芎為細末空心濃煎艾葉湯調下 錢覺腹內微

動則有胎也否則經滯

○胎動不安

安胎散 治胎動不安

治妊娠自高墮下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血縮砂不拘多少於熨斗內炒令熱却去皮

研為細末每服二錢熱酒調服艾鹽湯亦可

川芎散 治妊婦從高墮下胎氣不和轉動不能腹

臍疼痛

南川芎為末每服二錢溫酒調下

佛手散 治妊婦胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸酒 治妊婦胎動不安血氣衝心欲絕者

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

艾葉二錢 阿膠三錢

右二味水煎服

產前 心法附餘卷三十一

膠艾湯 治妊婦或因倒仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黃 艾葉 白芍藥 川芎

黃芪 阿膠 當歸 甘草

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚同煎去粗空

心溫服

杜仲丸 治妊婦三兩月胎動不安防其欲墮預宜

服之

杜仲 去皮剉姜汁炒去絲 川續斷 酒浸各二兩

右為末肉煮爛杵和為丸如梧桐子大每服三十九

米下

安胎當歸湯 治妊婦五月舉動驚悸胎動不安

下墮小腹引腰痛小便疼痛下血

當歸 阿膠 川芎 人參

棗子二枚 艾一虎口

右細切酒水各三升合煮至二升內膠令烊分二服腹

中當安小便當煖也 一方有甘草無參棗

旋覆花湯 治妊婦六七月間胎不安常處亦名

阻病

旋覆花 厚朴 白朮 枳殼

黃芩 茯苓 半夏 芍藥

產前 心法附餘卷三十一

生薑 各二兩

右咬咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去粗溫服食前忌

羊肉餛飩麋李雀肉

芍藥湯 治妊婦八月中風寒有所化觸身體盡

疼乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小

便白如米泔或青黃寒慄腰背苦冷痛面目視茫茫

芍藥 人參 當歸 甘草

白朮 厚朴 薤白 生薑

右用水五升酒四升煮取三升分三服日再夜一忌海

藻葱薤李雀肉等物

二香散 聖惠方 治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔

吐酸水起坐覺重且服

香附子 一兩 藿香葉 甘草 各二錢

右為細末每服二錢鹽沸湯調下

當歸湯 人全良方 治妊娠胎動過心煩躁悶絕口乾橫生

倒產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科各保安

飲 當歸 人參各一兩 阿膠 一兩 甘草 二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半連根葱白一莖煎至八分

去滓溫服 一方無甘草有川芎厚朴產保方有

產前 心法附餘卷五十一 九

芎 阿膠散 大全良方 治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓 白朮 川芎各七錢半 阿膠 半 七錢

當歸 陳皮各一兩 甘草 二錢

右咬咀每服八錢水一鍾半生姜二片棗二枚煎至八

分食前溫服

龍骨散 大全良方 因藥損胎下惡血不止

龍骨 當歸 地黃 各八分 艾葉 炒四分

地榆 阿膠 芍藥 乾姜 各六分

蒲黃 五分 牛角鯁 三分

右為末食前米飲調二錢服

歸散 大全良方 療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連

腰痛下血

當歸 川芎 各八分 阿膠 炒 人參 各六分

艾葉 四分 大棗 二枚 茯苓 一錢

右咬咀每服八錢生姜三片水一鍾半煎至八分去粗

食前溫服

一方 治胎動出血產門痛

用黃連為末酒調一錢日三服

主聖散 胎動不安下血不止

產前 心法附餘卷五十一 三

用雞肝二具好酒一斤煮熟共酒食之大効

金匱當歸散 妊娠宜常服之

當歸 川芎 白芍 黃芩 各一兩

白朮 半兩

右五味為末酒飲調服方寸匕日二次 或用酒糊為

丸如梧桐子大每服五十丸茶湯任下空心食前服日

三次

此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素曾

半產者皆宜服之以清其源而後無患也

○廣按婦人有妊娠則碍脾運化遲而生濕濕而生熱

古人用白木黃芩為安胎之聖藥蓋白木補脾燥濕  
黃芩清熱故也况妊娠賴血培養此方又加當歸川  
芎白芍以補血充為備也服此劑之後尤為易產所  
生男女兼無胎毒則痘疹稀少無病易育而聰明智  
慧不假言矣此端本澄源之事也累試累驗  
安胎飲 永類鈴方 治懷胎三四月至九月惡阻病者心中  
潰悶頭重目昏眩四肢沉重懈墜不欲動作惡聞食氣  
欲吃鹹酸睡多少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動  
腹腸疼痛或時下血及妊娠一切病疾並皆治之  
甘草炙 茯苓去皮 當歸去芦 川芎  
產前 心法附錄卷之二十一  
熟苳酒 白木 黃耆 白芍藥  
半夏湯泡 阿膠 蛤粉炒 地榆 各等分  
右咬咀每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分去滓溫  
服不拘時候 一方無半夏地榆有人參桑寄生 一  
方無白木黃耆半夏地榆有艾是膠艾湯加白茯苓  
安胎和氣飲 濟生方 治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大  
便虛滑  
訶子 去核麩 白木 各一 陳皮 去白 高良姜 炒  
木香 不見火 陳米 炒 甘草 各半兩  
右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎服忌食生冷之物

大聖散 濟生方 治妊娠忪悸睡裏多驚腹脇膨脹坐卧不  
寧  
白茯苓 去皮 川芎 麥門冬 去心 當歸 去芦酒  
黃芪 去芦 木香 不見火 人參 甘草 各半兩  
右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去粗溫服  
芎藭補中湯 濟生方 治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數  
月而墮  
乾姜 炮五錢 阿膠 蛤粉炒 芎藭 五味子 各一  
黃芪 去芦 當歸 去芦酒 白木 赤芍藥 各一  
本香 不見火 人參 杜仲 去皮炒 甘草 各半兩  
產前 心法附錄卷之二十一  
右咬咀每服四錢水一鍾煎至七分不拘時服  
益母丸 醫方大全 專治難產橫逆併安胎順氣  
用益母草其葉類大麻葉莖方花紫色白者不是五月  
五日採其葉莖陰乾不見日忌鐵器以石磨為末煉蜜  
丸如彈子大每服一丸臨產時以童子小便溫酒化下  
若氣不順木香人參湯或艾醋湯化下  
枳實枳榔丸 宣明方 安養胎氣和調經候破癥瘕癰塊有  
似妊娠可以久服血氣通和無寬膈美食  
枳實 生 枳榔 黃連 黃蘗  
黃芩 當歸 阿膠 炙 木香 各半兩

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十丸日進三服		黃芩湯	宣明方	治婦人孕胎不安
白朮		黃芩	各等分	
右為末每服一三錢水二鍾入當歸一根同煎至一鍾		溫脈		
黃耆散		大全良方	療妊娠胎不長宜服安胎和氣惠食利	
四肢		川芎	甘草各五錢	黃耆
陳皮		麥門冬	白茯苓	前胡
人參		錢各二		
右咬咀每服八錢生姜三片棗二枚水一鍾半煎至八		分食前服		
知母丸		聖惠方	治月日未足而似欲產腹痛者	
用知母為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸溫酒嚼下日		一服	一方如梧桐子大每服二十九丸粥飲送下	
槐子丸		大全良方	治妊娠月數未足而似欲產腹痛者	
槐子		蒲黃	各等分	
右為末用煉蜜丸如梧子大溫酒下三十丸以痛止為		度		
○胎漏				

如聖湯		濟生方	治胎動腹痛或為漏胎	
鯉魚皮		當歸	去蘆酒浸	熟地黄
川芎		阿膠	蛤粉炒	川續斷
右咬咀每服四錢水一鍾葶根少許姜五片同煎溫服		桑寄生散	潮生方	治胎漏經血妄行淋瀝不已
當歸		酒浸	桑寄生	川續斷
白朮		香附子	炒去毛	阿膠
茯苓		去木各一兩	甘草	炙五錢
右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去粗不拘時		溫服		
二黃散		後萃方	治婦人胎漏下血	
生地黃		熟地黄	各等分	
右為細末煎白朮枳殼湯調下二錢食前服		枳殼湯	後萃方	治婦人胎漏下血及因事下血
枳殼		去穢	黃芩	各半兩
右為末水煎食前溫服二錢		秘傳當歸寄生湯	治妊娠胎漏非時下血	
當歸		川芎	艾葉	白朮
人參		桑寄生	川續斷	熟地黄
用水二鍾煎至一鍾去粗空心溫服				

厚朴散 無故李下血

阿膠二兩蛤粉炒

生地黃半斤

右以清酒三升將二味攪勻溫熱分三服飲之

一方 無故尿血

龍骨一兩 蒲黃半兩

右為末酒調每服二錢日三服

一方胎動不安或腰疼胞轉撞心下血不止

用石莖蒲根搗汁三升飲之

方用枳榔一兩為末葱白湯調下一錢

榆白皮散簡易方 治妊孕漏胎去血恐其難產常宜服之

產前

榆白皮 葵根 大麻仁去殼 瞿麥各一兩

木通半兩

牛膝七錢半 酒浸焙

右咬咀每服四錢水一鍾煎八分溫服

地黃當歸湯 治胎痛

當歸一兩 熟地黃二兩

右為末每半兩水煎大全良方等分為末蜜丸名內補

丸許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋此等藥

甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是

枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散苦

寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽

不至強陰不至弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也愚詳陰陽調停不若不服為愈

○惡阻

半夏茯苓湯和劑方 治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔

吐

旋覆花

陳皮去白

桔梗

白芍藥

人參去芦

甘草炙

川芎各半兩

半夏泡七次

赤茯苓

熟苓各半

右咬咀每服四錢水一鍾姜四片煎七分空心熱服

茯苓丸和劑方 治妊娠惡阻停飲憂聞食氣當與茯苓湯

產前

赤茯苓去皮

人參去芦

肉桂去皮

乾姜泡

半夏洗七次

陳皮各一兩

白朮

葛根

甘草炙

枳實去白

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

竹茹湯和劑方

治妊娠嘔吐頭眩眩暈

橘紅去白

人參一兩

甘草二錢

麥門冬去心

厚朴姜製

白茯苓各半兩

白朮一兩

右咬咀每服五錢水一鍾姜五片入竹茹一塊如彈子

大同煎至八分不拘時溫服

地黃丸和劑方治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

人參去芦 乾姜炮各

右為末用生地黃汁丸如梧桐子大每服五十丸白木

湯下食前服

參橘散和劑方治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓 橘皮去白各 麥門冬去心 白木

厚朴姜製 甘草炙各

右咬咀每服四錢水一鍾姜七片竹茹少許煎七分去

滓溫服

白木散簡易方治妊娠胎氣不和不進飲食

白木剉 紫蘇各一兩 白芷炒 人參各一兩

訶子 青皮去白 川芎各七錢半 甘草二錢半

右咬咀每服四錢水一鍾姜三片煎七分不拘時服

旋覆半夏湯濟生方治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

卧少起

旋覆花 川芎 細辛洗去土 人參

甘草炙各 半夏湯洗七 赤茯苓去皮 當歸去芦酒

乾生薑 陳皮各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去粗溫服

人參半夏丸濟生方治妊娠惡阻醋心胸腹冷痛吐逆不

食

半夏湯洗 人參 乾生薑各半

右為末以生地黃汁浸蒸餅丸如梧桐子大每服四十

丸米飲下

白木散大全良方治惡阻吐清水十餘日粥漿不入者

白木一兩 人參五錢 丁香二錢半 甘草一錢

右咬咀每服一兩生薑五片水二鍾煎至一鍾去滓溫

服食前

人參橘皮湯聖惠方治惡阻病嘔吐痰水

人參去芦 橘皮 白木 麥門冬

甘草各三 厚朴剉 白茯苓各半

右咬咀每服一兩水二鍾姜三片竹茹彈大一塊煎至

一鍾去滓食前溫服集驗方無茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散大全良方治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食

及心腹刺痛

人參五錢 丁香 藿香各一錢半

右咬咀每服五錢水一鍾煎至八分去滓溫服無時

保生湯大全良方治婦人經候不調或不行身無病似病

脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞

食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此各惡阻切勿

作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服

人參 甘草各二錢 白朮 香附子

烏藥 橘紅各五錢

右咬咀每服一兩水一鍾半生薑三片煎十分去滓溫服不拘時或為末調服亦可

○子煩

竹葉湯 治妊娘心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓 四兩 防風 麥門冬 去心 黃芩 各三兩

右咬咀每服四錢水一鍾竹葉五片煎服不拘時

產前 治妊娘心脾腫熱咽膈渴舌煩悶多驚

知母 飲 黃芩 黃耆 各三兩 知母

赤茯苓 麥門冬 甘草 各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾入桑白皮煎熟再入竹瀝同服

服

竹茹湯 治妊娘煩燥或胎不動

淡青竹茹 一兩

右用水一大升煮四合徐徐服盡為度

麥門冬散 治妊娘心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬 防風 白茯苓 各二兩 人參 半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片淡竹葉十片煎七分溫服

歸涼接命散 治妊娘面赤口苦心煩腹脹

川芎 苧根 白朮 麥門冬 去心

當歸 酒浸 白朮 各一兩 糯米 半合 甘草 炙五錢

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至一鍾去粗溫服

麥門冬散 治妊娘心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣

頭眩四肢沉重百節疼痛多卧少起

麥門冬 子芩 赤茯苓 柴胡

赤芍藥 陳皮 人參 桑寄生

產前 治妊娘心脾腫熱咽膈渴舌煩悶多驚

桔梗 甘草 旋覆花 各半兩 生地黄 二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑三片煎至八分去滓

食前溫服

柴胡散 治妊娘心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡 半兩 赤茯苓 麥門冬 各一兩 枇杷葉 去毛

人參 橘皮 甘草 各三錢

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑三片煎至八分去粗

溫服無時

大參散 治妊娘熱氣乘於心脾津液枯少煩躁

熱口舌乾渴



人參	麥門冬	赤茯苓	地骨皮
家葛根	黃芩	犀角屑 <small>各七錢半</small>	甘草 <small>五錢</small>
右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓溫服			
○子癰			
羚羊角散 <small>永類鈴方</small>	治妊娠中風頭項強直筋脉掣急言		
語塞澁痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癰			
羚羊角 <small>錢</small>	川獨活	酸棗仁 <small>炒</small>	五加皮 <small>各半</small>
薤白仁	防風	當歸	川芎
茯神	杏仁 <small>各四分</small>	木香	甘草 <small>各二分</small>
右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分不拘時服			
產前 <small>心法附餘卷三十一</small>	治妊娠中風卒倒心神悶亂口禁不能		
防風湯 <small>大全良方</small>			
言四肢強直			
防風	桑寄生	葛根 <small>各一兩</small>	菊花
防已	細辛	秦艽	當歸
官桂	茯神	甘草	羚羊角 <small>各半</small>
右咬咀每服八錢水一鍾半生薑三片煎至八分去滓			
加竹瀝 <small>半合</small> 溫服不拘時候			
葛根湯 <small>聖惠方</small>	療妊娠臨月因發風痙忽悶憤不識人吐		
逆眩倒少醒復發名曰子癰			
葛根	貝母	牡丹皮 <small>去心</small>	防風

防已	當歸	川芎	白茯苓
官桂	澤瀉	甘草 <small>各二兩</small>	石膏
獨活	人參 <small>各二兩</small>		
右咬咀每服八錢水二鍾煎至八分去滓溫服無時			
防風葛根湯	妊娠中風腰背強直時復反張		
防風	葛根	川芎	生地黄 <small>各一兩</small>
杏仁 <small>去皮尖</small>	麻黃 <small>去節</small>	桂心 <small>少許</small>	獨活
甘草	防已 <small>各一兩</small>		
右每服八錢水一鍾半煎八分不拘時溫服			
一方 妊娠中風角弓反張口噤語澁調之風痙亦名子			
產前 <small>心法附餘卷三十一</small>			
麻黃 <small>去節</small>	防風	獨活 <small>各一兩</small>	桂心 <small>少許</small>
羚羊角	升麻	甘草	酸棗仁
秦艽 <small>各半兩</small>	川芎	當歸	杏仁 <small>錢各七</small>
右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分加竹瀝一合			
溫服			
○子腫			
全生白朮散 <small>簡易方</small>	治妊娠面目虛浮肢體腫如水氣名		
曰子腫			
白朮 <small>一兩</small>	生薑皮	大腹皮	陳皮

白茯苓皮 各半兩

右為末每服二錢米飲調下不拘時服

五皮散 大全良方 治胎水尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 生姜皮

陳皮 等分

右以咀每服八錢水一鍾濃磨木香水一鍾同煎至八分去粗不拘時溫服 一方空心服

防已湯 脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已 半七錢 木香 二錢 赤茯苓 桑白皮

紫蘊莖葉 各一兩

產前 心法附餘卷之三十一

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分食前溫服

如大便不通加枳殼枳榔

○子氣

李氏天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸

腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美狀似水氣

至於脚指間有黃水出者名曰子氣

天仙藤 洗淨 香附子 炒 陳皮 甘草

烏藥 各等分

右為末每服三錢水一鍾半姜三片紫蘊莖三錢

片同煎空心食前服日三次腫消止藥



腎著湯 人生要方 治妊娠腰脚腫

茯苓 白朮 各四錢 杏仁 甘草

右以咀每服八錢水二鍾煎至一鍾去粗通口食前服

○子淋

安榮散 濟生方 治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋

麥門冬 去心 通草 滑石 各三錢 當歸 去酒

燈心 甘草 各半兩 人參 細辛 各一兩

右為細末煎麥門冬湯調下不拘時服

大腹皮散 濟生方 治妊娠大小便赤澀

枳殼 去白 大腹皮 甘草 各一錢 赤茯苓 去皮

產前 心法附餘卷之三十一

右為末每服一錢濃煎白湯調下不拘時

冬葵子散 濟生方 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈

欲倒

冬葵子 三錢 赤茯苓 去皮

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是

轉胞加髮灰少許極妙

○轉胞

八味丸 治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋 方見補損

全生茯苓散 簡易方 治妊娠小便不通

赤茯苓 葵子 各等分



右咬咀每服五錢水二鍾煎至一鍾空心溫服濟生方  
加髮灰少許同服極妙

○子懸

氣結飲 濟生方 治胎氣不和奏上心腹脹滿疼痛謂之子

懸

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮 去白

紫蘆葉

當歸 去芦酒 各半

甘草 各半

右咬咀每服四錢水一鍾生姜五片葱白七寸煎至七

分空心溫服

香木散

大全良方

治妊娠五箇月已後每常胸腹間氣刺

產前

心法附錄卷之二十一

三

三

滿痛或腸鳴以致嘔逆減食此由忿怒憂思過度飲食

失節所致蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂成此病

醫官王師復處此方三服而愈

義木 煨一兩

丁香 五錢

甘草 一錢

右為細末每服一錢空心鹽湯調服覺胸中如物推下

之狀

○廣按此方所言婦人忿怒憂思過度以致胸腹之間

氣刺滿痛此言良是蓋婦人上有舅姑丈夫事觸物

忤不能自決而憂思忿怒沉鬱于中丹溪云氣鬱便

成火火載胎上榮衛不通則心腹之間脹滿痛俱作

也宜矣

○兒在腹中哭

經驗方

用多年空屋下鼠穴中土一塊令孕婦嚙之即止

又方

經驗方

用川黃連濃煎令母嚙之

○鬼胎

斬鬼丹

鬼胎如抱一瓮

吳茱萸

川烏 炮

秦艽

紫胡

白礬 等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸蜜酒送下取出

產前

心法附錄卷之二十一

三

三

惡物愈

○風寒熱病

表虛六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項

強身熱惡風脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯

四兩

桂枝

地骨皮 各七錢

表實六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊

惡寒太陽經病宜服

四物湯

四兩

麻黃

細辛 各半兩

風濕六合湯

聖惠方

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼

脉浮而瀉頭痛太陽標病也宜服

<p>升麻六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發</p> <p>班如錦文宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 防風 蒼朮 <small>各七錢</small></p>	<p>柴胡六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽</p> <p>頭昏項強宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 升麻 連翹 <small>各七錢</small></p>	<p>大黃六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而</p> <p>脉沉數陽明太陽本病也急下之宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 大黃 五錢 芫仁 <small>十個去皮</small></p>	<p>人參六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜</p> <p>服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 人參 五味子 <small>各五錢</small></p>	<p>厚朴六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽</p> <p>明本虛宜服亦治咳嗽喘滿</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 厚朴 枳實 <small>各五錢</small></p>	<p>梔子六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 梔子 黃芩 <small>各五錢</small></p>	<p>石膏六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒身熱大渴蒸熱而煩脉</p> <p>長而大者宜服</p>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

<p>四物湯 <small>四兩</small> 石膏 知母 <small>各五錢</small></p>	<p>茯苓六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒小便不利太陽本病也</p> <p>宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 茯苓 澤瀉 <small>各五錢</small></p>	<p>琥珀六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血</p> <p>狀者宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 琥珀 茯苓 <small>各五錢</small></p>	<p>膠艾六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣</p> <p>損者宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 阿膠 艾葉 <small>各半兩</small></p>	<p>一方有甘草同上 一方加乾姜甘草黃耆</p>	<p>附子六合湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹</p> <p>中痛脉沉而遲少陰病也宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 附子 <small>炮去</small> 桂枝 <small>各半兩</small></p>	<p>四物大黃湯 <small>聖惠方</small> 若妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下</p> <p>宜服</p>	<p>四物湯 <small>四兩</small> 生地黃 大黃 <small>酒浸各五錢</small></p>	<p>芩蘩散 <small>產生方</small> 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心</p> <p>胸煩悶</p>	<p>紫蘩葉 川芎 白芍藥 白朮</p>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------

麥門冬 <small>去心</small> 陳皮 <small>去白</small> 乾葛 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙半兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白二寸煎服	白木散 <small>振華方</small> 治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐逆不下食	白木 橘紅 人參 前胡	川芎 麥門冬 赤茯苓 <small>各一兩</small> 甘草	半夏 <small>湯泡七次姜汁炒各半兩</small>	右咬咀每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎去粗溫服無時	升麻散 <small>振華方</small> 治妊娠傷寒頭痛身體熱	升麻 蒼朮 麥門冬 麻黃 <small>去節各一兩</small>	黃芩 大青 <small>各半兩</small> 石膏 <small>二兩</small>	右為粗末每服四錢生薑四片竹葉五七片水同煎	芍藥湯 <small>振華方</small> 治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下	芍藥 白木 <small>各一兩</small> 甘草 茯苓 <small>各五錢</small>	黃耆 <small>二兩</small>	右剉細每服一兩水煎服	麻黃散 <small>聖惠方</small> 治妊娠五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩疼	麻黃 桂心 柴胡 赤芍藥 <small>各一兩</small>
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------	------------	-----------------------------------------	---------------------------------

甘草 <small>半兩</small>	右咬咀每服八錢生薑三片水一盞半煎至八分去粗通口服	前胡湯 <small>大全良方</small> 治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼	石膏 <small>二錢</small> 前胡 <small>六分</small> 甜竹葉 <small>三分</small> 黃芩	大青 <small>各五分</small> 知母 梔子 <small>各四分</small>	右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去粗溫服不拘時外臺無甜竹葉	黃龍湯 <small>聖惠方</small> 治婦人妊娠寒熱頭痛黑嘿不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解宜服	柴胡 <small>去芦一兩</small> 黃芩 人參 甘草 <small>各三錢</small>	右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去粗溫服無時	枳實散 <small>聖惠方</small> 治妊娠傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止飲食不多腰疼體重	枳實 <small>炒一兩</small> 陳皮 <small>七錢</small> 麥門冬 <small>去心半兩</small>	右咬咀每服一兩水一盞半生薑半錢葱白七寸煎至八分溫服	麥門冬湯 <small>聖惠方</small> 治妊娠傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎動不安
----------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------

人參	石膏各一兩	前胡	黃芩各七錢半
家葛根	麥門冬各五錢		
右咬咀每服一兩水二盞生薑三片棗一枚竹茹一錢半煎至一盞去粗溫服不拘時			
秦艽散	傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語嘔逆		
秦艽	柴胡	石膏	前胡
赤茯苓	甘草節	葛根	犀角屑
升麻各等分			
右每服八錢水二盞姜三片竹茹三錢煎至八分溫服			
○廣按此方云傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語吐逆此即溫熱病之証候也古方溫熱病皆謂之傷寒多不分也用者審之			
黃耆解肌湯	聖惠方	治妊娠傷風自汗	
人參	黃芪	當歸	川芎
甘草各半	芍藥六錢		
右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去粗溫服不拘時			
加蒼朮生地黃亦可			
柴胡散	聖惠方	治妊娠熱病骨節煩痛頭痛壯熱若熱不	
治則損胎			
柴胡	葛根	知母	梔子

甘草各五錢	石膏三兩	大青	茯苓
升麻各七錢半			
右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去粗			
通口服不拘時候	一方有黃芩無茯苓		
梔子仁飲子	大全良方	治妊娠熱病斑出黑色小便如血	
氣急絕胎欲落			
梔子仁	升麻	石膏	地黃各二兩
黃芩	大青各一兩	豆豉加十	
救急方有杏仁無地黃石膏			
右咬咀每服半兩水一盞葱白七寸煎至五分去粗溫			
服無時	一方加青黛無大青	又方以陳艾如雞子	
大酒煮服救妊婦危困			
大黃飲子	聖惠方	治妊娠熱病六七日熱入腸中大小便	
秘澀煩熱			
大黃微炒	石膏各一兩	知母	前胡
赤茯苓各二錢	梔子仁	甘草	黃芩各五錢
右咬咀每服八錢水一盞生地黃二錢半煎至七分去			
粗食前溫服			
柴胡石膏湯	聖惠方	治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱煩燥悶	
亂四肢疼痛項背拘急口乾舌燥宜服			

柴胡四兩 甘草二兩 石膏八兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至八分去粗

傷寒熱病護胎法

一方 用白藥子不拘多少為末以雞彈清調攤於紙上

如碗大貼臍下胎存處乾以溫水潤之

一方 以龜心土水調塗臍下乾又塗之就調服一錢

一方 壯熱甚并底泥敷心下令胎不傷

○雜病

消風散 濟生方 治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴頭眩目暈

產前 心法附餘卷之二十一

腮項腫核胸膈涎壅

石膏 煨 甘菊花 枝 防風 去 荊芥穗

川羌活 去 川芎 羚羊角 鎊 大豆黃卷 鎊

當歸 去 白芷 各一 甘草 兩 半

右咬咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去粗

食後溫服

天門冬飲子 濟生方 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失

明

天門冬 去 知母 羌蔚子 各一 防風 半 兩

五味子 茯苓 去 皮 川羌活 去 人參 各七 錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至八分去粗食後

溫服

百合散 濟生方 治妊娠風壅咳嗽痰喘滿悶

百合 蒸 紫苑茸 洗 貝母 去 心 白芍藥

前胡 去 赤茯苓 去 桔梗 各一 兩 甘草 錢五

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分去粗不拘

時溫服

百合散 聖惠方 治妊娠咳嗽心胸不利煩滿不食

川百合 紫苑 麥門冬 桔梗

桑白皮 各一 甘草 兩 半 竹茹 一 兩

產前 心法附餘卷之二十一

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去粗入蜜半匙

再煎一二沸食後溫服

紫苑湯 永類鈴方 治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草 杏仁 桑白皮 各二 紫苑 一 兩

桔梗 半 兩 天門冬 去 心 各

右咬咀每服八錢水一盞半竹茹一團煎至八分去粗

入蜜半匙再煎一二沸溫服

馬兜鈴散 大全良方 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草

貝母 各 錢五 陳皮 大腹皮 紫苑

桑白皮 <small>兩各一</small>	五味子 <small>七錢</small>	右咬咀每服八錢生薑三片水一盞半煎至八分去粗食後溫服	平安散 <small>濟生方</small> 治妊娠上氣喘急嘔吐不食腹脇脹痛	厚朴 <small>半錢</small> 生薑 <small>錢各二</small> 乾姜 <small>錢</small> 陳皮 <small>去白各錢</small>	川芎 <small>半錢</small> 木香 <small>二錢</small> 乾地黃 <small>清一錢半</small> 甘草 <small>錢四</small>	右咬咀每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時驅邪散 <small>濟生方</small> 治妊娠停食感冷發為瘧疾	高良姜 <small>炒</small> 白朮 <small>草果仁</small> 橘紅	藿香葉 <small>縮砂仁</small> 白茯苓 <small>去皮各兩</small> 甘草 <small>錢半</small>	右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服不拘時柴胡散治妊娠瘧疾	黃芩 <small>半錢</small> 甘草 <small>一錢</small> 柴胡 <small>生大黃各錢二</small>	右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度如胎上逼心可服枳殼散忌油麪辛酸之物	一方治瘧疾發熱口乾渴飲無度	生地黃 <small>半兩</small> 黃芩 <small>麥門冬去心</small> 人參	知母 <small>乾葛各一</small> 石膏 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	右每服一兩水一鍾半烏梅半箇煎至一鍾溫服	一方治瘧疾
------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------	-------

常山	石膏 <small>兩各一</small>	甘草 <small>錢</small>	黃芩 <small>各半</small>	烏梅 <small>七箇</small>	右作二服每服酒水各一碗浸一宿平日煎服	蒙姜黃連 <small>凡清生方</small> 治妊娠下痢赤白絞道腫痛冷熱皆可服之	乾姜 <small>泡</small> 黃連 <small>去須</small> 縮砂仁 <small>炒</small> 川芎	阿膠 <small>蛤粉</small> 白朮 <small>兩各一</small> 乳香 <small>三錢</small> 枳殼 <small>去白半兩</small>	右為末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵丸如梧桐子大每服四十九丸白痢乾姜湯赤痢甘草湯下赤白痢乾姜甘草湯下	當歸芍藥湯 <small>濟生方</small> 治妊娠腹中疼痛下痢	白芍藥 <small>白茯苓去皮</small> 當歸 <small>酒浸</small> 澤瀉	川芎 <small>兩各一</small> 白朮 <small>半兩</small>	右為末每服三錢空心溫酒米飲任下	白木湯治孕婦下痢膿下血	白朮 <small>黃芩</small> 當歸 <small>各四錢</small>	用水二盞煎至一盞去粗食前溫服	大龍散 <small>拔毒方</small> 治妊娠氣痛	艾葉末 <small>鹽炒一兩半</small> 茴香	川練子 <small>各一</small>	右為末每服二錢水一盞煎至七分食後服
----	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------	-------------	--------------------------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------



白木湯千金方治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白木三兩去黑心赤芍藥二兩黃芩一兩去黑心

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去粗不拘時溫服忌食李雀肉

當歸散大良方治妊娠中惡心腹痛

當歸各三兩丁香二兩川芎各三兩青皮二兩

吳茱萸半兩去根湯泡三次

右為末溫酒調一錢服無時

芎歸湯按方治妊娠先忽患中心腹痛如刀刺

川芎人參茯苓官桂

吳茱萸當歸各三兩厚朴厚朴白芍藥各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗溫服不拘時

候一方有桔梗無官桂

○廣按丹溪云凡心腹諸痛不可用參朮補氣其痛愈甚則此方與前白木湯中皆犯藥禁未知果否否乎

倉公下氣湯大良方治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下

飲食四肢無力

羌活赤芍藥甘草枳櫛

青皮大腹皮陳皮赤茯苓

半夏桑白皮官桂各五錢紫蘘二兩

右咬咀每服八錢生薑五片棗一枚水一盞半煎至八分去粗食前溫服

勝金散濟生方治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸酒浸炒陳皮去白生薑乾姜泡

川芎厚朴去皮縮砂仁炒甘草各等分

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

通氣散大良方治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒令香熟

右為末嚼胡荽肉半個空心溫酒調下二錢

消熱飲子聖惠方治妊娠時氣六七日熱甚大小便不利

最宜服之

川芒硝研一兩葵子三兩

右為末每服五錢溫水調下無時一方水二大盞煎至一盞三分去粗不拘時溫服

一方治孕婦大便秘澀大良方

枳殼麩炒防風去蘆甘草炙一兩

右為末每服二錢白湯調下空心食前日三服

桑螵蛸散濟生方治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十箇炙為細末每服一錢空心米飲調下

白微散濟生方治妊娠遺尿不禁

白薇

白芍藥各等

右為末每服三錢食前溫酒調服

○瘦胎

瘦胎枳殼散

簡易方

治姙孕七八月常宜服滑胎易產

粉甘草

一兩

商州枳殼

五兩去白

右為末每服一錢空心白湯點服 一方加香附子九

佳

○廣按前人云枳殼散性苦寒若單服之恐有胎寒胎

痛之疾以地黃當歸湯蜜丸佐之可也 說見前

地黃當歸湯

補血養胎與枳殼散間服 枳殼散破氣

有餘而地黃當歸湯補血不足也 方見前

救生散

濟生方

治胎氣本性不宜瘦胎合服此藥安胎益

氣易產

人參

各等

訶子

煨去核

白朮

神麴

陳皮

各等

右為末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

○催生

催生如聖散

黃葵花

不以多少焙乾

右為末熱湯調下二錢神効一或有漏血胎臍乾澀難

產痛劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下

如無花只以蜀葵子研爛小半合以酒調充妙 亦治

打撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下 經驗方用

子四十九粒或三十粒歌曰黃金丙子三十粒細研酒

調能備急命若懸係在須臾即令眷屬不悲泣

催生如聖散

濟生方

用黃蜀葵子為細末每服二錢熱酒調下熱湯亦可

催生神効佛手散

大全良方

治婦人姙娠五七月因事驚

磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此

藥搽之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下

當歸

六錢

川芎

四錢

用水一盞半煎令泣欲乾頭酒一大盞止煎一沸去粗

溫服口噤灌之如人行五里再服不過二三服便生

催生如意散 聖惠方 臨產腰疼方可服

人參

一錢

乳香

一錢

辰砂

五分

右將一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末再用

姜汁調開冷服如橫生倒產即時順子母平安

催生神効七寶散

大全良方

臨產腰痛方可服

玄胡索

沒藥

各等

白礬

各等

香白芷

姜黃

當歸

各等

桂心

各等

右為細末每服三錢燒梨頭令紅酒調下臨陣疼時服一二服立產

催生如神散 聖惠方 治逆產橫生瘦胎無產前產後虛損

月脉不調崩漏等証一名催生黑散子一名烏金散一名二神散

百草霜 白芷 不見火

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗方用童子便酒各半盞煎沸即調停熱服甚者不過再服

催生丹 簡易方 治產婦生理不順臨產艱難

十二月免腦髓 去皮 乳香 一分 射香 一分

母丁香末一錢

右研勻用兔髓和丸如雞頭大陰乾油紙封貯每一丸

研破後溫水服即時產下隨男左女右手握藥出是驗

催生鉛丹 濟生方 治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上鎔投水銀一錢急攪結成

砂子傾出以熟絹水角紐作丸子如菜豆大臨產時射

香水吞下二丸立下

催生散 懷孕不曾行動舒伸忍痛曲身反卧故子在腹中不能動轉致有橫逆難產甚則子死腹中

蛇退一條 蟬退二七 人退 即男子頭髮一

右俱燒為末酒調下分作三服

一方

用蛇退一條全者燒灰入射香一字酒調二錢而東服如橫生逆產以餘相塗所出手足即順也

一方

用草鞋鼻繩路上者洗淨燒灰末童便和酒調服一名

千里馬

消胎散 聖惠方 催生神効

益元散 是暑門

男子亂髮 香油一 蟬退 全者五

穿山甲 灰存性

右為細末用蠶水一碗和藥煎二沸入油頭髮拌勻冷

定服之立下

○產難

無憂散 濟生方 治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難產

當歸 川芎 白芍藥 各一 枳殼 炒半兩

乳香 三錢 木香 甘草 各一 血餘灰 三錢

右為末每服二錢水一盞煎至八分不拘時

金液丸 濟生方 治胎氣太肥橫逆難產

飛生毛	下火燒如脫	血餘灰	無病女
公母羊糞	半錢	灶心土	一錢
黑鉛	二錢	鐵砂	別研
右為末用粽子角為丸	如菜豆大	過難產以倒流水吞	
五丸			
來麤散	濟生方	治臨產用力太過氣脉衰微精神困倦頭	
眩目暈口噤面青髮直不省人事			
木香	神麤	陳皮	麥蘖
黃芪	去芦	生美	切炒
苧根	三錢	甘草	三錢
糯米	一合	白芍	各一
產前	心法附錄卷之五	聖	
右用水三盞煎至一盞半	幹開口灌之	連進為妙	
二退散	治產難		
蛇退	一條	蚕退紙	一方
右各燒存性為細末酒調服			
雲母散	橫生逆產		
用雲母石研成粉每服一錢	酒調下不拘時服		
救生散	橫生逆產		
用桂心為末童便酒調一錢服之神効			
一方	治產難		
用臘月兔頭一枚燒灰為末葱白湯調二錢立生	又		

或吞雞子黃三箇并少苦酒服之立生	又或用赤小
豆二升水九升煮取一升汁入炙了明黃膠一兩同煎	
少時一服五合	又用槐子十四枚即下
又方當歸	為末酒調方寸七服之
一方	治難產三日不下
用伏龍肝細研每服一錢	酒調服之
一方	治胞衣不下
取阜屋黑塵研為細末酒調方寸七服之	
黑龍丹	濟生方
治妊娠臨產難生或胎衣不下產後血暈	
不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中刺痛血滯	
產前	心法附錄卷之五
腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛	
或類癰疾胎前產後一切聲急很俱重先以此藥灌之	
四九無不救活者	
五靈脂	當歸
良姜	各二兩
生地黃	川芎
右剉入砂鍋內紙筋鹽泥固濟炭火煨通紅候火減冷	
取出研細入後藥	
百草霜	三錢
乳香	生硫黃
琥珀	
花藥石	錢各二
右五味計一兩一錢細末同前藥和勻米醋煮麤糊	

丸如彈子大每要服用炭大煨藥通紅拔入生薑自熬  
汁浸碎之以無灰酒併合童便頓服神效不可盡述  
內灸散和劑方治婦人產前產後一切血疾血崩虛癯腹  
脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下  
五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐清水頻產血  
衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈  
血癥時發疼痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不  
乾體虛多汗手足逆冷並宜服之

○死胎

香桂散 大全良方下死胎

麝香五分 官桂二錢

右共為末和勻酒一盞調服須臾如手推下

一方 治胎死腹中或半產不下 產寶方

官桂五錢 牡丹皮 川芎

葵子各一錢

右為細末每服三錢煎葱白湯下

一字神散 十全良方 治子死腹中胎不下胞破不生此方

累有效驗

鬼臼不拘多少黃

有研為末以手指燃之如粉極細為度此藥不用羅每  
服三無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

一方 死胎不出產婦面青指甲青舌青口臭

用朴硝為末每服二錢順流水調下甚者溫童子小便  
調服胎下母活亦治胎衣不下

霹靂奪命丹 濟生方 治臨產驚然氣痰目翻口噤面黑唇

青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活修合時勿  
令婦妄雞大見之

蛇退一條八瓦

金銀箔各七片 丁香五分

髮灰一錢 馬鳴即垂退 黑鉛二錢

水銀七分半依 千里馬取雞上左腳舊草鞋一隻

右為末以積猪心血丸如梧桐子大倒添冰灌下二丸

如灌不下研開亦得

如聖膏 大全良方 治難產兼治胞衣不下亦治死胎

用草麻子七粒去殼細研成膏塗腳心胞衣即下速洗  
去不洗腸出却用此膏塗頂上腸即縮入如聖之妙

一方用四十九粒

○唐按產前諸証皆因胎氣所致夫胎動胎漏皆下血

胎漏宜清熱也惡阻者惡心而阻隔飲食也子煩者

煩燥而悶亂心神也子癰者痰涎潮搐目吊口噤也

子腫者面目虛浮肢體腫滿也子氣者兩足浮腫也

子淋者小便澀少也轉胞者小便不通也子懸者心胃脹痛也蓋脾主運化水穀婦人有胎則脾運化水穀不利而生濕濕則生痰痰生熱熱生風也子腫子氣者濕也惡阻者痰也子煩子淋者熱也子癰者風也子懸者氣也轉胞者虛也濕則滲之痰則消之熱則清之風則平之氣則散之虛則補之何為而不愈哉外有風寒熱病雜病之條者用藥要去邪保胎之並行有催生難產死胎之目者治法有緩急輕重之少異業醫者其可忽乎

產前 心法附餘卷之二十一 聖藥 產後

# 產後 九十六

○產後無得令虛當大補氣血為先雖有雜証以末治之一切病多是血虛皆不可發表 產後不可用芍藥以其酸寒伐生發之氣故也 產後血暈因虛火載血上行漸漸暈來方用鹿角燒灰出火毒研極細末好酒同童便灌下一呷即醒行血極快 又方以韭菜細切盛於有嘴瓶中以熱醋沃之急封其口速以嘴塞產婦鼻孔中可愈 產後中風切不可作風治必大補氣血為主然後治痰當以左右手之脉分其血氣多少而治

產後中風口眼喎斜切不可服小續命湯 產後水腫必用大補氣血為主少佐蒼朮茯苓使水自利 產後大發熱必用乾姜輕者用茯苓淡滲其熱一應寒苦并發表之藥皆不可用 產後發熱惡寒皆屬血虛 左手脉不足補血藥多於補氣藥 惡寒發熱腹痛者當去惡血腹滿者不是 產後發熱乳汁不通及膨者無子當消用麥藥二兩炒研細末清湯調下作四服 有子者用木通通草猪蹄煎服 凡產後有病先固血氣前條云產後大熱必用乾姜或曰用姜者何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以補陰藥大劑服之且乾姜能入肺和肺氣入肝分引血藥生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙非天下之至神孰能與於此乎 產後脉洪數產前脉細小澀弱多死懷孕者脉主洪數已產而洪數不改者多主死

入方 產後補虛 人參 白朮一錢 茯苓 陳皮 川芎各半錢 甘草分三 有熱加黃芩一錢 產後消血塊方 滑石三錢 沒藥二錢 血竭二錢如無以牡丹皮代之

右為末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為末神效丸  
白木陳皮湯下 尾龍子能消血塊

又方

血竭一錢 五靈脂一錢

右為末消產後血塊極妙

又方 治產後泄瀉

黃芩下

白木上

川芎中

茯苓上

乾姜下

滑石上

陳皮中

炒芍藥中

甘草下

右以咀水煎食遠溫服

又方 治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂中

香附上

一方加蛤粉下

右為末醋糊丸甚者入菟仁不去尖溫水服三十九

獨行丸 治婦人產後血衝心痛及治男子血氣心腹痛

有孕者忌服

五靈脂不拘多少去

右為末水丸彈子大每一丸或酒或姜湯化下

參朮膏 治產後胞損成淋瀝証

人參三錢半

白朮二錢

菟仁去皮尖

陳皮各二錢

黃芪一錢半

茯苓一錢

甘草半錢

右咬咀先用水煮羊胎熟湯二鍾入藥煎一鍾溫服

附諸賢論

王節齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故  
多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾姜之苦溫從  
治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲  
食傷滯而發熱者誤作血虛則不効矣但遇產後發熱  
者須審問用何飲食有無傷積胸膈飽悶噯氣惡食泄  
瀉等証只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補  
血正法

附諸方

產後

心法制餘卷上

卷上

三頁六分

花藥石散

治產後胎衣不下極有神効

方見前

奪命丹

治產後血入水中脹滿衝心久而不下或

去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証宜急

取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子

治產後血入水中

乾漆炒令煙盡

各一兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸如

梧桐子大每服五十丸溫酒送下

一方 產後惡血衝心胞衣不下腹中血塊

用綿紋大黃一兩為末以好醋半升熬成膏丸如梧桐

子大以醋大半鍾化五丸服之須臾即下

一方 治產後生腸不收

用枳殼二兩去穢煎湯溫浸良久即入

一方 治婦人子宮不收

荊芥穗 中 蒼香葉 中 臭椿皮 上

右等分改咀煎湯薰洗子宮即入

一方 治婦人子宮太痛不可忍者

五倍子 白礬 各等分

右為末溫湯泡洗乾糝亦可

一方 治下胎或產後血上冲心已死

用鐵釜燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調灌之立

產後 心法附錄卷之三十一 至

活

芎歸湯 和劑方 治產後去血過多暈煩不省一切去血并

宜服之

芎藭 當歸 去芦酒洗 各等分

石咬咀每服四錢水一盞煎至七分去粗不拘時熱服

腹中刺痛加白芍藥 口乾煩渴加烏梅麥門冬 發

寒熱加乾姜白芍藥 水停心下微有嘔逆加茯苓生

姜 虛煩不得眠加人參竹葉 大便秘澀加生地黃

橘紅杏仁 小便不利加車前子 股脇膨脹加厚朴

血崩不止加香附子 咳嗽痰多加紫苑半夏生姜

腰膝痛加牛膝 心下痰痛加玄胡索 惡血不下

還魂丹 治生一十六証 一名益母丸

野天麻 一名益母草 方按四五月節開

赤芍藥 六錢 當歸 七錢 木香 五錢

右同為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸隨飲子下

○子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷爪甲青黑童

便酒和勻煎沸化下

○產後惡血不盡臍腹刺痛童便和酒化下

○產時面垢頰赤胎衣不下敗血自下如滯或橫生不

產後 心法附錄卷之三十一 至

順心悶欲死童便酒薄荷自然汁和勻化下鹽酒亦

可

○產後三四日起卧不得眼暗生花口乾煩燥心亂見

鬼狂言不省人事童便酒薄荷汁下

○產後煩渴呵欠不思飲食手足麻疼痛溫米飲下

○產後浮腫氣喘小便澀咳嗽惡心口吐酸水脇痛無

力酒下

○產後寒熱如瘧臍腹作痛米湯下桂枝湯亦可

○產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便和酒

下



○產後大便秘心煩口渴童便酒化下薄荷自然汁亦可

○產後痢疾月未滿食冷物與血相擊或有積聚湯化下

○產後身體百節痛溫米飲下

○產後崩中漏下蓋是傷酸物狀如雞肝脊背悶倦糯米秦艽湯下桂枝湯下亦可

○產後食熱麪糲結成塊四肢無力睡後汗出不止且水不調久成骨蒸勞童便和酒下

○產後嘔逆虛脹酒下

產後 心法附餘卷之二十一 聖  
○產後鼻衄口乾舌黑童便酒下

○產後赤白帶下秦艽同糯米煎湯下

○廣按返魂丹功効不可具述其於產前清熱養血產後推陳致新無不可也有事之家理宜預備

黑神散 和劑方 治婦人產後惡露不盡胞衣不下血氣攻

心眩暈等証

黑豆 炒半 熟地黃 當歸 酒洗 肉桂 去皮

乾姜 炮 甘草 炙 芍藥 蒲黃 各四錢

濟生方去蒲黃加附子

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便尤佳

○廣按敗血見熱則行見寒則凝理也此方姜桂俱用已是熱矣而濟生又加以附子不無熱之太過乎世俗好溫惡寒之弊於此見之也

黑龍丹 治姪娠臨產臨生或胎衣不下產後血暈不省

人事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜服之 方見產前

四味湯 聖惠方 療產後一切諸疾緩方分娩宜服

當歸 玄胡索 血竭 沒藥 各五分

右共二錢為細末用童子小便半盞煎熱調通口服

如心膈煩加當歸五分 如氣悶喘急加玄胡索五分

產後 心法附餘卷之二十一 聖  
如惡露不快加血竭五分 如心腹撮痛加沒藥五分

分 神仙索金散 醫方大成 治婦人產後血暈血虛積血不散

寒熱往來胸膈不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血風瘡此藥逐惡血生新血止肚痛

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃

金藤 川牛膝 麻黃 玄胡索 炒

官桂 神麴 炒 荊芥 粉甘草

雄黑豆 各一兩

右為末每服二錢溫酒調下或當歸湯童子小便任下

不拘時候

一方 治產後血暈心悶氣絕

用紅花一兩坏子者為末作二服酒二盞煎取一盞併服如口噤幹開口灌之

血竭破棺散 秘方 治婦人產後血閉血迷血暈血勞嗽血

男子傷力勞嗽吐血

乳香

血竭

箭頭砂各一錢

右為末巴豆仁研泥共為膏磁器盛之如用丸如雞頭

大婦人狗膽調冷酒下男子止用冷酒下

清魂散 清生方 治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或

產後

心法附餘卷之二十一

辛五

三月廿七

漆器燒烟鼻中薰之頻置醋炭房內次進此藥

澤蘭葉

一兩 人參

去芦 荆芥穗

四兩 甘草

川芎

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

奪命散

大生良方

治產後血暈血入心經語言顛倒健忘

失志及產後百病

沒藥

血竭

右等分為末纔產下使用童便與細酒各半盞煎一二

沸調下二錢良久再服其惡血自此下行更不衝上免

生百病專治婦人方只用白湯調下

七珍散 大生良方 論曰產後不語者何答曰人心有七孔

三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此即服此藥

川芎

人參

石菖蒲

各一錢

防風

辰砂

另研各半兩

生乾地黄

一兩

一方加甘草半兩名八珍散

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候

胡氏孤鳳散

大生良方

治產後閉口不語

用白礬研細熟水調下一錢

產後

心法附餘卷之二十一

辛五

三月廿七

○廣按產後不語有熱血迷塞心竅者有熱痰迷塞心

竅者前方七珍散治熱血此方孤鳳散治熱痰也肥

人多熱痰瘦人多熱血

卷荷散

後生方

治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡

露不快並皆治之

初出卷荷

紅花

當歸

蒲黃

細炒

牡丹皮

各一兩

右為細末每服三錢空心鹽酒送下二臘月用童子小

便調下

大嚴蜜湯

清生方

治產後血氣衝心時發疼痛甚者宜進

玄胡索湯 方見前

熟地黃 酒蒸 當歸 酒洗 川獨活 去蘆 白芍藥

細辛 洗 吳茱萸 炒 桂心 不見火 小草

乾姜 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一鍾不拘時煎服

當歸血竭丸 聖惠方 治婦人產後惡物不下結聚成塊心

胸痞悶及臍下堅痛

當歸 炒 血竭 蓬朮 芍藥 各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十丸溫酒送下

或粥清下空心食前服 一方加五靈脂四兩

產後 心法附餘卷之十一 聖惠方 治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

荷葉散 聖惠方 治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉 二兩 薏仁 半兩去皮 劉寄奴

蒲黃 各一兩

右咬咀每服四錢半童子小便一大盞生薑三片生地

黃一分煎至六分去粗熱服不拘時

失笑散 治產後心腹絞痛欲死者 方見經病類

紫金丸 大 全良方 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作

寒熱頭痛亦治久有瘀血月水不調羸瘦不思飲食亦

療心痛與失笑散同

五靈脂 脂 小 治 石 砂 真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末  
搜和丸如櫻桃大每服一九水與童子小便各半盞煎  
七分令藥化溫服少頃再一服惡露即下久有瘀血成  
塊月信不利者並用酒磨下

一方 治產後血塊腹痛

荊芥 炒 川當歸 炒 乾地黃 洗 芍藥 各半兩

蒲黃 二錢半 紙炒赤色

右同為細末每服三錢空心溫酒調服

地黃散 聖惠方 治產後惡物不盡腹中疝痛

生乾地黃 當歸 炒各二兩 生薑 半兩細切如蠅頭大

產後 心法附餘卷之十一 聖惠方 治產後惡物不盡腹中疝痛

右為細末姜酒調下二錢服不拘時

四神散 和劑方 治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切

痛

當歸 乾姜 泡 川芎 赤芍藥 各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下

當歸養血丸 和劑方 治產後惡血不盡發熱身痛經閉者

並皆治之

肉桂 一兩 當歸 去蘆 牡丹皮 玄胡索

赤芍藥 各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸空心用溫酒

<p>仙藤散 聖惠方 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛</p> <p>天仙藤 五兩</p> <p>右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小便和酒調下常</p> <p>患氣血用溫酒調下</p>	<p>玉燭散 治產後惡露不盡臍腹疼痛時寒熱</p> <p>當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃</p> <p>大黃 甘草 朴硝 各一錢半</p> <p>右作一服水二盞煎至一盞去粗食前溫服</p>	<p>○廣按諸方治敗血作痛皆是溫劑熱劑流通之理雖</p> <p>產後 心法附餘卷之三</p> <p>此一方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便燥結者</p> <p>設也非大便燥結者慎不可用</p>	<p>一方 治產後敗血不止</p> <p>生乾地黃 一兩</p> <p>用石器內搗為細末每服二錢食前熱酒調服連進三</p>	<p>瑞蓮散 聖惠方 治產後惡血崩漏狀如泉水</p> <p>瑞蓮 一百兩 煨 棕櫚 煨 當歸 各一兩</p> <p>官桂 半兩 枳殼 鯉魚鱗 炒 川芎 各七錢半</p> <p>右為細末每服三錢煨生薑酒調如未止更進一服或</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>時血崩此藥可治進此三服即止</p> <p>紅花散 產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣</p> <p>乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花</p> <p>蒲黃 各一錢</p>	<p>右為細末每服一錢酒調溫服 若胞衣不下以榆白</p> <p>皮煎湯調服半兩立効</p>	<p>琥珀散 聖惠方 治產後經脉不調四肢煩疼飲食減少日</p> <p>漸羸瘦</p> <p>琥珀 牛膝 生地黃 當歸 各一錢</p>	<p>產後 心法附餘卷之三</p> <p>右吹咀每服八錢水二盞生薑三片煎至八分去粗無</p> <p>時溫服 一方加桂心半兩</p>	<p>調經散 治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮</p> <p>腫不可作水氣治之但調其經而腫自消又有去血過</p> <p>多心虛易驚加生龍腦一握煎服</p>	<p>沒藥 研 肉桂 各一錢 赤芍藥 細辛 各半錢</p> <p>琥珀 別研 射香 別研 當歸 各一兩</p>	<p>同芍藥甘草 錢二</p> <p>右為末每服二錢生薑汁溫酒任意調下</p> <p>逐痛散 治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

痛

當歸

當歸

白木

黃芪

獨活

生薑

川牛膝

各半兩

甘草

薤白

半錢

右吹咀每服四錢水二盞煎服加桑寄生半兩尤佳

愈風散 聖惠方 療產後中風不省人事口噤牙緊手足瘳

瘳如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或築心眼

倒吐瀉欲死

荆芥穗

當歸身尾

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効

產後

心法附餘卷之三

空

如神口噤者幹開灌之或吹鼻中皆効 一方用蜜丸

或麩糊丸如梧桐子大每服五十丸空心米湯下

血風湯 產後諸風掣急或痿弱無力

川芎

芍藥

當歸

熟地黃

秦艽

羌活

防風

白芷

白木

茯苓

右為細末一半煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸

溫酒下一半末溫酒調下

交加散

治產後中風脇不得轉動

生地黃

生薑

右交互以汁浸渣一夕次日漬取盡汁各炒黃焙為末

酒調服不拘時

○已上諸方行血去邪之劑

四順理中丸 和劑方 治新產血氣俱傷脾胃不調百日內

宜常服

甘草

人參

乾姜

白木

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

千金散 治產後虛勞不能食

白木

茯苓

黃芪

人參

川芎

芍藥

熟地黃

當歸

產後

心法附餘卷之三

空

肉桂

甘草

右吹咀每服一兩水二盞生薑五片棗三枚同煎至一

盞空心溫服

人參當歸散 和劑方

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

生內熱其証心胸煩滿吸吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚

與大病後虛煩相類急服之

乾地黃

人參

當歸

肉桂

麥門冬

白芍藥

右吹咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片

煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加

生地黃

當歸黃耆湯 和劑方 治產後失血過多腰脚痠痛壯熱自汗

當歸 去芦

黃耆

白芍藥 各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎十分不拘時溫服

增損四物湯 濟生方 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸 去芦

白芍藥

川芎

乾姜

人參 各兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎服不拘時

當歸羊肉湯 濟生方 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰勞

當歸 去芦

人參 各七錢

黃芪 去芦

生薑 半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四

盞去粗作六服早晚頻進

猪腰子粥 濟生方 治產後羸勞發熱

用猪腰子一箇去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用

粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熟

粥蓋之如作盒生粥狀空心服之

熟地黃湯 濟生方 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食

無味

熟地黃 一兩酒浸洗

人參 去芦

麥門冬 去心

甘草 炙半兩 枳椇根 四兩

右咬咀每服四錢水一盞半糯米一撮姜三片棗二枚

煎八分不拘時服

人參湯 永類方 治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身

人參 去芦

右等分為末猪腰子一箇去膜切作片子以水三升

米半合葱白二莖煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至

八分不拘時服

大調經散 聖惠方 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯

榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣未

平之所為也

大豆 炒去皮

茯神 去皮

琥珀 一錢

右為末每服三錢濃煎烏豆紫藕湯調下

白茯苓散 聖惠方 治產後羸勞蓋因生產日淺久坐多語

運動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀

白茯苓 一兩

當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參

熟地黃 各半兩

右咬咀先用水二盞入猪腎一雙去脂膜細研生薑三

片棗十二枚同煎至一盞去腎姜棗入沒藥五分煮取  
七分去粗食前分二服溫服

佛手散 大全良方 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽  
有痰

當歸

川芎

黃芩 各一兩 柴胡

前胡 錢各二

右咬咀每服五錢水一大盞煮柳枝各三寸棗子烏梅

各一枚生薑三片煎至六分去粗溫服如有痰去烏梅

黃龍湯 大全良方 治婦人寒熱頭痛黑嘿不欲食脇下痛

嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘧并經水適

產後

心法附錄卷之二十一

五

三

來適斷病後勞復餘熱不解

柴胡 錢各二

黃芩

人參

甘草 各一錢

右作一服用水二盞煎至一盞去粗溫服不拘時

增損柴胡湯 聖惠方 治產後經水適斷感于異証手足搐

棒咬牙昏胃係屬上焦

柴胡 八錢

黃芩 四錢半

人參 三錢

甘草

石膏 各四錢

知母 二錢

黃芪 五錢

半夏 三錢

右咬咀每服八錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至八

分去粗溫服無時

增損柴胡湯 濟生方 治產後血虛發寒熱飲食少進腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥

右等分咬咀每服八錢水一盞半生薑五片棗二枚煎

至八分去粗不拘時通口服

三之一湯 濟生方

治產後虛勞雖日久而脉浮盛疾

柴胡 八錢

黃芩

人參

半夏 洗

甘草 炙

川芎

芍藥

熟地黃

當歸 各三

右咬咀每服八錢水二盞生薑三片棗一枚煎至八分

去粗溫服

產後

心法附錄卷之二十一

五

三

三聖散 濟生方

治產後日久虛勞針灸服藥俱不効者

川芎

當歸

熟地黃

白芍藥

白朮

白茯苓

黃芪 各一兩

柴胡

人參 各一兩

黃芩

半夏

甘草 各六錢

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至八

分去粗通口服前服一方無姜棗

○廣按已上五方小柴胡湯加減法也學者對証而用

則中肯綮矣

○已上諸方補虛退熱之劑

皆慈理中丸 產後元氣虛弱膈腹疼痛泄瀉不止又治

男子脾胃虛弱久泄不止

人參一兩 白朮二兩

乾姜

甘草五錢

肉豆蔻七錢

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十九空心米

湯下酒者麪糊為丸亦可

調中湯濟生方 治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛洞

泄不止

良姜炒

當歸去尾

肉桂不見

白芍藥

附子炮去

川芎各一兩

甘草炙

人參各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎服

產後

心法附餘卷之二十一

五

三十九

白朮散聖惠方

治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮

橘皮

麥門冬

人參

乾姜炮各

甘草炙半兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑五片煎至八分去粗

服無時

枳實芍藥湯聖惠方

治產後腹痛煩滿不得卧

枳實燒存性

芍藥

右咬咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去粗溫服

無時 一方為末服方寸七日三服

抵聖湯濟生方

治產後血氣傷于脾胃腹脇痛悶嘔逆惡

心

赤芍藥

半夏湯洗

澤蘭葉

陳皮去白

人參各二兩 甘草炙一兩

右咬咀每服四錢生薑七片煎服不拘時

晚曉濟生方

治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心

下痞痛

高良姜炮

姜黃洗

厚朴去白

陳皮去白

蓬朮泡

人參

京三稜泡各一兩

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麪糊丸

如梧桐子大每服五十丸就用蘿蔔湯送下

產後

心法附餘卷之二十一

五

○廣按已上六方皆為產後脾胃虛弱飲食過傷遂成

諸疾而作也

旋覆湯和劑方

治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞

聲重

麻黃去節

柴胡

杏仁去皮尖

五味子去梗

旋覆花

甘草炙

茯苓

赤芍藥

荆芥去梗

半夏各等分

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片棗一枚同煎七分溫

服

芎烏散

治產後頭痛



天台烏藥 川芎霜

右為末各等分每服三錢燒秤鍾澤酒服

二母散 聖惠方 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽如傷風

痰嗽用尋常傷風藥不効宜服

知母

貝母

白茯苓

人參 各五錢

薤仁

去皮

杏仁

去皮尖

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去粗食後溫

參蘘飲 聖惠方

治婦人產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參

為末

蘘木

二兩槌碎

右用水二碗煎蘘木一碗去粗調人參末隨時加減服

產後

心法附餘卷之二十一

完

丁香散 聖惠方

治產後心煩咳嗽不止脾胃虛寒衛氣厥

逆

白豆蔻

丁香

各五錢

伏龍肝 一兩

右為細末煎薤仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再

服

石蓮散 聖惠方

治氣欬噫又治吐逆心怔目暈不思飲食

石蓮子

半一兩

白茯苓

一兩

丁香 半兩

右為細末每三錢米飲調下不拘時服

漢防己散 大全良方

治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防己

猪苓

枳殼

桑白皮 各一兩

商陸

甘草

各七錢半

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去渣

溫服無時一方空心服

調導散 聖惠方

治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼 各四錢

甘草

各二錢

右咬咀每服一兩用姜三片棗子一枚水二盞煎至一

盞去粗溫服不拘時忌動風物

麻仁丸 濟生方

治產後去血過多津液枯竭不能轉送大

便閉澀

產後

心法附餘卷之二十一

三

麻子仁

另研

枳殼

炒去白

人參

中

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒米飲任

下

橘杏丸

治產後體弱大便虛秘

方見燥結類

一方 產後小便數及遺尿

龍骨

一兩

桑螵蛸

半兩

右為細末米飲調下二錢空心服

漏蘆散 濟生方

治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

漏蘆

二兩

蛇蛻

炙十條

瓜蒌

十箇急火燒存性

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍吃熱羹助

一方 治產後陰腫痛

用桃仁去皮尖細研四五次抹之

一方 治產後用力太過陰門突出

用四物湯煎熟入龍骨末少許空心連進二服用麻油  
和湯薰洗

一方 治婦人陰冷

用吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎  
帛裹納陰中良久如火熱

○已上諸方調理雜証之劑

○廣按產後諸証其源有三曰血虛火動曰敗血妄行

產後

心法附餘卷之五

主

論

曰飲食過傷何以明之氣屬陽也血屬陰也經曰陽  
虛生外寒陰虛生內熱蓋產後去血過多血虛火動  
而為煩燥發熱之類一也血猶水也水之就下性也  
孟子云今夫水搏而躍之可使過顙激而行之可使  
出山非水之性也勢使之然也蓋產後虛火上載敗  
血妄行而為頭暈腹痛之類二也經云少火生氣壯  
火食氣東垣云火為元氣之賊火與元氣不兩立一  
勝則一負蓋產後火傷元氣脾胃虛弱若飲食過傷  
則為痞滿吐瀉之類三也治之之法血虛火動則補  
之敗血妄行則散之飲食過傷則消之何患乎不愈

哉雖然元氣有虛實疾病有淺深治療有難易又不  
可一槩論也

猪蹄湯 產後方 治婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄一隻 通草五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮  
得四五升取汁飲之

玉露散 大全良方 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目

昏痛大便澁滯悉能治之凉膈壓熱下乳

人參 白茯苓 甘草各半 桔梗炒

川芎 白芷各一兩 當歸二錢半 芍藥七錢半

產後

心法附餘卷之五

主

論

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至七分去滓溫服食後  
如頭熱甚大便秘加大黃二錢半

湧泉散 因氣乳汁少

瞿麥穗 麥門冬 王不留行 緊龍骨

川山甲 炮黃各

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服藥以

木梳左右乳上梳三十餘下日三服

卓角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

歌曰

婦人吹乳

月燒灰蛤粉和

熱酒一盃調八字 須臾揉散笑呵呵

# 子嗣

九十七 附諸虛 斷子法

## 丹溪心法

○若是肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食之人經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用星夏蒼朮台芎防風羌活滑石或導痰湯之類 若是怯瘦性急之人經水不調不能成胎謂之子宮乾澁無血不能攝受精氣宜涼血降火或四物加香附黃芩柴胡養血養陰等藥可宜 東垣有六味地黃丸以補婦人之陰血不足無子服之者能使胎孕出試効方

## 附脉理

脉訣舉要曰陰搏於下陽別於上血氣和調有子之象手之少陰其脉動甚尺按不絕此為有孕少陰屬心心主血脉腎為胞門脉應於尺或寸脉微闊滑尺數往來流利如雀之啄或診三部浮沉一止或平而虛當問月水婦人有病而無邪脉此孕非病所以不月

## 附諸方

六味地黃丸 見補損  
女金丹 韓養安方

白芍藥 川芎 不見火 藁本 赤石脂 白赤

人參 白薇 桂心 牡丹皮

白芷 白朮 玄胡 白茯苓

沒藥 各一 當歸 二兩 甘草 五錢

十五味除石脂沒藥另研外其餘皆以醇酒浸三日烘

乾為細末足較一十五兩

香附子 十五兩 以水煎三日

右十六味和合重羅數過煉蜜丸如彈子大磁銀器封

收每取七丸空心雞未鳴時服一丸先以薄荷湯或茶

灌漱咽喉後細嚼以溫酒或白湯送下鹹物乾果壓之

子嗣 心法附錄卷下

服至四十丸為一劑以癸水調平受胎為度胎中三日

一丸產後二日一丸百日止盡人事而不育為天矣人

為齒齠諺曰天命予每于世之嗣者惜焉

說說凡和劑治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

澤蘭葉 一兩 肉桂 五錢 當歸 洗焙 川芎

石斛 酒浸 白芍藥 牡丹皮 熟地黃 洗焙

延胡索 各一 白朮 一兩 乾姜 炮半兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒下

烏雞丸 治婦人羸弱血虛有執經水不調崩漏帶下骨

蒸等疾不能成胎

用白毛烏骨公雞一隻重二斤半許閉死去毛腸淨  
用艾四兩青蒿四兩剉碎納一半二錢腹用酒罈一  
隻納雞并餘艾蒿在內用重便和小若令艾雞二寸  
許煮絕乾取出去骨餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研為  
細末

南香附去毛淨一斤分作四分米泔水浸一分童便  
浸一分醋浸一分酒浸一分春秋二夏一冬四日取

出晒乾

熟地黃四兩 當歸酒浸

白芍藥 遼人參

驚甲醋浸

生地黃條麋者勿用

白朮

子嗣

治法附餘卷之十一

主

黃芪

川牛膝去芦

柴胡

牡丹皮去心

知母

貝母各二兩

秦艽一兩半

地骨皮

乾姜

玄胡索

黃連各一兩

川芎三兩半

白茯苓去皮二兩半

右并香附共為細末并雞末酒醋糊為丸如梧桐子大  
每服五六十丸漸加至七八十丸溫酒下或米飲下亦  
得忌煎炒辛辣之物及莧菜

○補血新增

附諸方

治婦人一切血氣不足虛損羸瘦

當歸去毛

桂枝去皮

甘草炙各二兩

白芍藥六兩

右咬咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚同煎空心熱  
服

人參養血丸

和劑方

治女人稟受素弱血氣虛損常服補

衝任調月候暖下元生血氣令人有子

烏梅肉三兩

熟乾地黃五兩

當歸去毛

人參去芦

赤芍藥

川芎

蒲黃炒各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十九丸溫酒米飲

任下

六神湯

御藥院方

治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進

子嗣

治法附餘卷之十一

主

主

飲食

當歸

地黃

芍藥

川芎

地骨皮

黃芪各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

補中丸

聖惠方

治婦人虛損諸疾宜常服

川芎

白芍藥

黃芪

當歸

人參

陳皮各五錢

白朮

地黃各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸溫水下

八珍散

瑞竹堂方

調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲

食

四物湯 四君子湯

右等分姜二片棗子一枚水二盞煎至一盞去粗食前  
溫服

滋血湯 御藥院方 治婦人皮聚色落心肺俱損血脉虛弱

月水過期益氣養血調進飲食

人參 中 白茯苓 去皮 川芎 中 當歸 上

白芍藥 山藥 上 黃耆 上 熟地黄 上

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食前溫服不  
拘時

滋血湯 大全良方 滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷

子嗣 心津附錄卷之十一 主 人參

當歸 川芎 芍藥 麥門冬 牡丹皮 阿膠 各二 琥珀 七錢半

酸棗仁 炒 官桂 甘草 各一 半夏 麴 半一兩

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至八分去粗通  
口服食前日三服

烏雞煎丸 和方 治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

當歸 黃芪 各六 生地黃 香附子 各四

茯苓 二兩 人參 官桂 地骨皮 各二

右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和  
炒過丸雞頭子大喂雞服生暖吊死腸肚洗淨掃毛翅

碎骨入前藥雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯  
研共為細末用汁打糊丸如梧桐子大每服五十丸鹽  
湯下

○斷子法用白麴麴一升無灰酒五升作糊煮至二升半  
濾去粗可分作三服候經至前一日晚次早五更及天  
明各喫一服經即不一無不字 行則終身無子矣

○廣按婦人無子之因或經不勻或血不足或有疾病  
或交不時四者而已調其經而補其血去其病而節  
其慾夫如是則經調血足無病而交有時豈有不姓  
娠者乎雖然人之後嗣係乎天命亦或人事未之盡  
子嗣 心津附錄卷之十一 主 人參

者可不究其心歟

諸病 九十八 新增

附諸方 加減四物湯 治婦人諸病

熟地黄 川芎 芍藥 當歸 各等分

右咬咀每服六錢用水一鍾半煎八分不拘時服

○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩

○妊娠胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芪

○血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉

○血崩加生地黃蒲黃黃芩 一方加阿膠艾葉黃芩  
 ○血虛腹疼微汗惡風加義木官桂  
 ○風虛眩暈加秦芫羌活  
 ○氣虛無力加厚朴陳皮  
 ○發熱心煩不得卧加黃連梔子  
 ○虛寒脉微自汗氣短自利加乾姜附子  
 ○中濕身重無力身涼微汗加白朮茯苓  
 ○筋骨肢節疼及頭疼增寒加羌活防風藁本細辛  
 ○膈中虛冷脘疼腰脊間痛加玄胡索川練子  
 ○經水過多加黃芩白朮  
 諸病 心附餘卷之三 十九  
 ○經水澁少加葵花紅花  
 ○虛勞氣弱咳嗽喘滿加厚朴姜製枳實麩炒  
 ○經水暴下加黃芩  
 ○血積塊痛加義木三稜官桂乾漆炒  
 ○赤白帶下加香附官桂  
 ○血痢加阿膠艾葉黃連  
 ○產後血痢腹疼加槐花黃連鹽菜殼  
 ○血熱相搏舌乾口渴加括蕞根麥門冬  
 ○大渴引飲加知母石膏  
 ○臟腑秘澁加大黃薤仁

○嘔吐加白朮人參藿香生薑  
 ○虛寒滑泄加官桂附子炮  
 ○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁  
 ○目暴赤作翳障加防風羌活防己酒浸龍膽草  
 加減四物湯 大 全 良 方 治 妊 娠 產 前 腹 痛 及 治 月 事 或 多 或 少 或 前 或 後 胎 氣 不 安 產 後 血 塊 不 散 或 亡 血 過 多 或 惡 露 不 下 宜 服  
 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各一  
 右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗食前溫服  
 ○妊婦下血即入艾葉六七片阿膠末一錢同煎病瘳  
 諸病 心附餘卷之三 二十  
 甚大散藥不及以四味各半兩用水四盞煎至二盞  
 半去粗分四服食前熱服一日中令盡以止為度  
 ○產乳服至三臘止  
 ○如虛弱血藏不調至一月止  
 ○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水者加天花粉  
 一兩麥門冬七錢半  
 ○腹中刺痛惡露不下加當歸芍藥各二錢半  
 ○血崩加生地黃蒲黃各一兩  
 ○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢  
 ○身熱脉燥頭昏項強加柴胡黃芩各半兩

○大便秘結加大黃半兩薤仁二錢半炒  
 ○如大便滑泄加桂心熟附子各二錢半  
 ○發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥各二錢半  
 ○嘔者加白朮人參各半兩  
 ○腹脹加厚朴枳實各二錢半  
 ○虛煩不得眠加竹葉人參各二錢半  
 ○煩燥大渴加知母石膏各五錢  
 ○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各二錢半  
 ○虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各七錢半  
 經驗加減四物湯醫方大成 治婦人諸虛不足  
 諸病酒浸一附錄卷之三十一 全  
 當歸酒浸一熟地黃 白芍藥 川芎各一兩  
 右咬咀剉為散着病証加減後藥煎服  
 ○血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩  
 ○胎動下血加熟艾一塊阿膠末一錢  
 ○補下元加乾姜半兩甘草七錢  
 ○血崩淋瀝不斷加炮附子一個赤石脂一兩  
 ○便血及帶下加荆芥地椒  
 ○血氣滯腹內刺痛加桂  
 ○產後傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩  
 ○血風勞加荆芥柴胡

○熱加前胡乾葛人參黃芩  
 ○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩  
 ○嘔吐不止加藿香白朮半兩人參一錢  
 ○產後虛憊血熱煩悶加生地黃  
 ○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢  
 ○產後惡露腹痛不止加薤仁蘊木牛膝  
 ○產後寒熱往來加柴胡麥門冬各半兩  
 ○經脉淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥  
 ○血滯不通加紅花桃仁各二錢半  
 ○產後悶亂加茯苓遠志各半兩  
 諸病酒浸一附錄卷之三十一 全  
 ○虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩  
 ○妊娠心腹煩加竹茹一塊  
 ○如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃  
 以生者易之  
 ○大便閉加大黃桃仁各二錢半  
 △物湯聖惠方 若經事欲行腹臍絞痛者血澁也宜服  
 四物湯四錢玄胡索苦練碎炒黑 檳榔木香各一兩  
 ○若經水過多別無証宜服黃芩六合湯  
 四物湯四兩黃芩白朮各一兩  
 ○若經水澁少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見愁

○若虛勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合湯  
四物湯四兩厚朴製一兩枳實炒五錢

○若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏月  
不去黃芩

○若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

○若經水少面色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯  
以去其寒熱後以四物湯和之

○若婦人血積者四物湯內加京三稜桂枝廣茂乾漆各  
二兩

諸病 心附錄卷之十一 全 三百三十一

八物湯 聖惠方 若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜  
服四物湯四兩黃耆甘草茯苓白朮各一兩

○若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩桂香附子各五錢

○若虛熱病四物與參蘓飲相合名補心湯主之

○若四肢腫痛不能舉動四物蒼朮各半湯主之

○若治燥結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散

○若流濕潤燥宜四物湯理中湯各半

○若大渴者加知母石膏

○若保胎氣令人有子四物湯加確砂四君子湯各半

名八珍湯

○若熱與血相搏口舌乾渴飲水加括蕞麥門冬

○若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥

○若血崩者加生地黃蒲黃黃芩

○若臟秘結澀者加大黃桃仁

○若頭昏項強者加柴胡黃芩

○若滑瀉者加官桂附子

○若因熱生風者加川芎柴胡防風

○若嘔者加白朮人參生薑

○若發寒熱者加乾生薑牡丹皮芍藥柴胡

諸病 心附錄卷之十一 全 三百三十一

○若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防己

○若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風

○若產婦諸証各隨六經以四物與仲景藥各半服之  
其効如神

○若婦人或因病酒或因生產去血或虛勞五心煩熱  
者宜服四物二連湯

四物湯內用生地黃黃連胡黃連真者溫飲清服

○若虛煩不得睡加竹葉人參

○若婦人血虛心腹痞痛不可忍者去地黃加乾姜名  
四神湯



○若諸痛有濕者四物與白朮相半加天麻茯苓川山

甲酒煎

○廣按婦人外感內傷一切疾病與丈夫同治惟月候

孕產崩漏滯下數証與丈夫異治也夫婦人以血為

海婦人伏於人者凡事不得專行每多憂思忿怒也

醫書云氣行則血行氣止則血止蓋婦人憂思過度

則氣結氣結而血亦結矣又云氣順則血順氣逆則

血逆蓋婦人忿怒過度則氣逆氣逆而血亦逆矣氣

血結逆於臟腑經絡之間所以婦人多腹痛諸痛內

外煩熱也然疼痛煩熱二者不可不分疼痛者血滯

也煩熱者氣滯也血滯以辛溫之劑治之氣滯以辛

涼之劑治之氣血俱滯而疼痛煩熱齊作者又當以

辛平之劑治之大抵婦人血用事氣行則無病而古

人治婦人之病多用香附縮砂木香枳殼青皮枳殼

者行氣故也抑嘗論之凡治婦人之病先問月候緊

要以月候如期為安先期而未者血熱也過期而未

者血虛也或疼痛或發熱者氣血鬱結也凡婦人之

病多是血氣鬱結故治婦人之病以開鬱行氣為主

鬱開氣行而諸病自瘳矣煩熱是二意煩者

丹溪心法附錄卷之二十一

丹溪心法附錄卷之二十一

丹溪心法附錄卷之二十一

丹溪心法附錄卷之二十二

休寧東山古庵方



# 小兒門

上

## 小兒諸病

九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足

○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置

地上出火毒一時許用水一小盞熬至三分之一去粗用

新綿蘸滴兒口中令嚥盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年

長知瘡無病

○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽痰喘此

類証並用湧法吐之重劑瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末

須蝦蟇汁調服之後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上

牛兒陰乾焙末調服以平其氣驚有二証一者熱痰

主急驚當吐瀉之一者脾虛乃為慢驚所以多亢當養

脾急驚只用降火下痰養血慢驚者先實脾土後散

脾

風邪只用朱砂安神丸更於血藥中求之

○小兒驚然無故大斗作發者必死是火大發則虛其氣故也

入方黑龍丸 治小兒急慢驚風

牛膽南星 一兩

青礞石 煅 等分

青黛 半兩

蘆薈 二錢

辰砂 三錢

礪石 半兩

蜈蚣 一錢半

天竺黃 半兩

右為末甘草煎膏丸如雞頭大每服一二丸急驚煎姜

蜜薄荷湯下慢驚煎桔梗白朮湯下

治驚而有熱者

諸病

心法附餘卷之二十一

二

其劑

人參 五分

茯苓 八分

白芍藥 一錢

白朮 一錢

右咬咀姜水煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散

見附參類

朱砂安神丸

見驚悸類

瓜蒂散

見痘類

○疳病或肚大筋青

胡黃連丸 治疳病腹大

胡黃連 半錢

去

阿魏 一錢半

醋浸

神麴 二錢

去

射香 四粒

炒黃連 二錢

去

右為末猪膽汁丸如黍米大每服二三十丸白朮湯送

下 又云胡黃連丸十二粒白朮湯下

五積丸 治小兒諸般疳積

丑頭末 一兩

黃連 半兩

陳皮 一兩

青皮 半兩

山查 半兩

右炒焦黑色為末每服巴豆霜半錢煎藥末半錢宿蒸

餅丸麻子大小兒二歲十丸五更姜湯下至天明大便

泄為度溫粥補之未利再服三五丸

烏犀丸

丑頭末 三兩

青皮 三兩

史君子肉 七錢

白蕪荑 一錢

鶴虱 五錢

蘆薈 一錢

煨紅

苦練根皮 五錢

諸病

心法附餘卷之二十三

三

右炒令焦黑色為末麴丸麻子大每三五丸米飲送

下食前量小兒大小加減

黃龍丸

三稜 三兩

黑角義木 三兩

青皮 一兩

山查肉 七錢

乾姜 七錢半

右用麴丸麻子大日晒乾食後姜湯下量兒大小加減

○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積

蘆薈 另研

胡黃連 三錢

炒麴 四錢

黃連

白朮

山查 半兩

蕪荑 二錢

右為末蘆薈和勻猪膽汁丸粟米大每六十九食前米飲下

疳積食積

白朮 黃連 苦參 山查 等分

右為末麴糊丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱熏蒸

白朮 一兩 半夏 半兩 黃連 半兩 平胃散

右用粥丸食後白湯下二十九丸

○心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆因乳食不調其

諸病 心法附錄卷之三 四 知州

肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生延及歲月五疳病成甚者胸陷喘噦乳食直瀉腫滿不利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面稿色天骨露齒張腹硬不食者皆危篤矣凡此等類盧扁復生難施其巧

○子熱

炒芍藥 香附 滑石 一兩 甘草 三錢

黃連 二錢

右作四服水一盞半生姜三片煎乳母服

○風痰

南星 一兩切用白礬末半兩水  
右為末飛白麴糊丸如芡實大每服一二十九姜蜜薄荷湯化下

白附丸

牛膽南星 一兩酒洗黃柏牛胆臘月粉南星親手修合

大陳半夏 半兩粉白南星 一兩切作片用臘月雪水浸七日去水晒乾

枯白礬 二錢

右為末宿蒸餅丸如桐子大用姜汁蜜湯送下有熱加薄荷葉

紫金丸 治小兒哮喘不止端午日修合

諸病 心法附錄卷之三 五 三百五十一

黑椒 四十九粒浸透去皮研如泥次入 人言 一錢 鵝管石 一錢

右為末丸如黍米大硃砂為衣每一丸或二丸量兒大小空心冷茶清下當日忌生冷葷腥熱物服藥病止後更服白附丸三五貼

○小兒腹痛多是飲食所傷宜

白朮 上 陳皮 中 青皮 中 山查 中

神麴 炒中 砂仁 下 麥蘖 中 甘草 下

受寒痛者加藿香吳茱萸更有熱加黃芩水煎服

○小兒腹脹

蘿蔔子 蒸 紫蘊 乾葛 陳皮 等分

甘草減半

食減者加白木煎服

小兒好喫粽成腹脹疼用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹

茯苓皮

陳皮

赤小豆

蘿蔔子炒

木通

各半錢 木香二分

甘草些少

右咬咀姜一片煎服

○小兒吐瀉黃疸

三稜中

義木中

青皮中

陳皮上

諸病

心法附餘卷之三十一

十六

連三首十八

神麴炒中

茯苓上

麥蘖下

黃連下

甘草下

白木上

右為末調服

傷乳食吐瀉加山查

時氣吐瀉加滑

石 發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用

吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名

萬安膏用米湯化下

○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾

黃連下

黃芩下

陳皮上

甘草中

赤痢加紅花菴仁 白痢加滑石末

又方治小兒食積痢

炒神麴中

蒼木中

滑石中

白芍上

黃芩中

白木上

甘草炙上

陳皮下

右咬咀水煎下保和丸 一方加茯苓

○小兒赤痢壯熱用藍青搗汁每服半盞與之妙

○小兒黑斑紅斑瘡痒癰疹並宜用防風通聖散為末調服

服

○小兒口糜

戴云謂滿口生瘡者是

諸病

心法附餘卷之三十一

七

連三首二十

江茶二錢

粉草二錢

右為末敷之一方用黃丹一錢炒過傳之

又方

苦參一錢

黃丹一錢

五倍子二錢

青黛一錢

右等分為末敷之

又方

青黛二錢

芒硝一錢

右為末敷口中吐嚔俱宜

又方

黃柏二錢

細辛三分

青鹽五分

右等分爲末噙之吐出涎不過三日愈亦治大人治胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分爲末敷之

○龜胸

蒼朮

酒栢

酒芍藥

陳皮

防風

威靈仙

山查

當歸

痢後加生芋水煎服

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連一錢半甘草三分

右用竹葉二十片煎服又方加人參二錢半作二服

入姜一片煎

諸病

心法附錄卷之三

八

本二百字

又法夜啼不止潛取摘雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

○脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說或云潰爛

陰丸脫出

入方

木通

甘草

黃連

當歸

黃芩

右以水煎服

又方治脫肛

用東北方陳壁土泡湯先熏後洗

又方治脫囊

紫蘊葉坐爲末如爛乾傳如未破用香油調鵝翎掃

青荷葉包上

○小兒木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二

者皆是熱病

入方

百草霜

芒硝

滑石

諸病

心法附錄卷之三

本

右爲末酒調傳之

重舌用好膽礬研細傳之

○咯血

戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血同

又方

黑豆

甘草

陳皮

右水煎食後服

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥胃氣熱故也

入方

軟石膏<sub>中</sub>

黃芩<sub>中</sub>

陳皮<sub>中</sub>

茯苓<sub>上</sub>

白朮<sub>上</sub>

甘草<sub>下</sub>

石用水煎服

又方

賦粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出上辛瘥

○小兒解顱乃是母氣虛熱多耳

戴云即初生小兒頭二骨未合而開者

入方

奇方 心法附餘卷之三十一

四君子與四物子母皆可服有熱加酒炒黃芩黃連生甘草煎服外用帛束緊用白飯末傳之

○小兒吐蛇虫

以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛇多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香

二粒

錢氏白朮散

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參<sub>代</sub>

乾葛<sub>二錢</sub>

右為末每一錢至二錢水煎服

○小兒口噤

治法用搗鼻方

鬱金<sub>下</sub>

蘇蘆<sub>中</sub>

瓜蒂<sub>下</sub>

右為末水調搗之

○小兒禿頭

用白炭燒紅碎長流水令熱洗之內又服酒製通聖散除大黃而用酒炒入研為末再用酒拌乾每服一錢水煎服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾<sub>上即果</sub>黃連白礬為末油調傳

又方

奇方 心法附餘卷之三十一

松樹厚皮<sub>兩</sub> 黃丹<sub>二兩</sub> 寒水石<sub>一兩</sub>

白礬<sub>相</sub> 黃連<sub>二兩</sub> 輕粉<sub>四錢</sub>

白膠香<sub>熟煮傾石</sub> 大黃<sub>各半</sub> 輕粉<sub>四錢</sub>

右為末熬熱油調傳瘡上須先洗了瘡痂傳之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証

松皮<sub>燒灰</sub> 白膠香

枯礬

大黃

黃柏<sub>等分</sub>

右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡

臘猪油<sub>半生</sub> 雄黃

水銀<sub>等分</sub>

右研和勻洗淨傳瘡上

又方

川芎 酒片苓 酒芍藥 陳皮 半兩

酒白朮 酒當歸 半兩 酒天麻 蒼朮

蒼耳 半兩 酒栢 酒粉草 四錢 防風 三錢

右為末水盪起煎服日四五次服後睡片時

又方 單治頭瘡

松樹皮 厚者燒 白膠香 熱沸傾石

黃丹 一兩 白礬 火飛 黃芩 黃連

大黃 各三錢 蛇床子 寒水石 三錢 白芷

諸病 心法附餘卷之三十二 三

無名異 許少許 木香 少許 輕粉

右為極細末熬熟油調敷瘡上須洗淨瘡去痂傳之佳

又小兒瘡

猪牙皂角 去胡椒些小 枯礬 輕粉

右為末樟腦燭油搽七日如嬰兒膿窠去椒

○小兒臍腫汁出

用枯白礬末付或黃栢為末付之 又小兒臍不乾

伏龍肝塗 或用枯礬煨過白龍骨等分付之

○小兒天火丹臍腹起者赤痛不妨

蛭蚓泥炒調付

○小兒赤瘡 其餘傷

用生苦木通荆芥苦藥帶表之類外以芭蕉油塗患處芒硝濃煎汁洗之 又方雞子清調伏龍肝傳之

○小兒耳後月蝕瘡

黃連 枯白礬 等分

右為末傳之

○小兒鼻赤

雄黃 中 黃丹 上

右同為末無根水調傳之 又蒼耳葉酒蒸焙乾為末調服最解食毒 又鼻下一道赤者名曰蟹以黃連末

諸病 心法附餘卷之三十二 三

傳之

辛夷膏 專治小兒鼻流清涕不止

辛夷 葉一兩洗 細辛 木通

白芷 各半 杏仁 一兩去皮 木香 半兩

右為細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和

勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦

射各一錢拌勻塗顙門上每用少許塗鼻中

○小兒變蒸是胎毒散也

○乳兒瘡疾瘡塊

川芎 二錢 生芩 白芍藥 一錢 陳皮

半夏

炒茶

甘草二分

右作一服姜三片就煎下川山甲末半錢

○胎熱胎寒新傳

附諸方

釀乳方楊氏方解胎中受熱生下而赤眼閉不開大小便

不通不能進乳食

澤瀉二兩

猪苓

赤茯苓

天花粉

茵陳

甘草各一兩

生地黃二兩

右咬咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母捏去

宿乳却服

胎熱

心法附餘卷之三

治

治

生地黃湯楊氏方治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上

壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆

因母受熱而傳於胎也凡有此証乳母宜服此藥并畧

與些兒服

生乾地黃 當歸

赤芍藥

川芎

天花粉各等分

右咬咀每服五錢水一盞煎服

當歸散楊氏方治小兒胎中受寒生下再感外風面色青

白四肢厥冷大便青黑及腹疼盤腸內吊病並皆治之

當歸

黃耆

細辛

黃芩

龍骨細研

桂心

赤芍藥各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減

釣藤膏楊氏方治內吊腹疼

沒藥

乳香各三錢

木香

姜黃各四錢

木鱉十箇

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑收沙

罐內量兒大小加減煎釣藤湯化下次服魏香散

魏香散錢氏方

蓬莪朮半兩 真阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服

一字

煎紫蘆米飲空心調下

治

治

胎寒傷氣痛楊氏方

方用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨

水半盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

茴香散

宣明方治小兒盤腸氣痛

茴香炒

木香

黑附子

金鈴子去核

蘿蔔子炒

枳榔

破故紙炒

白豆蔻等分

右咬咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散

治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼

叫尿如米泔



<p>川練子 <small>二箇去皮核用巴豆三十五粒</small> 木香</p> <p>黃史君子肉 <small>延胡索 茴香 各一錢</small></p> <p>右同為末清米飲空心調下量兒大小服之</p> <p>勻氣散 治氣滯不勻宿食不消心腹刺痛嘔吐惡心調脾胃進飲食</p> <p>丁香 檀香 木香 白豆蔻 <small>各四錢</small></p> <p>藿香 甘草 <small>各八錢</small> 砂仁 <small>四錢</small> 沉香 <small>三錢</small></p> <p>陳皮 <small>四錢</small></p> <p>右為細末用鹽湯調不拘時服</p> <p>○臍風撮口 <small>新增</small></p> <p>臍風 <small>心法附餘卷之三十一</small></p> <p>附諸方</p> <p>宣風散 治初生小兒臍風撮口多啼不乳口出白沫</p> <p>全蝎 <small>二十一箇頭尾全者去</small> 射香 <small>一字別</small></p> <p>右同和為細末用半字金銀煎湯調服</p> <p>辰砂蠶散 治小兒臍風撮口</p> <p>辰砂 白蠶 <small>各一錢</small> 蛇蛻皮 <small>一錢</small></p> <p>射香 <small>半份別研</small></p> <p>右為細末少許用蜜調傳唇口</p> <p>治撮口 <small>張氏方</small> 治小兒斷臍為風濕所乘或尿在抱裙之內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治之</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>赤脚金頭蜈蚣 一枚 蝎稍 四尾 姜蚕 七箇</p> <p>霍麥 <small>半錢</small></p> <p>右為末先將鴉翎管吹藥入鼻內使嚏噴啼哭為可醫後用薄荷湯調服之</p> <p>定命散 <small>張氏方</small> 治因剪臍傷於風濕致令唇青撮口</p> <p>赤脚蜈蚣 <small>半條酒</small> 川烏頭 <small>三箇</small> 射香 <small>少許另研</small></p> <p>右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下</p> <p>治撮口 <small>張氏方</small></p> <p>用白姜蚕為末蜜調塗口唇內即瘥 <small>白姜蚕要</small></p> <p>治撮口 <small>聖惠方</small></p> <p>撮口 <small>心法附餘卷之三十一</small></p> <p>用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中</p> <p>一方</p> <p>取活蝎虎一箇 <small>江南名壁虎</small> 裝瓶內硃砂細末不拘多少亦入瓶內封口食砂月餘取出其身赤色陰乾為細末每服一二分酒下大効</p> <p>一方</p> <p>用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝎稍七箇共為極細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣包裹須臾小兒冷汗出愈</p> <p>一方</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬者  
者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺破一二處入射香  
末少許灸三炷後無臍風

又方 同前

珍珠四十九粒  
研極細

白礬飛過  
蛤粉

黃丹

血竭各五

棗核兒飛至青灰色棗子  
大頭上有兩角棗

子有之陰乾三  
枚無此味亦可

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚五六  
寸處先用軟線繒住却於線外將臍咬斷片時去線待  
血流盡用鵝翎管送藥一二分入臍大孔內近肚處臍  
撮口心法附餘卷之五

孔以手指輕輕揉散艾灸臍頭三炷結作紮結軟帛腰

裹切不可常時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失

一 又云臍硬直者宜用此法臍軟者不必用此法

一方

兒初生七日若有臍風必自發出青筋一道行至肚却  
生兩岔待行至心不治必死知者常視其青筋初發速  
照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上  
截灸六炷青筋自消兒必活矣

一方

小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其

而無救良可憫哉一秘法極有神驗世罕知之凡兒  
患此者齒齬之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青  
熟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服藥  
○鵝口口瘡新填

附諸方

保命散 治小兒鵝口

白礬錢一 馬牙硝五錢 硃砂水飛一

右為細末每用一字取白雞糞以水攪取汁調塗舌上  
領頰內未用藥時先以手指纏亂頭髮揩舌上拭舌上  
垢然後用藥傳之

一捻金散 治小兒鵝口口瘡

雄黃三錢 鵬砂一錢 龍腦少許 甘草半錢一

右為末乾搽患處或用蜜調搽

一方 小兒白屑滿舌狀如鵝口 葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭口上如下脫濃煮粟米汁以  
綿纏筋頭拭之却用煨過黃丹搽之

一方 小兒初生舌下有膜如柘榴子連於舌根令兒言  
語不發

可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰搽之 葛氏方

小兒鵝口 治小兒口瘡

用黃連去蘆為末蜜水調服 洗心散九鈔 方見火門

硃礬散 和劑方 治口瘡鵝口不能乳者

一方 治小兒口瘡

枯過白礬 兩黃丹一錢半 乳香

右件煉蜜為丸如阜子大臨卧嚙化小兒用筋頭點

一方 治小兒心有客熱滿口生瘡 楊氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末末醋調塗亦可

又方 鵝口 心法附餘卷之三

用巴豆一粒去殼搗爛黃丹少許和捏餅外用紙護貼

眉心立止

真黃散 治小兒走馬疳

雞腔脰黃皮不以多少油燈上燒存性研細末入黃栢

枯礬射香一字用米泔水攪口內貼

立効散 同前

青黛 黃栢末 白礬 各一錢 五倍子 各一錢

右為細末用米泔水攪口內貼

牙疳散

珍珠七箇 銅青一分 白礬 錢三 千里沉石灰 錢三

右為細末米泔水攪口貼

一方 治小兒牙疳

用白礬裝於五倍子內合燒過為末貼之

重舌木舌 新增

附諸方 青液散 治嬰孩小兒驚口重舌及口瘡

青黛一錢 龍腦一字 朴硝一錢

右為細末用蜜調驚翎少許付上

一方 治小兒舌下生舌名曰重舌 楊氏方

口瘡 心法附餘卷之三 用針刺去惡血即愈

治小兒重舌 千金方

用竹瀝清黃蘗無時點舌上亦有用真滴黃金亦可

一方 治小兒舌腫塞口欲滿者

用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以盡為度

○胎驚夜啼 新增

附諸方

一方 治小兒在胎中受驚故生未滿月而發驚 楊氏方

用硃砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入射香當門子者尤妙

治胎驚風 湯氏方

月全蠲頭尾全者以生薄荷葉裹之以綿扎定火上炙燥研為末入射香硃砂少許麥門冬湯下

真珠散 湯氏方 治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡臥驚跳時或咬牙啼斗不已小便赤澀或吐黃沫

真珠末 海螵蛸 滑石 各一錢 茯苓

人參 白附子 各二錢 甘草 各半錢 全蠲 各半錢

硃砂 一錢 腦子 射香 各半錢 金銀箔 五片

右為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜少許調下

金箔鎮心丹 治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩燥

夜啼 心法附餘卷之三十一 主

止啼

全蠲 上筒用薄荷包 天麻 煨 防風 去芦

羌活 去芦 牛黃 赤茯苓 去皮 犀角

甘草 各一錢 射香 辰砂 水飛一錢 金箔 二十片

右為細末煉蜜丸如皂角子大薄荷煎湯不拘時候服

治小兒夜啼

用蟬蛻二七枚全者去翅足為末入硃砂一字蜜調為

丸使吮之

燈花散 三國方 治邪熱在心內燥夜啼

用燈花三兩顆研為末燈心煎湯調末口中以乳汁送

下日二服

龍齒散 湯氏方 治小兒夜啼不住

蟬蛻 去翅足 釣藤 有釣子 龍齒 茯苓 去皮

人參 各等分

右為末每服一錢水半鍾煎服不拘時

乳頭散 湯氏方 治夜啼不止腹中疼痛

黃耆 當歸 甘草 炙 赤芍藥

木香 各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之

○變蒸發熱 新增

變蒸 心法附餘卷之三十一 主

附諸方

惺惺散 湯氏方 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲重

相似傷寒者此藥宜服

人參 去芦半 白朮 白茯苓 甘草

白芍藥 天花粉 桔梗 去芦各半兩 細辛 二錢半去

右為末每服一錢水半盞姜一片薄荷一葉煎服

神仙黑散子 陳氏方 治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其

証若上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥

麻黃 去節 大黃 杏仁 去皮各

右燒灰存性為末每服一字水半盞煎服抱男於溫暖

虞連進之有微汗身涼即瘥

生犀散 骨蒸肌熱瘦悴煩赤口乾日晚潮熱夜有盜汗  
五心煩熱

犀角 剉末二錢 地骨皮 赤芍藥 柴胡

乾葛 剉末一兩 甘草 炙二兩

右每服三錢水一鍾煎半鍾食遠溫服

○丹毒蘊熱 新增

附諸方

四順青涼飲子 和劑方 治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉  
方見火門

丹毒 心法附餘卷之三十二

牛黃散 和劑方 治五種丹毒

鬱金 桔梗 去芦 天花粉 甘草

葛粉 各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白玉散 錢氏方 治赤遊丹腫

白芷 一兩 寒水石

右為末米醋調付患處或腫至外腎有破處只用水調

生料四物湯 湯氏方 治血熱生瘡遍身腫痒

生乾地黄 赤芍藥 川芎 當歸 去芦剉

風續加 各等分 黃芩 炙半

右咬咀每服三錢水一盞煎服

防已散 湯氏方 治小兒伏熱毒之氣遍身赤腫入腹入腎  
切防其殺人

漢防已 半兩 朴硝 犀角 黃芩

黃耆 川升麻 各二錢半

右咬咀每服三錢水一鍾加竹葉同煎半鍾溫服

漏芦散 湯氏方 治五腫丹毒并諸瘡瘡

漏芦 麻黃 去根節 連翹 川升麻

川芒硝 黃芩 各二錢半 白欬 七錢半 甘草 二錢半

川大黃 炒一兩

丹毒 心法附餘卷之三十二

右咬咀每服二錢水一盞煎服不拘時

一方 治丹毒發作恐其入腹一時無藥

急以針於紅點處刺出惡使毒於此而散

一方 治走馬火丹

用景天一名慎火草一名仙指甲不拘多少搗爛取汁

塗之即効

土黃散 治赤流丹毒

先用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用

土硝 一兩 大黃 末一兩

右二件相合新汲水調拌勻用雞翎蘸藥時時塗掃

伏龍肝散 應驗方 治赤腫赤毒火毒走注

伏龍肝不拘多少用雞子清調敷赤腫處大効

升麻飲 經方 治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴

升麻 黃芩 大黃 各一 麥門冬 去心

葛根 朴硝

右為末和勻熟水調下半錢或吹咀作一服白水煎服

五福化毒丹 和劑方 治小兒蘊積熱毒驚惕狂燥煩赤咽

乾口舌生瘡夜卧不寧謔語煩渴頭面身體多生瘡癰

玄參 水洗 桔梗 各二 白茯苓 二錢 人參 去芦

牙硝 枯 青黛 各一 甘草 半錢 射香 半錢

舟毒 心法附餘卷之三 未

右為末煉蜜丸如雞頭太金銀箔為衣薄荷湯化下一

丸

消毒犀角飲 和劑方 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰

涎癰嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚遍身風疹瘡毒

赤癰及瘡癰已出未出不能快透並皆治寮小兒疹痘

欲出已出熱尚未解急進此藥三四服快透消毒應手

神効

鼠粘子 四錢 荆芥 甘草 各一 防風 去芦半

一方加黃芩 一錢 犀角 以升麻代之

右用水 鍾煎至半鍾溫服

牛黃丸 聖惠方 治小兒心經積熱兩頰紅如奎胭脂手足

常熱口乾燥

○上焦熱壅

牛黃 一錢 天竺黃 二錢 鬱金 三錢 大梔子 四錢

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜

為丸一周兒黃米大服三十九丸乳下三歲小兒菜豆大

服三十九丸薄湯下

導小赤散 錢氏方 治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥

悶亂傳流下部小便赤澀淋閉臍下滿痛

生地黃 木通 甘草 各二 一方加黃芩 二錢

舟毒 心法附餘卷之三 未

右用水一鍾竹葉十片煎至半鍾溫服

大連翹飲 活幼方 治小兒心經邪熱心與小腸受盛乃水

竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則澀盛則淋平涼

心火三焦自順不待疾作而解證成而寮者疎急有之

矣一十五味加湯使用纔覺蘊熱客熱寒邪風邪胃入

肺經心將受之心不受觸傳于小腸或閉或澀或赤或

白淋瀝不通榮衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱

眼目腫赤唇口白瘡津液不生涕唾稠盛須在表裏俱

得其宜驚風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂

大矣

連翹	霍麥穗	滑石	車前子
牛蒡子	赤芍藥	山梔子	木通
川當歸	防風	黃芩	柴胡
甘草	荊芥穗	蟬退	
右用水一鍾半竹葉十片燈心十莖煎至一鍾服無時			
天一丸	韓飛霞方	治小兒百病	
燈心	用十斤以木粉洗晒乾所末入水澄之浮者		
赤白茯苓	去皮五兩	澤瀉	去木五兩
猪苓	去皮五兩	人參	一斤去芦切片煮濃
如錫糖可			
以入藥			
心法附錄卷五			
一方人參六兩白朮六兩甘草四兩同熬膏亦妙			
右燈心等五味各足分兩為細末以人參膏和成丸如			
圓眼大硃砂為衣貼金箔任病換引大段小兒生理本			
一天一生水之妙凡治病以水道通利為捷徑也			
○廣按小兒陰不能配陽血不能配氣故凡疾作皆屬			
火韓先生定此方清心而利小便正所以散火也凡			
小兒蘊熱丹毒驚風痰熱變蒸發熱之症用此最當			
而嘔吐瀉痢諸症無不治也			
人參生犀散	解時氣寒瘧咳嗽痰喘心忪驚悸臟腑或		
秘或瀉及一切風熱			

前胡	七錢	杏仁	去皮大	桔梗	各三	人參	三錢
甘草	炙二錢						
右每服三錢水一鍾煎半鍾食後溫服							
天竺黃散	涼膈退潮熱						
天竺黃	七分	大黃		蟬蛻	各三	白礬	各二分
川羌活	全蝎	去毒		甘草	各五分		
右為細末每服一錢麥門冬煎湯調下							
辰砂湯	退虛熱和胃進飲食去心驚邪熱						
白芍藥	人參	甘草	炙各一	茯苓	一錢		
硃砂	五分	石蓮肉	五錢				
心法附錄卷五							
右為末次入硃砂研勻每服五分薄荷湯調服							
甘露飲	解五毒治煩熱						
寒水石	石膏	各一	甘草	半兩			
右為末如解諸毒氣用生薑自然汁調服傷寒時氣作							
熱發狂新汲水滴薑汁調服							
瀉青丸	錢氏方	治小兒肝經風熱目赤腫痛					
當歸	龍膽草	川芎		山梔子			
大黃	紙裹	羌活		防風	各二錢		
右為末煉蜜丸如雞頭大竹葉沙糖湯化下一丸							
三黃丸	全嬰方	治小兒諸熱無治身黃疸血便血					

黃芩 黃連 大黃 各一錢

右為末滴水為丸茶清下三五十丸

地膚子湯 千金方 治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通 欲便則澀痛不出出少瘀血須更復出

地膚子 瞿麥 知母 黃芩

枳實 升麻 葵子 猪苓 各六分

海藻 橘皮 通草 各三分 大黃 八分

右用水一盞煎至半盞去粗溫服

石葦散 活幼方 治小兒熱淋沙淋石淋

石葦 海金沙 木通 滑石 各一錢

右用水一盞煎至半盞去粗不拘時溫服

八正散 治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便淋澀 方見火

梔子仁散 湯氏方 治小便不通心神煩熱

梔子仁 五枚 茅根 冬葵根 各半 甘草 炙一錢

右為末每服二錢煎服

勻氣散 御藥院方 治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮胃膈痞悶

小便不利

桑白皮 二兩 陳皮 去白一兩 桔梗 炒一兩 甘草 炙一兩

藿香葉 半兩 木通 四兩 赤茯苓 去皮一兩

右以咀每服三錢水一盞姜二片煎半盞溫服

○中惡大吊 新傳

附諸方

蘇合香丸 和劑方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛 方見氣滯

辟邪膏 楊氏方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡

腹大而滿診其脉緊細而微者生緊大而浮則死急服

蘇合香丸再以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加入人參

茯苓不愈進以辟邪膏無不効者客忤亦可服

降真香 白膠香 沉香 虎頭骨

鬼臼 龍膽草 人參 茯苓 各半兩

右為末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯化下

及今兒帶燒卧處尤妙

沉香降氣湯 方見氣滯

九龍控涎散 湯氏方 治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名

為天吊

滴乳香 一錢 天竺黃 二錢 桂黃 二錢 陂茶 二錢

白礬 一錢 甘草 二錢 荊芥穗 一錢 炒

某豆 一百粒 半生 赤脚蜈蚣 一條 酒浸

右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯下

釣藤散 湯氏方 治小兒天吊潮熱

釣藤 人參 去芦 犀角屑 各半 全蝎 二錢



甘草 <small>一錢一分半</small> 天麻 <small>二錢</small> 右為末每服一錢煎至半盞溫服	牛黃膏 治小兒風癇迷悶抽搐涎潮	牛膽南星 <small>依前製</small> 全蝎 <small>去毒</small> 蟬蛻 <small>去足各一錢半</small>	僵蚕 <small>去絲</small> 白附子 防風 天麻 <small>錢半</small>	右為細末蒸棗去皮核取肉研為丸如小豆大用荊芥生薑同前湯研化食遠服	斷癇丹 <small>楊氏方</small> 治癇即愈而復作者	黃耆 <small>蜜塗</small> 釣藤釣子 細辛 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	蛇退 <small>酒炙</small> 蟬殼 <small>四箇</small> 牛黃 <small>一字</small>	中惡 <small>心法附餘卷之五</small>	右為末棗肉為丸如麻子大煎人參湯下一歲十九大	小加減用	細辛大黃湯 <small>湯氏方</small> 治風癇熱癇	細辛 <small>去苗土</small> 大黃 <small>炮</small> 防風 <small>去苗各一兩</small> 甘草 <small>炙二錢半</small>	右咬咀每服二錢水半盞加犀角屑少許煎服	竹瀝膏 <small>湯氏方</small> 治小兒諸癇	白朮 <small>蜜炒二錢半</small> 大附子 <small>去皮</small> 犀角 <small>銹末各一錢</small> 厚朴 <small>煮甘草水</small>	二錢 全蝎 <small>七箇</small> 麻黃 <small>每一箇用大葉薄荷葉湯</small>	右為末取竹瀝為膏丸黑豆大每服用金錢薄荷湯化	下一丸隨兒大小加減
---------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------	------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------	-----------

至寶丹 <small>錢氏方</small> 治諸癇急驚卒中客忤並宜服之	安息香 <small>一兩半為末無灰酒飛過沙石</small>	琥珀 <small>研</small> 硃砂	龍腦 射香 <small>各二錢</small> 牛黃 <small>研半兩</small> 生犀角	生玳瑁 <small>硝各一兩</small> 金箔 <small>五十片</small>	右生犀玳瑁搗羅為細末入餘藥令勻將安息香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐子大二歲服二九人參湯化下大小量意加減	一方 <small>醫方集成</small> 治小兒癇癇及婦人心風諸疾	用甘遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和甘遂末	中惡 <small>心法附餘卷之五</small>	將猪心批作兩半以藥入在內用線纏定以皮紙包裹水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心煎湯化下再服	別取猪心煎湯此方神効	龍腦地黃膏 <small>宣明方</small> 治小兒急慢驚風痰涎上潮心胸天	吊驚纏喉風小兒胃膈不利一切熱毒大有神効如病不愈與分肢散一二服吐利得快常服此藥	川大黃 <small>別搗</small> 甘草 <small>各半兩</small> 雄黃 <small>水蜜者一</small>	射香 <small>別研</small> 生腦子 <small>別研</small>	右五味各製了再入乳鉢內同研細煉蜜為膏油紙裹
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------

如有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如小兒大人睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服新汲水下大解暑毒如孕婦人常服永生男婦亦無疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉二錢龍腦許少水化下一丸杏核大小兒者年紀大小加減服立効

分肢散宣明方治小兒卒風大人眼喎斜風涎裏心驚癰天吊走馬喉閉急驚一切風熱等疾

芭豆出油兩半川大黃一兩朴硝半兩

右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油紙包起如有前患每服半錢熱茶下吐下頑涎立愈如小兒胃

驚風心法附錄卷之三

驚風

喉驚吊等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字吞下時上吐下瀉微瀉以吐利得快馬効大人半錢小兒一字者虛實加減只是一二服見効不宜頻服如吐瀉不定以葱白湯立効

○急慢驚風新增

附諸方

牛黃清心丸 治小兒諸病狂亂驚癰痰涎壅塞精神昏憤見中風

一方 治小兒口噤牙關不開諸藥不効者用天南星末一錢腦子少許研勻用紙蘸生薑自然汁

湛藥於左右大牙根上搽之便開

金箔鎮心丸和劑方治風痰壅熱心神恍惚急驚搐搦

紫荷車黑豆末煮山藥一兩甘草五錢

牙硝一錢人參五錢射香研半金箔十二片

龍腦一錢茯苓五錢朱砂研飛一

右為末煉蜜成劑每兩作五十九丸以金箔為衣每服一

丸薄荷湯下常服安心止驚散邪涼膈

抱龍丸 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍

木木生火謂生我者父母也肝為母心為子母安則子

安況心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸

驚風心法附錄卷之三

驚風

理嬰孩諸驚四時瘟疫邪熱以致煩燥不寧痰嗽氣急

瘡疹欲出發指並宜投此其藥性溫平不慳不燥常服

驅風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

琥珀 人參 天竺黃 檀香

白茯苓錢七甘草炙一兩枳殼枳實錢七

辰砂兩半白山藥八兩牛膽南星錢五金箔五十片

右各味為細末和勻取新汲水丸如芡實大陰乾用葱

白煎湯或薄荷湯痰壅救甚姜湯研化服

南星膏 治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭常服去

風退執消痰鎮心除百病

<p>牛膽南星 臘月黃牛膽將南星研和汁盛 內掛當風處乾用五錢炒</p>	<p>人參 白朮 山藥 白茯苓</p>	<p>伏神 去木 羌活 甘草 炙各 白僵蚕 去嘴</p>	<p>全蝎 去毒薄荷湯 辰砂 二錢才 射香 一字</p>	<p>右為細末入辰砂射香研勻煉蜜丸如芡實大金箔為</p>	<p>衣薄荷湯調化食後服</p>	<p>天麻丸 湯氏方 治急驚風四肢拘急壯熱口噤</p>	<p>天麻 雄黃 烏蛇肉 蟬殼</p>	<p>乾蝎 射香 細研 天竺黃 細研 桂心</p>	<p>天南星 白附子 膩粉 白芷</p>	<p>驚風 心法附餘卷之三 五</p>	<p>半夏 湯泡七次 各一分</p>	<p>右為末煮棗肉丸如棗豆大每服三五丸薄荷酒送下</p>	<p>珍珠丸 全嬰方 治小兒急驚風發搐涎潮壯熱及痰嗽擁</p>	<p>塞肚腹脹硬</p>	<p>白附子 炮 滑石 一錢 巴豆 十五粒 輕粉 一錢</p>	<p>天南星 一錢</p>	<p>右為末麵糊丸如棗豆大三歲一二丸葱白湯送下</p>	<p>一方加蝎尾 半錢炒</p>	<p>牛黃奪命散 拔毒方 治小兒肺脹喘滿胃高氣急兩脇扇</p>	<p>動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲亞不鳴痰涎潮塞</p>
-----------------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------

<p>俗云馬脾風若不急治死在朝夕</p>	<p>白牽牛 半生 黑牽牛 半生 熟 各一兩 川大黃 二兩</p>	<p>檳榔 半兩 廣木香 三錢</p>	<p>右為一處研作細末入輕粉少許每服二錢用蜜水或</p>	<p>漿水調下不拘時候微利為度</p>	<p>驅風膏 全嬰方 治小兒肝風筋脉拘急面赤目青眼驚搐</p>	<p>連剉及胎風</p>	<p>辰砂 蝎尾 當歸 草龍膽</p>	<p>川芎 山梔子 川大黃 羌活</p>	<p>防風 去芦 甘草 各一錢</p>	<p>驚風 心法附餘卷之三 五</p>	<p>右為末入射香少許煉沙糖丸如雞頭子大三歲一丸</p>	<p>薄荷竹葉蜜湯化下</p>	<p>瀉青丸 聖惠方 治小兒肝臟實熱手尋衣領亂捻物目直</p>	<p>視不搐得心熱則搐身反折強直目連剉或目內青或</p>	<p>臟腑發泄諸藥不止脾虛肝盛者 見丹毒</p>	<p>○廣按已上二方皆瀉肝經風熱之劑也夫小兒肝常</p>	<p>有餘脾常不足故急驚風乃肝氣有餘宜用瀉青丸</p>	<p>之類瀉之慢驚風乃脾氣不足宜用醒脾散之類補</p>	<p>之</p>	<p>大効疎風散 活幼方 治嬰孩小兒驚執疫風四證聚結於</p>
----------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	---------------------------------

胸臆之間令兒昏困沉重調發不通諸脉氣閉所以發  
默欲食不食欲起不起倦伏不知其證候者但不經吐  
利宜與服之立見甦省

錦文大黃 一錢半

鷄心檳榔 錢半 朴硝 半錢

黑牽牛 七分半

陳橘皮 錢半

右為末二歲兒服半錢蜜少許薄荷湯調下看大小加  
或服之

紅綿散 湯氏方 治夾驚傷寒

麻黃 去節

全蝎 炒

甘草

天麻

大黃 濕布

白附子

蘇木 炒各等分

驚風

心法附餘卷之三

天

三百六十六

右為末每服一錢水半盞煎服

全蝎觀音散

治慢驚慢驚者因久吐瀉而脾胃先虛脾

胃與肝母子也母虛亦令子衰二經俱虛則生頑涎頑

涎者脾肺所出也涎則溢流在於咽喉如水雞之聲時

復瘳癡是也此方主之

全蝎 去毒十

天麻 煨

防風

白芷

黃芪 蜜炙

甘草

茯苓 各二錢

人參 二錢

白扁豆 姜汁去皮

炒二錢半

右為細末用棗肉煎湯調勻不拘時候

烏蝎四君子湯

治小兒慢驚慢脾風吐瀉不止

人參

白朮

茯苓

甘草

川烏 去皮

失炮

全蝎 各等分

右咬咀姜三片棗一枚水一鍾煎五分食前服

理中湯 治小兒吐瀉手足厥冷加附子名附子理中湯

回陽

方見中寒

八仙散

湯氏方 治慢驚虛風

天麻

白附子

花蛇肉

防風 去芦

南星 炮

半夏 麩

冬瓜子

全蝎 各等分

右咬咀每服一錢水半盞姜棗薄荷煎服加川烏大妙

釀乳法

湯氏方

治慢驚睡多驚啼凡面黃脉細者難治

驚風

心法附餘卷之三

天

三百六十六

人參

木香

藿香

沉香

陳皮

神麩

麥蘖 各等分

丁香 減半

右咬咀每服四錢水一碗姜十片紫蘇十葉棗三枚砂

瓶內煮至半碗乳母食後捏妳汁服之即便臥霎時令

藥入乳之絡次令兒吮不可過飽亦良法也

吉州醒脾散

湯氏方

人參 去芦

橘紅

甘草 炙

白朮

白茯苓

全蝎 各半兩

木香

半夏 麩 各二錢

白附子 炮

陳倉米 二兩

南星 一箇

右為末每服一錢水半盞姜三片棗三枚煎服

本附湯 治慢脾風身弓髮直吐乳食睡汗流不

大附子 白朮 木香 肉豆蔻

甘草 右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗三枚煎服

○廣按此方用附子不必疑蓋小兒慢驚風皆由吐瀉

後脾氣大虛時作瘈瘲非若急驚搐搦之緊猛也此

方溫寒燥濕行氣健脾適合其宜

神効萬金丹 治小兒慢驚風急驚風十無一失

硃砂 研細末 真輕粉 研細末

右二味各等分不以多少用青蒿內重兒取出於淨磁

盆內將硃砂輕粉以重汁就成丸如黃米大量兒大小

加減服之半歲一歲小兒服一丸乳汁送下如取重時

法止於七月初五日取蒿重則靈驗

一方 治急慢驚風神効

硃砂 一分 輕粉 一分 姜蚕 七箇 炒 全蝎 三箇 去

右為細末用人乳汁調服 詩曰七箇姜蚕三箇蝎一

粒硃砂一片雪不論急風與慢風用時須用生人血

天麻防風丸 和劑方 治一切驚風壯熱痰盛驚怖

姜蚕 炒 半兩 天麻 防風

人參 各一兩 牛黃 一錢 研 全蝎 半兩 硃砂

雄黃 射香 甘草 天南星 人參 牛黃 天麻 防風

生珠膏 治急慢驚風

雄黃 射香 甘草 天南星 人參 牛黃 天麻 防風

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三丸薄荷湯化下

大天南星丸 和劑方 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上

視

天南星 牛膽 硃砂 腦子

人參 乳香 全蝎 射香 一錢 半

牛黃 天麻 防風 各二錢

右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸荊芥薄荷湯下

奪命散 治急慢驚風痰潮壅盛滯塞於咽喉間命

在須臾服此藥者無有不愈

驚風 硃砂 研細末 真輕粉 研細末

青礞石 通紅須消盡為灰候藥冷如金色取去研為

末 右為末急驚風痰發熱者薄荷自然汁入蜜調服慢驚

脾虛者以青州白丸子再碾煎稀糊入熟蜜調下神効

青州白丸子 方見中風

抱龍丸 治痰嗽驚風時作潮熱

牛膽南星 天竺黃 辰砂 雄黃 各二

射香 研 雄黃 各二

右為末煉蜜丸如芡實大甘草薄荷湯化下一丸

生珠膏 治急慢驚風

雄黃 射香 甘草 天南星 人參 牛黃 天麻 防風

天麻	二錢半	砂	二錢	姜	二錢	白附子	錢
全蝎	二十	黑附子	二錢	射香	半字	蜈蚣	一條
南星	一錢	花蛇	二錢	右為末和勻煉蜜丸如雞頭大每服一丸金銀箔薄荷湯化下			
右為末和勻煉蜜丸如雞頭大每服一丸金銀箔薄荷湯化下							
湯化下							
○廣按用附子者熱則流通痰火之理也							
太青膏	錢氏方						
全蝎尾	去毒生	砂	一	青黛	一錢		
天麻	一錢	天竺黃	一字	白附子	生一	射香	一字七
烏梢蛇肉	酒浸焙乾						
驚風	心法附餘卷之五						
右為末蜜和成膏每服一丸如皂角子大同牛黃膏溫薄荷湯化一處服之五歲以上同甘露散服方見中昂							
牛黃膏	聖惠方						
治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽止煩							
甘草末	二錢	雄黃	一錢	川甜硝	二錢	菴豆粉	半兩
寒水石	別研	片腦	二錢	鬱金末	一錢		
右研勻煉蜜和成膏薄荷水化半皂角子大食後							
辰砂保命丹	秘方						
射香	一錢	南星	炒	白附子	炮	砂	各半兩
治小兒驚風							

右件為末用端午午時火為定用金箔點號若急驚薄煎湯下慢驚荊芥湯化下熱驚薄荷湯下風驚荊芥湯下							
備急丸	應驗方						
治急慢驚風							
右以五月五日取地龍數條用竹刀分中截作兩段看地龍跳得急者慢者各另一處研爛用砂末同研和勻得所丸如小菴豆大急驚用急跳者慢驚用慢跳者用金錢薄荷湯送下量大小加丸數如合藥後分明寫記急慢各另包裹收貯							
愈風丹	儒門事親方						
治大人小兒一切諸風							
芍藥	川芎	白殭	炒	桔梗			
驚風	心法附餘卷之五						
細辛	去葉	羌活	各半兩	麻黃	去節	防風	去芦
白芷	天麻	全蝎	各一兩	甘草	三錢		
天南星	半兩	砂	半兩				
右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下							
全蝎散	直指方						
治小兒驚風							
人參	陳皮	各一		全蝎	炙三	甘草	炙半
南星	三錢						
右咬咀每服一錢水半鍾紫蘇姜棗煎服有熱加防風砂丸							
宣明方							
治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利							

取驚積

硃砂

天南星

芭豆霜各半

右為末麵糊和丸黍粒大有病虛實大小每服二丸或天吊戴上每服四五丸薄荷水下立愈

珍珠丸宣明方治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭豆霜

膩粉各二錢

滑石三錢

天南星

粉霜各二錢

蝎稍

續隨子去皮各二錢

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小兒二歲以下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十丸茶湯下

荊芥湯亦得量虛實加減

驚風

心法附錄卷之三

四

三

四

祛風羌活散 散風邪止驚搐退肌熱

羌活

粉草

天麻

茯苓

川芎

荊芥穗

白僵蚕炒

白朮

白附子

地各桔梗二錢

防風一錢

全蝎半錢去

硃砂

天南星

炮熟

右為細末薄荷湯調下 如傷風鼻塞流涕葱白湯下

喘救氣促存白皮湯調下 若常服白湯亦可

真珠天麻丸

驚風痰熱壅盛及撮口

南星

天麻

白附子

地各巴豆霜十七箇去油

全蝎

滑石

防風

半夏各一錢炒

右為細末麵糊丸如小豆大百草霜為衣每服五六十丸淡姜湯下

至聖保命丹 胎驚吊眼目上視手足抽掣角弓反張痰

盛急慢驚風

全蝎十四枚

防風五錢

白附子炮

南星炮

蟬蛻去土

僵蚕直者各一兩

天麻五錢

硃砂

射香各一錢

金箔十片

右為末後入硃砂射香和勻以粳米飯為丸如芡實太

每服一丸金錢薄荷煎湯化下急者二丸

青珠丸 急慢驚風痰熱往來

驚風

心法附錄卷之三

五

六

七

天麻

半夏

南星

白附子

川烏

乾蝎頭尾全

姜蚕十枚

青黛一錢

羌活

硃砂七枚

右用研入巴豆七粒去油研勻麵糊為丸如黍米大每服五丸金錢薄荷湯下 如驚睡瀉得青色是驚積白

色是疳積赤色是熱積

安神散 治搐搦

用全蝎四箇糖水浸一宿南星大者一箇開一穴入蝎

在內以南星末蓋其口用麵裹火煨令赤色取出放地

坑土宿去南星用蝎為末每服一字磨刀水調下

犀角散 虛風有涎胃氣弱或吐乳喉中作聲

酸棗仁 麥門冬 人參 白附子

茯苓 二錢 各 硃砂 一錢

右為細末每服半錢磨犀角湯下日二服此藥壓驚退

熱安心定神

睡驚丸 和劑方 治心蘊邪熱怔忡不安睡中驚啼風痰壅

盛

茯苓 去皮 鐵粉 蛇黃 南星 炮

史君子 半兩 腦子 半兩

右為末糯米糊丸如皂莢子大朱砂為衣薄荷湯調下

驚風 心法附餘卷之三

安神丹 治小兒心神不寧困卧多驚痰涎壅盛

硃砂 人參 各二錢 乳香 半兩 各 酸棗仁 炒去

遠志 錢半

右為末蜜丸如榛子大金箔為衣每服一丸人參湯化

下

寧眠散 御藥院方 治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星 炮製 人參 去芦 白附子 炮各 乾蝎 二十箇

乾赤頭蜈蚣 一條 酒浸 乳香 血竭 各二錢 半

右為末每服一字用水酒少許浸薄荷酒下

寧心膏 金匱方 治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭如

人將捕眠睡驚驚常服鎮心除百病

人參 去芦 白朮 白茯苓 皮 茯神

山藥 羌活 甘草 各一錢 硃砂 一錢

腦麝 各一

右為末煉蜜丸如雞頭大一歲一丸薄荷湯化下

○五疳五軟 新增

附諸方

蘆薈丸 湯氏方 治脾胃積熱遂成疳疾宜服此藥

黃連 去鬚 龍膽草 蕪荑 各一兩 去皮 先炒黃

赤

五疳 心法附餘卷之三

右各件為末別入蘆薈末二錢半和勻飯飲丸如黍米

大隨大小人加減空心米湯下

驚甲散 湯氏方 治疳勞骨蒸

驚甲 九筋者沸湯浸洗 黃芪 蜜炙 白芍藥 各一

生熟地黃 當歸 去芦 人參 去芦 各 地骨皮 兩

右咬咀每服二錢水半盞煎服不拘時

猪肚丸 湯氏方 治骨蒸疳癆肌體黃瘦

木香 半兩 宣黃連 生地黃 銀州胡

驚甲 九筋者沸湯浸洗 青皮 各一

右為末猪肚一枚入藥於內麻繩纏定於沙鍋內懸泡



煮熟取出細研壯子為丸如麻子大米飲下大小加減不拘時

大胡黃連丸 湯氏方 治驚疳腹脹虫動多睡肌體黃瘦五

心煩熱

胡黃連

黃連

苦練子各一兩

白燕羹

去皮半兩

乾蟾頭

二錢半 燒存性

蕭薑各半

射香

二錢

青黛

一兩

右將前四味為末猪膽汁和為劑每一胡桃大入巴豆仁一枚在內却用油單紙一層裹之蒸熟又入後四味

糊丸如麻子大每服十四五丸清米飲下食後時

五疳

心法附餘卷之三

四

本方

日三服

龍膽丸 和劑方 治小兒疳發熱

龍膽草

去芦

黃連

史君子

去核

青皮

各一錢

右為末猪膽汁丸如蘿蔔子大每服二十丸以意加減

臨卧溫水下

胡黃連丸 直指方 治小兒熱疳

胡黃連

川黃連

各半兩

硃砂

二錢半 另別

右為末入猪膽內繫定虛懸於銚中煮一時又取出入

蘆薈青黛各二錢半去足蝦蟆灰二錢射香少許粳米

飲丸如麻子大每服十九丸米飲湯下

九疳 湯氏方 治小兒五疳

蕭薑

燕羹

去皮

青黛

各二錢半

真射香

少許

檳榔

宣連

各二錢半

胡黃連

半兩

猪膽

一箇

蟬殼

二十箇

右為末猪膽丸如麻子大每服五十丸飯飲吞下

肥兒丸 和劑方 治小兒疳病夫小兒疳病者多因闕乳喫

食太早以致脾胃受傷虛而生濕濕而生熱熱太甚

所以生虫日漸羸瘦腹大髮堅不能行步面黃口臭發

熱面無精采此藥殺虫退熱進食

神麴

炒

黃連

各一兩

麥藥

炒

肉豆蔻

煨

五疳

心法附餘卷之三

四

本方

史君子

各半兩

檳榔

木香

各二錢

右為細末猪膽汁并麴糊為丸如粟米大每服四五十

丸用米湯送下食前服

揭丸 子瑞作堂方 治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消

心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癢

乳癖瘰癧痞結積聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳

食及瘰癧五腫疳疾八種痢疾肌肉消瘦氣麓腹大神色

昏憤情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑進飲食生肌

肉悅顏色功效非常不能盡述

蘿蔔子

一兩

陳皮

去白

青皮

去白

三稜

炮

蓬木 <small>炮各半兩</small>	黑牽牛 <small>二錢半</small>	胡椒 <small>二錢</small>
木香 <small>一錢半</small>		
右為末麴糊和丸如菜豆大空心用蘿蔔子煎湯送下		
或生薑湯亦可量見大小加減丸數		
○廣按此藥緊峻去病有功病退則已不可過服恐傷正氣		
蘆薈丸 <small>和劑方</small>	治疳氣羸瘦面色痿黃腹脹滿頭髮作穗捺鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來目澀口臭	
大皂角	乾蝦蟆 <small>已上等分同燒存性</small>	
五疳 <small>心法附餘卷之五</small>	射香 <small>錢各一</small>	
青黛 <small>二錢</small>	蘆薈	
右研勻湯浸蒸餅和丸如麻子大每三歲兒服二十九		
不計時米湯下量大小加減服		
史君子丸 <small>和劑方</small>	治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時作疳痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之	
史君子 <small>去皮厚朴製</small>	陳皮 <small>去白</small>	川芎 <small>各二錢半</small>
右為末煉蜜為丸如皂子大三歲一丸陳米飲化下		
○廣按此方用藥平和可以久服		
六神丸 <small>全製方</small>	治小兒疳氣消瘦臟腑怯弱泄瀉虛滑乳食減少飲食無度心腹脹滿	

木香	丁香	肉荳蔻 <small>炮裂</small>	訶子 <small>炮去核</small>
史君子 <small>各半兩</small>		蘆薈 <small>一兩</small>	
右為末棗肉和丸如菜豆大三歲三十九米湯下			
○廣按疳本濕熱宜用苦寒藥今此方用苦溫藥何也			
殊不知疳久泄瀉虛滑則為濕寒宜用苦溫藥本草云苦寒去濕熱苦溫去濕寒是也			
大蘆薈丸 <small>發明</small>	治疳殺虫和胃止瀉		
胡黃連	黃連	蘆薈 <small>研</small>	木香
白蕪荑	雷丸	青皮 <small>去白</small>	鶴虱 <small>微炒各半兩</small>
右為細末粟米飯和丸如菜豆大米湯送下二十九無			
五疳 <small>心法附餘卷之五</small>			
時			
傑聖丸	治小兒疳病通用		
蘆薈	五靈脂	好夜明砂 <small>砂仁</small>	
陳皮	青皮	莪朮 <small>煨</small>	木香
史君子 <small>各一錢</small>	黃連	蝦蟇 <small>日乾吳焦</small>	
右為末用雄猪膽二枚取汁和藥調勻為丸麻子大每服十五丸米飲送下			
大蘆薈丸	治諸疳		
蘆薈	蕪荑	木香	青黛
檳榔	黃連 <small>炒各二錢半</small>	蟬殼 <small>二十枚</small>	胡黃連 <small>半兩</small>

射香

右為末猪膽汁一枚取汁浸糕為丸麻子大每服二十丸米飲下

黃連丸 治疳疾

黃連半兩 燕薹去皮 史君子洗淨研

右為末用雄猪膽丸如菉豆大每服二十九丸米飲空心送下

蘆薹丸 治疳殺虫

蘆薹半兩 史君子焙 三稜生 石榴皮焙

草龍膽生各苦練根焙少

五疳心法附餘卷之五

右為細末麵糊丸如蘿蔔子大每服五丸量大小加減米飲送下疳熱麥門冬湯下

布袋丸 治諸疳疾面黃腹大飲食不潤肌膚

夜明沙揀淨 燕薹炒去 史君子肥白者微炒

白茯苓去皮 白朮無油者 人參去芦 甘草

蘆薹細研各

右為細末湯浸蒸餅和丸如彈子大每用一丸以生絹袋盛之次用精猪肉二兩同藥一處煮候肉熟爛提取藥於當風處懸掛將所煮肉并汁令小兒食之所懸之藥第二日仍依前法煮食只待藥盡為度

六神丸 治諸疳

木香黑紙 黃連去鬚 神麴 川練子肉

燕薹等分

右為細末以雄猪膽蒸熟為丸如麻子大每服三四十丸量大小加減米飲送下

肥兒丸 疳病蒸熱腹脹滿面色萎黃飲食遲化大小便澀滯

麥蘖炒 川黃連 大燕薹 神麴炒

胡黃連各半

右為末以雄猪膽汁丸如麻子大每服二十九丸食前米飲送下乳母忌食酒麵生冷

五疳心法附餘卷之五

如聖丸 冷熱疳瀉

胡黃連 川黃連 燕薹 史君子各二兩

射香研五分 乾蝦蟆五箇剉碎

右為末以蝦蟆膏子丸如麻子大每服三十丸人參湯送下

肉棗丸 因疳而瘡侵入口鼻

用肉棗二枚去核入青礬如核大在內以火煨存性為末入射香少許清油調塗

煮肝散 疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙

蛤粉

殺精草各一

右為末每服一錢五七歲以上二錢用雄豬肝如是太

一片批開糝藥在內攤勻以麻紫定米泔水半碗煮肝

熟撈出肝傾湯碗內董眼分肝作三次嚼食仍用肝湯

嚥下日三服不拘時如大人雀目空心服至夜便見物

如患目久不効日作二服見効

小茸丸

幼幼方

治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸

川牛膝

肉苁蓉

木瓜

杜仲

兔絲子

當歸

熟地黃

天麻

青鹽

各等分

五海

心法附錄卷三

五海

三五五海

右為末用煉蜜為丸如菜豆大鹽湯溫酒化下皆可

羚羊角散

幼幼方

治小兒面紅唇白肌熱項軟

熟地黃

酒浸

白茯苓

羚羊角

酸棗仁炒

虎脛骨

酒炙

肉桂

防風

甘草

各等分

右為末溫酒鹽湯化下皆可

羚羊角丸

楊氏方

治小兒五六歲骨氣虛筋脉弱不能行

者

羚羊角屑

白茯苓

去皮

防風

去芦

虎脛骨

酒炙

酸棗仁

炒

生苧

各半

黃芪

桂心

當歸

各二錢半

右為末煉蜜丸如菜豆大食前以溫酒研破三五丸服

吐瀉痢

新增

附諸方

觀音散和劑方治小兒外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不

進乳食

石蓮肉

炒去心

白扁豆

一錢

茯苓

一錢

人參

去芦

神麴

炒二錢

白芷

綿黃芪

木香

甘草

各一錢

全蝎觀音散

和劑方

治小兒外感風冷內傷飲食脾胃受

傷嘔逆吐瀉不進乳食久則漸漸羸瘦大抵脾虛則瀉

胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進

飲食及治吐瀉致虛將成驚風

石蓮肉

人參

去芦

白扁豆

各一錢

全蝎

天麻

木香

甘草

各一錢

羌活

防風

去芦

白芷

黃芪

各半

神麴

錢

白茯苓

去皮

七

右為末每二錢乳汁調服或咬咀每服五錢用水一盞

棗子煎服

人參白朮散

錢氏方

治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不

止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困  
失治變成風癰不問陰陽虛實並宜服之

人參去芦 白朮 白茯苓去皮 木香

藿香去土 甘草各五分 乾葛一錢

右以咀用水一盞煎至半盞去滓溫服

異功散錢氏方 溫中和氣治吐瀉不思食凡治小兒虛冷

病先於數服以正其氣

人參去芦 白朮 白茯苓去皮 甘草炙去皮

橘紅各一錢

右用水二盞生薑三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

醒脾散集成 治小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沉默默

不食

木香 天麻 人參去芦 白茯苓去皮

白朮 甘草炒 白僵蚕炒 白附子各半錢

全蝎二分半炒

右用水一盞生薑三片棗子一枚煎至七分去滓溫服

辰砂益元散應驗方 治小兒中暑吐瀉小便赤少夜卧不

寧心煩作渴常服寧心解熱

益元散一兩 辰砂一錢

右研勻每服五錢用燈心竹葉湯調服如嘔吐生薑湯

調服

黃連香薷飲全嬰方 治小兒陰陽不順清濁相干霍亂吐

瀉體熱煩燥昏冒多渴

厚朴去皮姜製 黃連二味與生薑汁拌炒五分

香薷三錢

右以咀一服用水一盞酒半盞煎至七分去滓水中頓

冷服

一方加白匾豆炒七分半

黃龍丸全嬰方 治小兒中暑吐瀉胃悶煩渴昏迷身熱有

痰

半夏二兩以米醋升乾炒 白茯苓 甘草各半兩

右為末生薑汁煮麵糊為丸如小豆大每服二十九煎

生薑燈心湯送下量大小加減丸數

五苓散全嬰方 治大人小兒中暑伏熱煩渴身熱頭痛霍

亂吐瀉小便赤少心神恍惚

澤瀉一錢 白朮一錢五分 猪苓一錢 肉桂一錢

赤茯苓半錢

右為細末每服一錢熱湯調下不拘時服加辰砂名辰

砂五苓散去辰砂加生料平胃散用蒼朮橘皮甘草厚

朴二方共一處生薑棗子同煎各冒茶散

<p>香朴飲子 <small>集成</small> 治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚壯</p> <p>人參 <small>七片</small> 白茯苓 <small>去皮甘草炙去</small> 熟蘇</p> <p>木瓜 澤瀉 香薷 半夏麴</p> <p>白扁豆 陳皮 <small>去白</small> 烏梅 厚朴 <small>各四</small></p> <p>右用水一盞煎至七分去滓溫服</p> <p>玉露散 <small>一名甘露飲</small> 治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥體熱頭疼或伏熱吐瀉亦作傷風體熱煩渴</p> <p>石膏 寒水石 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p> <p>右為細末每服五錢灯心湯調下暑熱冷水下吐不止</p> <p>生薑湯下</p>	<p>吐瀉 <small>心法附錄卷之五</small> 吳 治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止</p> <p>人參 <small>一兩</small> 茯苓 <small>二兩</small> 生犀 桔梗 <small>各二錢</small></p> <p>甘草 乾葛 <small>各半</small></p> <p>右為末每服用二大錢水一鍾加入灯心五莖同煎至六分溫服無時煩渴者以新竹葉湯下量年紀加減服內散散 調氣進食止瀉嘔</p> <p>木香 人參 白木 茯苓</p> <p>甘草 茯神 <small>各等</small> 藿香 <small>微半</small></p> <p>右為末每服一錢米飲調下</p> <p>益黃散 <small>錢氏方</small> 治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛並</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>治之</p> <p>丁香 <small>四錢</small> 訶子 <small>炮去</small> 青皮 <small>去白各一兩</small> 甘草 <small>炙</small></p> <p>陳皮 <small>二兩</small></p> <p>右為末每服二錢水半盞煎食前服</p> <p>藿香散 <small>經劑方</small> 治小兒吐瀉嘔逆身熱面青不進乳食</p> <p>藿香 <small>一錢</small> 丁香 人參 白木</p> <p>茯苓 神麴 匾豆 <small>各半</small></p> <p>右為末每服半錢白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下</p> <p>硃沉煎 <small>按方</small> 治小兒嘔吐不止</p> <p>硃砂 <small>二錢</small> 沉香 <small>二錢</small> 藿香 <small>二錢</small> 滑石 <small>半兩</small></p> <p>吐瀉 <small>心法附錄卷之五</small> 吳 治小兒嘔吐不止</p> <p>丁香 <small>十四</small></p> <p>右為細末每服半錢用新汲水一盞芝蔴油點成花子炒藥在上須臾墜濾去水却用別水送下</p> <p>助胃膏 <small>湯氏方</small> 治小兒冷氣入胃嘔吐不已</p> <p>白豆蔻 <small>十四箇</small> 木香 <small>炮二</small> 縮砂仁 <small>四十箇</small> 乾山藥 <small>兩</small></p> <p>肉豆蔻 <small>四箇</small> 人參 <small>去芦</small> 白木 白茯苓</p> <p>甘草 <small>炙各半兩</small></p> <p>右為末每服一錢陳熟蘇木瓜湯調下 一方煉蜜為丸如芡實大一歲一丸米湯調下</p> <p>訶子湯 <small>湯氏方</small> 治瀉寒泄瀉</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

訶子 <small>同或</small>	人參 <small>去</small>	白茯苓 <small>去皮</small>	白朮 <small>各一兩</small>
木香 <small>炮</small>	陳皮 <small>去白</small>	甘草 <small>炙</small>	肉豆蔻 <small>各半兩</small>
右為末每服二錢水一盞姜三片煎半盞溫服寒甚者加附子			
白朮丁香丸	水瀉脾虛飲食不進水穀不化		
白朮 <small>不油者二錢半</small>	半夏 <small>錢半湯泡七次</small>	丁香 <small>半錢</small>	
右為細末用生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子大十歲上下可服二十五丸七八歲二十九五六歲十四五九二三歲十丸週歲五七丸用姜湯或米湯無時送下一服不止日進二服新洩一服見効舊洩三服即止			
痢症 <small>心法附錄卷之三</small>			
乳豆 <small>馬豆</small>	治小兒傷冷泄瀉滑腸不禁面青腹痛		
肉豆蔻 <small>三箇</small>	乳香 <small>二錢</small>		
右為末麵糊為丸如菉豆大湯下三十丸			
熟霜丸	治宿滯不化胸腹痞滿泄瀉如痢當以藥推利		
杏仁 <small>五十箇去皮尖別研</small>	黛赭石 <small>研一兩</small>		
芭豆 <small>去皮心腹油炒</small>	赤石脂 <small>一兩</small>		
右研勻湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以上服三丸以乳汁或米飲下			
玉餅子	吐瀉驚疳乳食不消肚脹潮熱咳嗽急慢驚風及痢疾		

半夏 <small>大者十箇</small>	巴豆 <small>五十粒去</small>	滑石
寒食麵 <small>兩</small>		
右為末滴水丸如菉豆大捏作餅每服五七餅或八九餅或十一二餅姜湯送下看大小加減一方加輕粉		
木香檳榔丸	治小兒初得痢疾赤白相雜裏急後重方見痢疾	
○廣按小兒痢疾皆因感寒停積飲食所致初得一二日間元氣未虛宜用此丸與玉餅子分寒熱利之日子既久涉虛宜用香連丸木香散之類和之繼用豆蔻香連丸水煮木香丸之類服之		
香連丸 <small>心法附錄卷之三</small>	治冷熱不調下痢赤白裏急後重方見痢疾	
胃風湯	治風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉不利腸鳴痞痛或下如荳汁或頻下瘀血方見胃風	
木香散 <small>經方</small>	治諸瀉痢日久不安並皆治之	
白朮 <small>用</small>	麥芽	木香
當歸	陳紅 <small>各一錢同</small>	茯苓
神麴	甘草	青皮 <small>各二錢</small>
右為末每服半錢或二錢白湯調下一方用紫蘇木瓜湯調下		
劑方	治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之	

<p>氣客於腸闌下痢赤白腹內疝痛日夜頻併不欲飲食</p> <p>黃連<small>錢五分</small> 肉蔻<small>二箇</small> 木香<small>半兩</small> 丁香<small>二錢</small></p> <p>訶子<small>炮去核</small></p> <p>右為細末粟米粥和丸黍米大每服三十九丸米湯下大</p> <p>小加減丸數</p>	<p>水煮木香丸 治下痢赤白裏急後重</p> <p>真人養臟湯 治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏</p> <p>急後重臍腹絞痛並皆治之 並見痢疾</p> <p>木香散<small>湯氏方</small> 治冷痢腹痛不食</p> <p>木香<small>錢半</small> 厚朴<small>錢半</small> 白朮<small>錢半</small> 龍骨</p> <p>痢症<small>心法附餘卷之五</small></p> <p>當歸<small>淨洗焙</small> 乾姜<small>炮</small> 訶子肉<small>各二錢半</small></p> <p>右為末水半盞姜三片煎服隨大小加減</p> <p>一方 治休息痢及疝瀉日久不能安者 湯氏方</p> <p>用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內溶以雞子</p> <p>拌和炒熟空心食之</p> <p>赤石脂散<small>錢氏方</small> 治因瀉痢後肛門不收</p> <p>真赤石脂<small>剉去土</small> 伏龍肝<small>各等分</small></p> <p>右為末每用半錢傳腸頭上頻用</p> <p>又方 治瀉痢後脫肛</p> <p>用陳槐花不拘多少為末陳米湯調下</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>霍亂湯 治內傷生冷外感風寒增寒壯熱或發寒熱</p> <p>方見霍亂類</p> <p>草菓飲<small>張氏方</small> 治發瘧寒多熱少或遍身浮腫者</p> <p>厚朴 青皮<small>去白</small> 草菓 藿香</p> <p>半夏<small>麴</small> 甘草<small>炙</small> 丁香皮 神麴<small>炒</small></p> <p>良姜<small>各等分</small></p> <p>右以咀每服二錢水一盞姜三片菓一枚空心煎服</p> <p>○廣按以上二方治小兒瘧疾寒多熱少無汗者</p> <p>清脾湯 治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱 方見瘧類</p> <p>常山飲<small>張氏方</small> 治一切瘧疾</p> <p>痢症<small>心法附餘卷之五</small></p> <p>常山<small>一錢</small> 人參 草果 知母</p> <p>甘草 厚朴<small>姜汁製一宿</small> 貝母</p> <p>半夏<small>麴</small> 茯苓<small>各五</small></p> <p>右以咀每服二錢水半盞姜三片菓一枚空心煎服忌</p> <p>雞肉牛肉諸般毒食</p> <p>○廣按已上二方治小兒瘧疾熱多寒少有汗者</p> <p>鬼哭飲<small>湯氏方</small> 治瘧疾久未愈者</p> <p>常山 犬腹皮 茯苓 薑甲<small>醋炙</small></p> <p>甘草<small>炙</small></p> <p>右為末用桃柳枝各七寸同煎臨發時服之略</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



不妨

露星飲湯氏方治久瘧成勞

秦艽去芦 白朮

柴胡去芦 茯苓

半夏麩

檳榔

黃芩

常山

甘草

官桂各等分

右咬咀每服三錢酒醋各一盞姜一片煎露一宿次早服

○感冒四氣新增

附諸方

麻黃湯錢氏方治傷寒發熱咳嗽喘急

外感

麻黃去根節剉

肉桂去粗皮 甘草一錢

杏仁四錢去皮尖

右咬咀每服四錢水一盞煎服有汗不宜服

人參羌活散和劑方

羌活

白獨活

柴胡去芦

川芎

人參

甘草炙

白茯苓各一兩

前胡

桔梗去芦

地骨

天麻酒浸焙

枳殼去穢

右咬咀每服二錢水半盞姜一片薄荷一葉棗半枚煎服

瘡疹未發亦可服

解肌湯湯氏方治傷寒發熱心煩燥渴

麻黃去節半兩或

人參

芍藥

獨活各半兩

川芎

前胡各二錢

右咬咀每服二錢薄荷一葉姜一片水半盞煎服

七寶散湯氏方治感冒寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇葉

香附子炒去毛

橘皮

甘草

桔梗

白芷

川芎各一兩

加麻黃半兩

右咬咀每二錢水一盞姜一片棗半枚煎服

參蘇飲和劑方治感冒發熱頭疼或因痰飲凝結為熱此藥解肌退熱寬中快膈止嘔吐開胃進食

紫蘇葉

乾葛

半夏製

前胡去苗

外感

人參去苗

白茯苓各六分

枳殼去穢

桔梗去芦

陳皮各四分

一方加水香少許

右用水一盞生薑三片棗一枚煎溫服

不換金正氣散和劑方治四時傷寒感冒風濕瘧疫時氣

頭疼壯熱或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢亦宜服之

厚朴製 藿香去土 甘草炙 半夏製

蒼木製

陳皮各八分

右用水一盞姜三片棗子一枚煎至半盞溫服

黃連香薷散 治伏暑發渴或作瘧痢並宜服之方見中

傷寒 方見驚風

金沸草散 治風化痰除頭目昏痛項頸強急往來

寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠

粘及時行寒痰壯熱惡風

旋覆花

去梗

前胡 各七

荆芥 一錢

麻黃 七分

甘草 炙

半夏 製

赤芍藥 各二分

右用水一盞生薑三片棗子一枚煎至八分溫服

薄荷散

湯氏方

治熱極生風痰涎壅盛

薄荷葉 半兩

羌活

全蝎

白附子 炮

麻黃 去節

甘草 一分

天竺黃

白附子 炮

姜蚕 各二分

麻黃 去節

外感

心法附餘卷之三

六

六

六

右為末每服一錢水半盞煎服加竹葉少許尤妙

華蓋散

治肺感寒邪咳嗽鼻塞聲重

方見咳嗽

潤肺散

和劑方

治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母 麩炒

杏仁 各二兩

去皮麩炒

麻黃 去根

甘草 一兩

人參 各二兩

阿膠 炒半兩

陳皮 二錢

甘草 一兩

桔梗 半兩

右咬咀每服二錢水一盞食後煎服

人參散

經方

治咳嗽發熱氣喘吐紅

人參

天花粉 各等分

右為末每服半錢蜜水調下

百部丸 湯氏方 治小兒感寒咳嗽

百部 炒乾

麻黃 去節各二錢

杏仁 四十箇 去皮尖

右為末煉蜜丸如芡實大熟水化下

一方加松子肉五十粒同杏仁入沙糖為丸噙化尤妙

瀉肝散

錢氏方

治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮

地骨皮 各一兩

甘草 炙二分

右為末每服四錢水一盞粳米同煎食後服

補肺散

錢氏方

治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠 兩半

牛蒡子

甘草 各半

馬兜鈴 半兩

杏仁 七箇 去皮尖

糯米 四兩

內傷

心法附餘卷之三

六

六

右為末每服四錢水一盞煎至二分食後服

流金丸

全要方

治小兒咳嗽痰盛

半夏 一錢

白礬 各二錢

寒水石 各六錢

硃砂 一錢

雄黃 一錢

右為末麵糊為丸菴豆大生薑湯下每服二十九大小

加減丸數

雄黃丸

治小兒諸般咳嗽鹽醋等啖無治大人

雄黃 五錢

半夏 一兩

人言 明者

明礬

巴豆 一兩

右用明礬火化開入信末同枯乾再研為末再炒成砂

同前藥為末和勻麵糊丸如粟米大每服三十九大小  
加減臨睡桑白皮湯冷送下或冷茶湯下亦可

升麻葛根湯錢氏方治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢  
體煩疼及瘡疹未發疑似之間並宜服之

升麻 白芍 甘草各一錢 葛根 二錢  
右用水一盞煎至半盞去粗稍熱服日二三服

柴胡升麻湯和劑方治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼口  
燥咽乾心胃煩滿寒熱往來咳嗽痰盛涕唾稠粘

柴胡去苗 前胡去苗 乾葛 石膏  
赤芍藥各七分 升麻二分 桑白皮微炒 黃芩各四分  
內傷心法附餘卷五 李八

荆芥五分  
右咬咀作一服水一鍾半煎八分食後服

人參前胡湯湯氏方治小兒感冒發熱治瘧加地骨皮去土  
前胡一錢四分 柴胡去苗 半夏湯泡 黃芩

人參去芦 桔梗去芦 甘草各七分  
右用水一盞生薑三片棗子一枚煎至半盞溫服

柴苓散湯氏方治腹中伏熱候如溫狀  
柴胡去苗 麥門冬去心 人參去芦 赤茯苓去皮

甘草各一錢 黃芩去芦  
右用水一盞入小麥二十粒青竹葉七片煎服

地骨皮散集成治虛熱潮作治傷寒壯熱

知母 柴胡去苗 甘草去皮 人參去芦  
地骨皮去土 赤茯苓去皮 半夏湯泡

右用水一盞生薑三片煎至半盞去滓溫服  
加減建中湯湯氏方治傷寒發熱自汗虛煩

熟地黃 甘草炙 人參各半 黃耆各二兩  
白芍藥三兩

右咬咀每服二錢水半盞煎服  
田方導赤散拔萃方治小兒傷寒煩熱小便赤色大便褐

色面赤  
內傷心法附餘卷五 李九

生地黃 木通 甘草各等分  
右為末每服四錢水一小鍾竹葉三五片同煎溫服

益黃散拔萃方治小兒客熱在內不思乳食宜服導赤散  
次服此藥方見小兒吐瀉

柴苓湯 治小兒傷寒煩熱小便赤色大便褐色面赤  
柴胡去苗 半夏 人參 黃芩

甘草 白朮 茯苓 澤瀉  
猪苓各五分 桂三分

右咬咀水一盞生薑三片煎至半盞去粗溫服無時  
三黃犀角散湯氏方治臟腑熱秘

犀角屑

大黃酒蒸

釣藤

梔子仁

甘草

黃芩各半

右為末看兒大小加減熱湯調服

○廣按小兒多有驚熱因外感風寒內傷乳食而鬱熱發於外鼻塞者是因外感而發以麻黃湯人參羌活湯以後之類治之鼻不塞者是因內傷而發宜升麻葛根湯紫胡升麻湯以後之類治之

○蟲痛疝氣新增

附諸方

化蟲散 治嬰孩小兒蛔厥腹痛 幼幼方曰蛔厥多似

慢驚但唇口紫者是蛔厥

湯氏曰每月初五日已前

蟲頭向上可取已後可安

雷丸三錢

史君子去殼鶴虱三錢

甘草

大黃各三錢

右為細末用猪肉煮汁調空心服大者二錢小者一錢

檳榔遣虫散 治嬰孩蛔虫咬心吐涎疼痛惡哭不止

檳榔炒存性

鶴虱

貫衆

乾漆炒存性

蕪荑

川練子

史君子肉

雷丸

雄黃

黃丹炒

錫灰炒不見星如灰

木香各錢

巴豆

去皮心油十箇輕粉一錢

右為細末酒煮糊丸如黍米大五更早用猪肉葱油

將肉細嚼莫吞引虫頭向上吐去肉用猪肉汁調化

散送服檳榔丸至已時取下虫積可進食五歲可服七

分十歲服一錢大人亦可服

化虫圓和劑方 治一切疳虫攻刺心腹疼痛不已叫哭合

眼

胡椒炒

鶴虱

檳榔

苦楝皮各五錢

白礬枯一分半

右為末麵糊丸如麻子大量兒大小加減米飲下

靈礬散錢氏方 治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂末二錢

白礬火枯半錢

右為末每服二錢水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈

安虫散錢氏方 凡虫不可盡去宜安之

檳榔

胡粉炒黃

川練子去皮

鶴虱炒黃各二兩

白礬枯過二錢半

右為末每服一錢溫米飲調下

川練丸錢氏方 治上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆炒烟出盡

雄黃二錢

巴豆霜一錢

右為末麵糊丸如黍米大看兒大小與服取東向石榴

根煎湯下痛者煎有子苦楝根湯下或無羹湯下亦可

蕪美散 錢氏方 治諸虫作痛

白蕪美 去屑 乾漆 各等分

右為末每服二錢米飲調下臨發時服

化虫丸 湯氏方 治因疳生虫五心煩熱

蕪美 黃連 神麴 麥藥 各等分

右為末麵糊丸如黍米大空心米飲下

三稜散 湯氏方 治積氣肚痛

縮砂仁 甘草 益智 三稜

我木 青皮 各等分

右為末白湯點下

治疝氣方 湯氏方

芫花 醋浸 木香 檳榔 三稜 各等分

附子 炮 茯苓 去皮 青皮 去白 全蝎

肉桂 硃砂 各二錢

右為末將硃砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和糖

醋打麵糊丸如菉豆大每服三十丸空心溫酒下未効

再服

一方

小兒心痛欲絕一時無藥可察急用艾灸足大拇指中

男左女右

小兒疝痛可灸足大拇指甲後以韭菜聚毛間名大敦

穴男左女右

積聚癖塊 新增

附諸方

快膈消食丸 集成 消食積

縮砂仁 橘皮 京三稜 我木

神麴 麥芽 各半 香附子 各一兩

右為末麵糊丸如麻仁大食後白湯下隨大小加減

紫霜丸 治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心便

利不調乳食減少又治傷寒傳裏大便酸臭乳食不消

積聚 或已得汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食成癰

先寒後熱並宜服之 方見吐瀉痢症

十全丹 湯氏方 治小兒乳哺不調傷於脾胃丁奚哺露

枳殼 去白 檳榔 青皮 陳皮 各半

木香 二錢 蓬朮 三稜 砂仁 各半

丁香 半錢 香附子 炒一兩

右為末神麴打麵糊和丸如黍米大空心米湯送下五

十九

異香散 治小兒疳積腫脹調理脾胃

三稜 我木 青皮 陳皮

半夏麴	藿香	桔梗	益智仁
枳殼	香附子	砂仁	丁香
甘草 各等分			
右判散生薑三片棗一枚同煎食遠服			
香稜丸 治小兒積氣發熱肚腹膨脹肢體瘦弱飲食不為肌膚			
木香	丁香	檳榔 去麤	枳殼 去穢
甘松	史君子 去殼	神麴	麥芽 錢各二
三稜 煨	莪朮 煨	青皮	陳皮
香附 錢各五錢	胡黃連 錢		
積聚 心法附錄卷之五 下 治小兒積聚			
右為細末蒸餅丸如黍米大用米飲送下食遠服			
三稜散			
三稜	莪朮	甘草	益智 去殼
青皮	陳皮	神麴	麥芽 錢各二
右為細末用白湯調化不拘時候			
七聖丸 湯氏方消積滯調脾胃			
芫花 先用醋浸一宿炒乾加入三稜莪朮同炒令赤色入陳皮川練同炒取出用	蓬莪朮 陳皮 去白	京三稜	川練 取肉
青皮 去白	杏仁 去皮尖		
右件為細末入巴豆二十粒去油膜和白醋糊丸如粟			

米大每歲常服二丸臨卧熟水送下常服宜去巴豆			
六味三稜丸 五六箇月小兒未喫穀食有癖積者			
莪朮 煨	三稜 煨	神麴 炒	麥蘖 炒
青皮	陳皮 各等分		
右為細末稀麵糊丸如菉豆大每服三十丸白湯下			
三稜煎丸 飲食過多痞悶疼痛食不消化久而成癖又			
治婦人血積血塊乾血氣經閉			
莪朮 者黑角	三稜 各一兩二味	大黃 去皮	
右為末先以大黃銀石器內好醋漬令平慢火熬微乾			
入二味為丸如菉豆大每服十九至二十九食後溫白			
積聚 心法附錄卷之五 下 治小兒積聚			
湯送下虛實加減服大人如梧桐子大每服四十九			
月蟾丸 秘方治小兒脾癰癥瘕			
木香	人參	黃耆	當歸
桔梗	黃連	三稜 炮	蓬朮 煨
驚申 酥炙	夜明沙	綠礬	枳實
史君子	苦練根皮	訶子 各一兩	蝦蟆 燒存性
右件為末如菉豆大每服三四十丸食前米飲下忌生			
冷雜果子發脾之物大人癥瘕丸如梧桐子大空心服			
減夜明沙蝦蟆黃連服五七十丸			
治小兒積實樂			

用水紅花子炒二錢大黃朴硝山梔子 石灰各一錢 酒醱雞旦大一塊共搗和為膏用青綿布攤貼再用濕 瓶熱封用手帕勒之三日後揭起肉黑如墨是其効也 一方 治小兒癰積丸藥	用三稜莪朮阿魏蘆薈白朮陳皮各二錢水紅花子炒 三錢大黃三錢為細末棗肉搗為丸如菉豆大每服三 十九空心米飲下	甘遂散 湯氏方 治胸膈伏熱內停飲食以致臟腑不舒氣 結脹滿	甘遂 赤 青皮 去白 黃芩 大黃 炒各 右吹咀每服二錢水半盞煎服以利為度	取水方 湯氏方 積水癖水並皆治之	甘遂 青皮 去白 陳皮 去白 木香 各 一兩	檳榔 一箇 生用	右為末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草 退腫消毒散 湯氏方 治積水驚水或飲水過多停積於脾 或四肢腫而身熱宜用藥內消之其腫自退	蘿蔔子 赤小豆 甘草 炙 陳皮 各半 木香 半錢	右吹咀每服二錢水一小盞姜棗煎服
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------	------------------	---------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------

勾氣散 御華院方 治脾肺氣逆喘嗽面浮胃膈痞悶小便 不利	桑白皮 二兩 陳皮 兩半 桔梗 炒 甘草 炙 藿香葉 半兩 木通 四兩 赤茯苓 去皮 一兩	右吹咀每服二錢水一小盞姜二片煎服	木香散 湯氏方 治心經伏熱小便不通	木通 兩 牽牛 半兩 滑石 一兩	右為末灯心葱白水煎二錢不拘時服	○調理脾胃	附諸方	調胃 心法附餘卷五 生	參苓白朮散 治小兒脾胃虛弱不進飲食 方見調補脾	四君子湯 調脾胃進飲食 見補	溫脾散 和劑方 治脾胃不和腹脇虛脹不進飲食困倦無 力	訶子 炮去核 人參 各七錢半 白朮 木香 桔梗 各半兩 茯苓 藿香 陳皮 黃芪 各半兩 甘草 二錢半	右吹咀每服二錢水半盞姜棗煎服不拘時	丁香散 和劑方 治胃虛氣逆嘔乳不食	人參 半兩 丁香 藿香葉 各二錢半
--------------------------------	--------------------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

右咬咀每服二錢水半盞煎熟入乳汁少許煎服	和中散 <small>和劑方</small> 治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進	厚朴 <small>六兩</small> 乾姜 <small>炮</small> 甘草 <small>各二兩</small> 白朮 <small>三兩</small>	右咬咀每服四錢水一小盞姜二片煎空心熱服	調中散 <small>湯氏方</small> 治脾胃不和	人參 <small>去芦</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 木香 <small>白朮</small>	甘草 <small>炙</small> 乾姜 <small>炮</small> 藿香葉 <small>縮砂仁</small>	香附子 <small>去毛</small> 丁香 <small>等分</small>	右為末每服一錢姜棗煎湯下如肚疼以白湯點下	醒脾散 <small>湯氏方</small> 治小兒脾胃怯弱為風冷所乘體熱頭疼	霍亂	天南星 <small>二箇重</small> 人參 <small>去芦</small> 丁香 <small>四十粒</small>	白茯苓 <small>錢者</small> 藿香葉 <small>白朮</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>	右為末生姜冬瓜子煎服	加減觀音散 <small>湯氏方</small> 調理脾胃宜常服之	白朮 <small>炒</small> 人參 <small>去芦</small> 白扁豆 <small>蒸</small> 白茯苓	麥藥 <small>炒</small> 黃芪 <small>蜜水</small> 甘草 <small>乾山藥</small>	神麴 <small>各等分</small> 香附子 <small>炮去毛</small>	右為末每服一錢空心米湯調下	治吐逆頻併手足心熱不進飲食
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------	---------------

紅連 <small>三錢半</small> 甘草 <small>錢一</small> 白朮 <small>一錢半</small>	右為末每服半錢煎棗子米飲下	銀白散 <small>簡易方</small> 治小兒百病	霍香 <small>去土</small> 天麻 <small>炒</small> 糯米 <small>炒一方用糯</small>	姜蚕 <small>炒去絲</small> 川升麻 <small>甘草</small> 白附子 <small>半錢</small>	木香 <small>濕紙裹煨</small> 白朮 <small>對以菜豆同炒</small>	山藥 <small>黃芪</small> 入參 <small>各一</small> 白茯苓 <small>一兩</small>	白扁豆 <small>一兩</small>	右為末隨証加減常服沸湯或米飲調下慢驚搐搦射	香飯飲下急驚定後吐不止陳米飲下夾驚傷寒	發搐薄荷葱白湯下壯熱面赤乾葛金錢薄荷湯下	天柱倒行步脚軟濃米飲下疳氣腹急多渴百合湯	下飲食不知飽饑不生肌肉炒麥芽生姜煎湯下	神氣脫語言不正及吐瀉霍香湯下暴瀉紫蘇木瓜	湯下白赤痢不進飲食米飲煎罌粟殼湯下藥受	怯弱每日服常服調理脾胃姜棗湯下和劑云木	香黃芪白附子姜蚕糯米藿香加知母共味各等分	瀉黃散 <small>按華方</small> 瀉脾熱目黃口不能吮乳	藿香 <small>七錢</small> 山梔子 <small>二兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 石膏 <small>半兩</small>	防風 <small>四兩</small>
------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



右劉用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水

同煎清汁服

異功散 按萃方 溫中和氣治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷

病先與數服以正其氣 方見吐瀉痢瘡

進食散 進食神効

白匾豆 微炒 石蓮肉 炒去心 人參 焙各二錢 茯苓 一錢

神麴 二錢 甘草 炙 白芷 木香

黃芪 蜜水塗炙 各一錢

右為細末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢用

水半鍾生薑一片棗子半枚煎十數沸調末服之

雜方 心法附餘卷之五 人參沉香散 治脾氣虛

人參 木香 白朮 沉香 各五錢

茯苓 二兩 甘草 白芷 各三錢

右為末每服一錢米飲調下嘔吐霍香湯下

○小兒雜方 新增

附諸方

小兒初生回氣法 保生要方

小兒初生氣欲絕不能啼哭者必是難產或冒寒所致  
急以綿絮包裹懷中未可斷臍帶急燃大紙撚蘸油  
點燈於臍帶上往來遍帶薰燒之蓋臍帶連兒腹待火

臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如  
常方可浴洗浴洗了方斷臍帶

通小兒大小便法 保生要方

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水

先嗽了口吸咂兒前後心并臍下手足心共七處每一

處凡二五次嗽口吸咂取紅赤為度須臾自通不爾無

生益有此證知此法可得再生

煉臍法

嘗聞子在母腹中胞胎十月止於臍中與母通氣初降

生之時雖曰胞胎已破始於兒口鼻中接天地之氣而

呼吸之其臍中所通之氣猶未盡絕況收生之母不明

通氣之大理不知斷臍之細功粗心妄意以致斷臍之

初因所通之氣招風入內者有之其法新生小兒綿裹

臍帶離肚五六寸處先用軟綿繒住却於線外將臍咬

斷片時去線待血流盡以手輕輕揉散艾灸臍頭二五

炷結作紮結軟帛腰裹切不可常時揭看待臍根落去

自然無事一法小兒降生之後即將軟線貼臍根繒住

待第三日離肚二指將臍剪斷用生薑自然汁或香油

和麴裹臍四圍將臍頭鋪艾灸三炷謂之薰臍後不招

風

封頤法 醫方集成

射香 蜈蚣 牛黃 青黛 末各一

薄荷 半字 蝎尾 去尾 末各半 錢

右為末熟菜肉和成膏新綿上塗勻貼於頤上四方可  
出一指許大上灸火頻熨百日裏外小兒可用此塗并

浴法

浴體法 錢氏方

天麻 二錢 蝎尾 去毒 珠砂 各半 烏蝎肉 酒浸

青黛 白礬 各三 射香 一字

右為末每用三錢水一碗桃枝一握同煎溫熱浴兒勿

浴方

浴背上

雄黃解毒丸 治小兒痰熱上攻發作纏喉風喉痺雙蛾

腫痛湯藥不下咽痛頸腫等証用此藥吐之

雄黃 一兩 巴豆 去油 鬱金 一錢

右為末醋糊丸如黍米大熱茶清下七丸至十丸吐出

頑涎即甦大効如口禁以物幹開灌之下咽無不活者

吐風散 治小兒急中風口禁不開不省人事

全蝎 一箇 瓜蒂 十箇 赤小豆 三十粒

右為末一歲一字溫米飲調下未出再服

○唐按丹溪云小兒忌慢驚風發熱口禁手心伏熱痰

熱嗽痰喘此類証並宜湧法吐之別此方可通

用

猪牙皂角 天南星 牛夏 荊芥穗

川烏 天麻 防風 薄荷 各五

細辛 全蝎 去毒 炒 草烏 炮

雄黃 五分

右為末入射香一字藥少許研勻用竹管盛藥吹入鼻

中開關再用生薑汁調藥搽牙根上

疎風散 治小兒五臟中風身體不能自收胃悶不知痰

痛口不能言筋脉拘急手足抽掣

防風 犀角 麻黃 去節 人參

當歸 川芎 羌活 遠志 去心

茯神 去木 甘草 炙 各

右咬咀用水煎食前服永除病根不成痼疾

白餅子 錢氏方 治小兒停乳以致嘔吐泄瀉腹脹潮熱驚

疳喘嗽等証用此藥下之

巴豆 二十四箇 去皮用水 天南星 炮 半夏 湯炮七次

輕粉 滑石 各一錢

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸小豆大捻作餅

子煎葱湯下

○廣按人乳味甘戀腸易於停積所以小兒之病多聚於此此方用南星半夏以豁痰飲用輕粉滑石以瀉濕熱用巴豆以通利積滯推陳致新之妙用也

寶鑑三稜煎丸 治小兒飲食過多痞悶痰痛宿食不化久而成癖

廣木 黑角者 荆三稜 二味濕紙裹煨 大黃 去皮八兩

右將大黃為末銀石器內以好醋浸令透慢火熬成膏和二藥為丸麻子大或菴豆大每一二十九食後溫水下

雅方 心法附餘卷五

廣木化癖丸 治乳食不消心腹飽脹壯熱喘嘔吐痰涎食癥乳癖

代赭石 醋淬 當歸 炒 朱砂 研 枳殼 炒

廣木 炮 荆三稜 炮各半兩 木香 一兩 射香

巴豆 去油各二錢半

右為末研勻麵糊丸如麻子大每一歲兒二丸米飲下

○廣按已上二方消導之劑也但有寒熱輕重之分宜選用為妙

一方 治小兒外腎腫硬及陰瘡

用乾地龍為末先葱椒湯於避風處洗次用津唾調傳

其上

三白散 和劑方 治小兒膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹以致大小便不利皆治

白牽牛 二兩 桑白皮 木通 去節 白朮

右為末每服二錢姜湯調下空心服

牡丹散 清主方 治小兒外腎偏墜

防風 去芦 牡丹皮 去木各等分

右為末每服二錢溫酒調服如不飲酒鹽湯點服亦可

疳瘡方

雅方 心法附餘卷五

白礬 煨 五倍子 各一錢

右為末薑水洗淨貽患處

金華散 錢氏方 治小兒一切濕瘡疳癬等瘡

黃蘗 黃連各半兩 黃丹 一兩 輕粉 一錢

右同研勻先以溫水洗然後貼之

一方 湯氏方 治濕癬瘡

用蛇床子為末先以韭根煎湯洗次用臘月猪脂調藥傳之

羊蹄散 小兒頭癬久不瘥者

白礬 半兩 羊蹄根 四兩 黃丹 少許

右搗爛入米醋半盞調均候癰極痒捺之至疼即止隔

日洗去再搽

治大腸虛弱肛門脫下湯氏方

龍骨

訶子肉各一兩 沒石子二枚

罌粟殼去穢醋塗各二錢

右為末白湯點服仍用葱湯薰洗令軟欬欬以手托上

又用甄一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數層壓

定使熱氣上透不可過熱令病者臀坐布上如覺布溫

逐旋減之常得溫熱為度并常服前藥

治鼻衄湯氏方用生蘿蔔去葉搗汁仰頭滴入鼻中或血

雜方

心法附餘卷五

全

卷三百六

妄行取汁飲之立効

白欬散湯氏方治小兒凍耳成瘡或癢或痛

黃蘗

白欬各等分

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

生附散湯氏方治凍爛脚成瘡

用生附子為末麵水調貼之即愈

香薷煎湯氏方治小兒白禿不生髮燥痛

陳香薷二兩 胡粉一兩 猪脂半兩

右用水一盞煎香薷取汁三分去滓入胡粉猪脂相

和令勻塗令頭上日日頻用之

黃連散湯氏方治小兒齒不生

大芩藟

乾地黃各半兩 山薯蕷

當歸

芍藥

甘草各二錢五分

右為末熟湯調服用搽齒脚

黃連散張子和方治頭瘡

川黃連

黃柏去粗皮

真輕粉

草決明各等分

右為末用生小油調藥於瘡上塗立効

一方治小兒耳邊鼻下赤爛濕痒名曰蝕瘡瘡切勿方

黃丹

菜豆粉一錢

白礬飛過

右研細末付瘡上唾調亦可

雜方

心法附餘卷五

全

卷三百六

軟青膏治一切風熱及小兒頭瘡

巴豆七箇

瀝青

黃蠟

香油各五兩

膩粉一錢

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆

焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放於敷瘡上

大烏散治小兒癰癤腫毒

南星

赤小豆

草烏

黃柏各等分

右為末生薑自然汁調貼患處或用米醋調尤佳

槲皮散治嬰孩小兒解癩癰作疼痛

槲皮去粗皮此槲在處處有即包盛槲葉木也

右不拘多少切碎用水煎溫湯頻洗

白芨散 治小兒瘰癧膿汁不乾

白芨 貝母去心各 輕粉二錢

右為末先糊皮散洗過後用清油調傳

龍骨散 治小兒停耳

白礬錢一 龍骨錢一 黃丹錢一 乾胭脂半錢

射香一字

右為末以綿杖子展却耳中膿水用藥末一字糝在耳中勿令風入

耳瘡方

黃連去鬚 蛇床子錢一 輕粉一字

右為末鵝毛管吹藥入耳內

連床散 治嬰孩小兒滿頭如癩瘡毒及手足身上陰器

膚囊痒則抓爛黃水汁淋滴燥痛

黃連去鬚 蛇床子錢五分 五倍子二錢

輕粉五帖

右為末先以荊芥蔥煎湯洗拭乾後用清油調傳

金銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名煉銀瘡

煅金銀鍋一箇 輕粉五分

右為末用麻油調傳

澤瀉散 治小兒鼻下兩膀瘡濕痒爛

澤瀉 鬱金 甘草炙 山梔子錢一

右為末用甘草煎湯調食後服

地黃湯 治小兒鼻衄

川芎 生地黃 赤芍藥 當歸各等分

蒲黃少許

右吹咀用水煎不拘時服

蒲黃散 治初生小兒大小便下血

生蒲黃 油頭髮燒灰各

右為末用生地黃汁或米飲調乳食前服

立効散 治小兒瀉血

蒲黃 生地黃 生甘草 赤茯苓去皮各

右吹咀用水煎入髮灰調勻食前服

聖惠方 治小兒龜胃

大黃錢三 天門冬去心 百合 木通

杏仁去皮尖 枳殼炒 桑白皮蜜炒 葶藶隔紙

朴硝各五錢

右為末煉蜜丸如芡實大用溫湯調化食後仍用灸兩

乳前各一寸半上兩行三骨間六處各灸三壯春夏從

下灸起秋冬從上灸起依法灸之

枳殼丸 治小兒龜背

枳殼炒 防風去芦 獨活去芦 大黃炒

前胡去芦 當歸酒洗 麻黃去節各

右為末麵糊丸如黍米大用米飲食後服仍用灸肺俞穴在三椎下兩傍各一寸半心俞穴五椎下兩傍各一寸半膈俞穴七椎下兩傍各一寸各灸三壯

芎藭散 治小兒齒

川芎 山藥 當歸 芍藥炒

甘草炙各二錢半

右為末用白湯調化食後服將乾藥末搽齒根

雜方 心法附餘卷之三 牛 治小兒語遲

菖蒲丸 治小兒語遲

人參 石菖蒲 麥門冬去心 遠志去心

川芎 當歸 乳香 硃砂各二錢

右為末煉蜜丸如黍米大用米飲食遠服三十九丸

虎骨丸 治小兒行遲

虎脰骨酥油炙 生地黃酒洗 白茯苓去皮 酸棗仁炒去殼

肉桂去粗皮 防風 當歸酒洗 川芎

牛膝酒洗去芦各五錢

右為末煉蜜丸如黍米大服三十九丸木瓜湯食前服

牡蠣散 治小兒盜汗

牡蠣煅二兩 黃芪蜜炙一兩 生地黃一兩

右咬咀分作三服水煎不拘時

○庶按小兒如草頭之露水上之泡用藥不可不謹也夫小兒之病多因脾胃嬌嫩乳食傷積痰火結滯而然其証不一且舉其尤者而言乳食傷胃則為嘔吐乳食傷脾則為泄瀉吐瀉既久則成慢驚或為疳病乳食停積則生濕痰痰則生火痰火交作則為急驚或成喉痺痰火結滯則成癰吊或為喘嗽胎熱胎寒者稟受有病也臍風撮口者胎元有毒也鵝口口瘡者胃中有濕熱也重舌木舌者脾經有實火也胎驚夜啼者邪熱乘心也變蒸發熱者胎毒將散也丹毒者火行於外也蘊熱者火積於中也中惡者外邪乘也睡驚者內火動也痢者腹中食積也瘡者膈上痰結也外感發熱者鼻塞聲重也內傷發熱者口苦舌乾也心痛者虫所齧也疳痛者寒所鬱也積有常所育形之血也聚無定位無形之氣也胃者主納受也脾者主運化也脾胃壯實則四體安康脾胃虛弱則百病蜂起業童科者可不以調理脾胃為切要哉

丹溪心法附餘卷之二十二終

小兒門 下

痘瘡 一百

丹溪心法

○痘瘡分氣虛血虛用補 氣虛者人參白朮加解毒藥

血虛者四物湯中加解毒藥 酒炒黃芩黃連名解毒藥

藥

痘瘡

心法附錄卷之三

一

二百七十一

凡痘瘡初出之時色白者便用大補氣血人參白朮黃耆

川芎升麻乾葛甘草木香丁香酒洗當歸白芍藥 若

大便瀉加訶子肉豆蔻 但見紅點便忌葛根湯恐發

得表虛也

吐瀉食少為裏虛 不吐瀉能食為裏實裏實而補則結

癰毒 陷伏倒靨為表虛灰白者亦表虛或用燒人尿

紅活綻凸為表實表實而更復用實表之藥則要潰

爛不結痂

吐瀉陷伏二者俱見為表裏俱虛

黑陷甚者亦用燒人尿蜜水調服 出和方

痘瘡初出時或未見時有患者宜預服此藥多者令少者

者令輕方以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙

糖拌乾喫入硃砂末尤妙

痘瘡分人清濁就形氣上取勇怯

黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芩酒洗草

人參

顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸

川芎酒洗芍藥之類或加紅花

將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根黃

連黃芩桂枝連翹之類甚者犀角大解痘毒

痘瘡

心法附錄卷之三

二

三百九十四

爐灰色白靜者怯者作寒看

勇者燥者燥發者作熱看

痘瘡星粘于連翹山查甘草此四味始終必用之藥

全白色將靨時如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊

俗呼倒靨不好但服實表之劑消息他大小便如大便

秘通大便小便秘通小便

有初起煩躁語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以

涼藥解其標如益元散之類亦可服

痒塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯虛則脉無

力氣怯 輕者用淡蜜水調滑石末以羽潤瘡上

虛瘡者以實表之劑加涼血藥

實瘡如大便不通者以大黃寒涼之藥少許與之下其結

糞

疎則無毒蜜則有毒宜涼藥解之雖數十貼亦不妨無害

眼之患

瘡乾者宜退火濕者宜瀉濕退火只用輕劑荊芥升麻葛

根之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類

如瘡瘍傷眼必用山梔決明赤芍藥當歸尾黃連防風連

翹升麻桔梗作小劑末調服如眼無光過百日後血氣

復自明

瘡瘡

心法附餘卷之三

三

瘡瘡

瘡瘡多是實毒血熱成癰分上下用藥一日不可緩已成

膿必用涼藥為主赤芍甘草節連翹桔梗上引用升麻

葛根下引用檳榔牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜蒌

之類大便燥用大黃發寒熱用黃芩黃柏

瘡瘡黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑

陷而外白起得遲者則相兼而治

初起時自汗不妨蓋濕薰蒸而然故也

瘡風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足虛則黃

芩生血活血之劑助之畧佐以風藥實則白芍為君

之藥亦為君佐以白芷連翹續斷之類

陳氏方亦可用

入方 解瘡瘡毒

絲瓜 升麻 酒芍藥 生甘草

黑豆 山查 赤小豆 犀角等分

右咬咀每服三錢水一盞煎六分溫服

又方 治瘡瘡已出未出皆可服

硃砂

右為細末蜜水調服多者可減少者可無

瘡瘡敷藥

貝母 南星 僵蚕 天花粉

瘡瘡 心法附餘卷之三 四 瘡瘡

白芷 寒水石 最多 草烏 大黃

猪牙皂角 各等分

右為末醋調傳之

附諸方

○補虛

黃耆 熟地 人參 湯 治瘡瘡表虛黑陷 即前丹溪方

黃芪 酒炒 熟地 酒炒 人參 各等分

右為粗末每服五錢水一大盞煎六分加酒服

小異功散 治瘡瘡裏虛吐瀉及和胃助氣 楊氏方

人參 茯苓 白朮 甘草



陳皮

木香 各等分

右為末每服五錢末一大盞薑棗同煎六分服

白木散 治裏虛吐瀉煩渴除身熱清神生津痘無顏色

首尾可服

人參

白木

茯苓

甘草

木香

藿香 各七

乾葛 一錢

四分 一方作乾姜 止泄瀉用

右為粗末水一大盞薑棗同煎至六分溫服

大補湯 實表裏補氣血治痘瘡陷伏不紅者

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

人參

白木

甘草

白茯苓

黃芪

心法附錄卷之三

五

官桂 各等

右咬咀大小兒每服五錢小小兒三錢水煎服

痘瘡治例

心法附錄曰小兒凡覺身熱証似傷寒若未經瘡痘疑似

未明且先與惺惺散參蘇飲或人參羌活散

孰甚者則與升麻葛根湯人參敗毒散

痘瘡已出則少與化毒湯

出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯紫草木通

湯或快斑散絲瓜湯

出太甚者人參敗毒散犀角地黃湯

小便赤澀者大連翹湯甘露飲參門冬五苓散

大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最當或少與四

順清涼飲

若咽喉痛者大如聖湯鼠粘子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

胸腹脹滿者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯

煩渴者甘草散烏梅湯

若下痢嘔逆者木香理中湯甘草乾姜湯

若陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄傳其身厚傳其足

噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散入射香陳

酒調劑或不用酒則木香煎湯若其瘡已黑乃可用錢

氏宣風散加青皮主之

然而瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其有大便

自利所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用化

毒湯可也或不用亦可若大小二便一或閉焉則腸胃

壅塞脉絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉黧然

不旋踵而告變矣

○發熱

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓

細辛

桔梗

瓜蒌根

人參	甘草	白朮	川芎	各等分
右為末每二錢水煎入薄荷二葉同煎服				
參蘇散	治小兒時氣傷風傷寒發熱惡寒咳嗽未明痘症是與不是疑似之間此藥甚為穩當			
楊氏調解散即是此方				
前胡	人參	紫蘇葉	乾葛	
半夏	湯泡七次 姜汁製	茯苓	各二分	枳殼
陳皮	甘草	桔梗	各二分	
右咬咀姜東煎微熱服				
人參羌活散				
羌活	獨活	柴胡	人參	
川芎	枳殼	茯苓	各二分	前胡
北梗	天麻	地骨皮	甘草	各一分
加麻黃薄荷蔥白煎服	汗後尚熱宜服此去麻黃加			
紫草	如已見三五點加紫草陳皮赤芍使熱退瘡出			
亦輕更調辰硃末半錢以制胎毒				
消毒救苦散	拔毒方	治癰疹悉具消化便令不出如已出		
稀者再不生癰				
麻黃	羌活	防風	各五分	川芎
藁本	葛根	蒼朮		酒黃芩

生黃芩	柴胡	各二錢	細辛	橘皮
紅花	蘇木	生地黃	酒黃柏	
連翹	各五分	黃連	各三分	生甘草
右剉如麻豆大每服五錢水一盞煎去粗熱服				
三豆子湯	治天行豆瘡但覺有此證即服之			
赤小豆	黑豆	茶豆	各一兩	甘草節
右淘淨水煮熟任意食豆飲湯十七日自不發				
惡瘡膏				
用惡實子為末蜜調貼顙門上免有患眼之疾				
○熱甚者				
升麻葛根湯	加山查大力子其瘡稀疎而易愈			
川升麻	甘草	白芍藥	各一錢	葛根
右咬咀作一服水一盞半煎八分溫服				
人參敗毒散	方見前			
涼膈散	治小兒瘡疹未出三焦積熱煩躁多渴及面赤			
面熱頭昏咽燥喉咽腫痛口瘡便溺赤澀狂言譫妄睡				
卧不安並宜服之				
大黃	朴硝	甘草	梔子仁	
黃芩	薄荷葉	各一兩	連翹	各四兩
右為末每服二錢竹葉五片蜜漿少水一盞煎六分溫				

服

若瘡疹已出發熱作渴脉實悶亂便實者亦宜服此便不實者切不可服恐內虛而毒氣不能發外也

謹按瘡疹已發有寒熱溫涼不同形氣盛衰之異虛寒者用異功散實熱者用涼膈散有起死迴生之効若以實熱為虛寒用異功散虛寒為實熱用涼膈散死生在反掌之間慎之慎之

○已出

化毒湯 治瘡痘已發以此消毒

紫草茸 半兩 升麻 甘草各二錢

痘疹 心法附餘卷之三 右剉散每服二錢粳米五十粒同煎服

○出不快者

四聖散 簡易方 治小兒瘡疹出不快透及倒靨一切惡候

紫草茸 木通去節 甘草 枳殼去白熱燉各等分

右咬咀每服二錢水一盞煎服

加味四聖散

紫草 木通 黃芪 川芎

木香 各等分 甘草 炙

右為粗末水煎服 大便秘加枳殼 大便如常加糯米百粒 楊氏曰糯米能解毒發瘡

紫草木香湯 治瘡出不快大便泄利

紫草 木香 茯苓 白朮

甘草 許

入糯米煎服 楊氏云紫草能利大便白朮木香佐之

紫草木通湯

紫草 人參 木通 茯苓

糯米 甘草

右剉煎二錢溫服 內虛大便利者可入南木香去紫

草

快斑散

痘疹 心法附餘卷之三 紫草 蟬殼 人參 白芍

木通 甘草 右剉散煎二錢溫服

又方

紫草茸 陳皮 黃芪 赤芍

右剉加糯米百粒煎三歲以上服三錢已下一錢服後

瘡偏勻四肢住服

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性為末湯調 楊氏云發痘瘡最妙

加甘草紫草

加甘草紫草

消毒散和劑方治毒飲癰過壯熱心煩瘡疹難出未能勻

透

牛蒡子炒六兩 荊芥蕙一兩 甘草炙二兩 防風

升麻各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服

○出太甚者

人參敗毒散方見前

犀角地黃湯

犀角一兩 生苳二兩 赤芍七錢 牡丹皮一兩

右咬咀三歲兒三錢水煎

痘瘡心法附餘卷之三

○稠密者

加味犀角消毒散

惡實四兩 甘草炙一兩 防風半兩 荊芥穗二兩

宜加山查酒黃芩酒洗紫草減食加人參

右為末煎紫草糯米先煮湯調服食後臨卧日三

鼠粘子湯板料方 治癰子已出稠密身表熱急與此藥以

防已後青乾黑陷

鼠粘子炒 當歸身洗酒 甘草炙各一錢 柴胡

連翹 黃芩 黃耆各半錢 地骨皮二錢

右為粗末每服二錢水煎去渣溫服空心藥進且休與

乳食

○小便赤澀者

大連翹湯 連翹 瞿麥 荊芥

木通 車前 當歸 防風

柴胡 赤芍 滑石 蟬蛻

甘草炙各一錢 黃芩 山梔子各五分

右咬咀作一服用姜三片水一鍾煎五分不拘時服

甘露飲子

生苳 熟苳 天門冬去心 麥門冬去心

枇杷葉去毛 枳殼去穢 黃芩 石斛

痘瘡心法附餘卷之三 山茵陳 甘草炙各等分

右剉每二錢水一盞煎八分食後服

五苓散

加麥門冬煎服方見中暑

○大便閉結內煩外熱者

小柴胡湯

加枳殼同煎服方見傷寒類

四順清涼飲子

當歸 赤芍 大黃虛者煨 甘草各等分

一方加陳皮梗米煎

○咽喉痛者  
如聖飲子

桔梗

甘草生

鼠粘子炒各錢二 麥門冬錢三

右為末竹葉同煎二三錢

一方加荊芥防風重者竹瀝同煎

鼠粘子湯

鼠粘子炒四錢

荊芥穗錢一

甘草錢一

防風五分

右為細末沸湯點服 去防風名消毒散

○喘滿氣逆者

麻黃黃芩湯

麻黃錢三

赤芍

黃芩各二錢半

桂枝五分

心法附錄卷之三

辛

右咬咀作一服用姜三片水一鍾煎五分不拘時服

○胸腹脹滿者

桔梗枳殼湯

枳殼

桔梗各一兩

甘草炙半兩

右剉姜煎

二陳加枳殼湯

半夏

橘紅

茯苓

甘草

加枳殼各等分

右剉姜煎

○煩渴者

甘草湯

甘草

瓜蒌根等分

右為末每一錢煎服

烏梅湯

小黑豆

萊豆各一合

烏梅二個

右咬咀新汲水一碗煎取清汁旋服

人參麥門冬散集驗方 治發熱煩渴

麥門冬一兩 人參去心

甘草炙

陳皮

白朮

厚朴姜制各一兩

痘瘡

心法附錄卷之三

西

右咬咀每服二錢水一盞煎六分去粗溫服不拘時

○下利嘔逆者

木香理中湯

本方中加木香甘草乾姜

方見中寒

○陷入者

加味四聖散

方見前

胡荽酒

以荽荬煎酒薄傳其身厚傳其足噴其衣服併以厚

綿蓋之

獨聖散

牛旁子錢五 白殭二錢

右末入紫草三莖同煎連進三服 前條云獨聖散入射香陳酒調劑如不用酒則木香煎湯調服

穿山甲湯洗淨炒焦黃為末每服半錢入射香少許木香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許調下

○黑陷者

宣風散

枳榔二個

陳皮

甘草各半

黑丑四兩半生

右為末每一錢量大小與服蜜湯調下

瘡瘡心法附錄卷之三 治癰瘡不出黑陷欲死者

人猫猪犬腦晨燒

少許微將蜜水調

百者救生無一死

黃金萬錠也難消

右將前四物於臘日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭

火煨令烟盡白色為度但是瘡發不快倒驚黑陷者及

一切惡瘡每用一字蜜湯調服其効如神

一說人糞用九歲以下無疳童子者猪狗犬糞用未破

陽雄者先於重九日各置於淨處飼之以飯勿令雜食

過旬日換盡腸之宿垢方收其糞陰乾候臘八日未

出時燒

百祥丸

紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮熟軟去骨日中暴乾復納元汁中煮汁盡焙為末水丸如粟米大每服

又湯氏方 治小兒痘疹黑陷者

羌活一兩 川山甲醋炒 生人骨火煨存性各半兩即人牙

射香少許

右四味為細末麻黃薄荷煎湯調一錢只用一服便起萬不失一

乳香散 治痘瘡既收心痛不可忍者餘毒歸心急惡乳

香散之

乳香半錢或一錢

右用水一盞煎服

一方加沒藥赤芍藥當歸同煎

○疔毒

四聖丹 治痘瘡中有長大紫色者為疔毒把住痘瘡不

起發急用簪尖挑破維入此丹

珍珠三五粒 點黃點黃 硃砂四十九粒

頭髮燒灰

右為細末用搽面油臘脂調成膏子將兒在溫暖處安

有忌風寒穢氣先用膏尖平撥開疔口將藥紙入疔內

時變為紅白色餘瘡皆起 又嘗見有疔痘者但挑

破出其黑血即愈或挑開用口啞去黑血或用綿裹指

甲搗出黑血俟去亦可蓋自疔痘破而毒氣得散也

○愈後諸疾 五福化毒散 湯氏方 治疹痘餘毒未解并上焦熱壅口齒

出血 玄參 桔梗 赤茯苓 人參

牙硝 青黛 甘草 射香

右為末入青黛和勻煉蜜為丸如芡實大金銀箔為衣

痘瘡 心法附錄卷之二十一 磨生犀水化下 齒血臭氣用生地黃汁化下

人參白朮散 錢氏方 治痘已靨身熱不退此藥清神生津

除煩止渴 人參 白朮 藿香葉 木香

甘草 白茯苓 乾葛

右吹咀每服三錢水一盞煎六分溫服不拘時

雄黃散 集驗方 治小兒因痘瘡牙齦生疳蝕瘡

右同研極細末量瘡大小乾糝其上

綿蛋散 陳氏方 治因豆瘡身體肢節上有疳蝕瘡膿水不

絕

用出蛾綿蛋不拘多少以生白礬槌碎置其內炭火

燒令礬汁盡取細研乾糝瘡上

穀精草散 陳氏方 治痘已靨眼目翳膜或癰澁多淚

穀精草 生蛤粉

右為末獺猪肝一葉以竹刀批作片子糝藥在內用苧

繩縛定於磁瓦器內貯水慢火煮熟令兒食之

一方 治癰瘡入眼 張子和方 麩炒蒺藜炙甘草 羌活防風等分搗

每服二錢將水下 撥雲見日直到老

又方 張子和方 痘瘡 心法附錄卷之二十一 硃砂 腦子 水銀 麝香

右四味研為細末用水銀調滴耳中

一方 治小兒出瘡疹眼內有雲翳 瑞竹堂方

輕粉 黃丹

右為末竹筒吹入耳內左眼有翳吹右耳右眼有翳吹

左耳即退

麥湯散 治水痘 陳氏方

地骨皮 麻黃 甘草 人參

滑石 大黃 羌活

甜葶藶

右為末每服半錢水一盞小麥七粒同煎十數沸服

陳氏痘疹證治

凡小兒痘疹未出已出之間有類傷寒之狀其瘡疹病證自然憎寒狀熱身體疼痛大便黃稠此乃是正病也若無他疾不宜服藥

凡瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治如表裏俱實者其瘡易出易靨也如表實裏虛者其瘡易出難靨也

凡初覺痘瘡可用胡荽酒遶房噴之以辟穢濁之氣則豆瘡易收又急乾胭脂用蜜調塗見兩眼眶則痘瘡不入眼內

若痘疹已出未出之時或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛速與十一味木香散治之以和五臟之氣

若痘疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也速與十二味異攻散治之以表六腑之氣

若痘疹已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或腹脹或瀉渴或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻散送下七味豆蔻丸治之以助五臟六腑表裏之氣

若纔覺傷風身熱未明是與不是瘡疹便宜發散可服四味升麻葛根湯

若瘡疹始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹足稍冷者或身熱泄瀉者或身熱驚悸腹脹者或身熱汗出者皆不宜服升麻葛根湯已上四證宜服十一味木香散治之

若瘡疹始出一日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱實也其瘡必先澤起發肥滿易靨而不致損傷也

若痘瘡已出發熱口乾煩渴不止者切不可飲冷水亦不可食蜜及红柿西瓜等冷物又不可妄投清涼飲消毒散等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙則難治咬牙者齒橋也乃血氣不榮不可妄作熱治之

若痘瘡雖出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解散致令臟腑受冷榮衛澀滯則氣血不能衝貫皮膚肌肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多痒塌煩躁喘渴而死皆因宣利解散之過也縱得其生而必罕矣

若瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十一味木香散送下七味肉豆蔻丸治之如瀉止住服不止者多服

若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能靨也如身溫腹脹咬牙喘渴者難治緣水穀去多津液枯竭而欲飲水不止者蕩散真氣故多死矣速與十一味



木香散救之

若四五日不大便者可用肥嫩猪胰一塊以淡白水浸火煮軟熟取出切如豆大或皂子大與小兒食之令臟腑滋潤使瘡痂易落百無滯碍切不可妄投宣藥恐內虛瘡毒入於裏傷兒真氣

若六七日身壯熱不大便其脉緊盛與三味消毒散微得利即住

若小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩三日至十三日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡疹

若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不

瘡疹 愈者只服七味人參白朮散

若痘瘡欲靨已靨之間或不能靨腹脹煩渴者不可與水蜜若飲者轉渴而死急煎十一味木香散救之

若痘瘡欲靨已靨之間頭溫足指冷或腹脹瀉渴氣促者不可與水蜜若飲者即死急煎十二味異功散救之

若十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧卧則哽氣煩渴咬牙急煎十二味異功散更加木香當歸以

救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物食之速死

若十二日十三日瘡痂已落其瘡癰猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可洗浴亦不宜食炙煖物又不宜食五辛五味

并有毒之物恐熱毒薰于肝膈眼目多生翳障若不依此禁忌必為小兒終身之患用兩味穀精草散治之

若痘瘡已靨其痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜西瓜红柿等冷物食之若食之轉生焦渴或頭溫足冷或腹脹或時瀉或咬牙以致難愈速與十一味木香散救之即瘥

若身壯熱經日不除別無他證以六味柴胡麥門冬散治之熱退住服如不愈只服七味人參白朮散治之

若身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘毒未盡以四味射干鼠粘子湯治之如不愈者以七味

瘡疹 人參白朮散主之

若風熱咳嗽咽膈不利三味桔梗甘草防風湯治之如不愈者以七味人參白朮散主之

若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤以十六味人參清膈散治之如不愈只服七味人參白朮散立効

若痰實壯熱胸中煩悶大便堅實卧則喘急以五味前胡枳殼湯治之

凡痘瘡首尾不宜與水喫少與冷熱湯則可若候與之瘡靨之後其痂遲落或身生癰腫若鍼之成疳蝕瘡血水

面黃唇白以致難愈者何也蓋脾胃屬土外

主身之肌肉稊緣飲水過多濕損脾胃搏於肌肉其脾胃飢肉虛則津液衰少津液衰少則榮衛滯滯榮衛滯滯氣血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而生癰腫也若微作渴者以六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白朮散治之

若身熱大渴以七味人參白朮散治之如不愈者只服一味木香散治之

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫渴者或身熱面眊白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止者以上九証即非熱也

瘡瘡

心法附餘卷之三

五

瘡

乃脾胃肌肉虛津液衰少故也宜服十一味木香散治之如不愈者更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致於瘳塌喘渴死矣

若痘疹已靨未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膚腠之間則津液滯滯故成疔蝕瘡也宜用雄黃散綿繭散等藥治之久而不愈者潰骨傷筋以致殺人

凡斑駁疹毒之病俗呼疹子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蟲所咬故赤斑遍體也凡發赤斑者十生一死發黑斑者十死一

難治葛根麥門冬散生地黃散主之

（）葛根丹溪斑疹豆瘡各立病目所治不同而陳氏瘡疹混同立論豈不誤哉夫豆瘡出於脾其間有熱燥者有寒濕者而斑疹出於心肺肺屬陽多是風熱兼痰而作宜於通聖散中消息之陳氏此篇却言斑疹乃是肺胃蘊積熱毒每因時氣所觸而作用葛根麥門冬散生地黃散治之方合病情可見瘡疹不可一途而治也明矣

凡豆瘡或候拆或瘡膿血淋漓綠血氣衰肌肉虛故也切不可用新牛糞燒灰貼之其臭穢反觸其瘡宜用敗草散治之仍服十一味木香散加丁香肉桂煎服

瘡瘡

心法附餘卷之三

五

瘡

黃帝問曰飲有陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰虛用木香當歸每一兩藥共加一錢異攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使豆瘡易出易靨不能瘳塌木香散性溫平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽之藥也善治小兒腹脹瀉渴其効如神不能盡述大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生長者也今瘡疹之病臟腑調和則血氣充實自然易出易靨

蓋因外常和緩內無冷氣之所由也

凡瘡疹五不治一痒塌寒戰不止者二紫黑色喘渴不寧者三灰白色陷頂腹脹喘渴者四頭溫足冷悶亂飲水者五咬牙氣促泄瀉煩渴者皆難治

若瘡疹已出七日之間其瘡不光澤不起發根窠不紅痒塌振極謂之表虛也可隨証服藥蓋胖主身之肌肉肺主身之皮毛今瘡瘡出是肌肉皮毛受其証也治法先當調和臟腑滋養血氣使脾不虛而肺不寒表裏沖和其瘡自然易出易屬也故經云表病裏和不治而自愈也

瘡疹

心法附餘卷之三

五

今將瘡疹輕重開具于后

輕者 作三次出 大小不一等 頭面稀少

眼中無 根窠紅 肥滿光澤

重者 一齊并出 如蚕種 稠密

瀉渴 灰白色 頭溫足冷

身溫腹脹

輕變重 犯房事 不忌口 先曾瀉

飲冷水 餌涼藥

重變輕 避風寒 常和緩 大便稠

今將瘡疹方開列于后

胡荽酒

以荽荑煎酒遠房噴之以避穢濁之氣

胭脂膏

以乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則痘瘡不入眼內

升麻葛根湯 四味 方見前

木香散 十一味

木香 大腹皮 人參 去芦 桂心

青皮 去穢 赤茯苓 前胡 去芦 訶梨勒 去核

半夏 姜製 丁香 甘草 各三

右咬咀每服二錢水一盞姜三片同煎空心溫服量兒

大小加減

一方向桂心丁香加桂枝藿香

異攻散 十二味

木香 當歸 各三 官桂 去粗 茯苓 去

白木 各二 人參 厚朴 姜炒 肉豆蔻

丁香 陳皮 各二 半夏 姜製 附子 各一錢半

右咬咀每服二錢水一盞姜五片肥棗三枚同煎空心

溫服量大小加減

一方去丁香附子加藿香乾姜

肉豆蔻 九 七味

木香	縮砂仁	白龍骨	罈子肉
肉豆蔻	赤白脂	枯白礬	
右為細末麵糊為丸如黍米大一歲服三五丸三歲			
服百丸米飲湯下瀉甚者前異攻散吞下瀉不止多服			
或瀉水穀白色淡黃色木香散送下			
消毒散	出後身壯熱不大便其脉緊盛用此微利		
牛旁子	荊芥穗	甘草	
右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減			
人參麥門冬散	出後身反熱煩渴者		
人參白朮散	出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉		
紫胡麥門冬散	出後身壯熱經口不除		
紫胡	甘草	人參	黑參
龍膽草	麥門冬		
右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減			
射干鼠粘子湯	壯熱便實口舌生瘡咽喉腫痛		
鼠粘子	甘草	升麻	射干
右每服二錢水一盞煎溫服量大小加減			
桔梗甘草防風湯	治風熱咳嗽咽膈不利		
桔梗	甘草	防風	
右每服二錢水一盞煎溫服量大小加減			

人參清肺散	治涕唾稠粘身熱莫乾
人參	柴胡
知母	桑白皮
紫苑	地骨皮
桔梗	黃芩
右每服二錢水一盞姜三片溫服量大小加減	
前胡枳殼湯	疾實壯熱胸中煩悶大便堅實
前胡	枳殼
甘草	赤茯苓
右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減如身溫	
瘰癧	心法附錄卷之三
脉微并瀉者不可服	
雄黃散	因瘰癧牙齦生疳蝕瘡
綿繭散	因瘰癧身體肢節上有疳蝕瘡膿水不絕者
敗草散	用蓋房多年爛草或蓋牆爛草亦可其草經霜
露感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取草不	
以多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水	
不絕粘貼衣裳難以坐卧可用二三升攤於席上令兒	
坐卧其効如神仍復木香散加丁香官桂同煎服	
瘰癧散	瘰癧全愈而毒氣尚未全散瘰癧雖落其癰猶

點或凹凸內起當用此藥塗之

韶粉兩 輕粉錢一

右和研勻入煉過猪脂油調和如膏薄付瘡上如痘瘡欲落不落當滅癰痕

又方

用羊髓骨髓一兩入輕粉一錢研成白膏以磁盒盛之塗瘡上如痘瘡痒甚俱搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痂落亦無紫黑癰痕

穀精草散 治熱毒薰於肝膈眼目多生翳障 方見前

蒼木散 治痘瘡入眼

痘瘡 心法附錄卷之三 手五 二百七十五天陰

蒼木 乾葛 槐花 藜蘆

蛇蛻 防風 枸杞 白蒺藜 木賊

黃芩 川芎 白菊花 沒藥

甘草 蟬蛻 乳香

硬石膏 穀精草

右為末每服二錢白水煎食後服

菊花散 治瘡入眼

白菊花 菉豆殼 密蒙花 旋覆花

穀精草 甘草

右為末每服二錢用乾柿一枚粟米汁一盞煎乾為度

取乾柿食後服之

蟬菊散 痘瘡入目或病後生翳障

蟬蛻 白菊花

右為末每服二錢水一鍾入蜜少許同煎乳食後溫服

量兒大小加減

葛根麥門冬散 治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根 麥門冬 茯苓 石膏

川升麻 甘草 赤芍藥

右每服二錢水一盞煎溫服看兒大小加減

生地黄散 治斑駁毒身熱口乾咳嗽心煩

生地黄 麥門冬 杏仁 款冬花

陳皮 甘草

右每服二錢水一盞煎服量兒大小加減

麥湯散 治水痘 方見前

○廣按瘡疹之源蓋由母妊娠之時飲食煎炒炙博厚

味醇酒兒在腹中浸漬食母血穢蘊而成毒伏於五

臟之間及生之後或因外感風寒內傷生冷跌撲驚

恐時氣流行觸動鬱火發於肌膚之間心臟之毒為

斑肺之毒為疹肝臟之毒為水泡瘡脾臟之毒為膿

泡瘡小兒稟厚毒少氣血調勻表裏充實則易發易

醫苟或稟弱毒盛表裏虛氣血弱必須醫藥調治察  
幾有生前輩明醫錢仲陽氏出究其病源是熱是燥  
故用辛涼之藥以清熱潤燥及陳文中氏出又見病  
源之中有寒濕者故用辛溫之劑以溫寒散濕此二  
先生兩得之後之宗錢氏者惟知辛涼之是務而寒  
濕者不宜宗陳氏者惟以辛溫之是從而熱燥者不  
可小兒罹此禍患可勝計哉苟能用二子之長而無  
二家之弊斯可也故丹溪朱先生曰痘瘡者氣血虛  
表裏虛用補又曰瘡乾者是火宜退火瘡濕者是濕  
宜瀉濕又曰爐灰白色靜者怯者作寒者勇者燥者  
宜瀉  
心法附餘卷之三  
痘瘡者作熱者先生之言可謂活潑潑地矣以此觀  
之小兒痘瘡表裏充實者固不必於藥而虛中有寒  
濕者與夫虛中有熱燥者必須於藥也今將附方補  
虛及痘瘡治例具之於前使小兒痘瘡屬熱燥者宗  
之又以陳氏痘疹證治附之於後使小兒痘瘡屬寒  
濕者宗之後之業是科者必以補虛為主視其形色  
脉證寒濕熱燥及天時寒暄而分治之嬰孩之幸也  
又按王節齋論曰丹溪痘瘡治法最為明備近世通  
用陳文中木香異攻等方乃一偏之術若痘瘡陷伏  
淡白色及內瀉渴腹脹者此屬虛寒宜用陳文中方

若男盛稠密紅紫色及大便燥結者此屬熱毒急宜  
涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬  
熱毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解毒然吐瀉  
裏虛則使毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦  
千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解  
毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊必須詳究丹  
溪陳文中二法通用斯無弊也○痘瘡屬虛寒者直  
可延至十數日後方死屬毒盛轉紫色者不過七八  
日蓋痘是胎毒自內出外一二三日方出齊毒氣尚  
在內出至六日則當盡發於表七八九日成膿而結  
痘瘡  
心法附餘卷之三  
痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入臟腑故  
須於六日以前毒氣該出之時急服涼血解毒之藥  
以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱  
毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日  
久而後死此虛實輕重之分也○痘瘡多者是毒氣  
多便先宜解毒然多則恐氣血周貫不足故隨後亦  
宜兼補藥以助成膿血

丹溪心法附餘卷之二十三





# 雜治門

## 論倒倉

一百有一

丹溪心法

○倒倉法治癱勞蠱癩等證推陳致新扶虛補損可吐可下用黃色肥牯牛腿精肉二十斤或十五斤順取長流急水於大鍋肉煮候水耗少再添湯不可用冷水以肉

倒倉

心法附錄卷之二十四

法

爛成粗為度濾去粗用肉湯再熬如琥珀色隔宿不喫晚飯大便秘者隔宿進神芩丸不秘者不用五更於密室不通風處溫服一鍾伺隔間藥行又續續服至七八鍾病人不欲服強再與之必身體皮毛皆痛方見吐下寒月則重湯溫之病在上欲吐多者須緊服又不可太緊恐其不納病在下欲利多者須疎服又不可太疎恐其不達臨時消息大抵先見下方可使吐瀉極吐下伺其上下積俱出盡在大便中見如胡桃肉狀無臭氣則止吐瀉後或渴不得與湯其小便必長取以飲病者名曰輪迴瀉與一二梳非惟可以止渴抑者可以滌濯餘

垢睡一二日覺饑甚乃與粥淡食之待三日後始與少

菜羹自養半月覺精神煥發形體輕健沉痾悉安矣

大藥中間飲至七八鍾時藥力經涉經絡骨節搜逐宿

垢正邪寧不抵牾悉有急悶似痛非痛自有惡況此皆

好消息邪不勝正將就擒耳尤須寧耐忍受又於欲吐

未吐欲泄未泄交作皆有惱怙意思皆須歡喜樂受一

以靜處之此等有大半日景象不先說知使方寸瞭然

鮮有不張皇者矣未行此法前一月不可近婦人已

行此法半年不可近婦人五年不可喫牛肉性急好淫

不守禁忌者皆不可行此法倒倉全在初起二鍾慢飲

倒倉

心法附錄卷之二十四

法

緊要能行經隧中去

法曰腸胃為市以其無物不有而穀為最多故曰倉倉

積穀之室也倒者傾去積舊而滌濯使之潔淨也經曰

胃為受盛之官故五味入口即入於胃留毒不散積聚

既久致傷冲和諸病生焉今用黃牯牛肉其義至矣夫

牛坤土也黃土之色也以順為德而效法乎健以為功

者壯之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也橫

散入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛竅爪甲無不入也積

聚久則形質成依附腸胃回薄曲折處以為糟粕之窠

曰阻礙津液氣血薰蒸腐成病自非刮腸刮骨之神

妙孰能去之又豈合勺鉢兩之九散所能竅犯其藩牆  
尸腐乎夫牛肉全重厚和順之性潤枯澤槁豈有損也  
其方出於西域之異人人於中年後行一二次亦却疾  
養壽之一助也

### 附諸方

霞天膏 非飛霞方 此方即倒倉古法傳自西域有人指予

投煎剖治痰而遂推廣之

黃牯牛一具 選純黃肥澤無病才一二歲者

右洗淨取四腿項脊去筋膜將精肉切成塊子大栗大  
秤三十斤或四五十斤於靜室以大銅鍋無則用新鐵

倒倉 心法附餘卷之三

鍋加長流水煮之不時攪動另以一新鍋煮沸湯旋加

常使水淹肉五六寸掠去浮沫直煮至肉爛如泥盡去

渣却將肉汁以細布瀝入小銅鍋用一色桑柴文武火

候不住手攪不加熟水只以汁漸加如稀錫滴水不散

色如琥珀其膏成矣此節火候最要用心否則壞矣大

段每肉十二斤可煉膏一斤為度磁器盛之是名霞天

膏也 用調煎劑初少漸多沸熱自然溶化 用和丸

劑則每三分撓白麪一分同煮成糊或用煉蜜寒天久

收若生微用重湯煮過熱天冷水甯之可留三日

○廣按治痰之藥用南星半夏者所以燥之也用橘紅

枳殼者所以散之也用茯苓諸苓者所以滲之也用  
黃芩黃連者所以降之也用巴豆附子者流通之義  
也用竹瀝瓜蒌者潤下之義也雖然實痰新痰之為  
病宜此而虛痰老痰之為病所不宜也夫老痰稠粘  
膠固於胸臆之間係附盤薄於腸胃之處苟非霞天  
膏之浸潤流動而能從上從下以出之乎夫用霞天  
膏吐瀉以去痰積則不致虛損元氣所以為美也前  
條云倒倉法能治癱勞鼓噎夫癱勞鼓噎之症乃虛  
中有痰積也愚意治此四證於補虛藥中加霞天膏  
以去痰積必然安愈無人知此之妙訣也

倒倉 心法附餘卷之三

## 論吐法

一百有二

### 丹溪心法

○凡藥能升動其氣者皆能吐 如防風山梔川芎桔梗

茅茶以生薑汁少許醋少許入薑汁搗服以驚翎勾引

之 附子尖桔梗蘆人參蘆瓜蒂藜蘆砒 不甚用艾葉

末茶此皆自吐之法不用手探但藥但湯皆可吐吐時

先以布搭脾勒腰腹於不通風處行此法 一法用羅

蔔子五合搗入漿水瀝過入清油白蜜少許旋半溫用

帛緊束肚皮然後服以驚翎探吐其驚翎平時用桐油



浸阜角水洗晒乾待用 又法用蝦帶殼半斤入醬蔥  
姜等料物煮汁先喫蝦後飲汁以驚翎勾引即吐必須  
緊勒肚腹 又法苦參末赤小豆末各一錢薑汁調重  
則宜用三錢吐法取逆流水 益元散吐濕痰 白湯  
入鹽方可吐 人參蘆前湯吐虛病凡吐先飲二碗隔  
宿桔梗半兩陳皮二錢甘草二錢煎湯凡吐不止麝香  
解藜蘆瓜蒂 葱白湯亦解瓜蒂 甘草總解諸藥白  
水總解

充按三法中惟湧劑為難用有輕重卷舒之機汗下則  
一定法也故先生特註吐為詳者恐人不深造其理徒  
吐法 心法附錄卷之十四 五

倉皇顛倒反有害於病耳今總列諸法于此使臨病隨  
機應變披卷瞭然不必搜檢而便於施治也

附諸方

獨聖散 治中風痰迷心竅顛狂煩亂人事昏沉痰涎壅  
盛及治五癰心風等証

瓜蒂 不拘多少

石為細末每服一錢以薑汁調下

二神散 治證同前

常山 兩 蘇管藜蘆 兩半

右為粗末每服二錢水 鍾煎七分食後溫服

三仙散 治證同前

防風 去 瓜蒂 微火炒細剉研 蘇管藜蘆 兩

右為粗末每服三五錢以薑水二鍾煎七分沸去粗將  
粗又用薑水一鍾煎至半鍾却將先二鍾藥汁合作一  
處再熬五七沸去粗澄清放溫徐徐服之不必盡劑以  
吐為度

四靈散 治證同前

瓜蒂 錢一 人參 蘆 錢二 赤小豆 甘草 各一 錢半

右為細末每服一二錢或少至半錢量情與之食後薑  
汁調下

吐法 心法附錄卷之十四 六

五玄散 治證同前

猪牙皂角 不蛀者去 皮弦炙 綠礬 各一 錢 明礬 二 錢

赤小豆 錢一 蘇管藜蘆 五 錢

右為細末每服半錢或一二錢漿水調下如牙關緊閉  
幹開灌之

六應散 治證同前

鬱金 滑石 川芎 各等分

右為細末每服一二錢量虛實加減以薑汁調空心服

○凡服吐藥不須盡劑服藥後約人行十里未吐以溫茶  
一鍾 油數點投之良久以驚翎喉內徐徐牽引如

得吐即止未吐再投吐藥如服吐藥嘔吐不止者以麝香少許研水飲之即解

## 救急諸方

一百有三

丹溪心法

魚骨鯁用砂糖白炭皮末紫蘇葉滑石末和丸含口中津液嚥下骨自隨下

蕈毒用木香青皮等分作湯飲之

衆藥毒用五倍子二兩重研細用無灰酒調服毒在上即吐在下即瀉解一切毒

救急

心法附錄卷之三

七

卷三

用粉草五兩重細切微炒搗細量病人喫得多少酒取無灰酒一處研去粗溫服須臾大吐瀉毒亦隨去雖十分渴不可飲水飲水難救

解九里蜂用皂角鑽孔貼在蜂叮處就皂莢孔上用艾炙三五壯即安

天蛇頭 用落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥切碎用十分好醋濃煎先薰後洗

又方 用人糞雄黃泥搗之裹在患處即安

又方 用撲蛇燒為灰存性地上出火毒研為細末用香油調傅如洗只用井花水

天火帶 用白鮮泥炒研細香油傅之

又方 雄鷄毛及鷺毛燒灰傅之

治蜈蚣全蝎傷 方同九里蜂炙法

治一切蛇咬 用金線重樓水磨少許傳咬處又為細末

酒調飲

又方 柏樹葉魚腥草皺面草草決明一處研細傳咬處佳

中牛馬肉毒 方同解一切毒法

狗咬 以紫蘇口嚼碎塗之

風狗咬 取小兒胎髮炒新香附野菊花研細酒調服盡

救急

心法附錄卷之三

八

卷三

醉

附諸方

救自縊法 三因方

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安破肘之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手按據腦上數摩動之一人摩捋臂脰屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救自暮至旦陰

氣盛為難救

又法以一人兩手掩其口勿令透氣一人用手摩其頸

痕雨時氣急則活

半夏散 三因方 治魔寐卒死諸暴絕證

用半夏不拘多少湯洗七次為末每用少許吹入鼻中

心頭溫者可治倉卒無藥急於人中穴及兩脚大拇指

內離甲一確葉各灸三五壯即活

救凍死法 經驗方 四肢直口噤只有微氣者

用大釜炒灰煖以囊盛熨心上冷即換之目開氣出然

後以粥清稍稍進之若不先溫其心便將火灸則冷氣

與火爭必死

孫真人救落水法 醫方大成

急解死人不帶艾灸臍中即活

救溺水法 經驗方

凡人溺水者救上岸即將牛一頭却將溺水之人將肚

橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹

中之水如醒以蘇合香丸之類或老薑擦牙若無牛以

活人於長板凳上仰卧即令溺水人如前法將肚相抵

活人身上水出即活 蘇合香丸

治絞腸沙証 手足厥冷腹痛不可忍者 醫方大成

以手旋溫水於病者膝灣內拍打有紫黑點處以針刺

去惡黑紫血即愈

治骨鯁 醫方大成

以野苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被鷄骨所傷

以鷄羹化下如被魚骨所傷以魚汁湯化下

治一切骨鯁 醫方大成

用金鳳花子嚼爛嚥下無子用根亦可

治魚骨入喉 百一選方

縮砂 甘草各等分

右為末以綿裹少許嚥之旋旋嚥津久之隨皮吐出

金鈎釣食丸 治諸鯁

用葳靈仙根不拘多少以好米醋浸一二日曬乾為末

醋糊為丸如梧桐子大每服一丸或二丸半茶半湯下

如要吐轉用沙糖銅青為末半匙滴油一二點同茶湯

調服即吐出原物如藥性來遲令患人兩手伏地用清

水一盆以鷄翎口中攪探即吐出於盆內

又方 治魚刺并骨鯁在喉內

用山查樹獨根向下者與玉簪花根同搗取自然汁用

匙或竹筒盛汁送入口內不可着牙着牙皆化

太乙神丹 一名追毒丹 又名紫金丹

雄黃一兩

文蛤一名五倍子使

射香錢三

紅芽大戟去皮洗淨焙

硃砂錢五

山茨菰去皮洗淨

千金子

一名續隨子去殼研去油取霜一兩

右除雄黃硃砂千金子射香另研外其餘三味為細末

却入前四味再研勻以糯米糊和劑杵千餘下作餅子

四十個如錢大陰乾治一切醫所不療之疾毒藥蠱毒

瘴氣狐狸鼠莽惡菌河魃等毒喫死牛馬肉毒蛇犬惡

虫所傷中惡瘟疫傷寒結腦發狂纏喉諸風癰瘡赤腫

丹瘤生薑薄荷汁入井花水磨服大人中風諸癰用

酒磨服小兒急慢驚風五疳八痢一餅作五服入薄

荷一葉同井花水磨服牙關緊者塗之即開癰疽發

背疔腫一切惡瘡用井花水磨服及塗患處未潰者覺

痒立消頭痛用酒入薄荷同研爛以紙花貼太陽穴

上立効體實者一餅作二服體虛者一餅作三服凡

服此丹但得通利一二行其効尤速如不要行以米粥

補之若用塗瘡立消孕婦不可服

解毒丸三因方治誤食諸毒草并百物毒救人於必死

板藍根乾者貫衆去土青黛別生甘草各二

右為末蜜丸如梧桐子以青黛別為衣如稍覺精神恍

惚惡心即是誤中諸毒急取藥十五丸燂嚼新吸水下

青黛雄黃散三因方凡中毒及蛇虫咬傷即服此藥乃令

毒氣不得聚

上好青黛雄黃各等分

右為末新汲水調服二錢

礬茶散治中諸物毒

晉礬建茶各等分

右為末每服二錢新汲水調下得吐即効未吐再服

丹砂丸治蠱毒

雄黃硃砂別研各藜蘆炒鬼臼

巴豆去殼心膜油

右為末蜜丸如大豆每服三九空心乾姜湯下當轉下

惡物并蠱等如煩悶後以鴨為羹食之

雄射散治五種蠱毒

雄黃末射香末各等分

右取生羊肺如指大以刀開內裹藥吞之

又方治蠱毒

用升麻末三錢溪水調服

又方治中毒下血者

用蜎皮燒為灰細研以水調下二錢日進三服立愈

又方 治五種蠱毒

以馬兜鈴根三兩搗篩分為三貼用一貼以水一大盞煎至五分去渣空心頓服當時吐蠱出未快再服之以快為度

○袖珍方云蠱之為毒醫書所載雖有數種而中土少見之今古相傳多是閩廣深山之人於端午日以蛇虺蜈蚣蟻蟻三物同器貯之聽其自相食啖俟一物獨存者則謂之毒欲害其人密取其毒於酒食中啖之若中其毒者令人心腹絞痛如有虫咬吐下血皆如爛肉若不急治食人五臟即死然此毒中人有緩有急急者十數

救急

心法附餘卷之五

三

胃

日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死死則其毒流注於傍人亦成蠱注大抵驗試蠱毒之法令病人咳唾水中沉者是毒浮者非也或含一大豆其豆脹皮脫者蠱也豆不脹皮不脫又非也又以鵠皮至病人卧下勿令知覺病甚者是否則非也治療之法必須審而後行試而後可今人凡有積聚脹滿之病類乎蠱者便以為蠱尤為非也世說閩廣深山之人專有以蠱行毒於人者若欲知其姓名呼喚將云其病自愈又一說病者善能知原中毒是何物終身不服此物其毒亦不復作雖相傳如此俱未之見謹用載之以備搜覽

解砒毒 百一選方

漢椒四十粒 黑豆十四粒 烏梅二個 甘草節二寸 右咬咀用水一碗煎至七分溫服

又方 百一選方 解砒毒

白扁豆 青黛 甘草各等分 巴豆一錢去殼

右為極細末以沙糖一大塊水化開調一大盞飲之毒隨利去却服五苓散之類五苓散見中暑類

中砒毒 醫方大成

以地漿調鉛粉服之立解鼓汁又佳

解砒毒 經驗方

救急 心法附餘卷之五

南

言

用早禾捍燒灰新汲水淋汁絹帛濾過冷服一碗毒從利下即安

又方用水調豆粉吞之或草豆據水服皆可

解砒毒鼠莽毒 醫方大成

用旋刺下羊血或鷄鴨血熱服効 又有用烏柏根搗

水亦好

解鼠莽草毒

用大黑江豆煮汁服之如欲試其驗先用鼠莽草葉以豆汁澆其根從此敗爛不復生矣

又方 解鼠莽毒

用枯過明礬同極等好茶末少許新汲冷水調服令人

用之累効

解諸毒

用玉簪花根搗水服

又方 解諸毒 醫方大成

用黃連甘草節水一碗煎服

治食河魮魚中毒 醫方大成

一時用治倉卒無藥急以清油多灌之使毒物盡吐為

愈

中烏頭天雄附子毒 醫方大成

救急 心法附餘卷之三

用大豆汁解 遠志防風棗肉飴糖並能解

中巴豆毒 醫方大成

以黃連大豆苗清汁並解之

解砒毒及巴豆毒 經驗方

用藍根沙糖二味相和搗水服之或更入薄荷汁尤妙

治中諸藥毒 百一選方

生甘草 黑豆 淡竹葉 各等分

右咬咀用水一碗濃煎連服

解一切菌毒 百一選方

掘新地窟以冷水於內攪之令澄清取飲之即解謂之

地漿

又方 解食野菌中毒

用甘草不拘多少以麻油一盞煎數沸冷服其毒即解

治毒蛇惡犬蜈蚣蝎螫咬傷

細辛 白芷 雄黃 射香 少許

右為細末以好酒調服一錢

治一切蛇虫作傷 百一選方

用貝母為末酒調令病者盡量飲之少頃酒自傷處為

水流出候水盡却以藥渣傳瘡上即愈

治蛇虺蜈蚣咬傷 百一選方

救急 心法附餘卷之三

用艾於傷處灸三五壯拔去毒即愈

治蜈蚣諸毒虫所傷 經驗方

用清油燈心點燈以傷處於煙上薰之其痛即愈

又方用鷄糞塗之亦可

一方 治蛇傷

雄黃 五靈脂 貝母 香白芷 各等分

右為末每服二錢熱酒調服

又方用白礬以滾水泡洗其傷處

治惡蛇所傷 秘方

用青木香不拘多少煎服其痛即止

治蜈蚣咬傷

用百附子嚼搗患處立効

一方 治蜈蚣咬傷腹腫痛 即水腫

用田中泥為丸水吞下其虫必隨吐瀉出

治狗咬百一選方

用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗然後以此

塗傷處

治犬咬傷 經驗方

用草麻子五十粒去殼以井花水研成膏先以鹽湯洗

傷處後以此膏敷貼

救急 心法附餘卷之三十四

十七

治二百四十一

一方用虎骨屑傅之

一方 治顛犬咬傷及經久復發者

雄黃 黃明者五錢 射香 五分

右研勻以酒調服二錢服後得睡為佳俟其自醒利下

惡物再進一服即見効

定風散 治風狗咬傷

南星 生 防風 各等分

右為末先以口噙漿水洗淨傷處用綿拭乾以藥糝上

更不發無膿易瘥

又方 治風狗咬傷 經驗方

此病雖為小可乃九死一生之病可急用斑貓七個

翅足為末酒調服於小便盆內見水沫似狗形者為効

如無再服七次無狗形亦不再發也此方屢試屢驗

又方 治風狗咬傷 秘方

用斑貓七箇去翅以糯米一撮炒黃去米不用將斑貓

研為細末麪糊丸如菰豆大每服七丸溫酒下

又方 治顛犬所傷 醫方大成

用斑貓大者二十一隻去頭翅足用糯米一勺先將斑

貓七隻入米內於微火上炒不令米赤去此斑貓別以

七隻再於前米內炒令斑貓色變復去之又別用七隻

如前法炒以米出青烟為度去斑貓不用以米研為粉

用冷水入清油少許空心調服須臾又再進一服以小

便利下惡毒為度如不利再進一服利後肚腹疼痛急

用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃連水

亦可不宜便食熱物

又方 治風犬傷 經驗方

隨用蝦蟆後兩腿搗爛酒調服或醋亦可先於頭頂上

拔血髮三二根小便內見水沫

又方 治風狗咬傷 秘方

用葱白心四十九根搗爛如膏用生蜜一同調和用竹

簡見盛放用紙封一七日如有人被傷用此膏貼傷處  
瘡口上七日又用葱白皮封着如瘡口大再換膏子貼  
共二七日切忌諸般葷腥一百日外用消風散一錢用  
熟健豬肉七片葱白七莖蜜一小匙和撲再入原煮猪  
肉汁泡使葱白熟方可患人熟食小兒用肉七小片消  
風散一錢蜜半匙煮服消風散方見頭風類

## 十危病方

一百有四 新增

附諸方

華陀十件危病方 經驗方

救急

心法附餘卷之十四

九

漢神醫華陀字元化嘗云人有危病急如風雨命醫不  
及須臾不救觀其橫天實可哀憐予因暇日選十件危  
病處三十妙方以救橫天詳錄于後不可不知

一霍亂吐瀉

其證始因飲冷或冒寒或失饑或大怒或乘舟車傷動  
胃氣令人上吐吐不止令人下瀉吐瀉併作遂成霍亂  
頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷用藥遲緩須臾不救

吳茱萸

木瓜

食鹽各五錢

右三味同炒焦用磁罐盛水三升煮令百沸却入前藥  
同煎至一二升已下傾一盞隨病人意冷熱服之藥入

即醒

如倉卒無藥用枯白礬末每服一錢用百沸湯

點服

如無白礬只用鹽一撮醋一盞同煎八分溫服

或鹽梅鹹酸皆可煮服

二纏喉風喉閉

其證先兩日胸膈氣緊出氣短促驚然咽喉腫痛手足  
厥冷氣閉不通頃刻不治

巴豆

七粒三粒四粒生者去殼生  
研熟者去殼炒去油存性

雄黃卑子大  
明者研

鬱金

一箇蟬肚  
者研為末

右三味研末每服半字茶調細呷如口噤咽塞用小竹

管納藥吹喉中須臾吐利即醒

如無前藥用川升麻

危病

心法附餘卷之十四

辛

四兩剉碎水四碗煎一碗灌服又無升麻用皂角三

錠槌碎按水一盞灌服或吐或不吐即安

三吐血下血

其証皆因內損或因酒色勞損或心肺脉破血氣妄行  
血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側柏葉

氣乾

人參

焙乾各  
一兩

右二味為末每服二錢入飛羅麩二錢新水調和如稀

糊服如無前藥用荊芥一握燒過蓋地上要出火毒

碾如粉陳米飲調下三錢不過二服如無荊芥用金

底墨研如粉服三錢米飲下連進三服



四中砒霜毒

其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面口青黑四肢逆冷命在須臾

用黑鉛四兩磨水一碗灌之 如無前藥青藍兩握

研井水調一碗灌之 如無藍用清油二升許灌服

其毒即解 又無油掘地用水作漿濃吃一二碗土用黃色者佳

五尸厥

其證奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣出如雷鳴

燭硝五錢 硫黃二兩

危病 心法附餘卷之三

主 第三卷

右研如粉作三服每服用好陳酒一大盞煎覺燭硝起

傾於盞內蓋着服如人行五里又一服不過三服即醒

兼灸百會穴四十九壯臍下氣海丹田三百壯身溫止

如無前藥用附子七錢重炮熱去皮臍為末分作二

服用酒三盞煎一盞服 又無附子用生薑自然汁半

盞酒一盞同煎令百沸併灌二服仍照前灸

六中忤中惡鬼氣

其證暮夜或登廁或出郊野或遊冷屋或行人所不至之地忽然眼見鬼物鼻口及着惡鬼氣驚然倒地四肢逆冷兩手握拳鼻口出清血性命途巡須臾不救此證

與尸厥同但腹不鳴心腹俱暖凡中惡驚然倒地切忽

移動其屍即令親戚眾人圍繞打鼓燒火或燒射香安

息香蘇合香樟木之類直候醒記人事方可移歸

犀角末五錢 射香 硃砂各一錢半

右為末每服二錢井水調下 如無前藥用雄黃末服

一錢煎桃枝葉湯調灌 又無雄黃用故汗衣或觸衣

汗衣者着在身上多時久遭汗者佳觸衣者久着內衣

襯衣也婦用男衣男用婦衣燒存性服二錢百沸湯調

下

七脫陽

危病 心法附餘卷之三

主 第四卷

其證多因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不省人

事或傷寒新瘥誤與婦人交其証小腹緊痛外腎搐縮

面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽証須臾不救先以葱白

數莖炒令熱熨臍下次用

附子一枚重一兩對八片

白朮

乾姜各半兩

木香二錢半

右四味各研末用水二碗煎八分碗放冷灌服須臾

又進一服合渣併服 如無前藥用桂皮二兩好酒二

升煎一升分作二服灌之 又無桂皮用蔥白連鬚三

七根細判沙盆內研細用酒五升煮至二升分作二服

灌之陽氣即回先用炒鹽熨臍下氣海方令氣冷又無葱白用生姜二七片亦好依前法服

### 鬼魘鬼打

其證初到客舍館驛及久無人居冷房睡中覺鬼物魘打但其人嗤嗤作聲便令人叫喚如不醒此乃鬼魘也

### 牛黃

雄黃各一錢硃砂五分

右研為末和勻每挑一錢床下燒次挑一錢酒調灌之

如無前藥用桃柳枝東邊者各折七寸煎湯灌下

又無桃柳枝用龜心土搥碎末服二錢并水調灌更挑

### 危病

心法附餘卷之三

重

三百三十五

半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中次并灸兩脚大指內離甲一韭葉各灸七壯

### 九孕婦逆生

其証孕婦欲產時遇腹痛不肯舒伸行動多曲腰眠時忍痛其兒在腹中不得轉動故脚先出謂之逆生須臾不救子母俱亡

### 烏蛇退

一條蟬退十四個血餘脂髮一匙

已上各燒灰服二錢酒調下併進二服仰臥霎時兒即順生如無前藥用槐子二七粒并井花水吞下又無槐子用小絹針於兒脚心刺三五針急用鹽少許塗

脚心刺處即時順生子母俱活

十胎衣不下惡血湊心

其証心頭迷悶胎衣上逆衝心須臾不治其母即亡

### 乾漆

五錢大附子一枚炮去

已上用大黃末五錢酒醋熬乾即入前二味為丸梧桐子大每服三十九淡醋湯吞下須臾又進二服胎衣空

下此藥可預先合下妙如無前藥用赤小豆一升炒

過用水三升煮二升去豆取汁溫服其胎衣立下又

無豆用婦人自己手足指甲燒灰酒調須臾又進一服

更令有力婦人抱起將竹筒於心上趕下妙

### 危病

心法附餘卷之三

重

三百三十五

## 備用要方

一百有五新增

### 附諸方

夏月傷暑發熱汗大泄無氣力脉虛細而遲此暑傷元氣也服後方

### 人參

錢一錢麥門心一錢黃連五分

### 黃柏

三分白朮一錢白芍藥一錢甘草五分

### 陳皮

一錢白茯苓一錢香薷知母各七分

右用水一鍾半生薑三片煎七分食前溫服

夏秋暑熱困熱過飲食冷物茶水傷其內又過取涼風傷

其外以致惡寒發熱胸膈飽悶飲食不進或無嘔吐泄瀉此內外俱傷寒冷也

人參一錢 白朮二錢 乾姜一錢炒 甘草五錢炙

厚朴一錢姜 陳皮一錢 羌活 枳實

白茯苓一錢

右用水二盞生姜三片煎至八分食前溫服

夏暑若在途中常服以壯元氣清熱驅暑服之免中暑癘

亂泄瀉痢疾等證

人參一錢 麥門冬一錢去心 五味子十粒杵碎 白茯苓一錢

白芍藥一錢炒 甘草五分炙 知母七分炒 白朮一錢半

黃芩二分炒 陳皮 香薷各七分

右用水一盞半生姜三片煎至七分食前溫服

人遇勞倦辛苦用力過多即服後方二三服免生內傷發

熱之病此方主於補氣

黃耆一錢半 人參一錢 甘草五分炙 麥門冬一錢半

陳皮 白朮各一錢 五味子二十粒杵碎

勞倦甚加熟附子四五分 煎法同上

人遇勞心思慮損傷精神頭目眩昏心虛氣短驚悸煩熱

即服後方補血為主

人參一錢 五味子十五粒 當歸一錢 麥門冬一錢半

白芍藥一錢 山梔子五分炒 茯神一錢去 酸棗仁一錢炒  
生地黃五分酒洗 甘草五分炙 陳皮五分 川芎五分

右用水一盞半生姜三片煎至七分食前溫服

體氣 一百有六 新增

丹溪心法

○狐臭用硃砂蜜陀僧明礬銅青白附子辰砂為末先

皁角水洗二三次後傳上不過三次全好 又方加黃

丹水銀用白梅肉為丸擦之 又方飛黃丹蜜陀僧明

礬以蒸餅蘸藥擦之

附諸方

田螺散 治體氣

用大田螺一枚水中養之俟靨開以巴豆一粒去殼將

針挑巴豆放在內取去拭乾仰頓蓋內夏月一宿冬月

五七宿自然成水取搽腋下絕根 一方先用臘脂搽

腋下其出狐臭之處黃色就將前說巴豆田螺去靨掩

於狐臭之上絹帛勒緊其狐臭從大便出則絕根矣

一方用熱蒸餅一個擘開作兩邊搽蜜陀僧細末一錢

急夾在腋下畧睡少時候冷棄之除根

# 汗癬

一百有十 新增

附諸方

一方 治汗癬紫白色者

右用白附子硫黃各等分為細末以茄蒂蘸醋粘末擦之

又方

用夏枯草濃煎水日洗數次

肥皁凡方 去白癬黑點白癬諸般瘡痕令人面色好

白芷 白附子 白僵蚕 白芨

汗癬 心法附餘卷五 三

白茯苓 白敏 草烏 三奈

甘松 白丁香 杏仁 豆粉

猪牙皁角用 各一兩 肥皁 去裏外皮筋并子

輕粉 蜜陀僧 各半 孩兒茶 三錢 樟腦 半兩

右先將淨肥皁肉搗爛用鷄子清和晒去氣息將各藥為末同肥皁鷄清和為丸

一方 點疔塗瘡去瘡

人言 雄黃 各一錢 巴豆 個 蟾酥 二分

右為細末將瘡口用針撥開以藥點上如貼癰癰瘡去

蟾酥用輕粉

# 烏髭髮

一百有八 新增

附諸方

犀皮膏 御藥院方 治髮髮乾燥能令潤澤

小麥麩 半斤 半夏 湯洗 沉香 半兩 生薑 一兩 和皮

右用水一碗生薑一兩和皮細切同煎去渣取清汁入腦射少許攪勻洗髮髮自然潤澤

洗髮菊花散

乾菊花 蔓荊子 乾栢葉 川芎

白芷 細辛 去苗 桑白皮 去黃粗皮生用

烏髮 心法附餘卷之五 三

早蓮 根並花葉 各一兩

右咬咀每用藥二兩漿水三碗煎至二碗去渣洗髮

三聖膏 御藥院方 治髮髮脫落能令再生

黑附子 蔓荊子 栢子仁 各半兩

右為末烏鷄脂和搗研乾置瓦合內封固百日取出塗在髮髮脫處三五日即生自然少壯不脫

烏雲散 御藥院方 治髮髮黃白不黑

膽礬 五倍子 百藥煎 青胡桃皮

酸石榴皮 訶子皮 木瓜皮 猪牙皁角

何首烏 細辛 各等分

右為末煉蜜丸如錢大常於木炭內培養勿得離灰  
要烏髮髮時用熱酒化開塗髮上好熱酒亦可

方

生薑 半斤 生地黃 半斤 各洗淨研

右用不蛀阜角十莖去黑皮并筋將前藥汁蘸阜角慢  
火炙黃用藥汁盡為度前藥渣同入罐內用火煨存性  
為末用鐵器盛藥末三錢湯調停二日臨睡將藥蘸汁  
髮即黑

烏髮方

針少一錢一分潔淨者用好醋浸過一七撈起晒乾  
金石用少許慢火炒炒三二過起紫色為度  
烏髮 心法附餘卷三

訶子皮 百藥煎 白芨 各五分 阜蓉 三分半

右各搗為末用好醋調勻如爛泥為度至晚調塗髮上  
勻濟却用青葉葉預先用火烘軟包髮上再加油紙  
包却用手帕或用絹包裹令緊勿令透風延過一夜至  
清晨解脫用肥阜角洗去即黑極妙用核桃肉油潤之  
如連肌肉黑丁用無漿粉白布一擦即去

黑髮散 延生至寶

官粉 真蛤粉 黃丹 蜜陀僧

石灰 一錢 三

右為末水調搽上如乾水洗去藥核桃油潤

華山處士摘髮髮白日面東摘每日辰時

正月 初四 十七

二月 初八 二十

三月 初八 初十 十二

四月初三 十六 十八 十九

五月 十一 十六

六月 初四 十四 十七

七月 初三 初四 十八

八月 十五 十九 二十

九月 初二 初四 十五

十月 初七 十二 二十二

十一月 十五 十七 二十

十二月 初七 十六 三十

早蓮花 沒石子 荷葉 活猪鬃

各等分先將猪鬃鐵鉋內炒次將餘藥並炒令焦黑存  
性為末以柳枝自然汁調少許拔白即離入藥以柳枝  
蘸藥妙不可言

烏髮方

用大水蛭一箇放磁碗中餓一七將水蛭洗淨用白毛  
烏骨雄鷄血以好清烟京墨磨濃傾尿胞內任水蛭吮

飽將針刺破流出血汁搽髮髮留根二分其汁浸漬入肉髮髮一年茂黑不退且柔軟不損極妙

一方

五倍子

銅末

細辛

右各為細末對和一處次用石榴皮一個烏梅三個細茶一撮水二盞煎至七分去渣用磁茶盞盛將前末藥

汁納放鍋內重湯煮藥至皺面取起至晚間用柅子蘸藥刷上次早溫水洗臉鬚髮如漆

烏髮

又方

五倍子

用梓杖在板上新砂鍋內炒黑豆大小塊次揀去虫時為度用新布一塊水濕了包倍子攪碎

用三錢二分為極細末五倍子餅旋取為末

如無亦不效二三日亦不效

銅末 五分 硃砂 四分 浸石子 一分

共為極細末用煮烏梅水調和如稠糊搽時臨晚先將

鬚髮用菜豆粉和水洗再用減水洗如無減水用淋灰

水洗只要洗去油膩仍將白鬚用礬水洗過然後搽前

藥勻遍方變上色

○已上諸方外傳之劑

駐顏小丹煉方 韓飛霞方 此有古方主烏髮不驗方外一

衲報一煉法

茯神

辰砂

川椒

石五味為細末以人乳和稀劑入搗鴨蛋殼內糊紙封

固加以絳袋令體潔婦人帶于胸乳之間四十九日旦

夕不離取出乾透則成否則壞再研用棗肉和丸如棗

豆大每日空心人乳送下或人參麥門冬湯代之則時

酒下亦可 凡心血不足怔忡健忘等疾皆宜

一方 前藥五味各一兩用雞蛋二個去清黃只將辰

砂乳香各裝一蛋內用紙糊七層以青絹袋盛之令精

壯婦人懷於肚上辰砂懷三十五日乳香懷十九日

取出各為細末棗肉為丸用庚申甲子之夜幽靜處脩

合忌婦人雞犬見之每日清晨空心好酒服三十丸至

一月外加至四十九服至十次鬚髮自然發黑百日通

稍發黑

詩曰遐齡萬壽丹服食魂魄安養藥雞抱卵日期要週

全脩合宜深室一切人勿觀甲子庚申夜為丸不見天  
一返增六十二返百廿年服藥非凡骨壽同天地間秘  
之又秘之玄之又更玄

一秤金

熟地黄 兩二 甘州枸杞 蓮蕊

槐角子 去黑皮俱用酒 薄荷 三兩一半入

沒石子 一兩 人參 木香 各五

右為細末煉蜜為餅釐棋子大每日空心嚥化一餅日  
進三餅久之鬚髮皆黑凡酒浸者春秋三日夏一日冬  
六日

烏髮 心法附錄卷之五 七仙丹 此藥補心腎注容顏黑髮之聖藥

何首烏 酒洗九兩四兩 人參 二兩 生地黃 酒洗

熟地黄 酒洗 麥門冬 去心 天門冬 去皮心

小茴香 炒黃色 白茯苓 去皮春夏用

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸嚼爛好黃酒  
送下鹽湯亦可或丸如梧子大每服五十丸空心酒送

下亦可忌二白房事合時勿犯鐵器有奇効二白者葱  
蒜與蘿蔔也

古養心腎丸 補心腎烏髮 方見補損

○已上諸方內服之劑

# 駐容顏 一百有九 新增

附諸方

復香湯 百一選方

木香 丁香 檀香 沉香

人參 甘草 各一 枳殼 錢五 白茯苓 去皮

右為末每用二錢滾水服 此藥香能散氣不可久服

橙子湯 百一選方 鹽白梅 四兩打碎去 乾山藥 兩一 鹽 炒四兩 甘草 兩二

右先用五味一處爛研作餅子焙乾再碾為末百沸湯

調服 椒欖湯 百一選方 百藥煎 三兩 甘草 錢二 檀香 白芷 各五

右為細末沸湯點服 桂花 旋摘三升揀去蒂細研 乾姜 錢二

桂香湯 百一選方 甘草 錢二

右為末同桂花拌勻入炒鹽少許磁器盛貯沸湯點服

洞 選方

子 44-655

用薄皮黃柑子二斤於盆內薄去核留汁生薑去皮  
斤甘草四兩鹽三兩炒神麩麥芽各四兩拌和卷一宿  
以橘汁盡為度取出焙乾碾為細末沸湯點服

楊梅煎醫方大成

取熟楊梅於瓦器內卷一宿即爛用絹袋搗出汁慢火  
熬成膏瓦罐貯每用入蜜少許沸湯點服

金櫻煎醫方大成

霜時取金櫻子先擦去刺洗淨然後去穰搗爛用酒下  
取汁絹帛濾過慢火熬成膏後入檀香諸香在內瓦罐  
收貯沸湯點服酒調亦可

木瓜煎醫方大成

用木瓜去穰子蒸過爛研如泥入鹽少許用瓦罐盛貯  
每用入蜜少許沸湯點服

梅花湯醫方大成

旋摘梅花半開者溶蠟封花口投蜜罐子過時用之以  
匙桃花一二朵連蜜一匙沸湯斟服

集香湯秘方

白豆蔻剉一兩 縮砂剉一兩 白檀一兩 人參一兩

胡椒半兩 甘草三兩

右六味除檀香人參胡椒泡乾外將白豆蔻甘草白鹽

四兩相合鹽一宿次日就慢火上鐵器內炒乾不可大  
急恐作火氣與檀香三味共碾細用磁器收湯點服

糖毬子即山 甘草二斤 香附半斤 藿香葉

甘松各一兩

右為末炒麩糊丸如梧桐子大每服四五丸嚼茶清下  
不拘時服

補真丹

蜜半斤 煉熟以 酥油 牛髓

杏仁去皮 山藥 核桃仁去皮

駐顏心法附錄卷之四

白茯苓各四兩

先煉蜜酥并髓勻後下諸藥拌勻或丸或散空心湯點  
服之

白砂丹

茯苓三五斤 去黑皮為細末須要堅

用水淘三五遍去筋膜用白砂蜜對分拌勻固封罈口

鍋內懸煮一晝夜土埋三日去火毒白湯調服補虛補

心

瓊玉膏

生地黃一百六十斤 取汁重羅濾過

成煎去淨沫再濾過二十四斤



人參一斤十兩頭取 白沙蜜十斤重湯煉去  
白茯苓四斤去皮蒸爛去水去筋

右四味共入一處攪勻重羅濾過納磁罐內用蜜蠟打

成綿紙固封罈口七八層懸於大鍋內用桑柴火煮一

晝夜如水涸旋添熱水煮畢取出沉於井中水浸一晝

夜出火毒取出又煮一時出水氣如遇夏熱放陰涼所

在或埋地中其製時要靜處不聞雞犬婦人方妙藥成

先用些祭過天地方可自用每日用黃酒納藥一二匙

攪勻飲之不用酒白湯下日進二三服有能服過一料

者活百餘歲白髮變黑老還童顏妙不可言矣

地黃煎

生地黃不拘多少取 生麥門冬不拘多少取

右二煎入作一處濾過入砂鍋內同熬一時四分入蜜

一分再熬一時取出納磁罐內收之亦照前服瓊玉膏

法服之

人參膏

治傷寒汗吐下後壞証及行倒倉法吐下後用此補之

韓飛霞曰人參煉膏回元氣於無何有之鄉王道也

肺虛嗽亦宜人參膏補之如肺虛兼有火邪者人參膏

與天門冬膏對服之妙

人參去蘆剉細如前常藥法量水於銀石器內煎至一  
半渣再煎兩度去渣通以所煎汁文武火熬稠而止諸  
藥煎膏倣此

地黃膏

男婦血虛者用之

牛膝膏

男子腎虛及腰膝疼痛或痿弱者用之女人血虛及有

血病者用之

八仙茶韓飛霞方

粳米

黃粟米

赤小豆

黃豆

菜豆

細茶

芝麻

花椒

小茴香

乾白姜

白鹽

已上十一味俱為極細末和合一處外用小麥麴炒黃

熟與前藥等分拌勻磁罐收之胡桃仁肉棗松子仁瓜

仁白砂糖之類隨意加入每用二三匙白湯點服

長松酒韓飛霞方

長松

生地黃

陳皮

枳殼

當歸身

白芍

天門冬

半夏

厚朴

其菊

麥門冬

砂仁

木香 錢三	人參 錢四	蜀椒 錢二	酥 錢一
黃柏 錢五	黃連 錢三	小紅棗 八個	胡桃仁 二錢
老米 一撮	蒼朮 米泔浸去 根皮三錢	燈草 五寸長一 百二十根	

一料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒五罇煮一袋膏  
久用之

枸杞酒 韓飛實方 治大症酒性熱三藥制之

枸杞 黃連 炒各五錢 菜豆 錢一

右作一劑絹袋盛之用米五升造酒五罇用前藥煮膏  
久用之

固本酒 古唐方

駐顏 心法附錄卷之三 五

生地黃 煉新肥者 竹刀切	麥門冬 二味各一斤半用 酒浸二日去心
熟地黃 煉新肥者 竹刀切	天門冬 二味各一斤半用 酒浸二日去心
川牛膝 去芦酒 浸四兩	甘州枸杞 二兩
遼人參 四兩去 頭	川黃柏 去粗皮剉酒 色三兩
廣木香 兩半	確砂仁 兩半

一料分作十劑絹袋盛之每劑糯米一斗擠醇酒納瓦  
罐壘中納藥於內煮熟膏久用之每次冷飲一二盃或  
三五盃為止

仙家酒 大能益心氣補腦髓治消渴勞怯及風火症老  
人尤宜

棟潔淨婦人乳每用一吸即以指塞鼻孔按唇貼齒  
漱乳與口津相和然後以鼻內引上吸使氣由明堂入  
腦方可徐徐嚥下凡五七次為一度不漱而服者何異  
飲酪止於胃腸爾

班龍宴 韓飛實方

養壯鹿一二隻每日煎人參一兩湯飲之渣和草料飼  
之每用預夜減食次晨空心以布縛鹿於床首低尾高  
用三稜針刺眼大背前毛孔名天池穴銀管三寸許揮  
向鼻梁吮其血和以藥酒任意或入瓊散加沉香煮者  
盡量月可一鹿無恙若有屠刺鹿血乘熱和酒一醉亦  
妙

駐顏 心法附錄卷之三 四

小刀圭 此方所授與古方小異 韓飛實方

用黃牛犢一隻未知陰陽者肥嫩純黃色先期辨後開  
藥料至臘月初八日或本月戊巳日宰取血擣毛留皮  
碎切臟腑分寸不遺用長流水大鍋煮至半熟下後項  
藥肉以半斤為塊每肉十斤入

人參 兩	茯苓 去皮三兩	綿黃芪 五兩	良姜
肉桂 去粗皮各半兩	陳皮 去白三兩	甘草 去皮一兩	花椒 去目一兩
白鹽 八分	醇酒 上下		

右各件同牛肉煮文武火旋添熟水常以八分為節午

肉爛如泥槌骨內之髓煎化入汁中漉去渣但存稠汁如稀飭待冷入蜜甕掘黃土坑埋齊甕口封固凡早食不拘何樣飲食加此每每調和人事勞苦并房慾之後以醇酒調服造酒至醉來之日加此甚佳

## 拾遺雜論

一百二十

丹溪心法

小便黃用黃柏澀者數者或加澤瀉又云小便不利黃柏知母為君茯苓澤瀉為使若濕熱流注下焦小便赤

黃兼以澀滯用黃柏澤瀉甚當若稟受甚壯酒食過

雜論

心法附餘卷三

聖

三百六十四

度寡慾無慮之人小便澀滯不利並口痛甚却不宜用寒涼藥并滲利之藥只宜升麻柴胡羌活甘草稍服後

却用驚翎探而人嘔吐數十聲其小便自通若是下

焦無血小便澀數而赤宜四物加黃柏知母牛膝甘草

稍

凡用引經藥正藥六兩引經藥只可用半兩

白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛

接骨續筋補虛與合歡樹皮同入長肌肉膏藥用之神

効

凡製玄明粉朴硝一斤蘿蔔一斤同煮蘿蔔熟為度取出

用白皮紙濾在甕器中露一宿收之冬月可製

凡治上升之氣大槩用香附黃連黃芩山梔

凡補中氣藥必多服而効遲劫藥必速効如汗下之法

白芍藥酒浸炒與白朮同用則補脾與川芎同用則瀉肝

與參朮同用則補氣能治血虛腹痛餘腹痛皆不可用

凡面黑人不不可多服黃芩以其氣實而又補之也面白

人不不可多發散以其氣虛而又虧之也面白人不不可

飲酒耗血故也氣實人因服黃芩過多喘者用三拗

湯以瀉其氣

用椒葉升起胃氣之後胸中滿悶舊有痰之故以二陳加

雜論

心法附餘卷三

聖

三百六十五

白朮香附炒神麴

二陳湯治濁加升提之藥能使大便潤而小便長

腰曲不能伸者針人中妙

一作委中

惡寒久病亦可解鬱

中焦有食積與痰而生病者胃氣不虛卒不便死

人有病面皮上忽見紅點者多死

凡治病必先問平日起居飲食如何

氣屬陽無寒之理上升之氣覺惡寒者元則害承乃制故

也

人卧則氣浮於肺

凡治病必先固正氣

升降浮沉即春夏秋冬

升降浮沉即順之此必先藏歲氣毋伐天和

寒熱溫涼即逆之以寒治熱之法

凡看脉如得惡脉當覆手取如與正取同乃元氣絕必難治矣如與正取不同者乃陰陽錯綜未必死

弦堅之脉雖是有積亦帶陰虛脉無水不軟之意脉緊指者真氣大虛多死峻補氣無水參耒喘之類形脫者必補氣參耒面白補氣肥人補氣

針法渾是瀉而無補妙在押死其血氣則不痛故下針隨處皆可

處皆可

灸法有補瀉火若補火艾滅至肉若瀉火不要至肉便掃

除之用口吹風主散

點三里穴隨意依古法點但跌陽脉不應即是穴蓋三里

屬陽明經也

灸瘡不收口用黃連甘草節白芷黃丹香油煎膏貼

一婦人十九歲氣實多怒事不發一日忽大叫而欲厥蓋

痰閉於上火起於下而上衝始用香附五錢生甘草三

錢川芎七錢童便姜汁煎服又用青黛人中白香附末

兩丸稍愈不除後用大吐乃安吐後用導痰湯加姜炒

黃連香附生姜煎下龍會丸

金釵石斛每二錢洗淨生薑一片搗細末盪起煎沸去粗

食前飲之補脾清肺甚妙

治赤遊風用二蚕沙炒研細用剪刀草根自然汁調勻先

塗腹了却塗患處須留一面出處患處移動為効剪刀

草根即野茨菇

酒風多搗用白木半兩人參二錢半甘草三錢陳皮蒼朮

天麻細切酒浸白芍一錢酒浸防風川芎二錢半若小

便多加五味子右為細末作丸服亦可

### 醫論

一百一十

新增

附明醫雜著

或問仲景東垣河間丹溪諸書孰優學之宜何主曰宜專

主內經而博觀乎四子斯無弊矣蓋醫之有內經猶儒

道之六經無所不備四子之說則猶學庸語孟為六經

之階梯不可缺一者也四子之書初無優劣但各發明

一義耳仲景見內經載傷寒而其變遷反覆之詳未備

也故著論立方以盡其變後人宗之傳用既久漸失其

真用以通治濕暑內傷諸症遂致誤人故河間出而始

發明治濕暑之法東垣出而始發明治內傷之法河間之論即內經五運六氣之旨東垣之說即內經飲食勞倦之義仲景非不知濕暑與內傷也特其著書未之及河間東垣之於傷寒則遵用仲景而莫敢違矣至於丹溪出而又集諸醫之大成發明陰虛發熱類乎外感內傷及濕熱相火為病甚多隨証著論亦不過闡內經之要旨補前賢之未備耳故曰外感法仲景內傷法東垣熱病用河間雜病丹溪一以貫之歸於內經斯醫道之大全矣

或問仲景處方藥品甚少及東垣用藥多至二十餘味丹

醫論

心法附餘卷之三

五

卷之三

溪云予每治病用東垣之藥效仲景處方庶品味數少則藥力專精丹溪何以不法東垣而効仲景耶曰明察藥性莫如東垣蓋所謂聖於醫者也故在東垣則可多他人而効其多斯亂雜矣東垣如韓信將兵多多益善丹溪不過能將十萬故不敢效其多

或問人言東南氣熱可服寒藥西北氣寒須服溫藥然今東南之俗胡椒姜桂人常食之不見生病而北京士夫畏食胡椒辛熱之物何也曰東南雖熱然地卑多濕辛熱食藥亦能却濕西北寒然地高多燥辛熱食藥却能助燥故耳治病用藥者亦識此意

凡治諸病時常審察有無飲食傷積但見胸膈飽悶或噯氣噯酸腹痛腸泄惡食少食便問曾何飲食審知傷積即便先調脾胃消導飲食然後用本病之藥或於本病藥內加入消導飲食藥若不知審此則藥雖對証而不効蓋人以脾胃為主脾胃自傷則不能運化藥味以成功也亦有食後即藥或藥後即睡或服藥太多者謂之傷藥要須識此吾妻常病胎漏忽日血大崩晝暈即服小便而醒少頃復暈急煎服荊芥隨醒隨暈服止血止暈之藥不効忽然嘔吐予以其童便藥汁滿於胸膈也即以手探吐之末後吐出米飯及糞菜碗許詢問適方

醫論

心法附餘卷之三

五

卷之三

午飯後着惱少頃即崩不止予悟曰因方飽食胃氣不行故崩甚血既大崩胃氣益虛而不能運化宜乎崩暈不止而血藥無效也急宜調理脾胃遂用白朮五錢陳皮麥牙各二錢煎服之服未半而暈止再服而崩止遂專理脾胃服數十服胃氣始還然後加血藥服之而安若不審知食滯而專用血崩血暈之藥豈不悞哉書此以例其餘

飲食過傷變為異常急暴之證人多不識嘗有一壯年人忽得暴疾如中風口不能言目不識人四肢不舉急投蘇合香丸不效予偶過聞之因詢其由曰適方陪客飲

食後忽得此証遂教以煎生薑淡鹽湯多飲探吐之吐  
小飲食數碗即時病愈又一婦人先傷飲食損胃後夜  
飯早時因事復起少穿衣服覺虛冷少頃忽得厥逆昏  
迷不省予曰此必有食也今煎薑鹽湯吐之吐出夜飯  
遂醒後服白朮陳皮半夏麥芽湯調理而愈大抵此等  
證多因飲食醉飽之後或感風寒或着氣惱而得飲食  
填塞胃氣不行內傷時重若誤作中風中氣證而用驅  
風解表行氣散氣之藥則胃氣重傷死在旦夕嘗見人  
有卒暴病多作中風中氣用藥須臾不救莫知其由內  
經雖有暴病暴死之証但恐多有因於食者前輩不曾  
明言故人不識耳今後遇有此等急証須要審問明白  
若方飲食醉飽或屢傷飲食重複受傷但覺胸膈有食  
滯者只作食治之

南方人稱發熱為勞發蓋謂勞苦而發熱即東垣內傷之  
旨也此病輕者一二發自愈重者用東垣法補之重甚  
者可加熱附子人若因勞力辛苦而發熱切不可誤作  
外感輕易發汗也

內傷發熱是陽氣自傷不能升達降下陰分而為內熱乃  
陽虛也故其脉大而無力屬肺脾

陰虛發熱是陰血自傷不能製火陽氣升騰而為內熱乃

陽旺也故其脉數而無力屬心腎經曰脉大而無力為  
陽虛脉數而無力為陰虛無力為虛有力為實

傷寒發熱是寒邪入衛與陽氣交爭而為外熱陽氣主外

為寒而傷而失其職故為熱其脉緊而有力是外之寒  
邪傷衛也治主外

傷暑發熱是火邪傷心元氣耗散而邪熱入容於中故發  
為熱汗大泄無氣以動其脉虛遲而無力是外之熱邪

傷榮也治主內

病有感有傷有中感者在皮毛為輕傷者無肌肉稍重中  
者入臟腑最重寒有感寒傷寒中寒風有感風傷風中

風暑有感暑傷暑中暑當分輕重表裏治各不同又如  
中濕中氣中毒皆云中中者也謂邪直入於中也故

為重病

凡傷寒時氣大病熱退之後先服參芪甘溫之藥一二服

以扶元氣隨後便服滋血生津潤燥之藥蓋大病後汗  
液外耗水穀內竭必有小便赤澀大便秘結等証須識  
此意預藥防之

丹溪云氣病則治氣血病則治血兼痰則行痰兼鬱則開  
鬱斯言盡之矣近世治病多不知分氣血但見虛病便  
用參芪屬氣虛者固宜矣若是血虛則助氣而反耗陰

血耶是謂血病治氣則血愈虛耗甚而至於氣俱虛也故治病用藥須要分別氣血明白不可混淆此第一義也

凡泄瀉病誤服參芪等甘溫之藥則病不能愈而或變為黃疸蓋泄瀉屬濕甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則濕熱甚而為疸矣惟用苦溫苦寒之藥以治之則愈苦寒瀉濕熱苦溫除濕寒也泄止後脾胃虛弱方可用參芪等藥以補之

凡酒色過度損傷肺腎真陰咳嗽吐血衄血吐血咳血咯血等症誤服參芪等甘溫之藥則病日增服之過多則

醫論

心法附餘卷五

聖

本四百五

死不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消前項病證乃陰血虛而陽火旺宜服苦甘寒之藥以生血降火世人不識往往服參芪以為補予見服此而死者多矣東垣丹溪治病多自製方蓋二公深明本草藥性洞究內經處方要法故能自製自求以來局方盛行人皆遵用不敢輕率自為局方論證治病雖多差謬丹溪曾論辨之然方皆名醫所製其君臣佐使輕重緩急大小多寡之法則不差也近因東垣丹溪之書大行世醫見其不用古方也率皆效顰治病輒自製方然藥性不明處方之法莫究南奔亂雜反致無生甚有變証多端遂難識

治且夫藥之氣味厚薄不同如五味子之味厚故東垣方少者五六粒多者十數粒今世醫或用二三錢石膏味淡薄故曰白虎湯用半兩今世醫不敢多用補上治上劑宜輕少今不論上下率用大劑丸散湯液各有攸宜今不論緩急率用湯煎如此類者多矣今之醫者若非熟讀本草深究內經而輕自製方鮮不悞人也

或問今人有言東垣之法宜用於北丹溪之法可行於南

如何曰東垣北醫也羅謙甫傳其法以聞於江浙丹溪

南醫也劉宗厚世其學以鳴於陝西果如其言則本草

內經皆神農黃帝岐伯之說亦止宜施於北方耶夫五

醫論

心法附餘卷五

聖

本四百五

方所生異病及治之異宜內經異法方宜論五常正大論已詳言之矣又如北方多寒南方多熱江湖多濕嶺南多瘴謂其得此氣多故亦多生此病非謂北病無熱南病無寒也至於治寒以熱治熱以寒則五方皆同豈有南北之異耶但人之臟腑火各居二天之六氣熱居三分又半故天下之病熱多而寒少觀內經至真大論病機一篇可見又濕熱相火致病甚多自王太僕注文湮沒以致局方偏用溫熱之藥故丹溪出而闡內經之旨辨局方之偏論濕熱相火之病以補前人之未備耳後人不識見其多用苓連梔柏等苦寒之藥遂以為宜

用於南淺矣哉

昔有人云我但卧病即於胸前不時手寫死字則百無思慮俱息此心便得安靜勝於服藥此真無上妙法也蓋病而不謹則死必至達此理者必能清心克己凡百謹慎而病可獲痊否則雖有良藥無效也世人遇病而猶恣情任性以自戕賊者是故不知畏死者矣又有一等明知畏死而怕人知覺諱而不言或病已重而猶強作輕淺態度以欺人者斯又知畏死而反以取死尤可笑哉

## 用藥大畧

一百一十二 新增

用藥

心法附餘卷之五

至

三百六十五

附乾坤生意

○君臣佐使

論曰上藥為君中藥為臣下藥為佐使為君者主養命無毒多服皆能去病但其勢力和緩不為倉卒之効歲月悠久必獲大益為臣者主養性無毒縱有微毒斟酌得宜療病之功稍深輕身之說頗緩佐使者主治病有毒除寒熱邪氣破積聚主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服病愈即止大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐使用藥之法如朝廷之制若多君少臣少佐使則氣力不可周也藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君

二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也猶依本性所使

自有定主詳用此者益當為善又恐上品君中猶有品列譬如春秋諸侯雖並得稱王然猶宗周臣佐之中亦當如此凡和合之體不必徧用自隨人之聰明察而用之但君臣佐使務要配鍊得體毋相反者若單一味服之不論凡藥合三百六十五種應三百六十五度有單行者有相須者有相使者有相畏者有相殺者有相惡者有相反者藥單行者七十一種相須者三十二種相使者九十種相畏者七十一種相殺者三十六種相惡者六十種相反者十八種人參黨參玄參丹參芍藥細辛並反藜蘆白芨白斂半夏括萎貝母並反烏頭大戟芫花海藻甘遂並反甘草

用藥

心法附餘卷之五

至

三百六十五

○藥性反治

治病之法莫不以寒療熱以熱療寒塞則通之通則塞之益所不勝損其勝氣平邪伏病反乃良也然疾勢有大小藥力有輕重聖賢制立方論必求其所以伏其所主譬猶火也人間之火遇草燭得木而燭可以濕伏可以水滅疾之小者似之疾之大者則如神龍之火得濕反燭得水反燭寒與熱相拒熱與寒相違不可以常法治之故經有熱因寒用寒因熱用通因塞用塞因塞用之法治熱者以豆豉浸酒此因熱用寒者也治寒者以蜜浸烏頭此因寒



用熱者也久痢通消必當先去其積中滿實寒必當峻補其下經云塞積內凝久病泄瀉愈而復發連歷歲時以熱下之結散痢止此因通治通之法也下虛中滿之病補虛則滿甚於中宣導則虛弱轉甚故當踈啓其中峻補其下此因塞治塞之法也

○用藥增減

夫衆病積聚皆起於虛虛生百病積者五臟之所積聚者六腑之所聚宣可以去壅薑橘之屬通可以去滯通草防風之屬補可以去弱人參羊肉之屬瀉可以去閉葶藶大黃之屬重可以去怯磁器鐵粉之屬輕可以去實麻黃葛根之屬澀可以去脫牡蠣龍骨之屬滑可以去著冬葵榆皮之屬燥可以去濕桑白皮赤小豆之屬濕可以去枯白石英紫石英之屬

○藥象主治五臟

肝苦急甘以緩之甘草肝欲散以辛者川芎補以辛者細辛瀉以酸者白芍藥

心苦緩酸以收之五味子心欲更以鹹者芒硝補以鹹者澤瀉以甘者人參甘草黃耆

脾苦濕苦以燥之白朮脾欲暖以甘者甘草補以甘者人參瀉以苦者黃連

肺苦氣上逆苦以瀉之黃芩肺欲收以酸者白芍藥補以酸者五味子瀉以辛者桑白皮

腎苦燥辛以潤之黃蘗知母腎欲堅以苦者知母補以苦者黃蘗瀉以鹹者澤瀉

○用藥身稍

凡根在土者中半以上氣脉上行也以生苗者為根中半以下氣脉下行也以入土者為稍病在中焦者用身在上焦者用根在下焦者用稍蓋根升而稍降也大凡用藥以頭身稍分為上中下病在人身半已上者天之陽也用頭在中焦者用身在人身半已下者地之陰也用稍述類象形者也

○用藥丸散

仲景云剉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀者古之制也古者無鐵刀以口咬細今如麻豆為粗藥水煎之使藥清飲於腹中則易升易散也此所謂咬咀也今人以刀器剉如麻豆此咬咀之易成也若一槩為細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑是也咬咀之藥取汁清易循行經絡故也若治至高之病加酒煎如去濕加生薑煎補元氣以大棗煎發散風寒以葱白煎去膈上病以蜜煎散者細末也不循經

終止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣味薄者煎之和粗服丸者治下部之疾其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小也稠麪糊丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也犯半夏南星欲去濕者以生薑汁煮糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸炊餅為丸者及滴水為丸者皆取易化也煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者蕩也去大病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病用藥舒緩而治之意也

用藥

心法附餘卷之五

五

○用藥分兩

為君者最多為臣者次之佐使者又次之藥之於證所主同者則各等分也主治病者為君佐君者為臣應臣者為佐使也非上中下三品之謂也

○古今方劑分兩

古今方劑銖銖分兩與今不同謂如咬咀者即今剉如麻豆大是也云一升者即今之大白盞是也云銖者六銖為一分即今之二錢半也二十四銖為一兩也云三兩者即今之一兩也云二兩者即今之六錢半也料例大抵古今之分一足矣凡煎藥用銀石器微火煎不可太

下藥煎至八分對病藥煎至七分滋補藥煎至五分極熱亦不可猛火驟乾致傷藥力也

製方之法

一百一十三

新

附湯液本草

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等製其方者必且明其為用經曰味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純陽氣薄為陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄為陽凡此之味各有所能然辛能散結潤燥苦能燥濕堅軟鹹能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅故經曰肝若急急食甘以緩之心若緩急食酸以收之脾若濕急食苦以燥之肺若氣上逆急食苦以泄之腎若燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣也肝欲散急食辛以散之心欲軟急食鹹以軟之脾欲緩急食甘以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急食苦以堅之凡此者是明其氣味之用也若用其味必明其氣之可不用其氣必明其味之兩

宜識其病之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味隨其証而製其方也是故方有君臣佐使輕重緩急君臣大小反正逆從之制也主治病者為君佐君者為臣應者為使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也去咽嗑近者奇之遠者偶之汗者不奇下者不偶補上治上制之以緩補下治下制之以急急者氣味厚也緩者氣味薄也薄者少服而頻食厚者多服而頻食又當明五氣之鬱木鬱達之謂吐令條達也火鬱發之謂汗令疎散也土鬱奪之謂下無雍滯也金鬱泄之謂解表泄小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃治病之大要也

## 製造藥法

一百一十四 新增

議醫通纂要

○製香附法

香附主氣分之病香能竄苦能降推陳致新故諸書皆云益氣而俗有耗氣之訛女科之專藥也治本病畧炒無血以酒煮痰以薑汁虛以童便浸實以鹽水煮積以醋浸水煮婦人血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是質小

見日充形乃曰固大凡有病則氣滯而餒故香附于氣分為君藥世所罕知佐以木香散滯洩肺以沉香無不升降以小茴香可行經絡而鹽炒則補腎間元氣香附為君參耆為臣甘草為佐治虛怯甚速佐以厚朴之類決壅積我稜之類攻其甚者予嘗避諸香藥之熱而用檀香佐附流動諸氣極妙

○製當歸法

當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補凡用本病酒製而痰獨以姜汁浸透導血歸源之理熟地黃亦然血虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條苓不絕生化之源血積配以大黃婦形肥血化為痰二味姜汁浸佐以利水道藥要之血藥不能舍當歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃分生熟為佐芍為使可興要云

○製半夏法

痰分之病半夏為主脾主濕每惡濕濕生痰而寒又生濕故半夏之辛燥濕也然必造而為麴以生姜自然汁生白礬湯等分共和造麴葉包裹風乾然後入藥風痰以豬牙皂角煮汁去渣煉膏如餵火痰黑色老痰膠以竹瀝或荆瀝入姜汁濕痰白色寒痰清以老姜煎濃湯加煨白礬三分之一如半夏三兩煨過白礬一兩俱造麴如前法予

又以霞天膏加白芥子三分之二姜汁馨湯竹瀝造麴治痰積沉痾者日能使腐敗隨大小便出或散而為瘡此半夏麴之妙也古方二陳湯以此為君世醫因辛反減至少許而茯苓滲濕陳皮行氣甘草醒脾皆臣佐使而反多其銖兩益不造麴之過觀法製半夏以姜馨制辛而能大醫是也佐以南星治風痰以姜汁酒浸炒麥連及瓜蒌實香油拌麴畧炒之類治火痰以麴炒枳殼枳實姜汁浸蒸海粉之類治老痰以蒼朮白朮俱米泔姜汁浸炒甚至乾姜烏頭皆治濕痰而常有脾洩者以肉豆蔻半夏麴加麴藥作丸尤有奇効厚養之人酒後多此而苦濕為病者十常

製藥

心法附餘卷之五

卷

四百四十一

○製黃連法

火分之病黃連為主五臟皆有火平則治病則亂方書有君火相火邪火龍火之論其實一氣而已故丹溪云氣有餘便是火分為一類凡治本病畧炒以從邪實火以朴硝湯假火酒虛火醋痰火姜汁俱浸透炒氣滯火以茱萸食積黃土血疾癥瘕痛乾漆俱水拌同炒去更土漆下焦伏火以鹽水浸透焙目疾以人乳浸蒸或點或服生用為君佐官桂少許煎百沸入蜜空心服能使心腎交於頃刻

入五苓滑石大治夢遺以土姜酒蜜四炒者為君史君子為臣白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五痢以姜汁酒煮者為末和霞天膏治顛癇諸風眩暈瘡瘍皆神効非彼但云瀉心火而與苓藥諸苦藥例稱者此也

○造神麴法

六月六日謂諸神集會之晨故名神麴如過此日造者非神麴也或用此日辦藥料至上寅日踏麴亦是

白虎

即白麴

勾陳

即蒼耳自

滕蛇

即野蠶自

青龍

即青蒿自

玄武

即杏仁四升去

朱雀

即赤小豆三升

右共修合二伏內用上寅日踏極實為度或甲寅戌寅庚寅日乃三奇也近時神麴只以麴麥為之入藥多不効也一方加稀簪草自然汁尤妙

○造海粉法

擇取紫口蛤蜊不計多少三月取以炭火銀罐內煨成粉收時候至秋深待瓜萎熟時摘取連皮帶子搗爛如泥和勻乾濕得宜團如雞蛋大用篾穿之懸透風處陰乾次年聽用入末藥丸藥研極細入湯藥不宜細

○廣按丹溪云海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結痰

鉅款頑痰能消王節齋本草云海石即海蛤因蛤殼在泥沙日久風波淘漚圓淨如石故名海石其味苦鹹故能軟堅化痰今以蛤蚧爪蔓造法雖妙恐不如原物之味鹹也宜加朴硝方可

### ○煉蜜法

以白沙蜜一斤大磁碗盛重湯煮不住手攪文武火湯乾加水以蜜滴水不散為度大率蜜一斤煉成半斤罐封埋土七日凡和丸劑止以藥末一半入蜜春萬餘杵乾摻以布包裹入甌蒸軟又加未盡之藥如此三次則丸劑可以久收不回潤 一法治蜜丸不回潤用火一盆水一盆將蜜丸篩盛先放火盆上烘溶即便放水盆上收乾如此數番以乾為度磁碗盛之永不回潤切記不可烘焦了丸藥此水火煉蜜之法熱則流通寒則收凝之理

### 醫畧

一百一十五 新增

附西川周氏論

### 血榮氣衛論

人之一身所以得全其性命者氣與血也蓋氣取諸陽血取諸陰人生之初具此陰陽則亦具此血氣血氣者其人身之根本乎血何以為榮榮行脉中滋榮之義也氣何以

為衛衛行脉外護衛之義也然則榮與衛豈獨無所自來哉曰人受穀於胃胃為水穀之海灌溉經絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣故清者為榮濁者為衛榮衛二氣周流不息一日一夜脉行五十度平旦以來復會於氣口所謂陰陽相貫如環之無端則是二氣者常相隨而不相離也夫惟血榮氣衛常相流通則於人何病之有一室礙焉百病由此而生矣故氣之作恙發而為怒喜悲恐寒熱驚思勞聚而為積痞癥瘕痼癰上為頭眩中為五膈下為臍間動氣或喘促或咳噫聚則中滿逆則足寒凡此者氣使之然也血之為患其妄行則吐血衄其衰涸則虛勞蓄之在上其人忘蓄之在下其人狂達寒則筋不榮而學急挾熱則毒內瘀而發黃在小便者為淋痛在大便者為腸風其於婦人月事進退漏下崩中病猶不一凡此者血使之然也夫血譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉蓋氣者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以道達病原於氣區區調血何加焉故人之一身調氣為上調血次之是亦先陽後陰之義也若夫血有敗瘀滯泥乎諸經則氣之道路未免有所壅遏又當審所先而決去之經所謂先去其血而後調之又不可

不通其變矣然而調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣而乖張如木香如官桂如細辛如厚朴以至烏藥香附我朮三稜之類治氣可也治血亦可也若以當歸地黃輩論之施之血證無以逾此然其性纏滯於胃氣有虧焉胃氣既虧則五臟六腑之氣亦餒矣善用藥者其間劑量而佐助之

### ○火濕分治

肥人氣虛生寒寒生濕濕生痰瘦人血虛生熱熱生火火生燥故肥人多寒濕瘦人多熱燥也夫以人形分寒濕熱燥此得之於外然其中臟腑為病亦有寒濕熱燥之殊不

醫界

心法附餘卷之十四

至

醫界

可不知玉匱金鑰曰肝臟由來同火治三焦包絡都無異脾胃常將濕處求肺與大腸同濕類腎與膀胱心小腸寒熱臨時旋商議惡寒表熱小腸濕發熱表寒心腎熾干二經最端的四經屬火四經濕四經有熱有寒時攻裏解表細消息裏熱表寒宜越竭表熱表寒宜汗釋濕同寒火同熱寒熱到頭無兩說六分分來火熱寒寒熱中停真浪舌熱寒格拒病機深亢則害今承遇制緊寒數熱脉正邪標本治之真妙訣休治風休治燥治得火時風燥了當解表時莫攻裏當攻裏時莫解表裏如或兩可攻後先內外分多少治濕無過似汝川此個筌蹄最分曉感謝軒岐萬

世恩爭奈醯鷄笑天小

### ○虛實分治

夫疾病之生也皆因外感內傷生火生濕濕而生熱火而生痰四者而已審其為少壯新病是濕則燥之是火則瀉之是濕而生熱則燥濕而無消熱是火而生痰則瀉火而無豁痰無餘蘊矣審其為老衰久病又當半攻半補烏如氣虛而有濕熱痰火則以四君子湯補氣而無燥濕清熱豁痰瀉火如血虛而有痰火濕熱則以四物湯補血而無瀉火豁痰清熱燥濕如此則補攻兼施庶乎可也予故曰少壯新病攻邪為主老衰久病補虛為先

醫界

心法附餘卷之十四

至

醫界

### ○雜論

大抵人之生也十六歲為春十六歲為夏十六歲為秋十六歲為冬以至六十四歲以配六十四卦且如一年四季之內豈無陰晦晴明以人身方之豈無疾病蓋人之一身血脉通貫如乾坤之轉旋江河之流注一有不通則滯而成病雖聖人亦不能免但常人則自致之所以有賴於藥之功也

○氣血偏勝而成疾藥者偏勝之氣以此之偏濟彼之偏而使之平此用藥之功也藥優於伐病而不優於養生食優於養生而不優於伐病

○治病之法先去病根然後可用收澁如瀉水然先去垢  
膿然後可加粉飾也所以粟穀龍骨之藥不可輕用

○養病之人必得吾儒主一居敬之方仍知勿忘勿助之  
戒則心火易平不忘生而拘欲疾不期愈而自愈矣

○聞之老壽者言人得元氣以生穀氣以養肉氣以輔肉  
氣勝則滯穀氣穀氣勝則滯元氣元氣充行者壽此言深  
得養生之要敢贅于此

○東坡先生云于平時細察醫之工拙至於有疾必先  
盡告以所患而後診視故中醫療疾常愈吾病于求疾愈  
而已豈以困醫為事哉今之人往往以脉試醫醫者亦不

醫者

心法附餘卷之三

李

四百八

屑問孟浪一診以自挾其兩長寧能免實實虛虛之禍哉  
盖脉理精微必盡得其所患庶幾可以意求

○察脉之法先須六部齊診看何部異於衆者便是此部  
有病然後每部另診方可得其精微無病之人左手弱右

手強是血虛右手弱左手強是氣虛有病之人左手大右  
手小是外感右手大左手小是內傷如邪氣盛脉大醫而  
使之小正氣虛脉小醫而使之大者皆效也

此條古  
能補入

○脉者暴也診脉者如暴外之人而欲知其暴內之事也  
考之字韻可見矣

○宋景濂先生云扁鵲華陀天下固不常有使有之其值

淺易之疾遇難語之人上之不足展吾術次之不能從吾  
所欲為法宜針而責我以延為病是實而究我以虛何以  
成其功哉此言深足為任醫者勸敢併及之

○大凡治病當識本末假如嘔吐痰涎胃虛不實以致發  
熱若與涼劑退熱則胃氣愈虛熱愈不退惟先以助胃止  
吐為本其熱自退縱熱不退但得胃氣已正亦可旋與解  
熱之劑又有傷寒發大熱屢經寒涼踈轉其熱仍前但用  
和調胃氣自然無事

○大抵人之虛多是陰虛火動脾胃衰弱真陰者水也脾  
胃者土也土雖喜燥然太燥則草木枯槁水雖喜潤然太

醫者

心法附餘卷之三

李

四百八

潤則草木濕爛是以補脾胃及補腎之劑務在潤燥得宜  
隨病加減

○諺有之曰人無根本水食為命盖脾胃屬土主納水穀  
人之根本也脾土雖曰惡濕然太乾何以生物是非惡濕  
惡太濕也土能尅水水大土崩理之必然甚而腫脹盖由  
於斯醫用枳朮丸以理之宜矣然多服致燥恐亡津液用  
者審之理中湯去朮加桂治奔豚動氣者可見矣

○經曰形不足者溫之以氣溫者養也溫之者所以調其  
飲食適其起居澄心息慮從容以待其真氣之復常也禮  
記所謂柔色以溫之此溫字正與彼同或以藥扶助之亦



溫養也東垣乃以溫為溫涼之溫謂宜溫藥以補元氣而  
瀉火邪世人相循而用熱藥流弊尚未盡去也請因此而  
後舉前人之說以贊之蓋欲申明其義也

○溫藥之補元氣散火邪者亦惟氣溫而味甘者斯可矣  
蓋溫能益氣甘以助脾而緩火故元氣復而火邪息矣

○東垣補中益氣湯中加炒麴生苓名益胃升陽湯血脫  
益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣陽生陰長  
諸甘藥為之先務舉世皆以為補氣殊不知甘能生血此  
陽生陰長之理故先調胃氣人之身內水穀為寶氣虛血  
弱又當求長法血虛以人參補之之法陽旺則生陰氣旺  
則生血也

○經云腎氣動氣五臟六腑之本十二經脉之根呼吸之  
門主氣之原不可不知也

○凡腎虛血寒氣逆而脹胸腹走痛中脘痞滿兩眼多淚  
此寒泣血也須用官桂當歸以溫其血蓋寒傷榮官桂當  
歸溫血之上藥古人所以致意於寒泣血者以此然必察  
脉精而問病審方可用之若血熱輕用為害匪輕

○肝者脾之賊木能勝土古人慮之經曰肝腎氣虛為病  
泄瀉亦孰知腎者所守司於下而肝者又門戶要束之其  
東則不泄也泄瀉而面色青慘者

古書謂肝經受傷所致  
故當歸厚朴湯主之

○心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏誠  
哉是言也學者惟知血之出於心而不知血之納於肝惟  
知氣之出於肺而不知氣之納於腎用藥模稜往往南轅  
而北轍矣假如血痢作恙以五苓門冬等劑行其心以巴  
豆大黃等劑逐其積而其痛獨存者血之所藏無以養也  
必佐以川芎或芎歸湯則其痛止假如喘嗽氣鳴以薑橘  
枳梗蘇桂調其氣以南星半夏細辛豁其痰而終不下降  
者氣之所藏無以散也必佐以補骨脂或安腎丸輩則其  
氣歸元病有標本治有先後綱舉而目斯張矣噫此傳心  
喫緊之法也耳目所接敢不與衛生之家共之

○氣血冲和萬病不生一有拂鬱諸病生焉故人身諸病  
多生於鬱蒼木川芎總解諸鬱越菊丸解諸鬱如婦人并  
多憂慮者必加去心貝母蓋貝母開胸中鬱結之氣詩所  
謂言採其蠹者是也

○退熱之法全在清心必用麥門冬燈草白木茯苓蓋心  
者一身之主宰而萬事之本根萬令從心心不清則妄動  
而熱不退然熱久能傷血血滯則氣鬱而熱愈不退退熱  
之法所以又在調血法用川芎當歸若夫陽浮於外則當  
斂而降之法用參苓白朮散姜棗煎服

○痰在人身非血非氣生於脾土謂之津液周流運用血



氣由之如道路然不可無者但濕盛痰多加以外感圍帶  
於中斯為患耳故風寒客之燭以相火則上攻心月而為  
暗風痰厥暑濕乘之血氣相著則附於筋骨而為腫毒癰  
瘰又有心風者何也蓋君火在心因怒發之相火助盛痰  
動于中協氣上攻迷其心竅則為狂為癲所怒之事繆固  
於心輒自言談失其條序謂之心風與風何干也若痰不  
盛者則有感亦輕初在皮膚以傳經絡若是治療依時或  
汗或下由是解矣凡有怪證莫不由茲丹溪十病九痰之  
論豈欺我哉故智者覺其濕盛除以二陳之類亦非未病  
而治之理乎

醫界 心法附餘卷之三

金

四百八十八

○傷寒內實大熱通利之後已經得瘥且量進白粥兩三  
日未可遽與和胃之劑熱氣得之又復作也經此旋以易  
簡溫膽湯入竹茹與之或二陳湯加前胡亦可矣二藥傷  
寒瘥後通用無熱者只守本方世俗以四君子湯以貴細  
循習用之不思內有白朮溫而閉氣往往因此而燥開矣  
○寒疾人皆知用附子乾姜以溫氣而少知用肉桂當歸  
以溫血

○治瘥之法全在去水飲清瘀血惟水飲所以作寒熱惟  
瘀血所以增寒熱寒熱不歇有根惟癖為瘥之母惟瘀血  
為暑熱之毒有汗以扶正氣為王無汗以散邪氣為主瘥

在陰分者須用紅花方用二陳湯加枳殼枳實諸苓澤瀉  
柴胡黃芩蒼朮神麴麥芽山查香附木通川芎荊芥有癖  
加三稜無汗加青皮紫蘇有汗泄瀉俱加白朮暑毒加香  
蒿人壯氣實者加常山草果若無內熱而有裏寒者加肉  
桂乾薑

○禁口痢必先理胸膈而後可以入腸胃蓋痢久傷陰血  
虛火上攻於胸膈之間故也

○酒雖與水同體然傷於腸胃則升之不散降之不下者  
鬱於氣分無形之位蓋逐氣升降而半有消耗之矣今人  
飲醇酒則便少此其可驗故治法宜汗宜利小便東垣以

醫界 心法附餘卷之三

金

四百八十八

為無形之物固不可後人以傷飲食同治亦不可

○酒醉宜熱湯嗽口蓋其毒在齒大醉則以熱湯於案室  
洗面數次梳頭數十梳即醒

○四君子湯用人參白朮茯苓甘草四味固補氣之要藥  
然人參動肺火吐血又嗽面黑氣實血虛陰虛之人忌之  
以沙參代之可也蓋人參味甘補五臟之陽沙參味苦補  
五臟之陰白朮補中燥濕動氣者不宜茯苓淡滲行水目  
病者不宜甘草緩中中滿者不宜須要識得監制

○四物湯用熟地黃當歸芍藥川芎四味固補血之要藥  
然地黃當歸總屬引痰損胃氣芍藥酸寒血虛寒人禁用

古人云咸芍藥以避中寒誠不可忽川芎能散真氣久服令人暴亡亦須識得監制

○二陳湯用半夏陳皮茯苓甘草四味固治痰之要藥然半夏能燥陰血燥津液渴者禁用陳皮留白補胃和中去白消痰利氣有白朮則補脾胃無白朮則瀉脾胃有甘草則補肺無甘草則瀉脾亦須要識得監制

○三補丸用黃芩黃柏黃連三味固降火之要藥然黃連大忌猪肉黃柏峻下黃芩大寒皆能損胃氣用之宜斟酌亦要識得監制

○補中益氣湯內用柴胡升麻固善然天傾西北地不滿

東南東南人陰易升恐未為相宜

○補陰丸必以地黃為主然地黃見銅鐵服之令人腎消

男子損榮女子損衛且大忌菜菔皆能白人髮

○枳朮丸用荷葉包飯為丸恐不能盡荷葉之味不若以

荷葉煮粥夏月則以米置荷筒中數日取出再以荷葉煮粥更妙蓋荷葉內虛中空象震之體震者動也人感之則

生少陽中膽也傳曰履端於始序則不愆

○理中湯腎氣動者去朮加桂考之本書增補藥只復云

動氣者去朮加桂以桂能泄奔豚也腎惡燥故去朮也愚奔豚因土剋水而致去朮者恐土旺剋水腎氣虛不能

安而愈動也若止曰腎惡燥故云去朮則未明白耳蓋奔豚者腎之積也其人素有腎積因傷寒之邪衝下焦致其發動所以如江豚之奔衝或因汗吐之後心氣虛而攻動腎積也多用桂者以桂能泄奔豚用茯苓者以其能伐腎邪也臍下有動氣亦曰奔豚若上下左右動氣者難治也若素無腎積之人則正宜服朮故枳朮丸為常用之藥也東垣丹溪治病何常離本

仁齋直指傷寒證治奔豚動氣類有云動氣者臟氣不調築觸跳動隨臟所主而形見於臍之左右上下也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏即發奔豚以其走痛衝突如

豚之奔雖有發表攻裏之証汗之下之皆不可也愚按仁齋不言當臍動氣者何耶蓋胃為中州以主津液妄施汗下必先動脾是以不言而喻也舉此動氣非問証何以知之然則調理傷寒貴乎纖悉問證動氣通用理中湯去朮加桂蓋桂利小便泄奔豚故也奔豚一名腎氣白朮燥甚閉氣是以去之本草云白朮斂虛汗可見其為收斂之藥也

○氣不歸元破故紙為主白朮亦可者以其能和胃胃和財氣歸元但惟內邪盡去實是陽浮於外方可用此以斂之不然則白朮能閉氣反成不美

○甘草炙乾姜炮各等分每服三錢者治男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血虛極而逆氣不歸元甚効也

○補脾胃藥內必用心經藥蓋火能生土故也古方用益智仁是此意

○腎氣痛用川椒引而歸經即安

○外科藥內須用白朮白朮能生膿

○治病藥內多用辛苦甘之劑但能於三者中識得彼此相制氣味相資之法便是良醫也

○凡人四時以胃氣為本然治病必須先診六脉皆有胃

醫畧 心法附餘卷之三

五

三

氣外証須重病亦可治胃氣未絕則藥力運行而輸散於皮毛經絡故易治而生胃氣既絕則藥雖對証不能使其運用以輸精於皮毛經絡真臟而藥不及矣遂成不治之証也東垣曰脉貴有神有神者有胃氣之謂也故諸經方論皆曰有病早治療不令邪氣深入所以聖人治未病不治已病正謂此也

○凡藥內用苦寒如黃蘗之類必須以辛熱如薑桂之類佐之所以蘭室秘藏調中益氣湯後加減法云如夏月有此証為太熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以黃連酒洗黃柏酒浸知母酒浸已上各等分右為細末熱湯為丸

如梧桐子大每服一百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之不令胸中停留直至下元以瀉衝脉之邪也觀此立法皆是恐苦寒之藥泄其元氣損其脾胃脾胃虛則五臟六腑之氣皆餒而火愈盛矣所以山精膏山藥薏苡山精散為最妙之藥也

論藥

○粳米大能和胃胃和則血氣自生血氣足則調而能使真氣歸元但不能治痰和氣治病宜以陳皮為主以川芎補骨脂收其氣血之藏用黃芩柴胡調行其熱血他藥宜以類而推然凡熱皆出於心心心血不可不清麥門

醫畧 心法附餘卷之三

五

三

冬不可缺也以燈草為引子

○柴胡治熱在半表半裏既不可汗又不可下非小柴胡一劑孰能內和而外解之

○升麻似落新婦根而彼亦解毒意者其一物乎

○獨活羌活療風宜用獨活兼水宜用羌活

○栢忌取塚上者今出乾州者最佳則乾州栢茂大者皆乾陵所出也他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也

○胡黃連忌猪肉食之者漏精

○厚朴忌豆食之者動氣

○玄參犯銅餌之後噎人喉喪人目

○神麴者六神之麴也必六物備而後可以謂之神

○薄荷骨蒸熱勞用其汁與衆藥和為膏

○牛膽南星用南星為末入牛膽內臘月釀成

○當歸珍云頭止血身和血尾破血雷公云若要破血即使頭一節硬實處要止血即用尾若一時用不如不使

易老云用頭則破血用尾則止血若全用一破一止則

和血也如此紛紛不定大抵無大補血之功惟使氣血

各歸其經聖人立當歸之名必因此矣

○桔梗與木梗真相似但木梗甚腥澁又與薺花相亂而

梗有心芫無心用須去頭上尖硬二三分已來并兩畔

附枝子

○人參夏月多服發心痰薺花能亂人參薺花雖似人參

但其功專解百藥毒故味甚甜不若人參味甘而微苦

得其中和但恐責人煮而淡之

○麥門冬遠志不去心令人煩遠志苗為小草

○肉蓯忌銅

○乾薑辛多用則耗散元氣是壯火食氣故也須以生薑

草緩之

○蒼白二朮忌桃李雀蛤及三白青魚忌菜胡荽

○薏苡仁凡使勿用穢米顆大無味其穢米時人呼為梗

穢是也若薏苡仁粒小色青味甘咬著粘人齒

○貝母能治惡瘡江左有一人左膊上有瘡如人面亦無

他苦其人戲滴酒口中其面赤色以物食之亦能食食

多則覺膊內肉脹起有善醫者教以歷試諸藥金石草

木之類悉試之無苦至貝母瘡乃聚眉閉口其人喜曰

此藥可治也因以小葦筒毀其口數日成瘡遂愈然不

知何疾也 貝母中有獨顆團不作兩片無雜者誤服

令人筋脉永不收

○芍藥稍有金木二芍不同然救病止宜用金芍金芍色

白多脂木芍色紫多脉

○茯苓檮令細於水盆中攪令獨浮者去之是茯苓筋若

誤服之令人眼中童子白黑睛點小兼盲目甚忌之

○白芷凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤蕪

勿用馬蘭並不入藥

○牛膝忌牛肉

○天門冬忌鯉魚

○甘草桔梗忌猪肉

○香附知母當歸皆忌鐵

○甘草忌食粘菜食之令人病永不除

○山藥勿用平田生二二紀者或經十紀者山中生皮亦四面有鬚生者妙

○川芎大塊圓較色白不油嚼之微辛甘者佳

○木香形如枯骨油重者良行中下二焦氣須用枳櫛為使

○山梔子小而七稜者佳長大者亦可用但無力耳

○大南星無疑但市人多以由跋小者似南星殊不知南

星素桑膩肌細炮之易裂差可辨爾

○滑石白者佳餘者殺人

○天花粉即瓜蒌根必以人乳汁蒸竹瀝晒過能去上焦

痰熱渴又能止嗽潤肺

秘方

○久嗽不已加百部為主則已

○久瀉不已加破故紙肉蓯山藥則止

○久汗不出加青皮紫蘇則出

○久患血證血不歸元及久服藥無效者以川芎為君則

效或服芎歸湯

○久患氣証氣不歸元及久服藥無效者以破故紙為君

則效或服安腎丸

芎歸湯

川芎二錢 當歸一錢

水二盞姜三片棗一枚中滿者不加棗煎至七分食前

熱服

安腎丸

破故紙

懷香子

乳香

要真者不得真者則不如不用以沒藥代之

右為末煉蜜為丸空心白湯送下四十九或以煎藥吞之最妙

○肝氣不達用青皮以疎通肝氣

○身熱不退加黃芩即退或兼柴胡

○遺精不止

山藥四兩

烏藥二兩

益智仁一兩半

右為末蜜和丸空心白湯下四十九脾經濕熱脾精不

收加蒼朮腎經濕熱腎精不收加黃柏

○敗膿不去加白芷則去

○經絡不通元脉不接孔竅不疎加木通以達之

○腎火不除無根之火加玄參以除之

○火妄動夏日加滑石甘草重墜之物以鎮之益元散亦

好

益元散

滑石六兩

甘草半兩

原方一兩今減去一半

右為末每服三匙白湯調下

○水脹不除用香薷則除蓋香薷治水有徹上徹下之功  
○瘡疾久者須加白豆蔻以寒藥佐之蓋白豆蔻能消能  
磨流行三焦補上焦元氣馨香之氣味上行胃氣而疾  
自愈矣

○吐血大作無可奈何究其源有實火則以大黃下從大  
腸去蓋果是正氣虛而全無邪則當不吐

○治心漏方

胃前有孔常出血水謂之心漏此病醫書少載人多不  
知又能去腰痛

醫書

心法附餘卷之四

五九

卷之三

嫩鹿茸

去毛酥炙

附子

炮去皮脂

鹽花

右三味等分為末棗肉為丸每服三十九丸空心酒服

○治縣癰方

此瘡在穀道外腎之間醫書不載人所罕知初發甚小  
狀如松子漸大如蓮實治醫若遲則破大小便皆從此  
出不可治矣服此有効 橫文人甘草蘸潤水文武火  
慢炙之不可性急炙至表裏濕潤透徹每一兩用無灰  
酒二碗煮半碗溫服一日一服至消盡為度

半夏丸 治痰盛中惡欲吐

半夏一味切破  
香油炒黃

右為末麴糊為丸如梧桐子大每服十丸至三十丸姜  
湯送下量痰輕重加減用之

治火眼方

臘月羯羊膽一枚

以蜂蜜灌滿掛陰乾用時取一粒磁盞內水化開點之  
○枳朮丸用白朮須以紫蘇薄荷黃芩肉桂湯煮過東垣  
加陳皮名橘皮枳朮丸加橘半名橘半枳朮丸加麴蘖  
名麴蘖枳朮丸

○二陳湯加枳殼桔梗名枳桔二陳湯開胃膈去痰更効  
加苓連名苓連二陳湯降熱痰更妙

醫書

心法附餘卷之四

全

卷之三

○補陰丸方

黃柏三兩酒  
炒褐色

天門冬二兩

去心

牛膝二兩

去芦

菖蒲一兩

五錢

山藥四兩

麥門冬二兩

去心

知母二兩

炒去毛

加甘草少許

杜仲去粗皮炒

冬月加乾姜少許

右為末天門冬煉膏為丸淡鹽湯下四十九

○十全補陰丸

人參半兩

甘草四錢

破故紙一兩

桂二錢

山梔四錢

麥門冬一兩

去心

黃芩五錢

當歸八錢

白朮三錢

苦參二錢

菖蒲五錢

酸棗仁三錢

牛膝一兩

山茱萸八錢

去核

敗龜板五錢

五味子三錢

川芎三錢 陳皮一錢 麋鹿角三錢

右為末煉蜜丸梧桐子大用淡鹽湯送下或加茴香乾姜

○人參湯 治吐血咯血

新羅人參慢火煎服人參又能益血此方說見勞瘵類

○桂枝酒 治打撲傷墜瘀血滯悶身體疼痛

辣桂

右為末每服二錢溫酒下或未有藥倉卒且用米醋一

小盞亦散瘀血

○白朮散 治脾胃虛弱

醫署 心法附餘卷之五

白朮八分 蓮肉一錢 黃芩二分 山藥八分

神麴一錢 陳皮一錢 甘草二分

右為末白湯調下二匙或加菖蒲蒼朮主山嵐瘴氣

○加減參苓白朮散 補脾胃進飲食

白朮三錢 茯苓三錢 山藥一兩 甘草一錢

薏苡仁二兩 白扁豆七錢 陳皮七錢 麥門冬去心八錢

右為末每服二匙食前白湯調下一方加菖蒲

○加減二陳湯 能治痰火氣三者

陳皮一錢 蒼朮八分 茯苓一錢 甘草二分

白朮四分 枳殼七分 枳實二分 桔梗五錢

紫蘇三分 薄荷二分 香附七分 葛蒲一錢

荊芥六分 木通四分 川芎一錢 麥門冬五分

右用水二盞姜三片煎至八分服隨病加減藥味

○柔金丸 治脾與大腸為最解五臟結氣補少陰經血

用山梔子去皮炒焦黑為末麴糊為丸

○山精丸

用蒼朮米泔浸為末麴糊為丸或神麴糊為丸

○青金丸 治肺火降痰

用黃芩半枯半實炒黑色天門冬膏為丸

○調胃妙方

醫署 心法附餘卷之四

日間常用小茴香最妙脾腎俱虛破故紙肉蓯蓉

米尤妙脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而六腑

為之餐泄也脾腎之氣交通則水穀自然剋化

○降火妙方

用黃芩川芎能調血心火一調其熱自退心平則

血不妄行

○降火滋陰妙方

故紙山梔清晨吞下一升一提其氣歸臍一降一熨

水火相見天與地隔八萬四千里人心與腎隔八寸

四分黃庭界於二者之間

膏子藥補陰虛

天門冬去心二兩 麥門冬去心二兩 知母 菖蒲各一兩半

當歸身 白芍藥各一兩 白朮八錢 甘草半兩

黃柏蜜炙二兩 大約藥一兩用水二大碗煎至一碗去渣再熬成膏食

前白湯調服二匙中滿者去甘草

○浸酒方 熬膏亦用

黃柏 牛膝 玄參 沙參

白芍藥 蜜 山梔子 天門冬

黃芩 天花粉各一兩 當歸二錢 山藥

醫略心法附餘卷二 麥門冬半兩 甘草二錢

菽豆各二兩 用好酒燒酒浸皆可或加白朮

○散鬱湯

茯苓 陳皮各一錢 蒼朮 白芍藥

川芎 山梔各八分 枳殼 香附各七分

甘草二分

水二鍾姜三片煎七分食前熱服隨病加減

○法曰鬱則胃熱鬱散則上焦行下脘通水穀之陰自

滋沛身中之陰氣自生矣何陽盛而陰衰乎何陰虛生

內執乎陰氣不復加沙參山梔黃柏一二貼後加白朮

當歸久服用陰虛生內熱方

○陰虛生內熱方

當歸 川芎 蒼朮 陳皮各八分

白朮 麥門冬夏月多用 沙參各七分 梔子熱者炒

天花粉治痰熱渴 白芍 枳殼或酒浸各六分 玄參五分

黃柏三分 甘草二分 或以山藥代參朮

水二鍾姜三片煎至七分食前熱服久服去川芎冬月

加破故紙此方與下陰分生陽湯義相發明

○陰分生陽湯 此方與上陰虛生內熱方相為表裏

白朮七分 白芍製同前 當歸一錢 甘草二分

醫略心法附餘卷二 蒼朮五分 陳皮八分

或加參苓或以山藥代參苓姜棗煎服入蜜亦可加肉

果破故紙亦可冬日尤宜用故紙蓋以三焦者乃下焦

元氣生發之根帶也

○升陽益胃養榮湯 可常服正平人用的

當歸全用隨參朮大 山梔子炒八分

白芍炒隨白朮大 人參七分

甘草如食蒜菜以蜜代之 木通而通 白朮各五分

水二盞姜三片帶皮米一撮棗二枚食前熱服

○蒼朮山梔大能除鬱因食冷物鬱火於脾胃者故屬



脾者土也執伏地中此病多因血虛而得之也又有買  
虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之

○肉菓補骨脂二物冬月可服

○八物湯

白朮

山茱萸

牡丹皮各七

白芍五分

當歸

山藥各一

杜仲八分

五味四分

水二鍾姜帶皮三片棗二枚煎七分食前熱服

加遠志小草麥門冬生地黃牛膝

○八味丸

白芍七錢

黃柏六錢

當歸二兩

山藥三兩

山茱萸

牡丹皮各八

五味子五錢

杜仲一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大加遠志小草麥門冬生地

黃牛膝 其生地黃牛膝另用酒浸搗為膏入藥

○疥瘡方

用花椒研黃為末以檳榔一箇用香油摩搽之一掃

光神効

○醫畧一書乃予師新添周汝鳴先生舊日所言而予

私或雜記者中間皆切實理到之言人所當共理會

因附於此若夫先生之全書與其獨得之妙則既非

淺陋所能窺亦非草率所能悉記錄也 廣謹識

# 醫指

一百一十六 新譜

附古庵方氏賦

竊謂

醫雖小道迺寄死生

最要變通不宜固執

明藥脉病治之理藥性脉訣  
病機治法

悉望聞問切之情望色聞聲  
問病切脉

藥推寒熱溫涼平和之氣辛甘淡苦酸鹹之味升降浮沉

之性宣通瀉補之能

醫指心法附錄卷之三

脉究浮沉遲數滑濇之形表裏寒熱實虛之應阿阿嫩

之和弦鈎毛石之順

藥用君臣佐使主病之謂君最多輔君之謂臣  
次之應臣之謂佐使又其次之

脉分老幼瘦肥老人脉濡小兒脉數  
瘦者脉大肥者脉細

藥乃天地之精藥宜切病則切病矣  
則切病矣

脉者氣血之表脉貴有神脉中有神也  
謂有神也

病有外感內傷風寒暑濕燥火之機

治用宣通瀉補滑濇濕燥重輕之劑

外感異乎內傷外感乃有餘之症  
內傷乃不足之症

寒證不同熱證傷寒傳經之邪為熱  
傷寒傳經之邪為熱

外感宜瀉而內傷宜補

寒證可溫而熱證可清

補瀉得宜須臾病愈

溫清失度頃刻人亡

外感風寒宜分輕而解散

內傷飲食可調胃以消滯

胃陽主氣司納受陽常有餘

脾陰主血司運化陰常不足

胃乃六腑之本

脾為五臟之源

胃氣弱則百病生

脾陰足而萬邪息

調理胃脾為醫中之王道

節戒飲食過却病之良方

病多寒冷鬱氣氣鬱發熱

或出七情動火火動生痰

有因行藏動靜以傷暑邪

或是出入雨水而中濕氣

亦有飲食失調而生濕熱

倘或房勞過度以動相火

制伏相火要滋養其真陰

祛除濕熱煩燥補其脾胃

外濕宜表散內濕宜淡滲

陽暑可清熱陰暑可散寒

尋火尋痰分多分少而治

究表裏或汗或下而施

痰因火動治火為先

大因氣生理氣為本

治火輕者可降重者從其性而升消

理氣微則宜調甚則究其源而發散

實火可瀉或瀉表而或瀉裏

虛火宜補或補陰而或補陽

暴病之謂火

惟病之謂痰

寒熱濕燥風五痰有異

溫清燥潤散五治不同

有因火而生痰有因痰而生火

或鬱久而成病或病久而成鬱

金木水火土五鬱當分

泄折達發奪五法宜審

陽則生火生痰而成病

病則耗氣耗血以致虛

病有微甚

治有逆從

微則逆治

甚則從攻

病有本標急則治標緩則治本

法分攻補虛而用補實而用攻

少壯新邪專攻是則

老衰久病無補為規

醫補

心法附錄卷之三

金

卷之三

五

久病無補虛而無解鬱

陳腐或蕩滌而或消溶

積在胃腸可下而癒

塊居經絡宜消而痊

女人氣滯於血宜開血而行氣

男子陽多乎陰可補陰以配陽

從蓉山藥男子之佳珍

香附縮砂女人之至寶

氣病血病二者宜分

陽虛陰虛兩般勿紊

陽虛氣病晝重而夜輕

血病陰虛晝輕而夜重

陽虛生寒寒生濕濕生熱

陰虛生火火生燥燥生風

陽盛陰虛則生火火逼血而錯經妄行

陰盛陽虛則生寒寒滯氣而周身浮腫

陽虛畏外寒

陰虛生內熱

補陽補氣用甘溫之品

滋陰滋血以苦寒之流

醫補

心法附錄卷之三

牛

四

調氣貴用辛涼

和血必須辛熱

陽氣為陰血之引導

陰血乃陽氣之依歸

陽虛補陽而陰虛滋陰

氣病調氣而血病和血

陰陽兩虛惟補其陽陽生而陰長

氣血俱病只調其氣氣行而血隨

藏水發水以節陽氣之燔

滋水養水以制心火之亢

大降水升斯人無病	陰平陽秘我體長春	小兒純陽而無陰	老者多氣而少血	肥人氣虛有痰宜豁痰而補氣	瘦者血虛有火可瀉火以滋陰	膏梁無厭發癰疽熱燥所使	淡薄不堪生腫脹寒濕而然	壯地登高宜清熱而潤燥	南方溽下可散濕以溫寒	醫指 心法附錄卷之五	病機既明	用藥勿忒	麻黃湯發臘月寒傷榮	桂枝湯散冬天風傷衛	九味羌活湯發三時之表	六神通解散理晚發之邪	香蘇散十神湯參蘇飲發表調中	葛根湯解肌湯小柴胡和解半表	大柴胡三承氣攻熱邪傳裏	理中湯四逆湯散寒中陰經已上治外感
----------	----------	---------	---------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------	------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	---------------	-------------	------------------

補中益氣湯治飽饑勞役	升陽順氣湯療怒恐憂思	調中益氣湯調胃脾失協	參朮調中湯治脾肺俱傷	升陽散火湯升散熱邪	升陽益胃湯分消濕氣	和解散金沸草散治時行寒疫	神朮散定風餅子療暴中風邪	人參敗毒散升麻葛根湯解溫疫而身熱	陽毒升麻湯雄黃解毒丸散天行而咽疼	醫指 心法附錄卷之五	宣明雙解散主溫熱始終之要藥	藿香正氣散治暑濕內外之良方	香薷飲清暑益氣湯人參白虎湯益原散縮脾飲能驅實	虛暑氣	平胃散羌活勝濕湯升陽除濕湯五苓散朮附湯善解外	內濕邪	生料五積散解濕溫寒	防風通聖散清熱潤燥	搜風順氣丸神弓丸潤大腸燥症	黃連解毒湯三黃丸瀉三焦火邪
------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------------	------------------	------------	---------------	---------------	------------------------	-----	------------------------	-----	-----------	-----------	---------------	---------------

當歸六黃湯瀉火滋陰

防風當歸飲補虛退熱

舟車丸三花神佑丸能除濕熱濕熱則生熱

秦艽湯羌活愈風湯善解痺風燥則生風

胃苓湯主傷暑泄瀉腹疼

紫苓湯治傷寒泄瀉身熱

桂苓白朮散療霍亂而口發渴

加減理中湯治吐瀉而咽不乾

蒼朮湯胃風湯治濕傷氣分白痢便膿

地黃湯芍藥湯主熱傷血分赤痢下血

萬安散七寶飲治瘧無汗而寒多熱少

清脾飲六和湯療瘧有汗而寒少熱多

華蓋散五拗湯主喘嗽因寒外襲

洗肺散貝母散治咳嗽由火内生  
○已上發表和中以治風寒暑濕燥火

白虎湯瀉胃火有餘

八珍湯補脾陰不足

白朮和胃丸能養胃脾

寬中進食丸善滋形氣

治中湯枳朮丸和中九大安丸保和丸健脾消食

香穀丸香稜丸積氣丹妙功丸消塊丸破積除微

木香枳殼丸療食停久發黃

神妙列仙散治酒積陳成疸

木香枳朮丸化滯湯調氣進食

七轉靈應丹萬應丸取積追虫

丁香脾積丸妙應丸治心腹諸疼

大黃備急丸三陽散主卒暴百病

三稜消積丸治新傷生冷硬物內用巴豆

木香檳榔丸療久患氣食痞膨內用巴豆

巴豆斬關去時新之冷積可伏

大黃破結推陳久之熱癥宜導

氣病宜調氣用木香檳榔香附枳殼

血病宜和血以川芎當歸桃仁紅花

越鞠丸木香流氣飲開鬱氣之無形

蟠葱散撞氣阿魏丸破積血之有質

神砂一粒丹療氣鬱而為心疼

神聖代針散治血積而作疝氣

獨活寄生湯開氣血結滯在腰

當歸拈痛湯散濕熱沉凝于足

控涎丹小胃丹治濕熱流注四肢作疼

全棗丹虎骨散療氣血怫鬱遍體為病  
已上調胃消食并治氣血濕熱諸積

二陳湯以豁痰

三補丸而瀉火

六君湯豁痰補氣調胃

六物湯降火補血滋陰四物湯加黃柏知母是也

當歸龍會丸善降陰火無治脇痛

人參養胃湯能開結痰併療久瘡

太平丸消化丸治痰嗽有功

左金丸香連丸除熱痰必効

洗心散洗肝散瀉心肝之火

滾痰丸化痰丸瀉熱燥之痰

醫指心法附餘卷之三 四七湯黑錫丹開痰結心胃

清空膏涼膈散除火升頭膈

石膏羌活散祛風明目

川芎石膏湯瀉火定眩

川芎茶調散治風熱上攻頭目

葛花解酲湯療濕痰中滿胃腸

龍腦雞蘇丸除肺心虛煩

人參瀉肺湯散胸膈實火

犀角地黃湯桃仁承氣湯茯苓補心湯阿膠丸小建中湯

治火載血而上出

當歸承氣湯瑞竹蒲黃散當歸和血散聚金丸伏龍肝散  
療陽逼陰而下行

紅花當歸散千金桃仁煎六合湯理經脉不通

涼血地黃湯解毒四物湯膠艾湯治崩漏不止

金匱當歸散清熱安胎而易產

丹溪天麻丸活血保產而無驚

女金丹烏雞丸調氣血令老婦妊娠

天一丸連翹飲瀉火濕主小兒百病

醒脾散玉餅子肥兒丸香稜丸治嬰孩脾氣不足而致痰

瀉青丸奪命散抱龍丸檳榔丸療童穉肝邪有餘而生災

醫指心法附餘卷之三 金箔鎮心丸金箔鎮心丹安神定驚

五福化毒丹犀角消毒飲清熱解毒

異攻散補痘瘡之虛寒

通聖散瀉癰疹之實熱

內疎黃連湯千金漏蘆湯主陽癰腫掀向外

內托復煎散淵然奪命丹治陰疽毒蘊于中

立馬回疔丹萬靈奪命丹療疔瘡而有殊功

神効太醫膏散腫潰堅湯治瘰癧而收實効

紫金丹治藥食聚毒無癰疽疔腫主解利

如聖散療風濕諸邪及癰瘻痛風主發散

腎丸九芎歸丸療痔而清熱涼血	槐角丸烏玉丸治漏而散濕補虛	清心蓮子飲八正散治小便淋濁有虛實之分	導滯通幽湯三和散療大腸燥結有血氣之異	海藏五飲湯散五等之飲	開結枳實丸消諸般之痰	導痰湯三生丸豁痰疎風	千縉湯四磨湯下氣定喘	蘇子降氣湯消痰利氣	三因七氣湯解鬱開心	蘇青丹星香湯將痰湯豁痰而順氣	蘇合香丸烏藥順氣散勻氣散善開結氣	小省風湯青州白丸子搜風丸能散風痰	牛黃清心丸治諸痰熱而類風	諸小續命湯療直中風而在脉	三化湯主風入腑推陳潤燥	至寶丹治邪入臟散熱消風	龍星丹疎風清熱豁痰	風丹潤燥祛風瀉火
---------------	---------------	--------------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------	------------------	------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-----------	----------

養骨丹續命丹治風	清燥湯健步丸療濕	南星治風痰蒼木	夏治寒痰	紫胡瀉肝火黃連	柏瀉腎火	天門麥門	荆瀝竹	氣虛加以四君	血虛加以四物	四君補氣併益脾	四物補血兼滋腎	八物湯十全大補湯補氣血兩虛	固本丸古菴心腎丸滋心腎不足	錢氏白朮散參苓白朮散竹葉石膏湯補脾胃諸虛	丹溪補陰丸金匱腎氣丸三一腎氣丸滋真陰久損	龍氏八味丸補陰興陽	天王補心丹寧神定志	朱砂安神丸涼血清心	朱砂定志丸補虛開竅
----------	----------	---------	------	---------	------	------	-----	--------	--------	---------	---------	---------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<p>寒因熱用熱因寒用通因通用塞因塞用</p> <p><small>通因通用者通其利而塞之也</small></p> <p><small>塞因塞用者塞其下而通其上焦自開也</small></p>	<p>寒則堅凝熱則開行</p>	<p>風能勝濕濕能潤燥</p>	<p>辛能散結甘能緩中淡則利竅</p>	<p>苦以泄通酸以收耗鹹以軟堅</p>	<p>升降浮沉則順之</p> <p><small>謂順其升降浮沉之性也</small></p>	<p>寒熱溫涼宜逆也</p> <p><small>謂以寒治熱以熱治寒也</small></p>	<p>病有淺深</p>	<p>治有難易</p>
<p>醫指</p> <p>心法附錄卷之三</p>	<p>初中末三治要察</p> <p><small>初則發中則和末則收補</small></p>	<p>奇偶復七方須知</p> <p><small>七方者奇偶復大小緩急也</small></p>	<p>用藥補瀉任於味須隨時而換氣</p>	<p>依方加減存乎人要審病而合宜</p>	<p>瓊玉膏固本酒延年益壽</p> <p><small>已上補氣血臟腑</small></p>	<p>保和湯知母茯苓湯黃芪驚甲湯止嗽寧肺</p>	<p>保真湯十味人參散人參養榮湯除熱補虛</p>	<p>一秤金七仙丹烏髮駐顏</p>

<p>初感風寒乍傷飲食一藥可愈</p>	<p>諸存痼癖久患虛勞萬方難療</p>	<p>履霜之疾亟療</p>	<p>无妄之藥勿試</p>	<p>病若挾虛宜半攻而半補</p>	<p>醫稱多術或用灸而用針</p>	<p>針有劫病之功</p>	<p>灸獲回生之驗</p>	<p>針能去氣病而作痛</p>	<p>灸則消血癥以成形</p>	<p>醫指</p> <p>心法附錄卷之三</p>	<p>臟寒虛奪者治以灸熯</p>	<p>脉病掣痺者療以針刺</p>	<p>血實蓄結腫熱者宜從砭石</p>	<p>氣滯癢厥寒熱者當做導引</p>	<p>經絡不通病生於不仁者須覓醪醴</p>	<p>血氣凝泣病生於筋脉者可行劬藥</p>	<p>病慄悍者按而收之</p> <p><small>謂按之摩之也</small></p>	<p>乾霍亂者刮而行之</p> <p><small>謂刮之沙也</small></p>	<p>醫業十三科宜精一派</p>	<p>病情千萬變仔細推評</p>
---------------------	---------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------	------------------



姑撮碎言以陳管見	後之學者庶達迷津	附諸方	麻黃湯 見傷寒	九味羌活湯 見傷寒	香蘇飲 見傷寒	參蘇飲 見傷寒	解肌湯 見傷寒	大柴胡湯 見傷寒	小承氣湯 見傷寒	理中湯 見中寒	補中益氣湯 見內傷	調中益氣湯 見調胃	升陽散火湯 見火類	和解散 見傷寒	神木散 見傷風	人參敗毒散 見傷風	陽毒升麻湯 見斑疹	宣明雙解散 見傷寒	香薷飲 見中暑
			桂枝湯 見傷寒	六神通解散 見傷寒	十神湯 見傷寒	葛根湯 見傷寒	小柴胡湯 見傷寒	調胃承氣湯 見傷寒	大承氣湯 見傷寒	四逆湯 見中寒	升陽順氣湯 見諸氣	參朮調中湯 見內傷	升陽益胃湯 見內傷	金沸草散 見傷風	定風餅子 見傷風	升麻葛根湯 見傷寒	雄黃解毒丸 見喉痺	藿香正氣散 見傷寒	清暑益氣湯 見中暑

人參白虎湯 見中暑	益原散 見中暑	縮脾飲 見中暑	平胃散 見中濕	羌活勝濕湯 見中濕	升陽除濕湯 見中濕	五苓散 見傷寒	木附湯 見中濕	生料五積散 見中寒	防風通聖散 見中風	搜風順氣丸 見中風	神芎丸 見中濕	黃連解毒湯 見傷寒	三黃丸 見火類	當歸六黃湯 見盜汗	防風當歸飲子 見火類	舟車丸 見中濕	三花神佑丸 見中濕	大秦朮湯 見中風	羌活愈風湯 見中風	胃苓湯 見泄瀉	柴苓湯 見傷寒	桂苓白朮散 見中暑	加減理中湯 見霍亂	蒼朮湯 見痢疾	胃風湯 見痢疾	芍藥湯 見痢疾	萬安散 見瘡類	七寶飲 見瘡類	清脾飲 見瘡類	六和湯 見瘡類	華蓋散 見咳嗽	五拗湯 見咳嗽	洗肺散 見咳嗽	貝母散 見咳嗽	白虎湯 見傷寒	八珍湯 見調胃	白朮和胃丸 見調胃	寬中進食丸 見調胃
-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	------------	---------	-----------	----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

治中湯	見調胃	枳木丸	見痞類
大安丸	見傷食	和中丸	見調胃
保和丸	見積聚	消化香殼丸	見傷食
香稜丸	見積聚	積氣丹	見積聚
妙功丸	見積聚	消塊丸	見積聚
木香枳殼丸	見積聚	神妙列仙散	見傷食
木香枳木丸	見積聚	木香化滯湯	見諸氣
七轉靈應丹	見積聚	萬應丸	見積聚
丁香脾積丸	見腹痛	妙應丸	
大黃備急丸	見傷食	三陽散	
醫指 心法附錄卷之五			
三稜消積丸	見傷食	木香檳榔丸	見鼓脹
越鞠丸	見六鬱	木香流氣飲	見諸氣
蟠葱散	見諸氣	撞氣阿魏丸	見諸氣
神砂一粒丹	見疝痛	神聖代針散	見疝痛
獨活寄生湯	見腰痛	當歸拈痛湯	見脚氣
控涎丹	見痛風	小胃丹	見痰類
金棗丹	見痛風	虎骨散	見痛風
二陳湯	見痰類	三補丸	見補損
六君子湯	見調胃	六物湯	見勞瘵
當歸龍會丸	見腦痛	人參養胃湯	見傷寒

太平丸	見勞瘵	消化丸	見勞瘵
左金丸	見火類	香連丸	見痢疾
洗心散	見火類	洗肝散	見眼目
滾痰丸	見痰類	化痰丸	見痰類
四七湯	見痰類	黑錫丹	見痰類
清空膏	見頭痛	涼膈散	見傷寒
石膏羌活散	見眼目	川芎石膏湯	見中風
川芎茶調散	見傷風	葛花解酲湯	見傷食
龍腦雞蘇丸	見火類	人參瀉肺湯	見火類
犀角地黃湯	見吐血	桃仁承氣湯	見吐血
醫指 心法附錄卷之五			
茯苓補心湯	見咳血	阿膠丸	見吐血
小建中湯	見吐血	當歸承氣湯	見瀉血
瑞竹蒲黃散	見瀉血	當歸和血散	見瀉血
聚金丸	見下血	伏龍肝散	見下血
紅花當歸散	見經病	千金桃仁煎	見經病
六合湯	見經病	涼血地黃湯	見崩漏
解毒四物湯	見崩漏	膠艾湯	見崩漏
金匱當歸散	見產前	丹溪天麻丸	見產前
女金丹	見子嗣	烏雞丸	見子嗣
大一丸	見小兒	連翹飲	見小兒

蘇子降氣湯	見痰類	三因七氣湯	見諸氣
千縉湯	見痰類	四磨湯	見喘類
導痰湯	見痰類	三生丸	見中風
海藏五飲湯	見痰類	開結枳實丸	見痰類
導滯通幽湯	見燥結	三和散	見燥結
清心蓮子飲	見淋類	八正散	見淋類
加味槐角丸	見漏瘡	烏玉丸	見漏瘡
香殼丸	見痔瘡	芎歸丸	見痔瘡
熟金丹	見救急	如聖丹	見中風
神效太醫	見疥癩	散腫潰堅湯	見疥癩
立馬回疔丹	見疔瘡	萬靈奪命丹	見疔瘡
內托復前散	見癰疽	淵然奪命丹	見癰疽
內疎黃連湯	見癰疽	千金漏蘆湯	見癰疽
異功散	見痘瘡	通聖散	見痧疹
五福化毒丹	見小兒	犀角消毒飲	見小兒
金箔鎮心丸	見小兒	金箔鎮心丹	見小兒
抱龍丸	見小兒	檳榔丸	見小兒
瀉青丸	見小兒	奪命散	見小兒
肥兒丸	見小兒	香稜丸	見小兒
醒脾散	見小兒	玉鉞子	見小兒

犀氏八味丸	見補損	扶元丸	見赤白濁
金匱腎氣湯	見補損	三一腎氣丸	見補損
竹葉石膏湯	見補損	丹溪補陰丸	見補損
錢氏白朮散	見傷寒	參苓白朮散	見補損
人參固本丸	見補損	古菴心腎丸	見補損
八物湯	見補損	十全大補湯	見補損
四君子湯	見補損	四物湯	見補損
霞天膏	見創倉	竹瀝湯	
玄明粉	見火類	上清丸	見風熱
清燥湯	見痰類	健步丸	見痰類
換骨丹	見中風	續命丹	見中風
龍星丹	見中風	愈風丹	見中風
三化湯	見中風	至寶丹	見中風
牛黃清心丸	見中風	小續命丹	見中風
青州白丸子	見中風	搜風丸	見中風
勻氣散	見中風	小省風湯	見中風
蘇合香丸	見中風	烏藥順氣散	見中風
星香湯	見中風	滌痰湯	見中風
四靈散	見吐法	蘇青丹	見中風
底蒂散	見傷寒	稀涎散	見中風

華解分清飲 見赤白濁

固精丸 見夢遺

固真大寶丸

保和湯 見勞瘵

知母茯苓湯 見肺痿

黃芪驚甲湯 見勞瘵

保真湯 見勞瘵

一味人參散

人參養榮湯

一秤金 見烏髮

七仙丹 見烏髮

瓊玉膏 見脫顏

固本當 見脫顏

廣既類集此書以為醫道玄奧高深苟非指引門路

何由而升堂入室哉於是不揣疎庸輒將平生管見

及未各證良方為賦一篇綱目悉具名曰醫指蓋從

初學先熟乎此而入醫不難矣吁知我者其惟此賦

手罪我者其惟此賦乎 有全本在廣家

附錄

故丹溪先生朱公石表辭 宋太史濂撰

丹溪先生既卒宗屬失其所倚藉井邑失其所依憑嗜學

之士失其所承事莫不徬徨遙慕至於酒涕瀕聞之中心

尤雍咽不自勝蓋自加布于首輒相親於几杖間訂義質

疑而求古人精神心術之所寓先生不以瀟為不肖以忘

年交遇之必極言而無所隱故知先生之深者無踰於瀟

也方欲聚厥事行為書以傳來世而先生之子王汝從子

嗣記忽踏瀟門以先生從弟無忌所為狀請為表以勒諸

墓上瀟何敢辭先生諱震亨字彥脩姓朱氏其先出於漢

槐里令雲之後居平陵至晉永興中臨海太守汎始遷金

婺之義烏子孫蟬聯多發聞於世郡志家乘載之為詳當

宋之季有東堂府君者諱良祐懿然君子人也蓋以六經

為教以弘其宗府君生某某生迪功即桂迪功生鄉貢進

士環先生之大父也父諱元母某氏先生受資爽朗讀書

即了大義為聲律之賦刻燭而成長老咸器之已而棄去

尚俠氣不肯出人下鄉之右族咸陵之必風怒電激求直

于有司上下握手相戒莫或輕犯時鄉先生文懿許公講

道東陽八華山中公上承考亭朱子四傳之學授受分明

契証真切瞻望而從之者亡慮數百人先生歎曰丈夫所

字不務聞道而唯俠是尚不亦惑乎乃掘水往事焉先生之年蓋已三十六矣公為開明天命人心之秘內聖外王之微先生聞之自悔昔之沉冥顛隳汗下如雨由是日有所悟心焉融廓體膚如覺增長每宵挾冊坐至四鼓潛驗默察必欲見諸實踐抑其疎豪歸於粹夷理欲之闕誠偽之限嚴辨確守不以一毫苟且自恕如是者數年而其學堅定矣歲當寅與先生應書秋闈幸沾一命以驗其所施再往再不利復歎曰不仕固無義然得失則有命焉苟推一家之政以達於鄉黨州閭寧非是乎先是府君置祭田三十餘畝合為一區嗣人通司穡事以陳時薦然有恒登而無恒所生先乃即適意亭遺址建祠堂若干楹以奉先世神主歲時行事復考朱子家禮而損益其儀文少長咸在執事有恪深永大帶以序就列宴私治比不愆於禮適意亭者府君所造以延徐文清公之地先生弗忍其廢墜創祠堂之南俾諸子姪肄習其中包銀之令下州縣承之急如星火一里之間不下數十姓民莫敢與辨先生所居里僅上富氓二人郡守召先生自臨之曰此非常法君不愛頭乎先生咲曰守為官頭固當惜民不愛也此害將盡子孫必欲多及民願倍輸吾產當之守雖如竟不能屈縣令承好謫瀆鬼神欲令宗祠以徼福懼先生莫已與

以言嘗之曰人之死生微神實司之欲治其官孰敢于令先生曰吾受命于天何庸媚土偶為先死計耶且嶽神無知則已使其有知當此儉歲民食糠粃不飽能振吾民者然後降之福耳卒罷其事賦役無藝胥使高下其手以為民奸先生集同里之人謂曰有田則科徭隨之君等入胥吏餌而護相傾非策之上也宜相率以義紮其力之胸臆而數之衆翕然從每官書下相依如父子議事必先集若苛歛之至先生即以身前辭氣懇款上官多聽為之損裁縣大夫勸耕于鄉將有要於民先生懇其臨境邪幅扉屨往迎于道左大夫驚曰先生何事乃耶耶先生曰民有役于官禮固應尔大夫曰勸耕善乎先生曰私田不煩官勸第公田生青芻耳是時圭田賦重種戶移徙亡故先生以此為風大夫一咲而去鄉有蜀墅塘周圍凡三千六百步溉田至六千畝而贏堤壞而水竭數以旱告先生倡民興築置坊庸鑿為三實時其淺深而舒洩之民食其利後十年山水暴至堤又壞先生命再從子漳力任其事以嗣其成縣令長或問決獄得失先生必盡心為之開道東陽郭氏父子三人虐毆小民幾斃又貫鉞鰥腹逼使吞之事移義烏鞠問當共子父皆死先生曰原其故殺之情亦一人可償尔二子從父之命宜從末減若皆殺之無乃已重乎

事上從先生議張甲行小徑中適李乙荷任器來幾中甲目甲怒拳其耳而死甲乙皆貧人甲又有九十之親先生曰曹甲罪則廢法徇法甲必死親無以養亦死乙屍暴於道孰為藏之不若使竟其葬埋且慰其親徐來歸獄服中刑耳或曰甲或逃柰何先生曰若以誠待之必不尔也縣如先生言後會赦免細民有斬先生立木者先生訊之民弗服先生聞於縣將逮之人交讓民曰汝柰何犯仁人耶民曰計將安出人曰先生長者也急昇木還之當尔償民從之先生果真而不問先生客吳妙湛院尼刻木作人形以為厭盛館客陳庚得之欲發其事尼懼甚先生知之附錄 心法附錄卷之五 重

以計給陳出碎其木刻陳歸怒且置先生徐曰君乃士人獲此聲於吳楚問甚非君利儻乏金吾財可通用勿憂也尼後輦金帛為謝先生叱而去方嶽重臣及廉訪使者聞先生名無不願見既見無不欲交章薦之先生皆力辭唯民瘼吏弊必再三處額告之不啻親受其病者輩懷鄭公持節浙東九畝先生以尊客禮禮之眾或不樂競短其行於公公笑曰朱聘君盛舉諸公之長而諸公顧反短之何其量之懸隔耶皆慚不能退初先生壯齡時以母夫人痛脾頗習醫後益研確之且曰吾既窮而在下澤不能至遠冀可遠者非醫將安務乎時方盛行陳師文裴宗元所定

大觀一百九十七方先生獨疑之曰用藥如持衡隨物輕而為前却古方新証安能相值乎於是尋師而訂其說渡濤江走吳又走宛陵走建業皆不能得復回武林有以羅司徒知悌為告者知悌字子敬宋寶祐中寺人精於醫得金士劉完素之學而旁參於李杲張從正二家然此倨甚先生謁焉十往返不能通先生志益堅日拱立於其門大風雨不易或告羅曰此朱彥脩也君居江南而失此士人將議君後矣羅遽脩容見之一見如故交為言學醫之要必本於素問難經而濕熱相火為病最多人罕有知其秘者無之長沙之書詳於外感東垣之書詳於內傷兩盡之治疾方無所憾區區陳裴之學泥之且殺人先生間之夙疑為之釋然學成而歸鄉之諸醫始皆大驚中而笑且排卒乃大服相惟尊願為弟子四方以疾迎候者無虛日先生無不即往雖雨雪載途亦不為止僕夫告痛先生諭之曰疾者度刻如歲而欲自逸耶寡人求藥無不與不求其償其困阨無告者不待其招住藥往起之雖百里之遠弗憚也江浙省臣往討閩寇深入瘴地遂以病還錢塘將壯歸先生脉之曰二十日死使道經二衢時召吾可使還燕然亦不能生之也如期卒於姑蘇驛權貴人以微疾來召危坐中庭列三品儀衛於左右先生脉已不言而出或

附錄 心法附錄卷之五 重

追問之先生曰三月後當為鬼猶有驕氣耶又死其家親先生之醫載粟為壽先生辭之一少年病熱兩顙火赤不能自禁躁走于庭將蹈河先生曰此陰證也製附子湯飲之衆為之吐舌飲已其疾如失先生治病如神若此甚多門人類証有書茲不詳載先生孤高如鶴挺然不羣雙目有小大輪日出明雖毅然之色不可凌犯而清明坦夷不事表暴精神充滿接物和粹人皆樂親炙之語言有精魄金鑄鍊鑑使人側耳聳聽有驟然興起之意而於天人感應殃慶類至之說尤竭力戒厲反覆不厭故其教人也人既易知昏明強弱皆獲其心老者則愛慈詳幼者則樂恭附錄 心法附錄卷之五 重刊

順莫不皆知信忠之為美固未能一變至道去泰去甚有足觀者或有小過深掩密覆唯恐先生之知凡先生杖屨所臨人隨而化浦陽鄭太和十世同居先生為之喜動顏面其家所講冠婚喪祭之禮每容於先生而後定蓋先生之學稽諸載籍一以躬行為本以一心同天地之大以耳目為禮樂之原積養之久內外一致夜寐即平晝之為暗室即康衢之見汲汲孜孜耄而彌篤每見誇多鬬靡之士輒語之曰聖賢一言終身行之弗盡矣以為多至於括囊摘豔之辭尤不樂顧且以吾道為賤目之及自為文率以理為宗非有關於綱常者不化不經論也居室垣墉敦尚

科服御唯大布寬衣僅取蔽體藜羹糗飯安之如八珍或  
在豪大姓家當其肆筵設席水陸之羞交錯於前先生正襟默坐未嘗下箸其清脩苦節能為人之所不能為而於世上所悅者澹然無所嗜惟欲聞人之善如恐失之隨聞隨錄用為世勸遇有不順軌則者必誨其改事有難處者又導之以其方晚年識見尤卓嘗自枯蒼還道過永康謂人曰青田之民嚚悍值此法弛今垂之時必依險阻肅聚為亂已而果然又嘗告親友曰吾足跡所及廣矣風俗澆漓甚垂髫之童亦能操技謀罔上天怒已極必假手賊之盡力善以延其胤乎時方承平聞者咸笑先生之迂言未附錄 心法附錄卷之五 重刊

幾天下大亂空村無煙火動百餘里先生著書有宋論一卷格致餘論若干卷局方發揮若干卷傷寒論辨若干卷外科精要發揮若干卷本草衍義補遺若干卷風水問答若干卷凡七種徵文與義多發前人之所未發先生嘗曰義理精微禮樂制度吾門師友論著已悉吾可以無言矣故其所述獨志於醫為多先生生於至元辛巳十一月二十八日卒于至正戊戌六月二十四日瀕卒無他言獨呼嗣泥謂曰醫學亦難矣汝謹識之言訖端坐而逝享年七十有八娶戚氏道一書院山長象祖之女先三十五年卒子男二嗣衍玉汝

女四適傳似翁將長源呂文忠張思忠孫男一婿女二  
一適丁榆一尚幼其年十一月日始葬先生于其山之原  
卒後之五月也先生所居曰丹溪學者尊之而不敢字故  
因其地稱之曰丹溪先生云夫自學術不明于天下凡聖  
賢防範人心維持世道之書往往割裂撫拾組織成章流  
為詳世取寵之具間有注意遺經似若可尚又膠於訓詁  
之間異同紛拏有如聚訟其視身心皆藐然甚不相關此  
其知識反出於不學庸人之下於戲秦漢以來則或然矣  
然而靈夢不鳴孽狐之妖弗息黃鍾不奏瓦缶之音日甚  
天開文運濂洛奮興遠明九聖之緒流者遏而止之膠者  
附錄 心法附錄卷之三 五  
釋而通之一期閭廓其昏翳挽回其精明而後已至其相  
傳唯考亭集厥大成而考亭之傳又唯金華之四賢續其  
世胤之正如印印泥不差毫末此所以輝連景接而芳猶  
允著也先生少負任俠之氣不少撓屈及聞道德性命之  
說遽變之而為剛毅所以局量弘而任載重寤寐先哲雖  
日不足民吾同胞之念湏臾莫忘雖其力或弗支苟遇惠  
利少足以濡物必委蛇周旋求盡其心應接之際又因人  
心感發之機而施仁義之訓觸類而長開物成化所謂風  
雨霜露無非君子之教者要亦不可誣也致思於賢亦能  
搜隱挾秘倡明南方之絕學嬰疾之家倚以為命先生一

布衣耳其澤物有如此者使其得位于朝以行其道則亦  
明效大驗又將何如哉嗚呼先生已矣其山峙淵澄之色  
井潔石貞之操與其不可傳者弗能即矣徒因其遺行而  
誦言之見聞不憚惡能得十一於千百之間哉雖然舍是  
又無足以求先生者敢撫狀之槩叙而為之銘曰  
濂洛有作性學復明考亭承之集厥大成化覃荆楊以及  
閩粵時兩方行區萌畢達世胤之正實歸金華縣延四葉  
益輝其葩辟諸上尊寘彼達路隨其志分不爽其度有美  
君子欲振其奇血氣方剛疇能侮予七尺之軀忍令顛越  
壯齡已踰亟更其輟更之伊何我笈有書負而東遊以祛  
附錄 心法附錄卷之三 五  
所疑非刻非厲易圖易究豈止惜陰夜亦為書昔離其量  
今郭其滕始知人心與宇宙同出將用世時有不利乎惠  
家邦庶亨厥志勤我祠事以帥其宗况有書詩以陶以  
以暢其施期壽夫物苟躬可捐我豈遑恤仁義之言繩繩  
勿休昭明道真釋除欲仇上帝有赫日注吾目天人之交  
間不容粟聽者聳然如聞巨鑪有聲鏗錫無耳不聰旁溢  
予賢亦紹絕躅開闢玄微功利尤博歛具豪英變為毅弘  
所以百為度越于人咕咕世儒出入口耳競藻闢華析門  
殊軌以經為戲此孰甚焉不有躬行其失曷鐫世塗方具  
正資揚燦夢夢者天使埋其耀精神上征定為長庚與造



化遊白光煒煒表德幽墟遵古之義命曰允執是詞無愧

丹溪翁傳

戴九靈撰

丹溪翁者婺之義烏人也姓朱氏諱震亨字彥脩學者尊之曰丹溪翁翁自幼好學日記千言稍長從鄉先生治經為舉子業後聞許文懿公得朱子四傳之學講道八華山復往拜焉益聞道德性命之說宏深粹密遂為專門一日文懿謂曰吾卧病久非精於醫者不能以起之子聰明異常人其肯游藝於醫乎翁以母病脾於醫亦粗習及聞文懿之言即慨然曰士苟精一藝以推及物之仁雖不仕於時猶仕也乃悉焚棄向所習舉子業一於醫致力焉時方盛行陳師文裴宗元所定大觀二百九十七方翁躬晝夜是習既而悟曰操古方以治今病其勢不能以盡合苟將起度量立規矩稱權衡必也素難諸經乎然吾鄉諸賢鮮克知之者遂治裝出游求他師而叩之乃渡浙河走吳中出宛陵抵南徐達建業皆無所遇及還武林忽有以其郡羅氏告者羅名知悌字子敬世稱太無先生宋理宗朝寺人學精於醫得金劉完素之再傳而旁通張從正李杲二家之說然性偏甚恃能厭事難得意翁往謁焉凡數往返不與接已而求見愈篤羅乃進之曰子非朱彥脩乎時翁已有醫名羅故知之翁既得見遂北面再拜以謁受其所

教羅遇翁亦其懼即授以劉張李諸書為之敷揚三家之旨而一斷於經且曰盡去而舊學非是也翁聞其言渙然無少疑滯於胃臆居無何盡得其學以歸鄉之諸賢泥陳裴之學者聞翁言即大驚而嘆且排獨文懿喜曰吾疾其遂廖夫乎文懿得未疾醫不能療者餘數年翁以其法治之良驗於是諸醫之嘆且排者始皆心服口譽數年之間聲聞頓著翁不自滿足益以三家之說推廣之謂劉張之學其論臟腑氣化有六而於濕熱相火三氣致病為最多遂以推陳致新瀉火之法療之此固高出前代矣然有陰虛火動或陰陽兩虛濕熱自盛者又當消息而用之謂李之論飲食勞倦內傷脾胃則胃脘之陽不能以升舉并及心肺之氣陷八中焦而用補中益氣之劑治之此亦前人之所無也然而天不足於西北地不滿於東南天陽也地陰也西北之人陽氣易於降東南之人陰火易於升苟不知此而徒守其法則氣之降者固可愈而於其升者亦從而用之吾恐反增其病矣乃以三家之論去其短而用其長又復參之以太極之理易禮記通書正蒙諸書之義貫穿內經之言以尋其指歸而謂內經之言火蓋於太極動而生陽五性感動之說有合其言陰道虛則又與禮記之養陰意同因作相火及陽有餘陰不足二論以發揮之

論相火有曰陽動而變陰靜而合而生水火木金土然  
有二焉曰君火曰相火君火者人火也相火者天火也火  
內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質  
相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命  
故謂之相天生物恆於動人有此生亦恆於動然其所以  
恆於動者皆相火助之也見於天者出於龍雷則水之氣  
出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而  
腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配  
三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此  
火不能生人非此火不能以有生天之火雖出於木而皆  
附錄 心法附餘卷之三 四十五  
本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛  
不能波矣鳴也飛也波也動而為相火者也肝腎之陰悉  
其相火人而同乎天也或曰相火天人所問東垣何以指  
為元氣之賊又謂火與元氣不兩立一勝則一負然則如  
之何而可使之無勝負乎曰周子曰神發知矣五性感動  
而萬事出五者之性為物所感不能謂之動者即內經五  
火也相火易動五性厥陽之火又從而扇之則妄動矣火  
既妄動則煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以  
暑與濕言之而相火之氣則以火言蓋表其暴悍酷烈有  
傷於君火也故曰相火元氣之賊周子曰聖人定之以中

正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常為之主而人心無  
聽命焉此善處乎火者也人心聽命於道心而又能主之  
以靜彼五火將寂然不動而相火者惟有扶助造化而為  
生生不息之運用爾夫何元氣之賊哉或曰內經相火註  
言少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何也曰  
足太陽少陰東垣嘗言之治以炒栢取其味辛能瀉水中  
之火戴人亦言膽與三焦肝與胞絡皆從火治此歷指龍  
雷之火也余以天人之火皆生於地如上文所云者實廣  
二公之意耳或曰內經言火者非一往往於六氣中見之  
而言臟腑者未之有也二公豈他有所據耶曰經以百病  
附錄 心法附餘卷之三 四十六  
皆生於風寒暑濕燥火之動而為變者岐伯歷指病機千  
九條而屬火者五此非相火為病之出於臟腑者乎考之  
內經諸熱皆愈則屬之火諸狂躁越則屬之火諸病附腫  
痛酸驚駭則屬之火又原病式曰諸風掉眩屬於肝火之  
動也諸氣膈鬱病痿屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾  
火之勝也諸痛痒瘡瘍屬於心火之用也是皆火之為病  
出於臟腑者然也噫以陳無擇之通敏猶以暖熾論君火  
自用之火論相火是宜後人之聾瞽哉其論陽有餘陰不  
足有曰人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為  
血然氣常有餘而血常不足何為其然也天大也為陽而

運於地之外地虛天之中為陰而天之大氣舉之日寧也  
屬陽而運於月之外月缺也屬陰而稟日之光以為明者  
也則是地之陰已不勝夫天之陽月之陰亦不敵於日之  
陽天地日月尚然而況於人乎故人之生也男子十六歲  
而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺  
水穀之養而後陰可與陽配成乎人而為人之父母古人  
必近三十二而後嫁娶者可見陰氣之難於成而古人  
之善於保養也錢仲陽於腎有補而無瀉其知此意者乎  
又按禮記註曰人惟五十然後養陰者有以如內經曰年  
至四十陰氣自半而起居衰矣男子六十四歲而精絕女  
子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止為三十年之運用  
而竟已先虧可不知所保養哉經曰陽者天也主外陰者  
地也主內故陽道實陰道虛斯言豈欺我哉或曰遠取諸  
天地日月近取諸男女之身曰有餘曰不足吾已知之矣  
人在氣交之中今欲順陰陽之理而為攝養之法如之何  
則可曰主閉藏者腎也司疎泄者肝也二臟皆有相火而  
其系上屬於心心君火也為物所感則易於動心動則相  
火翕然而隨聖賢教人收心養心其旨深矣天地以五行  
更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月  
屬巳五月屬午為火大旺火為肺金之夫火旺則金衰六

月屬未為土大旺土為水之夫土旺則水衰况腎水嘗藉  
肺金為母以補助其不足古人於夏月必獨宿而淡味蔬  
蔬業業保養金水二臟正嫌火土之旺而內經又曰冬不  
藏精者春必病溫十月屬亥十一月屬子正火氣潛伏閉  
藏以養其本然之真而為來春升動發生之本若於此時  
不恣欲以自戕至春升之際根本壯實氣不輕浮尚何病  
之可言哉於是翁之醫益聞四方以病來迎者遂輻輳於  
道翁咸往起之其所治病凡幾病之狀何如施何良方飲  
何藥而愈自前至今驗者何人何縣里主名得諸見聞班  
班可紀蒲江鄭義士病滯下一夕忽昏仆目上視洩注而  
汗瀉翁診之脉大無倫即告曰此陰虛陽暴絕也蓋得之  
病後酒且內然吾能愈之急命治人參膏而且提灸其氣  
海項之手動又頃而唇動及參膏成三飲之甦矣其後服  
參膏盡數斤病已天台周進士病惡寒雖暑亦必以綿蒙  
其首服附子數百增劇翁診之脉滑而數即告曰此熱甚  
而反寒也乃以辛涼之劑吐痰一升許而蒙首之綿減半  
仍用防風通聖飲之愈周固喜甚翁曰病愈後須淡食以  
養胃內觀以養神則水可生火可降否則附毒必發殊不  
可救彼不能然後告疽發背死浙省平章南征聞與還病  
及冒醫以為可治翁診其脉告曰公之病不可言也即出

獨告其左右曰此病得之驚後而使內火木之邪相挾氣傷液亡腸胃枯損食雖入而不化五臟皆無所稟夫此十日元果如言鄭義士家一少年初病熱口渴而妄語兩額火赤豎作大熱治翁診之脉弱而遲告曰此作勞後病溫惟服補劑自己今六脉皆搏手必涼藥所致竟以附子湯啜之應手而瘥浙東憲幕傅氏子病妄語時若有所見其家妖之翁切其脉告曰此病痰也然脉虛弦而沉數蓋得之當暑飲酸又大驚傳曰然嘗夏因勞而甚渴恣飲梅水一二升又連得驚數次遂病翁以治痰補虛之劑處之旬浹愈里人陳時叔病脹腹如斗豎用利藥轉加翁診之

附錄 心法附餘卷之五

脉數而濇告曰此得之嗜酒嗜酒則血傷血傷則脾土之陰亦傷胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降而否矣陳曰其以嗜酒前後瘦見血者有年翁用補血之劑投之驗權貴人以微疾來召見翁至坐堂中自如翁診其脉不與言而出使詰之則曰公病在死法中不出三月且如鬼錄顧猶有驕氣耶後果如期死一老人病目無見使來求治翁診其脉微甚為製人參膏飲之目明如常時後數日翁復至忽見一豎在庭煉礬石問之則已服之矣翁愕然曰此病得之氣太虛今不救其虛而反用礬石不出此夜必死至夜參半氣奄奄不相屬而死一男子病小便不通醫治

以利藥益甚翁診之右寸頗弦滑曰此積痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦閉則下焦塞譬如滴之器必上竅通而後下竅之水出焉方以法大吐之吐已病如失一婦人病不知人稍蘇即號叫數四而復昏翁診之肝脉弦數而且滑曰此怒思所為蓋得之怒而強酒也詰之則不得於夫每遇夜引滿自酌解其懷翁治以流痰降火之劑而加香附以散肝分之鬱立愈一女子病不食面壯卧者且半載醫告術窮翁診之肝脉弦出左寸曰此思男子不得氣結於脾故耳叩之則許嫁夫入廣且五年翁謂其父曰是病惟怒可解蓋怒之氣擊而屬木故能衝衝其土之結今第觸之使怒耳父以為不然翁入而掌其面者三責以不當有外思女子號泣大怒怒已進食翁復潛謂其父曰思氣雖解然必得喜則庶不再結乃詐以夫有書旦夕且歸後三月夫果歸而病不作一婦人產後有物不上如衣裾醫不能喻翁曰此子宮也氣血虛故隨子而下即與黃芪當歸之劑而加升麻舉之仍用皮工之法以五倍子作湯洗濯雖其皮少頃子宮上翁慰之曰三年後可再生兒無憂也如之一貧婦寡居病癩翁見之惻然乃曰是疾也號難治者不守禁忌耳是婦貧而無厚味寡而無欲庶幾可療也即自具藥療之病愈後復投四物湯

附錄 心法附餘卷之五

數百劑遂不發動翁之為醫皆此類也蓋其遇病施治不膠於古方而所療皆中然於諸家方論則靡所不通他人新守古翁則操縱取舍而卒與古合一時學者咸聲隨影附翁教之豐豐忘疲一日門人趙良仁問太極之旨翁以陰陽造化之精微與鑿道相出入者論之且曰吾於諸生中未嘗論至於此今以吾子所問故偶及之是蓋以道相告非徒以醫言也趙出語人國翁之鑿其殆橐籥於此乎羅成之自金陵來見自以為精神景學翁曰仲景之書收拾於殘篇斷簡之餘然其間或文有不備或意有未盡或編次之脫落或義例之乖舛吾每觀之不能以無疑因

附錄 心法附餘卷之十四 百三十三 雜記

畧摘疑義數條以示羅尚未悟又遇治一疾翁以陰虛發熱而用益陰補血之劑療之不三日而愈羅乃歎曰以某之所見未免作傷寒治今翁治此猶以弓歸之性幸溫而非陰虛者所宜服又况汗下之誤乎翁春秋既高乃詢張翼等所請而著格致餘論局方發揮傷寒辨疑本草衍義補遺外科精要新論諸書學者多誦習而取則焉翁簡慈貞良剛嚴介特執心以正立身以誠而孝友之行實本乎天質奉時祀也訂其禮文而敬泣之事母夫人也時其節宜以忠養之寧歟於已而必致豐於兄弟寧薄於已子而必施厚於兄弟之子非其友不友非其道不道好論古今

得失慨然有天下之憂世之名公卿多折節下之翁謂真陳治道無所顧忌然但語及榮利事則拂衣而起與人交一以三綱五紀為去就嘗曰天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉夫行本也辭從而生者也苟見枝葉之辭去本而末是務輒怒溢顏面若將免焉翁之卓卓如是則醫又特一事而已然翁講學行事之大方已具吾友宋太史廬所為翁墓誌茲故不錄而竊錄其鑿之可傳者為翁傳庶使後之君子得以為互考焉

論曰昔漢嚴君平博學無不通賣卜成都人有邪惡非正之問則依著龜為陳其利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠史稱其風聲氣節足以教貪而厲俗翁在發得道學之源委而混迹於鑿或以鑿來見者未嘗不以得精毓神開其心至於一語一默一出之處凡有關於倫理者尤諄諄訓誨使人奮進感慨激厲之不暇左丘明有云仁人之言其利溥哉信矣若翁者殆古所謂直諒多聞之益友又可以醫師少之哉

賢官

丹溪心法附餘卷之二十四 終

醫官

國史館藏

經籍

丹溪心法附餘二十四卷

內府藏本

明方廣撰廣字約之號古齋休寧人是書成於嘉靖丙申因程用光所訂朱震亨丹溪心法贅列附錄與震亨本法或相矛盾乃削其附錄獨存一家之言別以諸家方論與震亨相發明者分綴各門之末然均非震亨之原書矣

# 上池雜說一卷

〔明〕馮時可撰

中國科學院圖書館藏清道光十一年六安

晁氏木活字學海類編本

附《四庫全書總目·上池雜說

一卷》提要

## 上池雜說

明 雲間馮時可元成著

人以陽氣爲主陰常有餘陽常不足近世醫工迺倡爲補陰之議其方以黃柏爲君以知母地黃諸寒藥爲佐合服升斗以爲可以保生噫左矣人之虛勞不足怠情嗜臥眩暈痺塞諸厥上逆滿悶痞隔誰則使之陽氣虧損之所致也迺助其陰而耗其陽乎人之一身飲食男女居處運動皆由陽氣若陰氣則隨陽運動而主持諸血者也故人之陽損但當補之溫之溫學海類編 六 上池雜說 一 藝能

補既行則陽氣長盛而百疾除焉

醫之用術惟吐利汗下與解表攻裏之法耳不能一病而自爲一法也今人遇病立方動輒二十餘品少亦不下數品豈知仲景諸名醫之心法哉吾觀古人率用成方加減不過一二味非有違戾未嘗輒易正謂宜汗宜吐宜下宜解表裏者病情有限故攻病之法亦有限也豈得動用己見隨意立方耶藥性有刑反忌宜處味既多莫識其性爲害不少故余欲世人須洞識病情恪遵古劑而後可

藥籠中物何所不可用貴當病情耳今醫工見藥味平緩者肆意增損呼爲醫中王道入亦利其無患而樂就之若稍涉性氣猛利之藥則束手不敢用稍用之人爭指爲狼虎不之近噫工師斷木尙取斧斤之利者至於用藥則取其鈍而舍其利何哉以此知不敢用猛烈之藥皆不深脈理不明病情者也

邵堯夫曰百病起於情情輕病亦輕諸病執非起於情

耶蓋人生以氣爲主情過喜則氣散怒則氣升哀則

氣消勞則氣耗驚則氣亂思則氣結欲則氣傾寒則

學海類編 二 藝能

上地雜說

藝能

氣收炙則氣泄病由之作矣識破知節病亦少損若著物不止豈不爲有生患哉故君子貴保性而不任情斯養氣延年之術也

病者去而復來已而復作者陽衰而不能制疾故耳今不能養陽而屢事攻擊有疾者痰利則易生矣有寒者寒去則裏虛矣有積者積下則胃寒矣其病至復作也奚疑故凡病情一去之後卽當頤神養性放下萬緣調息百日以生陽氣迨於陽氣既盛則陰邪不能干而舊疾無自作矣若病情少閒卽事酬應嘯傲

如常至於復作則危期將至矣

先大夫有訓云元氣與脾氣原無二致人之元氣充足則脾氣自然磨運而元氣愈充若元氣虛眇則脾不能運而脹滿痞氣之疾作矣不肖素稟衰弱年來脾胃時作因有感於先君至教謹識於此

余幼抱脾胃飲食下輒作脹滿思之未得其原嘗讀東垣論云氣聚於脾中不得散故時作脹滿誠中病情矣但未解治之方也後讀醫學拾遺治痞論云熱既在上則內中寒凝而氣不下行故當用熱藥以溫

學海類編 二 藝能

上地雜說

藝能

中焦而下引其熱使熱得降也又產後論云非由血能搶心乃榮衛不充中焦不治氣失所依而上奔於心耳夫氣聚則爲熱散則爲虛新產之婦陰陽俱散夫氣熱則行寒則凝行則病散凝則病生邪氣乘虛不在淤血之有無故乾薑爲產後要藥辛熱故也但當溫煖正氣以致和平則百病無由生也以此互觀則東垣氣聚脾中之旨昭昭明矣

附子大黃醫者俱畏而不用然往往有因而得力者嘗聞許北門云昔患脾泄經年不愈請教於鄭澹泉令



用棗附九附子用童便煮制經日末之棗肉煉爲丸  
依服神驗近學院謝蚪峰每日進枳殼大黃九二三  
服神纔清爽都憲張廬山止之弗聽而謝體質愈充  
藥性之宜於人非庸醫所能識也

今之治目者大都用涼藥點治不知目者血之華血得  
熱則行得寒則凝古人點目以冰片乾薑所以散其  
邪於外也故精明之府不可一毫渣滓當外傳熱藥  
以散其邪則睛膜舒轉內用溫藥以和其血則血脈  
通利目未有不可治者但外用熱藥若甚痛不可忍

學海類編

上池雜說

四

藝能

然拔去邪毒所謂一勞永佚者此醫學拾遺之論揭  
之

目得血而能視血冷則凝此理易明也而醫則罕知之  
鄰有管連雲之迺眷目患沿眶紅爛數年愈甚百計  
治之不能療爲延吳御醫診之曰吾得之矣爲治大  
熱之劑數服其病如脫目復明問之曰此不難知也  
此女人進涼藥多矣用大熱劑則凝血復散前藥皆  
得奏功此可爲治眼之良法吳忘其名專用附子人  
呼爲吳附子云

高安姚姓年三十時患弱氣息僅屬亦涉醫書欲取附  
子服之初皆疑弗與後病將殆不得已聽之服至一  
斤許疾遂愈生三子今近七旬常疑其或作附毒竟  
無他雖老猶閒服之不輟

顧色泉老醫年六十有五因盛怒疽發於背大如孟四  
圍色黑召瘍醫治之用冷藥敷貼敷已覺涼約曰七  
八日後爲用刀去淤肉顧俟其去曰四圍色黑乃血  
滯更加冷藥非其治也乃更治熱敷藥去舊藥敷之  
覺甚痒終夜明日色鮮紅掀腫亦消惟中起數十孔

學海類編

上池雜說

五

藝能

如蜂房一日許又覺惡心作嘔視一人頭如兩人頭  
自診曰此虛極證也用參附大劑進二服視已正矣  
不數日竟愈終無刀鍼之苦噫用藥係人生死若此  
證危如累卵稍一誤投難乎哉

顧色泉云凡瘡毒屬陰者必用熱藥如天雄附子之類  
皆生用庶可起死回生余問其證曰如對口陰發伏  
疽捫不知痛疽不起泡四圍如墨黑者是老人虛弱  
之人尤宜用之竊以爲瘡之陰陽一時難辨瘍醫遇  
此率用寒涼殺人多矣熱藥回生其功甚巨稍涉遲

疑生死反掌

丹溪之治吐衄率用黃柏一味或并用芩蓮生地門冬等味名曰滋陰降火近有議其後者曰元氣虧損之人有何火降乃虛證耳復令脾胃冰寒陽氣衰敗何以自全此所以沈困累年而後已也余以爲丹溪之見未可全非而議者之意良是今遇前證應以丹溪之法降其上升浮遊之火俟炎火稍退然後逐其淤血而以補助元陽溫和血氣之藥收功不亦可乎

家僕名賈者之金陵路遘寒證餌藥少瘥故好酒卽飲

李海類編

卷六

上池雜說

六

藝能

酒一二甌及水飯一盂病迺大作氣喘急吐痰竟夕不寐連三日余曰病且急矣奈何請醫與商推以瓜蒂散吐之遂吐痰幾半桶後吐一塊如豬腦血食相裹不二三日遂起

婦女病患率多心腹疼痛痞滿諸疾大都由於氣血凝聚致然庸醫妄投藥餌補之則益患稍削之則損元氣治之當有法先大夫宦長沙張碧泉夫人病血壅腹痛甚已死先大夫令用薑葱麝香真血竭慰其臍經行而病愈一婦人患血痞服藥多方未效張小泉

用通利行氣之藥爲餅貼其臍半日頻氣洩而散可見病在下者湯飲未易効須以意揣量治之使消散於下可也

痘疹之發根於骨髓臟腑與諸瘡瘍不同曾有人年十五歲而出者問之云極痛不可忍渾身如列鐵釘殆不能展側沈虛明善幼科一責公止一子將之官與別沈囑之曰出痘切莫用藥用藥則反傷生上痘不必用藥下痘用藥亦無功中痘則須藥扶持然未必得人則不如不藥之爲愈也旣而責公之任其子出

李海類編

卷六

上池雜說

七

藝能

痘不藥而愈竟如沈言

家妹年七歲下痢純血時丁倭亂徙避吳中醫者已辭莫救矣先憲副公語不肖當可救否曰痢疾起於氣滯兒欲飲以萬病解毒丹下之疏通其氣庶幾可治乃磨服一錠未可因再磨服一錠厥明大下卽進粥兩甌其病遂愈以此知解毒丹之效神妙莫比一名紫金錠子具載方書

王典者徽人寓京師通籍太醫院徐南湖爲侍御時嘗識之且屢驗其方藥每記憶之晚歸鄉患腸癖下血

諸醫治弗愈且殆南湖曰吾思用王典醫爲致書召之王至診其病曰非腸癖也連進黃硝之劑大下之復診曰病未盡也再進前劑復下痰積桶餘曰可以治矣調理而愈所下穢更無血積腸癖遂除以此見腹爲熱滯不能通血腸胃逼窄而血下耳眾醫皆以血治故不效也南湖自此更十年患他病殂

曾憶某醫書論倒倉一法非丹溪心印迺傳自西域異人者恐門人妄記也夫虛羸之人雖有積聚止宜養正積除宜宜傾瀉倉廩以損正氣此可戒也其言

學海類編

上池雜說

八

藝能

良是南都一醫者最稱知名士又善導引術偶苦壅滯因用前法大瀉不能起於廁遂殞余問其年則六十餘矣夫六十餘者豈宜行大吐下之法哉以是知醫者不貴知法又貴知理此醫豈能明於盈虛消息之理哉

一富室患中寒陰證名醫盈座最後延吳御醫至診之曰非附子莫救但忘攜來令人之市揀極重者三枚生切爲一劑計重三兩投之眾醫吐舌潛裁其半以兩半爲劑進之病遂已吳復診曰何減吾成藥也問

之知減其半曰噫嘻吾投三枚將令活三年也今止活年半耳後年餘復病而卒脈藥之神如此

張鶴僊名醫也其醫效有足采者張嘉興人少孤始攜藥裹入吾郡未知名也一日郁溫州水軒患陽證傷寒稟氣又薄羣醫束手不敢下曰脈已絕矣下之則死張診其足脈獨大曰可治遂投大承氣湯一劑而愈名遂振後有巡院楊裁庵者按松證如前郁薦之復愈由是吳之稱明醫者首鶴僊召視者滿吳下終其身取效無慮數百多以大黃之功俗遂稱張大黃

寧海類編

上池雜說

九

藝能

云自己常進大黃九子合許曰此瀉南方補北方人弗知也年九十卒

錢漸川幼攻文勤苦久之抱鬱成疾上焦苦咽閉中焦苦隔噎煩悶下焦則苦遺濁極而嘔血幾殆眾醫治之罔效偶值常熟顧愛杏至以疾叩請詢眾治按曰諸君治法未嘗誤也而弗效者證雜而藥淆也今請分治之上焦用藥清火解毒食飽服之中焦用藥開鬱除煩食後服之下焦用藥升降水火空心服之品不過三四劑不過五六俱奏驗病若失錢後強健如

故登仕版此明醫不失治法之效與

因病服藥喻如因漏船船艙久木朽則油料無所用矣  
是知舟之載以木非以艙人之生以氣非以藥今人  
竭精神以逐外物疲有用以事無用曰吾有藥焉是  
何異鑿舟沈舸而恃艙哉先輩沈東老性澹泊五旬  
餘合服人乳藥丸于久不輟年八十五卒卒之前半  
歲藥不能進矣

製附子須大熟不爾則有癰疽之禍耳聞中附子毒而  
發瘍者如武林童南恆是已童年五十好長生術交

學海類編

上池雜說

十 藝能

與多方士有進熱藥以助陽者童信之中有附子全  
劑百九僅進四十五丸疽發於腦竟卒詢知附子性  
毒多上升故中其毒者未嘗不發毒腦背多至不救  
藥不可不慎也雖然童所進藥當不止附子應是羣  
諸熱藥爲劑故其禍極烈耳

世人相傳灸不著抵吃藥達比屋不拘何病一槩火攻  
至有因灸反甚往葺年月以亡者可惜也不知藏寒  
而病滿與體厚而形充者於法宜灸安有病弱之人  
肢體羸瘦而顧槩施火攻爲也火攻爲病百端而耗

血爲尤甚不可不知或問其目曰虛者不灸弱者不  
灸脈浮者不灸脉微數者不灸溼家身疼煩者不灸  
若不審其宜而槩加灸炳其不至於危殆者幾希  
俗傳花香不宜嗅嗅之易生癆瘵余嘗驗之晨起見夜  
合花其時含蕊將放窺其中有細黑蟲縱橫不計其  
數少頃花大開復窺其中無有矣其花傍坐亦未見  
有一蟲飛出倏忽之間何以始夥而終無以此見嗅  
花得香非得香也得蟲也香盛則成蟲其理有不可  
測者

學海類編

上池雜說

十一

藝能

上池襍說一卷

編修程普  
芳家藏本

明馮時可撰時可有左氏釋已著錄此乃其襍論  
醫學之書大意主於溫補伸東垣而抑丹溪亦偏  
於一隅之見者也